


Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
596/A/1




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
596/A/1






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
596/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
596/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
596/A/1

A xxix. Bac



596/A/1
2 volumes
complete

5964
— A/1

Quintil
500 f. f.
8 Aug. '28.

48274 (v)

IOANNIS


BACCHANELLI
De cōsensu Medico-
rum in cognoscendis
Simplicibus, Liber.

LVTETIAE.

Apud Carolum Stephanum,
Typographum Regium.

M. D. LIII.

Des Hayes






IOANNIS

BACCHANELLI

De consensu Medicorum
in cognoscendis
Simplicibus, Liber.



ABRONVM duplex, alterum masculum,
quod omnibus notū est:
alterum foemellum, quod
uulgò dicitur Sātolina,
et est humilis cypressus.

Diosc. cap. 26. tertiij libri
uersione Marcelli. Gal. 6. de fac. simp. Plin.
lib. 21. c. 10. Paul. li. 7. calefacit et siccatur in 3.

Absinthium triplex, uulgare nostrum, Se-
a. 4.

4 DE CONSEN. MEDIC.

riphium, quod marinum appellatur: & San-
tonicum, quod plurimum in Gallia ultra Al-
pes nascitur, & est illud iuxta Mathiolum
Senensem, cuius semen uulgò dicitur Semen-
rina, quæ pro uerberibus datur pueris. Et no-
ta quòd Canabel Serapionis, non est Semen-
rina, ut uolunt aliqui, sed est terra arenosa
pluuialis, uide Dioscor. cap. 24. & 25. lib. 3.
& Gal. 6. de fac. simpl. ubi amaram & ad-
strictoriam ac acrem qualitatem illi tribuit.
Paul. lib. 7. cal. in 1. sic in 3.

Acacalis nisi sit species tamarisci, haud
scio quid sit, quoniam nullum semen uideri
potest, quod sit huic simile. lege Dioscor. ca.
103. lib. 1. Paul. lib. 7.

Acatia, non habetur uera, sed eius loco
accipitur succus prunioli agrestis communi-
ter: quāquam satius foret folijs rhus, sumach
uulgò appellati, uti, quā succo prunioli di-
cti: quoniā rhus eisdemmet facultatibus pol-
let, ac ipsa acatia, teste Dioscoride. Nec eius
gumi, quod à Serapione dicitur gumi Arabi-
cū, habetur, sed eius loco gumi utimur, quod
7. de fac. simpl. à Gal. describitur. Diosc. 118. 8.

Dr. Lalor, att. al-
a p. 2. d. q. p. l. aut p. h. r. a. f. e.
vel a. t. u. b. u. r.

cap. lib. 1. Theoph. cap. 4. lib. 3. nam acatiā simpliciter spinam uocat. Plin. lib. 24. ca. 12. Gal. 6. de fac. simpl. Siccatur in tertio, & refrigerat in secundo ordine: itidem ait Paul. lib. 7.

Acanthion quid sit nescio, etsi aliqui carduum montanum pro specie acanthij demonstrant. Dioscor. cap. 16. tertij. Gal. 6. de fac. simp. Plin. lib. 24. cap. 12. Paul. calidus est.

Acanthū domesticum & syluestrem, esse id quod uulgo branchā ursinā dicimus, aliqui affirmarunt: uide Plin. cap. 22. lib. 22. & Diosc. cap. 17. & 18. tertij: & Gal. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. discutit & siccatur.

Achillea non est millefolium, ut putant aliqui ex autoritate Plin. cap. 5. lib. 25. ubi ipse habet à Latinis millefolium uocari. Serapio uocat succum Achilleæ, eo quod rubeat, sanguinem draconis, qui nunc paratur ex sanguine arietis, sorbis & resina, & mille alijs miscellis. de Achillea Dioscor. cap. 34. quarti: Gal. 8. de fac. simp.

Acinus est iuxta Manardi opinionem basilicum syluestre, & iuxta Ruellium basilicum. a. ij.

6 DE CONSEN. MEDIC.

licum domesticum : sed huic repugnat Plin. cap. 15. lib. 21. quum dicat, acinum non florere, de acino Diosc. cap. 45. tertij. Paul. lib. 7. mediocres adstringendi vires habet.

Acorus, secundum Manardum, uerus calamus aromaticus, Brasauola tenet quòd sit galanga, aliqui quòd sit uulgare gisirium, communis opinio quòd sit calamus aromaticus. De acoro, Diosc. cap. 2. primi. Gal. 6. de fac. simp. & quinto eiusdem cap. 12. Plin. lib. 27. cap. 2. Paul. calefacit & desiccatur in tertio.

Aconitum uoluit Leonardus Fuchsius esse herbam paris, sed falsò, quum nulla sit cum descriptione aconiti similitudo. Leoniceus credidit aconitum esse napellum Auicennæ, quum sint res dissimiles, nec adeò peccauit Auicennas in descriptione napelli, prout notat Leoniceus, ut uideri potest ex Andrea Belunensi, qui Auicennæ textum optimè correxit. De aconito, Dioscorid. cap. 75. & 76. quarti, duas species assignat : prima dicitur pardaliches, eo quòd pardos interficiat : altera cynoctonon & lycoclonon, eo quòd canes & lupos perdat : at mansa uel bibita ra-

dix non statim interficit hominem, sed aliquos in duobus uel tribus, uel sex mensibus perdit. Gal. 6. de fac. simp. & Dioscord. iterum lib. 6. cap. 7. Paul. lib. 7. lechalis uis & excedens est.

Adiantum, est uulgaris capillus Veneris. Theophrast. cap. 13. lib. 7. Adianti duæ sunt species, nigra & alba. uide Plin. cap. 21. lib. 22. Et Dioscor. cap. 131. & 132. de adianto & trichomane. Vocatur & adiantum politricon & gallitrichon ab ipso effectu, quem circa capillos efficit. Galen. 6 de fac. simp. In caliditate & frigiditate Symmetron est, extenuat, desiccatur, & digerit: itidem Paul. lib. 7.

AEgylops, est id quod uulgo dicitur, segalla, & non est auena, ut aliqui uolunt. Diosc. 134. quarti. Gal. 6. de fac. simp. Paul. discutit duras inflammationes.

Agallochon, est lignum aloes, nunc habetur Venerijs, & nuper eius loco afferebatur ex Rhodo oliuastum, quod à Ruellio Aspalathum creditur. Dioscor. cap. 21. primi. Gal. nullibi, quod sciam, nisi succidanens. Paul.

a.iiij.

8 DE CONSEN. MEDIC.

lib. 7. iocinerosis, dysentericis & pleureticis
opitulatur.

Agaricum notum est, ideo appellatum, eo
quod abundanter in Agaria Sarmatiae na-
scatur. Plin. lib. 16. cap. 8, Nascitur in Gal-
lia super arbores glandiferas. Diosco. cap. 1.
tertiū, In Galatia Asiae supra cedros. Sunt
qui dicant in Italia iuxta laricis arboris ra-
dices nasci. Gal. 6. de fac. simp. Paul. digerit
crassos humores & incidit.

Ageraton sunt qui dicant in Hetruria in-
ueniri, simile origano. Diosc. cap. 57. quarti,
& Gal. 7. de fac. simpl. & 6. eiusdem. Paul.
lib. 7. habet vim digerendi.

Allium, Graecè σκόροδον, duplex est, dome-
sticum & sylvestre. Domesticum σκόροδον à
Graecis dictum, sylvestre ὀφιοσκόροδον, id
est, anguinum, non autem, ut Brasauola, sco-
rodoprason uel ampeloprason: nam ampe-
loprason nil aliud est quam porrum sylue-
stre, quod in uineis reperitur, & scorodo-
prason allium & porrum significat. Diosc.
cap. 141. secundi. Gal. 8. de fac. simp. desic-
cat & calefacit in quarto excessu: uide etiā

illum secundo de facultate alimentorum in fine.

Alcea, uulgò malua sylvestris, siue althea sylvestris, non habet proprium caput apud Gal. sed in cap. de malua, de hac mentionem facit septimo de fac. simp. Diosc. cap. 155. tertij. Volunt aliqui hanc esse quam uulgò dicunt herbam Hungaricam. Paul. lib. 7. sylvestris malua genus est.

Alypon quid sit nescio. Hoc scio plures de mente Arthuarij uelle alypon esse thurbit album: nam hoc ab ipso habetur, ubi de triphe-
ra compositione agit: aliqui dicunt alypon esse alyptiam, ut Paul. AEG. aliqui dubitant an sit sena. Diosc. cap. 173. quarti. Paul. bilē atram semen alypi ducit & ulcerat.

Alyisma nisi ea sit, quam Ruellius & Fuchsius fistulam pastoris, & ab alijs plantaginem aquaticam, quæ uulgò dicitur barba syluana, affirmare ne quid audeo: aliqui dicunt esse speciem betæ aquaticæ. Diosc. cap. 160. tertij, & Plin. cap. 10. lib. 25. duas species assignat. Damasoniū etiā uocatur à Gal. 6. de fac. simp. & habet uim abstersoriam.

Alisson sicut ex Plin. cap. 11. 24. lib. excerpti-
tur, uidetur esse herba quæ Rubia minor di-
citur: uerum quia Aet. alisson uocat syderi-
tim heracleam, quæ nullam præfert simili-
tudinem cum rubia minori, idcirco quid sit
affirmare nō possum: de hac meminit Diosc.
cap. 96. tertij, & Gal. 6. de fac. simp. Non-
nulli tamen duas species assignant, inter quas
facile posset rubia minor connumerari: uerū
ea quæ morsibus canū opitulatur, deperdita
est, nec reperitur. Paul. lib. 7. siccatoriam illi
ac discussoriam, abstersoriamque uim tribuit.

Aloes tria sunt genera, hepaticum, succo-
trinum & caballinum. Diosc. cap. 23. tertij,
meminit de hepatica, & Gal. 6. de fac. simp.
desiccat in tertio, & calefacit in primo, ad-
stringitque modicē.

Althæa, uulgò maluauschio, meminit Dio-
scor. cap. 154. tertij, Theoph. cap. 19. lib. 9.
uocatur & hibiscus, & est malua syluestris.
Gal. 6. de fac. simp. sub nomine hibisci, & 7.
de fac. simp. cap. de malua. Paul. lib. 7. Dis-
cutit, relaxat, lenit & concoquit.

Alumen, iuxta Diosc. cap. 77. lib. 5. tri-

plex est, scissile, rotundum & liquidum, lo-
quendo de his quæ in medicinæ usum ueniunt
(nam plura apud nos genera nunc habentur,
sicut alumen rochæ, plumæ, facis, catini,
scaioli, & zucharini) scissile illud est quod
nos plumæ uocamus, alumen rotundum non
habetur in Italia, nec liquidum: quanquam
Brasauola affirmet esse alumen rochæ, quem
ualidissimis rationibus confutare Mathiölus
Sen. conatur. Alumen zucharinum fit ex alu-
mine rochæ, ouorum albumine, & aqua ro-
sacæa. Alumen catinum fit ex herba uocata
soda, Arabice chali, unde etiam sal alchali
prouenit. Nota est herba apud Hetruscos:
alumen scaiolum fit ex petra lucida, scamosa
& transparenti, uulgo dicta, spechio d'asi-
no: alumen facis fit ex fæce uini cõbusta. Ga-
len. 9 de fac. simp. Plin. lib. 35. cap. 15. Paul.
maximè adstringit.

Ambrosia, iuxta Ruelliũ, notissima est in
Gallia, nascitur inter segetes: uerũ eã nec ui-
di, nec scio quid sit, nisi sit species artemisiæ.
Diosc. cap. 120. tertij, & Gal. 6. de fac. simp.
Adstringit & repellit.

Ambra odorifera tres sunt species, color^e distincta, citrina scilicet, albida, & nigricans, cuius metio fit à Serap. lib. aggreg. cap. hambar. Auic. lib. 2. Calida in secundo, sicca in primo, roborat cerebrum, & cor confortat. Nullibi quòd sciam, fit mentio de hac apud Diosc. uel Gal. aut Paul. uulgo dicitur Ambracane.

Amiantus, Græcè λίθος ἀμύαντος, lapis est qui ex Cypro assertur, similis alumini scissili, similis etiā ligno: unde Brasauola dixit esse aliquos qui eū credant esse lignū crucis Christi: nā in igne positus non cōburitur, sed magis illucescit: meminit Plin. cap. 19. lib. 36. & Diosc. ca. 113. quini lib. Paul. lib. 7.

Amylum, uoce parū deflexa amido. Optimi amyli conditiones recitantur à Plin. cap. 7. lib. 18. ut sit albus, leuis, recēs, lenis. Fit amylum ex granis frumenti, ut Dioscor. cap. 92. lib. 2. Et Galen. 1. de facul. alimementorum excerptur ex Plinio, cap. 25. lib. 22. quòd amylum corpus restringit, & fluxum sanguinis, & in doloribus uesicæ media uncia sumitur cum oleo & passulis. Galen. 1. de fac. alimen. ἀποία, id est, qualitate carentem. Paul.

IN COGNO. SIMPLIC. 13

Refrigerat mediocriter & siccatur.

Ammi, seplasiarijs ameos, & est simile semen cymino, ut testatur Plin. cap. 15. lib. 20. Et Galen. 6. de fac. simp. huius meminit, & Dioscor. cap. 63. tertij. Quod uerò accipitur pro ammi non est uerum, sed quid sit nescio. Paul. Calefacit & siccatur in tertio. Gal. 5. de fac. simp. itidem ait.

Ammonicum, uulgò in officinis dicitur armoniaco, & est duplex iuxta Plin. cap. 24. lib. 12. primū thrausma dictum, & altero est excellētius. alterū phyrama, & est crassum, & ueluti resina. Primum thuris similitudinem præ se fert, unde à Paulo & Aetio ammoniacum thymiama nūcupatur: meminit Dioscor. ca. 89. tertij, & Gal. 6. de fac. simpl. Auer. 5. collig. Calidum in tertio, siccū in primo. Paulus lib. 7. Molliendi uires habet.

Amomū uerum, nonnulli uolunt esse rosam de Hierico, non uerum esse quoddam semē habitum: sed credo uerum non haberi, si rectè eius descriptionem perpendamus. Vtemur igitur loco amomi acoro, ut placet Galen. Dioscor. cap. 14. primi. Plin. lib. 12. ca. 13. Gal. 6.

14 DE CONSEN. MEDIC.

de fac. simp. Paul. lib. 7. Eiusdem uirtutis cum acoro, sed paulò siccioris.

Ampelitis terra, Græcè γῆ ἀμπελίτις, sicuti & terra heretria, samiachia, selinusia, sunt apud me incognita. De ijs Gal. 9. de fac. simplic. diffuse, & Diosc. c. 138. lib. 5. Paul. lib. 7.

Ampelopraßon, agreste porrum, uulgò porrandello: de hoc Gal. 6. de fac. simp. meminit & Diosc. 139. secundi. Plin. lib. 24. cap. 15. Paul. li. 7. Acerrimū calidissimūq; in summo ordine, quamobrem ulcerat.

Anagallis, morsus gallinæ: non defuerint, qui portulacā syluestrem esse affirmarent: aliqui etiam dixerunt anagallidem esse pauarinam, uel centonē, sed longè à uero decipiuntur, quū flores illis non sint eius qualitatē, ac ab ipso Diosc. pinguntur ca. 170. secundi. De utraq; anagallide scripsit Gal. 6. de fac. simp. Deceptus est Razes, interpretās anagallidem pro matrisylua. Paul. Vis est abstersoria, subcalida & attractrix. Serapio lib. aggre. Calefacit parum, & siccatur sine mordacitate.

Anagyris, planta est arborescens, aliquibus herbarijs ualde cognita: hanc uoluerunt

IN COGNO. SIMPLIC. 15

quidā esse, quam dicunt esse uulvariā. Refert Mathiolus eius copiā inueniri in Trētino agro, ego eā minimè uidi. de hac Gal. 6. de fac. simp. meminit, & Diosc. c. 158. tertij. Plin. lib. 27. cap. 4. Paul. lib. 4. Calefacit & discutit.

Anchusa flores habet à buglossa non ualde dissimiles: huius tres species à Diosc. c. 25. 26. & 27. lib. 4. connumerantur, & à Plin. cap. 20. 21. lib. 22. Et à Galen. 6. de facul. simp. quatuor species. Paul. Adstringendi uim habet: aliqui hanc Asini lactucam dixere.

Androsæmon humani sanguinis herba, est species hypericonis: differt ab eo, quum frutex sit gracilibus ramulis, succosus, puniceo colore, rubentibus uirgis, &c. ut Dioscor. cap. 164. tertij, & Gal. 6. de facul. simplic. Paul. lib. 7. Duplex genus, alterum quod diximus, alterum Dionysias dictum, cuius fructus purgant, & folia desiccant.

Anemone nisi ea sit, quæ à Brasauola uocatur papauer syluestris, cuius flores sunt rubei, certè nescio si unquam uiderim: hoc scio certè non esse herbam uenti, ut Ruelius: nam herba uenti iuxta placitum Simo-

16 DE CONSEN. MEDIC.

nis Ianuensis est parietaria, quæ uulgò dicitur uitriola aut grassella: sunt qui anemone[m] uiderint longè à papauere syluestri differentem. Dioscor. cap. 167. secundi. Plin. lib. 21. cap. 23. Paul. lib. 7. Vim habet acrem, abstersoriam, & extrahēdi ac recludendi ora uasorum.

Anethum similem fœniculo effigiem præ se fert, ut uix ab ipso nisi per gustum cognoscatur. Gal. 6. de fac. sim. & Diosc. ca. 60. tertij. Paul. lib. 7. calefacit in secundo ordine intensius, & siccatur paulò remissius.

Anisum, Galen. 6. de fac. simp. semen eius dicit esse calidum & siccum in tertio gradu, & Diosc. ca. 58. tertij. Paul. lib. 7.

Angelica, calida & sicca in tertio ordine, unicè ualet contra uenena, præseruat à peste, comesta confert humori pituitoso, crasso: sanat tussim ab humore uiscoso, si eius decoctum bibatur: consolidat ulcera interiorū, coagulatum sanguinem soluit, roborat stomachum, recuperat appetitū, ualet defectui cordis & morsibus canum.

Anonis, spina est, in aratis terris nascens,

uulgò bognacho. Galen. 8. de fac. simp. Anon-
 nis calida in tertio gradu, &c. Huius memi-
 nit Diosc. ca. 19. tertij. & Theoph. cap. 5. lib.
 6. de hist. plantarum: & Plin. cap. 4. lib. 27.
 Paul. lib. 7. Vrinam ciet, calculos conterit, &
 dolores dentium mitigat.

Anthemis apud Diosc. est camomilla: duæ
 aliæ species à me non uisæ, necdum cognoscun-
 tur. Diosc. ca. 145. tertij, & Gal. ca. 9. lib. 3.
 & sex. de fac. simp. inquit, quòd camomilla ca-
 lida & sicca est in primo gradu. Paul. Virtus
 tenui discussoria laxantique constat.

Anthylus, nisi ea sit, quæ uulgò dicitur sal-
 sola de mente Ruellij, certè quid sit diuinare
 non possum: huius duæ sunt species, de quibus
 Gal. 6. de fac. simp. meminit. & Diosc. cap.
 144. lib. 3. Plin. lib. 21. cap. 29. Paul. lib. 7.
 Exiccat & absterget.

Anthirrinò, quid sit nescio, sunt qui uide-
 rint, & uulgare in Italia nasci passim affir-
 mât Diosc. 126. li. 4. & Gal. 6. de fac. simp.

Anthera non est flos, ut nonnulli putarunt,
 in medio rosarum positus, sed potius quædam
 compositio, ut ex Gal. Paul. Corn. Cel. elici-
 b. i.

18 DE CONSEN. MEDIC.

tur ad oris ulcera, & pedum scissuras, & digitorum pterigia accommodata.

Aparine inter lenes nascitur, omnibus nota, uulgò (eò quòd folia in modum calcaris habet) speronella dicitur, uel, ut aliqui uolunt, in modum stellæ folia, hæret uestibus hominum. Diosc. cap. 95. tertij. Gal. 6. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Modicè abstergit & desiccatur.

Aphace similis uiciæ, sed non est uiciæ. Theoph. 7. & 11. c. lib. 6. cōnumerauit aphacē inter species cichorij, similiter & Plin. li. 21. sed ca. 5. lib. 27. postea historiam ex Diosc. recitat: quare iuxta Diosc. connumeranda est inter legumina, non autem inter herbas syluestres. Diosc. ca. 137. secūdi. Gal. 2. de fac. aliment. Paul. lib. 7. Adstringit ualentius, siccat & mediocriter calefacit.

Apium satiuū, nil aliud est quàm uulgare petroselinum, ut testatur Plin. cap. 11. lib. 20.

Apium syluestre, quo utuntur seplasiarj pro uero apio, est apium aquaticum, eleoselinum à Diosc. dictum, ut testatur Theophrast. ca. 6. lib. 7. non autem est, ut placet Ruellio, quod uulgò dicitur il macerone. Petroseli-

num uerò, id est, saxatile apium, maximè Ma-
cedonicum, nussiam in Italia nascitur: a-
pium uerò hipposelinum dictum, id est gran-
de apium, illud esse tenetur, quod uulgò le-
uisticum dicitur. De apio meminit Diosc. 67.
68. 69. 70. & 71. tertij. & Galen. 8. de fac.
simp. & 6. eiusdem Paul. lib. 7. Tanti caloris,
ut menses & urinas eliciat.

Apios, nisi sit species raphani, haud scio
quid dicere debeam. Ruellius familiarem her-
bam esse rusticis Galliae, inquit, & communi-
ter ab ipsis edi: sed quum dicat Diosc. uomi-
tum dicere, nescio an illi credendum sit. Sunt
qui dicant uidisse inter segetes nasci cum fo-
lys rutæ, sed paulò strictioribus & uiridio-
ribus: ego nec uidi, nec scio quid sit. Diosc. ca.
170. lib. 4.

Apiastrum, Græcè *μελισσόφυλον*, uulgò
cedronella, aut melissa, aut muliserno, in pas-
sionibus cordis (si Serapioni creditur) mul-
tùm ualens. Diosco. ca. 109. tertij, & Galen.
7. de facul simpl. utitur pro marrubio dupli-
cata dosi. Paul. lib. 7. Viribus marrubio per
omnia responder.

b. ij.

Arbutus, Græcè κόμαρος, arbor similis coronæa malo, uulgò dicitur in Hetruria albatro. Diosc. cap. 143. primi, & Gal. 7. de fac. simp. Turdi libenter arbutifruitibus uescuntur in hyeme. Paul. lib. 7. Acerbæ qualitaris est, aduersatur stomacho.

Arctiō, Latinis personatia, quid sit, nisi, ut Ruelli⁹, sit lappa minor, facile dicerē me nescire, quāquam sint qui lappam minorem dicant à Diosc. uocari xanthion. De arctio loquitur Diosc. c. 101. quarti, & Gal. 6. de fac. simp. Personatia tamē est lappa maior. Plin. lib. 25. ca. 9. Paul. lib. 7. Vis tenuis siccans & mediocriter adstringens.

Argemone inter species papaueris cōnumeratur, ego tamē nusquā argemonē uidi, et si ubiq; nasci Mathiolus Sen. affirmet. Hoc bene scio, non esse agrimonium siue eupatorium, ut nonnulli. Diosc. cap. 168. secundi, & Plin. cap. 8. lib. 25. De hac apud Gal. nil memini me legisse. Paul. Abstergit & discutit.

Argentum uiuum est duplex, artificiale & minerale: sed quo pacto conficiatur, lege Dioscor. cap. 64. quinti, Gal. 9. de fac. simp. num

quam ausus est experiri, an foris uel intus applicandum foret, ueluti uenenum mortiferum.

Auer. 5. collig. ca. 9. Est frig. & humid. Galen. 4. de fac. simpl. cap. 18. Calidum est & siccum.

Aristolochia duplex est, rotunda & longa: tertia species eius est dematitidis uocata, quæ in Italia non habetur: de quarta specie facit mentionem Plin. cap. 8. lib. 25. & uocatur pistolochia. De Aristolochia meminit Galen. 6. de fac. simp. & Diosc. cap. 4. lib. 3. Commendatur in epilepsia. Paul. lib. 7. Calida, tenuis, abstergens, subacris. Auerr. Calida & sicca in secundo.

Armenius lapis, iuxta Manardi placitum, raro inuenitur: licet Mathiolus Senensis dicat in mineris argenti, huius copiam inueniri, & dici uulgò uerd'azurro, quod nec affirmare, nec negare audeo: siquidem sua experientia comprobatum refert in ijs omnibus quæ ab antiquis scripta sunt: uide Diosc. cap. 59. quinti, & Galen. 9. de fac. simp. & Alexan. Trallianum cap. 22. lib. 1. & Plin. cap. 6. lib. 35.

b. iij.

Aron, species dracunculi siue serpentaria, uocatur in Hetruria uulgò Gingaro, & fit ex eius radicibus aqua ad dealbandam faciem. Diosc. cap. 157. secundi, & Gal. 6. de fac. simp. Plin. lib. 19. cap. 5. & lib. 24. cap. 16. Et Gal. 2. de fac. alim. Paul. lib. 7. Calore & siccitate est primi ordinis, ex terrestri calida & adstringente substantia.

Artemisia, uulgò Cermisia, in hac deceptus est Brasauola, confundens Artemisiam cum Parthenio, uulgò Matricaria appellato: cognosco ego primam & tertiam speciem, & est apud Regienses in usu. Diosc. capite 118. & 119. tertij. Plin. cap. 7. lib. 25. Gal. 6. de fac. simp. Calida in secundo, & sicca in tertio ordine.

Asaron, uulgò Bacchara. Diosc. cap. 9. lib. 1. Gal. 6. de fac. simp. Plin. lib. 21. cap. 6. Paul. lib. 7. Similem acoro uirtutem habet.

Asclepias nisi ea sit herba, quam uocant hederam terrestrem, aut uincetoxico, ut Fuchsius, certè nescio quid sit: hoc scio Empiricos pro mirabili potione in uulneribus sanandis hedera terrestri uti. Dioscor. cap. 97. lib. 3.

et Galen. 6. de fac. simp. Plin. cap. 5. lib. 27.
Paul. lib. 7. Calida et sicca tenuisque sub-
stantia.

Aspalatus in Italia non habetur: sunt qui
dicant esse sandalum rubeum. Ruellius agal-
lochon uulgare: sed quum non præ manibus
habeatur, iuxta Galeni placitum in succi-
daneis pro eo utemur semine uiticis. Diosc.
cap. 16. lib. 1. Paul. lib. 7. Constat uirtute a-
cri et adstringente.

Asparagus duplex est, domesticus et sil-
uestris per se nascens. Galen. 6. de fac. simp.
Sunt abstersiui. Plin. 10. cap. lib. 20. Visum
corroborat, et doloribus thoracis et renum
medetur. Auic. fen. ult. lib. 4. Bonum odorem
in toto corpore inspirant, urinam uerò malè
olere faciunt. Paul. lib. 7. Medius in calore
et frigiditate.

Asphodelus, uulgò apud seplasiarios dici-
tur Haffrodilo, Latinis hastula regia. Gal.
6. de fac. simp. ait, cinerem eius radicis fa-
cere renasci pilos. Diosc. cap. 159. lib. 1. Plin.
lib. 22. cap. 22. Paul. lib. 7. Vim habet derer-
gentem discutientemque.

b. iiij.

Asplenon, uulgare citrach, etiam lingua ceruina est phyllitis apud Diosc. Huius minuit Gal. 6. de fac. simp. & Diosc. cap. 142. lib. 3. Ait Galen. Etsi subtilium sit partium, nihilominus non esse calidum, frangit lapidem, minuit lienem. Plin. lib. 27. cap. 5. Paul. lib. 7. Est uirtute tenuis, sed non calidum, ut supra Galenus.

Aster Atticus in pratis nascitur. Serapio non distinxit hunc ab iringo, quoniam utrique flores in modum stellæ habet. Diosc. cap. 115 lib. 4. Et Gal. 6. de fac. simp. Vocatur & bubonium, eo quod bubones sanat, & uocatur à Plin. lib. 22. cap. 7. & 8. ceterum capita. Paulus lib. 7. Mixta est uirtutis, digerentis & refrigeratoria, iccirco bubonibus prodest.

Astragalus Dioscor. cap. 60. quarti. & Plin. ca. 8. lib. 26. Gal. 6. de fac. simpl. Paul. lib. 7. Non ignauiter desiccatur, & eius radix adstringit.

Athara Diosc. cap. 83. secundi, genus puliculae, quod apud Teutonicos paratur ex farina, lacte & butyro, in conuiujs, & in cibandis infantibus. Galenus primo de alimēt.

IN COGNO. SIMPLIC. 25

Attractylis, à Theodoro fufus Syluestris:
Hermolaus uult carthamum, Sylueftrem cni-
cum, dictum effe attractylidē. Diosc. cap. 98.
tertij. Plin. cap. 15. lib. 21. & Theoph. cap. 4.
lib. 6. Paul. lib. 7. Vi siccante & mediocri-
ter calida pollet.

Attriplex, ἀτρίπλις, uulgò trepese, non
defuerint qui spinachia uulgaria effe uolue-
rint. Diosc. cap. 110. secūdi, & Gal. 6. de fac.
simp. Facit eius semen uomere & purgare
corpus per inferiora. Razes refert se uidisse
hominem acceptis eius duabus drachmis as-
sellasse usque ad magnam debilitatem. Paul.
Est humidum & frigidum in secundo.

Auellana, Græcè καρύων πόνικον, Sylue-
stris est & domestica. Diosc. cap. 146. primi.
Galen. 7. de fac. simp. & 2. de fac. aliment.
uulgò dicitur niciola. Paul. lib. 7. Frigidio-
res sunt & austera, in cæteris iuglandibus
æquales.

Auena, Græcis βρώμος. Diosc. cap. 85. se-
cundi, & Galen. 6. de fac. simp. Plin. cap. 25.
lib. 22. Paul. lib. 7. Siccat & modicè discu-
rit, alicuius astrictionis compos.

Baccharis, nō est asaron, ut hucusque putatum est à Seplasiarijs, nec est scarlegia, ut noluit Brasauola de mēte Leonicenni, quum in radicibus scarlegia bacchari non respondeat, ut uideri potest ex Dioscor. cap. 46. tertij. quare dicendum est baccharem nostris in partibus non haberi. Paul. lib. 7, βαχχα-
ρις acris est & odorata, eius folia adstringunt.

Ballote, marrubiū nigrum, adeo simile est melissophylo, ut nisi per odorem malum agnosceretur, uix id per uisum scires discernere. Dioscor. cap. 109. tertij, & Paul. lib. 7. Acris est & abstersoria facultatis.

Balsamum uerum non habetur, sed oleum antiquū pro balsamo uendū. de balsamo lege Plin. cap. 12. lib. 25. & Theoph. ca. 6. lib. 9. & Iustinū historicū lib. 36. & Dioscor. cap. 18. primi. Gal. 6. de fac. simp. Desiccatur & excalescit in secundo excessu, & est tenuium partium: itidem asserit Paul. lib. 7.

Barba hirci, Græcè τραχώδων, in Hertruria uulgo dicitur sassefrica: herba nota est: sunt qui uelint similem esse scandici: hu-

IN COGNO. SIMPLIC. 27

ius aqua chymico more stellata mirabiliter
uulnera recentia carnis cum syndone appli-
cata sanat. Theoph. cap. 7. lib. 7. Dioscor.
cap 132. lib. 2.

Bdellium, res nota est: uerum quod pingi-
tur à Diosc. non habetur, quod magis nigre-
scit & resinum est, magis mollior. Duplex re-
peritur, Sicilianum, quod folijs & radici-
bus palmæ assimilatur, & uulgò Neapoli di-
citur cephalone, cuius germen adhuc molle
comeditur. Et Iudaicum, quod describitur à
Diosc. cap. 61. primi, de primo loquens. Gal.
8. de fac. simp. dum de palma mentionem fa-
cit, dixit, medullam encephalon uocari, un-
de corrupto uocabulo uulgò cephalone uo-
catur. Paul. lib. 7. Emollior, maturatque.

Beta, Græcè τεύτλον, nota est, nam pas-
sim nascitur, nigra est & alba, & tertia
species, ut refert Mathiolus in agro Tren-
tino inuenitur, quæ rubea est, & radices ha-
bet carotis similes: comeditur non minus in-
suauis, q̃ ceteræ radices in acerarijs. Galen.
8. de fac. simp. Plin. lib. 20. cap. 8. & Diosc.
cap. 112. secūdi. Succus betæ albae per clysterē

infusus mirum in modum uentrē constipatum soluit, etiam si per alia enēmata solui non posset. Paul. lib. 7, Nitrosam uim habet, abstergit iccirco & discutit.

Betonica, Græcè κέσπων, notissima res est, habet multas uires quæ ab Antonio Musa Cæsaris Augusti medico exarantur. uide Dioscor. cap. 1. quarti, & Galen. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. duas species enumerat, sunt qui uelint calidam & siccam esse, ob id quod incidit & subacris est.

Bitumen, quod Græci ἀσφύτον uocāt, est quædam mixtura cum pice & alijs miscellis, quare ad eam non confert quæ à Diosc. recitantur. Nascebitur bitumen in Iudæa in eo lacu quo Iordanus fluuius ingreditur, sed de his latius uide cap. de Naphtha. Diosc. cap. 84. primi. Plin. lib. 35. cap. 15. Gal. 2. de fac. simp. Bitumen in mari mortuo inuentum, uim resiccatoriam & excafactoriā habet in secundo ordine, ad glutinationes uulnorum cruentorum idoneum. Itidem ait Paul. lib. 7.

Blatæ, Græcè σιλφῆ, sunt animalia quæ circa molas & in pistrinis inueniuntur, si-

milia grillis uocatis, ualent ad dolores aurium: uocantur etiam blatae quae in carnibus porci saljis inueniuntur, sed non sunt quae à Dioscor. cap. 35. secundi recitantur: quae uerò circa molas inueniuntur, ab aliquibus uulgò pintolae uocantur. Vide Paul. lib. 7.

Blitum, uulgò dicitur Biedone, duas habet species: alteram coloris rubei, alteram albi: nullum ferè usum obtinet in re medica, peruertit stomachum. Dioscor. cap. 108. secundi, & Plin. lib. 20. cap. 22. Galen. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Frigidum & humidum in secundo ordine.

Botrys, herba aliquibus nota est herbarijs, quae nisi sit artemisiae species, haud scio planè quid explicem. Meminit Dioscor. cap. 121. tertij. Plin. lib. 25. cap. 7. & lib. 27. cap. 8. Paul. lib. 7. Planta est insigniter odorata.

Brassica, nota & uulgaris est, uulgo dicitur cauolo siue uerza, cuius multae sunt species, ut refert Theoph. cap. 4. lib. 7. & Plin. cap. 8. li. 9. Prima brassica est quae magnum habet thyrsus cum longis folijs: est & altera quae crispa habet folia, & dicitur apiana:

29 DE CONSEN. MEDIC.

alia est quæ caulem habet subtilem cum teneris & tenuibus folijs, est & apud Plin. lagotia brassica, quam nonnulli uolunt esse id quod dicitur uulgo il capuzzo. Sunt & aliæ quamplures brassicæ species, quas narrare longū foret. Semina brassicæ inueterata si seminantur, in rapas transeunt, & e conuerso. Brassica marina est uulgaris soldanella. Vide Dioscor. cap. III. secundi. Galen. 3. de fac. simpl. cap. 14. & seprimo eiusdem & secundo de fac. aliment. Paul. lib. 7. Quæ comeditur siccatur & abstergit, ualentius tamen syluestris.

Britannica, nisi sit bistorta, aut betonica quæ nunc est in usu, certè nescio quid sit. Dioscor. cap. 2. quarti. Gal. 6. de fac. simpl. Plin. lib. 25. cap. 3. uocatur ab Auicen. Beritanich. Paul. lib. 7. Adstringit & conglutinat: quidam dixerunt esse lapatium acutum, sed decipiuntur.

Bromos herba, similis est auenæ, & est auena syluestris: meminit Plinius lib. 22. cap. 25. & Diosc. 135. quarti. Gale. 6. de fac. simp. Desiccatur & digeritur mediocriter & sine mor

IN COGNO. SIMPLIC. 31

su. Et primo de fac. aliment. itidem Paul. lib. 7. asserit.

Buccina, sunt animalia ostracodermata, id est duri corticis, et nascuntur in mari, sicuti et purpura: sunt similes buccinis siue tubis, unde dicta sunt. Maiores ijs sunt purpura, et habent liquorem in gula uenis, quo infectores in tingendis uestibus purpureum colorem efficiunt. lege Plin. lib. 9. et Dioscor. cap. 4. secundi. Galen. 2. de fac. simpl. Desiccant sine morso dum uruntur, et in polinem conteruntur.

Buglossum, lingua bouis, nil aliud est quam nostra uulgaris borago: de hac meminit Galenus 6. de facul. simpl. et Dioscor. cap. 123. lib. 4. Paulus lib. 7. Humidum calidumque temperamento est.

Bulbus uomitorius, nisi narcissi sit species, et bulb⁹ qui ededo est, nisi sit Ascalonia uulgaris, nescio profecto quid sint. Diosc. ca. 160. et 161. secundi. Scio nostras Ascalonias non esse Galeni bulbos, quoniam acerrimae sint, nec quales a Galeno scribuntur. Vide Galenum 5. de facul. simpl. cap. 22. et secundo de facul.

32 DE CONSEN. MEDIC.

aliment. Paul. lib. 7. Amari ac adstringentis
saporis modicè est, siccat, glutinat uulnera
& abstergit. Vomitorius uerò multò cali-
dior. uide & Gal. 6. de fac. simp.

Bunium, uulgò nauone saluatico, duæ eius
sunt species, ut Plin. cap. 4. lib. 20. bunion &
buniada. Huius meminit Gal. 6. de fac. simp.
& Diosc. cap. 119. quarti. Paul. lib. 7. Bunium
calidum est, urinam & menses ducit.

Buphthalmos, oculus bouis, non est cotu-
la, ut Fuchsius, sed flos similis camomillæ, lu-
teus est, non circumcirca albus, ut nonnulli.
Huius meminit Diosc. cap. 147. tertij. Et Gal.
6. de facul. simp. Plin. lib. 25. cap. 8. Paulus
lib. 7. Discutit ac durities emollit.

Cacalia quum semen, ut ait Plinius cap. 2.
lib. 25. paruum producat, ac sunt margaritæ
paruæ, nescio profectò diuinare quid sit. uide
Dioscor. cap. 117. quarti. Galen. 7. de facul.
simpl. Paul. lib. 7. Valet sicuti cancamus.

Cadmia fit ære in fornacibus accenso, ad-
hærente fornacum parietibus, & est res, quæ
nunc uulgò tutia dicitur. Dioscor. cap. 42.
quarti. Plin. lib. 34. cap. 13. uide Galen. 9. de

facul. simpl. Paul. lib. 7. Desiccat, abstergit,
& concaua ulcera explet.

Calamintha, est id quod uulgo dicitur ca-
lamēto: huius sunt tres species, ut refert Diosc.
cap. 38. tertij. secunda species uulgò dicitur
neueda, nec est ea uulgaris herba quæ dicitur
herba gatta, ut refert Brasauola, nec ista her-
ba gatta est tertia species, ut Ruellius putat,
quoniā similis est mentastro, non autē urticae
uel melissæ, ut herba gatta. Gal. de calamin-
tha meminit 7. de facul. simpl. Paul. lib. 7.
Nepita calida & sicca in tertio ordine.

Calamus aromaticus. i. odoratus: uerū nō
habetur, sed pro eo accipitur radix acori.
Meminit Theoph. 9. de historia plantarum,
& Plin. cap. 22. lib. 12. Et de uiribus canariū
cap. 11. lib. 24. Et Galen. lib. 7. de fac. simpl.
& Dioscor. cap. 17. primi. Paul. lib. 7. Cale-
facit & desiccat in secundo ordine.

Calx uiua, præsertim quæ ex fluminū ex-
coctis lapidibus fit, omnibus nota est: hæc si
diu lota fuerit, omnem mordacitatem amit-
tit, & malignis ulceribus prodest. Dioscor.
cap. 87. quinti, & Galenus 9. de facul. simp.
c. i.

34 DE CONSEN. MEDIC.

Paul lib. 7. Adeò uehementer urit, ut crustam inducat.

Cancamon, est lacha, & lacha est lachryma arboris Arabia, quæ ad nos non affertur: quare caueat, qui dialacha componunt, quid per lacha imponere debeant: nam gumi rubrum quod demonstratur, non est lacha, quum odore careat. Nec debet seplasiarum lacha artificiali uti, quæ componitur uerzino, grana & cremesi, nec uti debent, quod uulgò dicitur sanguis di draco in lachryma: quoniam uires lachæ contrarias habet: hic adstringit, illa aperit. Diosc. cap. 24. primi. Paul. lib. 7. Externuat, abstergit, aperit.

Canabis duplex, satina & syluestris: sed syluestris non sic nota. Semen domesticæ genituram extinguit, sed in gallinis contrarium agit: nam quæ ex huius semine pascuntur, multa oua pariunt. Dioscor. cap. 156. & 157. Et Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7. Semen discutit flatus, & ita siccatur, ut genituram arefaciat.

Camphora, est arboris Indici, statura maximæ, quoddam gumi frigidum & siccum in tertio

ordine. Bona cāphora cognoscitur, si intra
panē calidū reposita resoluatur. Auic. lib. 2.
et Serapio lib. aggreg. cap. de camphora.
Huius rei non memini quicquam me legisse
apud Græcos authores: multas hæc habet
species ex locorum diuersitate sumptas.

Capparis ex Alexādria affertur: de hac
Gal. 7. de fac. sim. et 2. de fac. aliment. cap.
24. Diosc. cap. 164. secūdi. Theoph. cap. 5.
lib. 6. et Plin. cap. 8. lib. 19. Paul. lib. 7. Ra-
dix extergit, purgat, incidit, discutit, et sua
acerbitate contrahit, stringit et densat.

Cardamomon uerū non habetur, sed quod
pro cardamomo uēditur triplex est, maius et
minus, quod nielam dicūt. Tertiū uocatur ab
aliquibus mele geta, aut granum paradisi,
Arabice dicitur cordumeni. Diosc. cap. 5. pri-
mi, et Plin. cap. 13. lib. 12. et Gal. 7. de facul.
simpl. Pro cardamomo accipitur cyperus uel
myrthus, ut Gal. in succidaneis. Paul. lib. 7.
Acre est et lumbricos interimit.

Carduus, domesticus est et syluestris, dome-
stici cardones appellari, qui in postrema cæ-
na crudi et cocti cū pipere et sale comedū-

36 DE CONSEN. MEDIC.

rum, uulgò carchiosoli. Theoph. ca. 4. li. 6. & Gal. 8. de fac. simp. ubi habet, quòd sunt calidi & sicci in secūdo ord. Diosc. ca. 14. tertij.

Carum, uulgò carui. Diosc. cap. 59. tertij, & Gal. 7. de fac. simp. Calidū siccū in tertio ordine. & 2. de fac. alimēt. iridē Paul. lib. 7.

Cassia duplex, uera quæ cinnamomum, & falsa quæ cassia lignea uocatur. Cassia uerò siliqua est cassia solutina ex Aegypto proueniens, sed nussia à Græcis de hac quicquam proditum est. Quum uerò apud Græcos legitur cassia, intellige de ea quæ nunc cinnamomum dicitur. Dioscor. cap. 12. primi. Gal. de antidotis, & 7. de fac. simp. Exiccat & calefacit in tertio ordine.

Castoris siue fibri testiculi, Græcè καστορος ὀρχες, in usu sunt & cognoscuntur, uerū qui iuxta heplasiarios cernuntur, nō sunt ueri, sed cōpositi, ut refert Plin. ex renū partibus & testiculis in uesticis repositi. Diosc. cap. 23. secūdi, & Plin. 30. cap. 8. lib. & cap. 3. lib. 32. Gal. 11. de fac. simp. de castoreo lib. scripsit Archigenes. Paul. lib. 7. Calefacit, siccātque cum extenuandi uiribus eximys.

IN COGNO. SIMPLIC. 37

Castanea, res nota est. Gal. 4. de fac. simp. cap. 7. & 2. de fac. aliment. Diosco. cap. 126. primi. Vocantur etiam Græcè λόπιμα, & cōnumerantur inter glandes.

Caucalis, secundū aliquos, est id quod uulgo dicitur petrosello saluatico, eo quod apio similia folia habeat. Dioscor. cap. 128. secūdi, & Gal. 7. de fac. simpl. Paul. lib. 7. Dau- ci modo calefacit & sicca: sunt qui uocent caucalim uuam lupinam.

Cedrus, est arbor ut iuniperus, sed quid sit cedrinus liquor, nisi sit uernix, certè nescio quid dicere debeam. Diosco. cap. 9. primi, & Gal. 7. de fac. simpl. Plin. lib. 13. cap. 5. Ma- ior & minor, & minoris sunt duo genera, ly- cea & sænica. Paul. lib. 7. Calefacit & sic- cat in tertio ordine.

Cētauriū maius, nil aliud est quàm rhapō- ricum uulgare. Plin. ca. 6. lib. 25. & Gal. 7. de fac. simpl. & Diosco. lib. 3. Paul. lib. 7. Ra- dix est acris, calida & terreæ adstrictionis.

Centauriū minus, apud Hetruscos uulgò biondella, ob affectū quem circa mulierū ca- pillos facit, uentrē soluit: non autem maius, ut

c. iij.

38 DE CONSEN. MEDIC.

Arabes. Diosc. ca. 7. tertij, & Gal. ultra particularē tracta. 7. de fac. simp. etiā mētionem facit. Paul. lib. 7. Radix inefficax, sed collisculi ualidè & citra morsum siccant.

Calcanthū, latinis atramentū sutoriū, uulgò uitriol. Dioscor. cap. 68. quinti, & Gal. 9. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Carnes humidās absumit, siccātque.

Chamacissos, nisi sit hedera terrestris, ut Fuchsius, haud scio quid sit, quū tot hederae terrestris genera demonstrantur. Dioscor. cap. 121. quarti, & Gal. 8. de fac. simp. Plin. lib. 24. cap. 10. & 15. Paul. lib. 7. Flos eius insigniter amarus.

Chamadaphne, est Dioscor. laureola, sed laureola non est mezereon, ut putarunt nonnulli, sed potius chamelea Diosc. Plin. lib. 21. cap. 11. id uocauit chamadaphnen, quod uulgò dicitur uinea peruinca, sed postea cap. 15. lib. 24. chamadaphnen appellauit, ut Dioscor. ca. 144. quarti, de qua Galen. 6. de fac. simpl. uerba facit. Paul. lib. 7. Calida & acris est.

Chamadris, uulgò Calamandrina, recens

comesta hominem à peste præseruat: huius meminit Theoph. ca. 10. lib. 9. Gal. 8. de fac. simp. & Diosc. cap. 103. tertij. Plin. lib. 24. cap. 15. Paul. lib. 7. in tertio ordine calefacit, exiccâtque.

Chamelea & Thimelea apud Arabes est mezereon. Dioscor. cap. 166. quarti, & 167. quarti. Galen. 8. de facul. simpl. Vincentem habet qualitatem amaram.

Chameleon albus est & niger: albus est id quod uulgò dicitur carlina, niger uerò in medicinis, quæ per os assumuntur, nõ est minèdus: nã teste Gal. 8. de fac. simp. nescio quid moriferi in se habet. Arabes sæpe cõfundunt chameleonem cum chamelea. In chameleonis nigri radice nascitur uiscus, quod dicitur ixia, & est uenenum: unde quum in Plinio legeris remedia contra uiscum, intellige contra ixiam. Dioscor. cap. 8. & 9. tertij. Galen. 8. de fac. simpl. Calefacit in secundo, & siccât in tertio ordine.

Chamæpitys, uulgò Iua & regij orbica, species à Dioscor. recitantur tres cap. 166. tertij, & Gal. 8. de facul. simpl. Expurgat, c. iiij.

40 DE CONSEN. MEDIC.

abstergit, calefacit in secundo, siccatur in tertio ordine.

Camæfice nisi sit species pepli, haud scio quid sit: interpretatur enim humilis & terrestris ficus. lege Diosc. cap. 164. quarti. Gal. 8. de fac. simp. Abstergendi simul & acrem vim possidet. itidem Paul. lib. 7.

Chelidonium duplex, maius quod uulgò dicitur cerdogna: & minus quod uocatur à quibusdā scrophularia minor, ob similitudinē quā cum scrophularia in radicibus tenet, in Hetruria uulgò dicitur fauoscello. Diosc. ca. 172. & 173. lib. 2. Pli. ca. 8. lib. 25. Gal. 8. de fac. simp. Chelidoniū min⁹ calefacit, & siccatur in 4. ordine absoluto. Paul. li. 7. Chelidoniū maius calefacit in tertio, & ualēter abstergit.

Chrysanthemon, Romanis calta: putauit ego olim corrupto uocabulo id esse, quod nos uulgò dicimus colta, & est similis camomillæ: sed quia nō omnes cōditiones seruat, quas chrysanthemo tribuit Diosc. nunc certè haud scio quid sit. Diosc. cap. 56. quarti. Differt autem chrysantem⁹ à buphthalmo, ea differētia quæ est in cap. 147. lib. 3. & cap. 56. quarti.

Chrysocolle, uulgò borace, duplex est, artificialis & mineralis: quæ uerò paratur ex alumine roche & sale ammoniaco, uocatur borace refacto. Viridior est in medicinis excellentior. Dioscor. cap. 58. quinti, Gal. 9. de fac. simp. & Plin. cap. 5. lib. 33. Paul. lib. 7. Abstergit, discutit, siccâtque.

Cichoriū siue intybum, uulgò endiuiā siue radechi. Dioscor. cap. 121. lib. 2. & Gal. 8. de fac. simp. ubi inquit, Endiuiā est herba amara, sed multò plus syluestris quæ ab amaritudine picris siue cichorium dicitur. Paul. lib. 7. Siccât, refrigerâtque in primo gradu.

Cicuta similis ferulæ, sed mali odoris. Dioscor. cap. 77. quarti, & cap. 11. lib. 6. Plin. ca. 10. lib. 21. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Habet uires summè refrigeratorias.

Cinnabaris, uulgò sanguis de draco in lachryma, est gummi cuiusdam arboris Aphricæ stillans, sanguini humano simile, unde nomen habuit. Cinnabaris uerò, quo nūc utuntur seplasiarū, duplex est, mineralis & artificialis: mineralis nascitur in mineris ubi argentum uiuum foditur: artificialis fit ex

42 DE CONSEN. MEDIC.

sublimatione argēti uiui & sulphuris, miniū
uerò Dioscor. est nostrum cinabrium. Vide
Dioscor. cap. 63. quinti. Galen. 9. de facul.
simpl. Modicè acrem facultatem habet, &
adstrictionis quippiam.

Cinnamomū uerum nō habetur, sed nostrū
duplicatū eosdē effectus quos uerū cinnamo-
mū efficit. Diosc. ca. 13. primi. Vide de cassia
Gal. 7. de fac. simpl. Calefacit in tertio, non
tamen ita desiccatur: itidem Paul. lib. 7. ait.

Circea nondum à me cognita, nec uisa est
hucusq;: de hac loquitur Diosc. ca. 125. tertij.
Galen. 7. de fac. simpl. Paul. lib. 7. Calida
est eius radix & odorata, eius semen lac
generat.

Cirsion, nisi sit nostra uulgaris buglossa,
nescio profectò quid sit. Diosc. cap. 14. lib. 4.

Cistos & hipocistos, apud seplasiarios uo-
catur corrupto uocabulo hipoquistidos, &
est succus radicis tragopoi, id est barba de
becho ad solē inspissatus, & nō est id quod
habet Diosc. ca. 111. & 112. primi: nā est her-
ba saxosis locis nascēs. Gal. 7. de fac. simpl.
Paul. li. 7. Adstringit & modicè refrigerat.

IN COGNO. SIMPLIC. 43

Citria, siue citromala, omnibus nota sunt.
in quorū numero ponuntur quæ nos uocamus
limonia & aurantia poma, unde Virgil.
Aurea mala decem misi, uulgò dicuntur Auran-
tia, quasi dixeris, aurantia. Diosc. cap. 136.
primi. Plin. cap. 3. lib. 12. Gal. 7. de fac. simp.
Paul. lib. 7. semen tertij refrigerantium sic-
cantiūque ordinis habetur, cortex siccatur in
secundo.

Clematis daphnoides uulgò uinea peruin-
ca, sed altera clematis, nisi sit uitis alba, aut
flamola uulgò dicta, nescio quid sit. Diosc.
cap. 7. & 8. quarti. Gal. 7. de facul. simpli-
ciū. Paul. lib. 7. Clematis daphnoides siccan-
di uirtute pollet: altera uerò clematis acri &
caustica facultate donata est.

Chymenon, sunt qui uelint esse uulgare sa-
ponariam, sicuti & periclimenon, matris syl-
uam: decipiuntur uerò qui credunt matris syl-
uam & caprifoliū esse unum & idem, quum
caprifolium sit pixia cantha Dioscor. Vide
de chymeno Diosc. cap. 14. quarti, & de peri-
chymeno cap. 15. quarti, & Gal. 8. de facul.
simpl. Plin. lib. 25. cap. 7.

44 DE CONSEN. MEDIC.

Cnicus à seplasiarijs, dicitur carchamo, uulgo zafarano sarasinesco. Diosc. cap. 182. quarti, & Gal. 7. de fac. simp. & Theoph. cap. 4. lib. 6. Paul. lib. 7. Tertij ordinis siccantium est, semen purgat aluum.

Condrilla, cichorij species est, & alterum condrillæ genus, quod uulgò ab ipsius lacte lattarola nuncupatur: uide Dioscor. cap. 122. secundi, & Gal. 8. de fac. simp. cap. de endiuiæ & cichorio. Plin. lib. 22. cap. 22.

Coryza, uulgo pulicaria, eo quòd pulices enecet. Diosc. cap. 127. tertij, Theoph. cap. 2. lib. 6. & Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7. Siccatur & calefacit in tertio ordine.

Corallium album & rubrum omnibus notum est, lithodendron etiam dictum, album rubro frigidius. Dioscorid. cap. 93. quinti, & Plin. cap. 2. lib. 32. Auic. de uiribus cordis. Paul. lib. 7. Validam siccandi uim habet, adstringendi uerò mediocrem.

Coriandrum omnibus notum: in uiribus eius dissentiunt Diosc. & Gal. nā tenet Dioscorid. cap. 64. tertij, quòd habeat uires frigidas, & similiter Auic. At Gal. 7. de facul.

simp. quòd sit tepentis facultatis cum pau-
xilla adstrictione: itidem Paul. lib. 7. tenet.

Cornus, mas & fœmina, non plantatur
apud apum aluearia, ne apes corni floribus
uescentes moriantur. Diosc. cap. 140. primi,
& Gal. 7. de fac. simp. Exiccat ualenter, ac
ulnèra conglutinat. Paul. lib. 7. itidem.

Coronopos est, ut placet Manardo, id
quod dicitur uulgò herba stella, & non Leo-
niceni, sanguinella, quæ est species graminis
spinosæ, ut placet Plin. cap. 19. lib. 24. &
uocatur dactylus. Diosc. cap. 119. secundi, &
Plin. lib. 22. idem ait quod Diosc. Gal. 7. de
fac. simp. Paul. lib. 7. Creditur prodesse ad
colicos cruciatus manducata.

Costus uerus non habetur, sed pro costo
quædam uulgaris radix uenditur, nec inue-
nitur dulcis & amarus, ut uulgus putat, sed
bene albus & niger, nunc Venetijs optimus
uenditur. uide Diosc. cap. 15. primi. Gal. 7. de
fac. simp. Plurimam acrem & calidam qua-
litatem simul & facultatem habet, adeò ut
etiam exulceret. Paul. lib. 7. itidem refert.

Coronea mala, uulgò pome codogne, fortè

à Cydone Cretensi oppido oriunda, quæ mi-
nora, & in partes diuisa citrina & lanugi-
nosa sunt, cæteris meliora: nam odorem longior
alijs suauiore reddūt. Struthia uerò à Galieno
appellata, sunt quæ in magnitudine maiora
& carnosiora, nec sic citrina, ut prædicta
conspiciuntur: muliana uerò à Plinio dicta
sunt cotonea, uulgò pome bastarde appellata
Diosc. cap. 136. primi. Paul. lib. 7. Frigidi,
terrestres temperamenti sunt. Gal. 2. de fa. alim.

Crimnon est ex tritico uel zea granum,
crassius tritum quàm farina, quo antiqui
uice panis uescebantur. Diosc. cap. 81. secun-
di, & Plin. cap. 8. lib. 18. Gal. 7. de fac. simp.
& primo de fac. alim. ubi de zea loquitur.
Paul. lib. 7. Valde nutrit, agrè conficitur.

Crithmon, plures existimarūt id esse quod
uulgò dicitur fenochio marino, ouer herba
di san Petro: ego crederem esse mentam Flo-
rentinam. Diosc. cap. 118. secundi. Gal. 7. de
fac. simp. Vis eius est exiccatoria & abster-
soria. Paul. lib. 7. idem refert.

Crocodilion est species chameleontis, sed
non est carlina. Diosc. cap. 10. tertij. Pl. ca.

IN COGNO. SIMPLIC. 47

8. lib. 22. & Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7.
Calidam, siccam, & discutiendi uim obtinet.

Crocus melior ex aquila Abruci affertur
Venetias, nascitur multò preciosior in mul-
tis Lombardia locis, sed rarior. Dioscor. cap.
25. primi, & Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7.
Calefacit in 2. & desiccatur in primo ordine.

Cucurbita, uulgò zucha, & est uel longa,
uel rotunda, uel lata. Ex semine colli cucur-
bitæ fiunt longæ, & ex semine in parte ro-
tunda contento, rotundæ: sicut & in parte
lata latæ oriuntur. Crassiores euadunt cucur-
bitæ, si semen cum acumine uersus terrā plā-
retur. Diosc. cap. 123. secundi, & Plin. cap. 5.
lib. 18. & Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7.
Humida & frigida in secundo abscessu.

Cucumis est id quod uulgò dicimus cucu-
mere ouer cedrone, ut probatur ex Plin. ca. 5.
lib. 19. & ex Diosc. nec est anguria ut uolunt
aliqui: omnes tamen species cucumerum, me-
lopeponum & peponum, ut affirmat Gal. 2.
de facult. alimen. uocantur nomine peponis.
Melo pepones sunt nostri uulgares melones:
sed quid sint pepones, nisi fortè sint, quos

Venetijs uulgò uocāt peponi, haud scio quid sint: scio hos non esse angurias, quum seorsum Serapio capita de omnibus faciat. Dioscor. cap. 124. secundi. Paul. Refrigerat & humectat in secundo ordine, semen abstergit & incidit: uide etiam Gal. 8 de fac. simp.

Cucurbita sylvestris, uulgò colocynthida, ualet mirabiliter in asthmate & tussi antiqua & iūcturarum doloribus. Oleum in eius concauitate bullitum nigros efficit capillos, nec sinit canos fieri, & prohibet eorum casum, auribus sibilantibus medetur. Diosc. ca. 171. quarti, & Gal. 7. de fac. simp. uide etiam Mes. Paul. lib. 7. Validā habet uim purgādi.

Cucumis sylvestris, uulgò cucumere asinino, ex quo fit elaterium, decoctum radice & eius foliorum, & succus eius ualet summopere hydropicis, cum melle abstergit maculas liuidas ex percussione, ualet etiam ad lentigines & maculas faciei. Dioscor. cap. 149. quarti, & Gal. 8. de fac. simp. Paul. li. 7. Radix detergit, dissipat & emollit, succus uerò siccandi uires habet.

Cupressus, formicis familiarissima, nō na-

scitur ubi sit aqua, nec eius lignū marcescit.
Diosc. cap. 87. primi, & Plin. ca. 15. lib. 24.
& Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7. Siccandi
uires habet absque calore conspicuo.

Curmi Plin. ult. potus ueluti ceruisia: uide
Diosc. cap. 79. lib. 2.

Cuscuta tantū iuxta Arabes memora-
tur, & est satis nota herba: habet uim ad-
stringendi & confortandi, ualet ad obstru-
ctiones hepatis & lienis, & sanguinem pu-
rificar.

Cyclaminus, uulgò pan porcino, & est om-
nibus nota: altera uerò cyclaminus dicta à
Diosc. haud certè scio quid sit. Diosc. cap.
153. secundi, & Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib.
7. Extergit, incidit, aperit, attrahit & dissi-
pat. Plin. cap. 9. lib. 21.

Cyanon puto esse lapidem lazuli, inueni-
tur in aerarijs fodinis, & in quibusdam maris
littoribus. Dioscor. cap. 60. quinti, Gal. 9. de
fac. simp.

Cuminum satium omnibus notum, uulgò
cumino dicitur. Syluestre uerò, q̄ sciam, non
cognoscitur, nisi sit quod uulgò dicitur ru-
d. i.

50 DE CONSEN. MEDIC.

eheta. Calidum est, ut placet Gal. 7. de fac. simp. Diosc. cap. 61. tertij. Paul. lib. 7. In tertio ordine calefacit, flatus discutit.

Cynocrambe, canina brassica, species mercurialis herbae, Diosc. cap. 184. quarti. Gal. 5. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Lethalis homini est, foedi odoris, citra siccitatem, digerit etiam.

Cynoglossa, lingua canina, duplex est. altera à Plinio descripta, altera vulgaris, quae uera non est. Diosc. cap. 124. quarti, & Plin. cap. 8. lib. 25.

Cyperus duplex, alter passim in Longobardia inuenitur, alter angulosi iunci radicis similis, nascitur in India, & est vulgaris nostra curcuma: Curcuma uerò Serapionis, non est curcuma nostra, sed radix chelidoni. e. uide Dioscor. cap. 4. primi. & Gal. 7. de fac. simplic. Paulus lib. 7. Siccat, calefacitque citra morsum.

Cytisus, uulgò trifolio caualino, ouer tribolo. Impinguantur equi cytiso, & à quocunque morbo liberantur libentius quàm hordeo, equi cytiso uescuntur. Dioscorid. cap. 108.

IN COGNO. SIMPLIC. 51

quarti, & Gal. 7. de fac. simp. & Plin. lib. 13. cap. 24. Paul. lib. 7. Tepida natura & leniter discutientis.

Daphnoides laureola, non est mezereon, quum sit chamelea Dioscoridis, ut dictum est, chamedaphne postea est species daphnoidis. Diosc. cap. 143. quarti. Plin. cap. 15. lib. 24. & Gal. 6. de facult. simplic. Paul. lib. 7. Calida, acris, & subamara est.

Daucus est secundum aliquos pastinaca sylvestris: uerus daucus nondum habetur, quoddam aliud à seplasiarijs pro dauco uenditur. Diosc. ca. 66. tertij. Gal. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7.

Dictamnus nuper inuentus habetur Venerijs: uerum quod uendunt pro dictamno, est species fraxinellæ, quæ nec dictamno Cretensi, uel salsæ conformis est: sed quæ sit fraxinella nuncupata, quum nullibi ab antiquis metio fiat, haud scio quid explicare debeam. De dictamno scribit Dioscor. cap. 32. & 33. & 34. tertij. Gal. 6. de fac. simp. Theophras. ca. 16. lib. 9. Paul. lib. 7. Virtutem habet pulegij.

d. 3.

Dipsacos, siue labrum Veneris, uulgò dicitur scarzo da scarzare li panni: uocatur & ineptè à seplasiarijs uirga pastoris, sic etiam Pandectarius, ubi dipsacum confundit cum polygonio, qui est centinodia siue corrigiola ouer sanguinaria de dipsaco. Dioscor. cap. 2. lib. 3. Gal. 6. de fac. simpl. Plin. cap. 13. lib. 24. & cap. 9. lib. 27. Paul. lib. 7. Desiccat in secundo ordine, & nonnullam adstringendi uim obtinet.

Dracunculus duplex, maior & minor, & est res ab aro differens & alia, uulgò dicitur serpentaria maior & minor, non est tamen herba nomine serpentina, siue herba argentina, quæ in recentibus consolidandis uulneribus mirabilis est, & in intestinorum rupturis. Dioscor. cap. 155. & 156. secundi, & Gal. 6. de fac. simp. Magis calefactorium & reuudoribus partibus constat ipso aro: itidem Paul. lib. 7.

Dryopteris, quercuum filix, similis esset filici, sed multò minores foliorum incisuras habet, depilat hæc cum radicibus emplastri modo imposita. Dioscor. cap. 181. quarti, &

Galenus 6. de facult. simplic. Plin. cap. 9. lib. 27. Paulus. Vim habet exedentem. Deceptus est Pandectarius, credens esse polypodium.

Ebenus, species ligni guaiaci, uel sancti appellati, in quorum ordine id melius ac excellentius esse existimarunt, quod minus nigricat. Ebenus olim in multa fuit ueneratione, ut testatur Plin. cap. 4. lib. 12. & de eius uiribus scripsit Plin. cap. 2. lib. 24. Galenus 6. de facult. simp. Dioscorid. cap. 114. primi. Paulus lib. 7. Vis est excalesfactoria, deterfensoria & subtilis.

Ebulus & Sambucus res sunt notissimæ. Aqua ex eorum floribus elicita, dolores capitis à uaporibus calidis factos mitigat. Succus ebuli ad solem concretus ac siccatus pondere unius drachmæ cum decocto inæ datus dolores podagricos, & iuncturarum & morbi gallici tollit, & in enæmate positus sciaticis prodest. Diosc. cap. 168. quarti, & Gal. 6. de fac. simp. Plin. cap. 8. lib. 24. Paul. lib. 7. Vterque desiccandi facultatē habet, digerit, conglutinat, & aquam per aluum educit.
d. ij.

54 DE CONSEN. MEDIC.

Ebur, ἑλεφας, uulgò auorio, & est dens elephanis. Aristot. 6. de natura animal. Ebur ualet fluxui albo mulierum cum lacte ex seminum lactuca extracto cum aqua chalybeata bibitum. Diosc. cap. 50. lib. 2.

Echion uolunt aliqui esse buglossum syluestre, flores iuxta folia purpureos habet, in quibus semen est uiperino capiti simile. Dioscor. cap. 28. quarti. Plin. cap. 19. lib. 25.

Echinus, uulgò riccio terrestre: uide eius uires iuxta Diosc. cap. 2. lib. 2. & apud Razem in tra. 6. animalium. Gale. 2. de facul. simpl. Plin. lib. 9. cap. 25. & lib. 32. cap. 1. Paul. lib. 7. Fel eius pilos fluentes glutinat, caro discutit & siccat.

Echinus, herba, nisi sit species spinæ albæ, eò quòd capitellū simile echino pisci habeat, certè diuinare nescirem. Plin. cap. 8. lib. 23. Gale. 6. de fac. simp. Acerba repellit & siccat. in idem Paul. lib. 7.

Electrum, Latini succinum, Arabes charabe: uulgò ambra da corone, habet uim retinendi fluores stomachi & uentris. Dioscor. cap. de populo nigra, cap. 98. primi. nec est

gumi albae populi, ut Brasauola. Plinius cap. 2. & 3. lib. 37. post longam impro-
bationem fabularum Ouidij, inquit certum
esse electrum gigni in insulis septentrionali-
bus, &c.

Elleborus duplex, albus & niger: uocatur
etiam ueratrum: & est omnibus notum, cuius
usum damnauit Mesues, sed conuenienter non
solum eius infusio, sed etiam puluis nunc in
usu est absque alicuius patientis incommodo:
radices quum extrahuntur, statim purgatur,
& abiecta parte interiore cortices tantum ad
solem exiccantur, ex quibus deinde fit puluis.
Vide de eius uiribus Actuarium. Galen. 6. de
fac. simp. & Diosc. cap. 145. & 146. quarti.
ualet suffusis felle, scabiei, leprae, uolaticis.
Paul. li. 7. Vterque calefacit, & siccatur in ter-
tio abscessu.

Ephemeron duplex, colchicon & epheme-
ron nuncupatum agrestis iris, uulgo giglio mac-
to. Colchicum uero id est, quod nunc dicitur
hermodactylus, & est res uenenosa. Hermoda-
ctylus uerus ac legitimus non inuenitur, nec
ephemera est lilium conuallium, ut Euchsus.
d. iiij.

Paul. Mixtæ potestatis est repellentis & discutientis.

Epithymon, thymi inuolucrū, uerum est id quo nunc utimur. Diosco. cap. 172. quarti, & Plin. cap. 8. lib. 26. Gal. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Siccat & calefacit in tertio abscessu.

Eryngium, uulgò Rinzò, non est secacul Serapionis, imò nec istud secacul adhuc cognoscitur: iccirco qui eryngio uim excitandi uenerem tribuunt (quum nullibi à Gal. uel Diosco. hoc dicatur) summopere decipiuntur. Vide Diosc. ca. 22. tertij, & Gal. lib. 6. de fac. simp. Plin. ca. 2. lib. 25. Paul. lib. 7. Calefacit quidem nō manifestè, siccat uerò nec modicè.

Eruca duplex, satina & syluestris: satina, dicitur Ruchetta in Hetruria, & Ruchula in Lōbardia, & comeditur in acetarijs. eius semen tritū cum felle bouino cicatrices nigras, albas reddit, & cum melle maculas faciei & lentigines delet. Vide Diosc. cap. 129. secundi, & Gal. 2. de fac. alim. & 6. de fac. simp. cap. de uitice. Plin. ca. 13. lib. 20. Paul. lib. 7. Flauulenta est & uenerem instigar, sed syluestris ualentior est.

Eruum, uulgò orobo inuenitur inter uarias segetes, & species uitiae esse praesumitur. Orobus uerò qui ex Alexandria Venetias affertur, non est uerus: Brasauola putauit id esse *Eruum*, quod uulgò dicitur Ruuione, quod à Galeno uocatur ochron, sed decipitur: nam non prouocat sanguinem cum urina ut orobus. Diosc. cap. 100. secundi. Et Galen. 8. de fac. simpl. Plin. cap. 25. lib. 22. Paul. lib. 7. Calefacit in primo, siccatur in secundo gradu.

Eupatorium est nostrum uulgare agrimonium, sed apud Arabes, & maximè apud Auicennam. & Mesum. sunt diuersa eupatoria: nam quod ab Auicenna describitur, id esse uolunt quod uulgò dicitur canuarola. *Eupatorium* Mesum. est quod in Hetruria dicunt herbam Iuliam, quae uehementer uermes interficit: idcirco in compositionibus Auicennae uteretur suo eupatorio, & similiter in Mesum. herba Iulia, & iuxta Graecos agrimonio uulgari. Diosc. ca. 39. quarti, Gal. 6. de fac. sim. Paul. lib. 7. Tenuem uim & incidentem sine conspicuo calore habet.

Euphorbium est, quo uulgariter utimur.

58 DE CONSEN. MEDIC.

uide de eius uiribus Mes. & Diosc. c. 87. tertij, & Gal. 7. de fac. simp. Plin. c. 7. lib. 25. Paul. lib. 7. Vim adurentem habet.

Faba, Græcè κνᾶμος, omnibus nota: Aegyptia uerò ea est, quæ uulgò dicitur colocasia, uide Diosc. c. 96. & 97. secundi, & Theoph. cap. 4. lib. 4. & Gal. 1. de fac. aliment. Paul. lib. 7. Nō recedit multum à medio temperamento in refrigerando & siccando.

Ferula, ῥάπινξ, in Apulia maximè cognoscitur, ubi lignorū loco comburitur: uide Theophrast. lib. 6. & Gal. 8. de fac. simp. & Plin. ca. 24. lib. 20. & Diosc. cap. 82. tertij.

Ficus, σῦκος, satiuā est & syluestris: uide Diosc. ca. 149. primi, & Gal. 2. de fac. alim. & 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Arida siccant in secundo, maturant, detergunt, ac discutiunt. Ficus uerò arbor calidi tenuisque temperamenti, adeò succus foliorum abstergit, ut etiam exulceret.

Filix, ῥέας, uulgò felese, mas est & fœmina: uide Diosc. ca. 178. quarti, & Theoph. ca. 20. lib. 9. & Plin. cap. 9. lib. 27. & Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. uim siccandi & amarā

habet, fœtus corrumpit, lumbricos enecat.

Flos æris res est diuersa à uiridi ære, quo passim utuntur seplasiarj pro flore æris. nã est pars æris tenuissima ex uapore æris fusi eleuata: quæ uerò in quadam excutitur, ærugo æris dicitur, & est æs uiride. Dioscor. cap. 45. quini. Plin. ca. 2. lib. 34.

Fœniculum, μάραθρον, domesticum & syluestre. Domesticum omnibus notum. uide Dioscor. cap. 74. tertij, & Galen. 7. de facul. simpl. Plin. lib. 20. cap. 23. & Gale. 2. de fac. aliment. Paul. lib. 7. Calefacit in tertio, siccatur in primo ordine.

Fœnugræcū, τήλιν, omnibus notū, buceras à corniculis suis à Theoph. uocatur. Gal. 8. de fac. simp. Diosc. cap. 93. secundi. Plin. ca. 19. lib. 23. Paul. lib. 7. Calidū in secundo, siccum in primo.

Fraxinus, μελία. Dioscor. cap. 93. primi. Theophrast. cap. 11. lib. 3. uide de eius uiribus Plin. ca. 8. lib. 24. Paul. lib. 7. Morsui uiperarum folia succurrunt, ligni ramena ferunt esse lethalia.

Fumaria, κάπνος, uulgò fumus terræ, om-

60 DE CONSEN. MEDIC.

nibus nota: uide Mes. de eius uiribus, & Dioscor. cap. 105. quarti, Galen. 7. de fac. simpl. Paul. li. 7. Acris & amara est, eò dicta, quòd lachrymas eius succus eliciat.

Fungi, *μυκήται*. Dioscor. ca. 81. quarti, Galen. 7. de fac. simp. Frigidos & humidos eos appellat. Plin. ca. 3. li. 19. Paul. lib. 7. Frigidi & humidi, nonnulli exitiosi, præcipuè putridæ qualitatibus participes.

Galbanum, uulgò galbina, liquor est cuiusdam plantæ nascentis in Syria ferula. Dioscor. cap. 88. tertij, & Gal. 8. de fac. simp. Calidum in primo, tertij, & siccum in primo, secundi ordinis. Plin. cap. 26. lib. 12.

Galiopsis, herba similis urtica, & est secundum aliquos urtica fœtida, uulgò urtica mortua, ouer quella ortica che ha le machie bianche. At secundum Fuchsiū est scrophularia, sed reuera scrophularia non fœtet, ueluti urtica mortua. Vide Dioscor. cap. 90. quarti. Plin. lib. 27. cap. 9. Paul. lib. 7. Dissipat & emollit scirrhusos humores.

Gallion, quo lac coagulatur, herba est similis rubiæ minori, quæ aparine dicitur: alia

IN COGNO. SIMPLIC. 61

certè à presura uocata. Dioscor. cap. 91. quarti, & Gal. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Siccan di uim cum mediocri acrimonia habet.

Garum est id iuxta Diosc. quod uulgò dicitur salamoia, sed apud Plin. cap. 7. lib. 31. erat condimentum ex interioribus gari piscis maceratis, & cum sale resolutis. Paul. lib. 7. Calefacit & exiccat.

Genista, *καρπύων*, uulgò genestro. Diosc. ca. 152. quarti, Gal. 8. de fac. simp. & Mesu. inter alia sua solutiu. Plin. ca. 9. lib. 24. Paul. li. 7. Semen & flores per inferiora purgant.

Gentianæ radicis aqua per balneum marie elicitæ, febres oppilationum sanat, uermes interficit, & sæpe lauando maculas faciei omnes repurgat. De hac Dioscor. cap. 3. tertij. Plin. cap. 7. lib. 25. Galen. 6. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Extenuat, perpurgat, abstergit, & aperit.

Geranion, uulgò herba gruaria, quod in summitate habeat caput gruis. Huius species sunt tres, una Latinorum, quæ est id quod uulgò dicitur rostrum gruis: & aliæ duæ Græcorum, inter quas est pes columbinus, & aliæ

82 DE CONSEN. MEDIC.

quæ folia maluæ similia habet. Diosc. ca. 122. tertij. Plin. cap. 6. lib. 16. Paul. lib. 7. Radicem habet esculentam quæ inflammationes uteri dissolvit.

Gingidium, nisi sit quod vulgò dicitur cerofoglio, ut putat Ruellius & Fuchsius, nescio certè quid sit: nam in Cilicia & Syria nasci traditur. Dioscor. cap. 126 secundi. Galen. 6. de facul. simplic. & secundo de facul. alimentorum. Paul. lib. 7. Non habet calorem manifestum, sed siccatur in tertio & adstringit.

Git, μελανήριον, siue nigella, idè sunt. Brasauola vult id esse quod vulgò dicitur gitone: aliqui volunt esse quod vulgò dicitur rosula, aut id quod pro nigella à seplasiarijs uè dicitur: nam omnia indicia præter colorem habet. uide Diosc. cap. 84. tertij. Gal. 7. de facul. simp. Plin. cap. 17. lib. 20. Paul. lib. 7. in tertio calefacit & desiccatur.

Gladiolus Pliny est acorus, sed gladiolus Dioscor. est cuius flores in Hetruria dicuntur Monacaccie, Græcè dicitur ξιφίδιον. Diosc. ca. 22. quarti, & Gal. 8. de fac. sim. Paul.

lib. 7. Radix trahit, discutit, & siccat.

Glaucium est quod dicitur memithe, à Serapione & ab Auic. Nota tamen duo esse in Serapione capita, alterum de glaucio græcorum, alterum de chelidonia minori. Dioscor. ca. 91. tertij. Gal. 6. de fac. simp. Plin. ca. 10. lib. 27. Paul. lib. 7. Adstringit & manifestè refrigerat.

Glaux nisi sit, ut Ruellius, quod dicitur uulgò galenga, siue ruta capraria, quid esset profectò nescirem: ualet enim galenga in peste, & ad uenena serpentum epilepsiaë que, si eius succus ad mediam unciam bibatur: sed quia galenga lac non facit multiplicare, dicere possem non esse glaucum, uide Diosc. ca. 136. quarti, & Gal. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Calida & humida temperamento est, unde lac generat.

Glycyrrhiza, uulgò regolitia. Theoph. scitica, c. 13. lib. 9. Et Gal. 6. de fac. simp. Diosc. cap. 5. tertij. Plin. cap. 9. lib. 22. Paul. lib. 7. Tepidi humidique temperamenti, alicuius adstrictionis particeps.

Gramen, ἀγρόν, multas habet species, sed

apud nos duæ tantum inueniuntur : altera scilicet communis, altera quæ uulgò dicitur sanguinella ouer capriola. Nota tamen non habere proprietatem ullam contra uermes, ut communis erat opinio. Dioscor. cap. 31. & 32. quarti, Galen. 6. de facul. simpl. Plin. cap. 19. lib. 24. Paul. lib. 7. Siccatur & modicè refrigerat, tenuis & subacerbæ substantiæ.

Halicacabus est apud Arabes Alchechen- gi, & est species solatri: uide igitur fusius de speciebus solatri, cap. de solatro.

Halcyonium, uulgò spuma maris, à septarijs dicitur, cuius species quinque enumerantur à Dioscor. cap. 90. quinti, Plin. cap. 9. lib. 32. non nisi quatuor species recensuit: ego quum essem Venetijs, uix duas species uidi. Galen. 11. de fac. simp. quinque etiam memorat. Paul. lib. 7. Abstergit, discutit, acri- qualitate præditum.

Harundo quinque species habet, ut Dioscorid. sed Plinius species 29. enumerat, cap. 36. lib. 16. & cap. 11. lib. 24. Vide Theophrast. cap. 12. lib. 4. & Gal. 7. de fac. simp. Diosc. cap. 99. lib. 1.

IN COGNO. SIMPLIC. 65

Hedera, *κισσός*, tres habet species, & omnes cognoscuntur. Qui maiorem de hedera lectionem cupiunt, legant Theophrast. cap. 18. lib. tertij. & Plin. cap. 34. lib. 16. & Galen. 7. de facul. simp. & Dioscor. cap. 171. secundi. De hedera terrestri lege Chamæcissos. Paul. lib. 7. Hedera contrarijs constat uiribus, adstringit, refrigerat, acris est & calida, aquea substantia & repida.

Hedysaron, est herba quæ crescit inter aphacen, id est uitiam, unde Theoph. ca. 8 lib. 8. inquit, quod hedysaron est ueluti aphaca pestis, sicut lolium tritico. Vocatur etiam securidaca, eò quod semen in siliquis contentum ancipiti securi simile habeat. Diosc. ca. 137. tertij. Plin. cap. 17. lib. 18. Paul. lib. 7. Amarum est, & leuiter adstringit.

Heliochryson, nisi sit quod à nobis dicitur garyophilum Hispanicum, haud scio quid sit: uide Diosc. cap. 55. quarti. Plin. ca. 25. lib. 21. Galen. 6. de facul. simp. sub nomine amaranthi. Facultatem habet incidentem & extenuantem, unde grumos sanguinis liquat ac dissoluit. Paul. lib. 7. itidem adserit.

e. i.

Heliotropiū duplex, maius & minus. Maius apud nos uulgò dicitur Mirasole, apud Hetruscos dicitur uerrucaria, & uulgò herba da porri, quoniam porros dissipat. Valet etiam mirabiliter cancris, idcirco dicitur etiam herba cancri: uide Dioscor. cap. 185. & 186. quarti. Paul. lib. 7. Manus calidam, siccam, & abstergentem uim habet: Minus uerò lumbricos interimit.

Helxine, uulgò uitriolo, alij dicunt esse speciem inuolucris, quod flores in modum campanæ albos fert. Dioscorid. cap. 37. quarti. Credo ego uerè quòd sit parietaria: uide Gal. 6. de fac. simpl. & Plin. cap. 15. lib. 11. Paul. li. 7. Vis est abstergendi & leuiter adstringendi cum humiditate subfrigida.

Hemerocallis, est lilium syluestre, non autem lilium conuallium, ut uolunt nonnulli. Germani utuntur lilio conualli ad corroborandum cor, cerebrum, & omnia membra spiritalia: ualet etiam tremori cordis, epilepsiae & apoplexie, morsibus & puncturis uenenosorum animalium. Dioscor. cap. 128. tertij. Galen. 6. de facul. simplic. Paul. lib. 7. Ra-

dix uiribus lilio responder : uide etiam Plin.
cap. 21. lib. 21.

Hemionitis, herba est apud me incognita,
nec est scolopendria illa quæ dicitur lingua
ceruina, quum sit phyllitis apud Dioscorid.
ca. 143. tertij. Paul. li. 7. Adstringit, & simul
amara, lienosis succurrit.

Hiberis duplex, altera Democratis, altera
à Paulo & Plinio recitata, quæ habet folia
lauro similia. Prima est lepidion Dioscor. se-
cunda uocatur piperitis siue piperella, à sa-
pore piperis acuto: uide Diosc. cap. ult. primi,
& Plin. cap. 8. lib. 19.

Hieracion, id est lactuca erratica, est her-
ba spinosa similis soncho, id est cicerbita, de
qua Plin. cap. 7. lib. 20. Valet cum lacte
mixta infirmitatibus oculorum, præsertim ci-
catricibus, suffusionibus, caligini : cum aqua
uerò & aceto bibita uentrem purgat : ualet
cum uino morsui serpentum & uulneribus,
si folia cum caule terantur : somnum excitat,
Venerem prohibet, refrigerat, & sanguinem
auget: uide Diosc. cap. 65. & 66. tertij. Plin.
cap. 7. lib. 20.

e. ij.

Hippoglosson, uulgò bis lingua uel bonifacia, ualet praefocationib⁹ uteri, si cochleare eius radice sumatur. Valet etiam mirabiliter ruptis siue crepatis, si pulueris cochleare cū brodio carnis quotidie sumatur: uidentur tamen in primis diebus eorum uelle intestina exire, nihilominus postea conglutinantur, idcirco diligenter in primis illis diebus ligentur. Dioscorid. cap. 127. quarti. Plin. cap. 10. lib. 77. Paul. lib. 7. Molliendi uirtute pollet.

Hippuris siue equisetū, uulgò cauda equina, huius aliud genus asprella dicitur. Valet, ut testatur Galen. 6. de facul. simplic. omnibus uulneribus, etiam si nerui essent praecisi. Dioscorid. cap. 44. quarti. Paul. lib. 7. Adstringit & ualenter circa mordacitatem exiccat.

Hordeum, κριθή, ex quo paratur ptisana. Dioscorides cap. 78. secundi. Galen. 7. de facul. simplic. & primo de facultat. aliment. Refrigerat & siccatur in primo ordine cū pauxilla adstrictione: itidem Paulus lib. 7.

Hordeum murinum, φολίτζ, uulgò lolium

DE CONSEN. MEDIC. 69

Sylvestre, ubique nascitur ac ipsum frumentum. Dioscorid. cap. 40. quarti. Plin. cap. 25. lib. 22.

Hyacinthus, est secundum aliquos id quod uulgò dicitur cipola seluatica, nec est ille hyacinthus, de quo fabulantur poetae, ex Aiakis sanguine natus: nam ille producit florem rubrum iridi similem. Dioscor. cap. 61. quarti. Galen. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Refrigerat in secundo, siccatur in primo, semen leuiter abstergit & adstringit.

Hydropiper non est, ut Ruellius, uulgaris canuazola, sed potius quædam species persicariae, quæ nullam in folijs maculam præsefert: hæc enim seruat omnes illas cõditiones, quas illi tribuit Diosc. cap. 150. secundi. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Aquaticum piper calidum, sed piperis modo.

Hyoscyamus albus & niger non inuenitur, sed tantum qui flores flauos profert, uulgò dicitur iusquiamo ouer dente cabalino. Dioscor. cap. 67. quarti. Latine dicitur apollinaris herba siue altercum. Galen. 8. de facul. simp. Plin. cap. 4. lib. 25. Paul. lib. 7. Est e. ij.

ex tertio refrigerantium ordine.

Hypecoon, uulgò ruta seluatica. Dioscorid. cap. 66. quarti. Galen. 8. de facul. simp. Plinius cap. 11. lib. 27. Paul. lib. 7. Refrigerat in tertio.

Hypericon, ascyron, androsemon, & cori, una & eadem res est, & si aliqua in folijs, caule, & floribus differentia adsit. Vocatur uulgò perforata, nec est ruta syluestris, ut opinatur Brasauola, sed est uera perforata, qua uulgariter utimur. Dioscor. cap. 162. & 163. & 164. & 165. Galen. 8. de facul. simp. Plin. cap. 8. lib. 26. Paul. lib. 7. Tertias species calefacit, & siccat tenui substantia prædita. De alijs dictum est in Androsemon.

Hyssopus, uulgò etiam hyssopo dicitur, aliqui putarant gratiolam esse hyssopum montanum, sed decipiuntur: nam graciola in locis humidis nascitur, & soluit uentrem, educens bilem & pituitam, & ulcera conglutinat. De hyssopo lege Dioscoridem cap. 27. tertij. Galen. 8. de fac. simp. Calidus & siccus in tertio ordine.

Iaspis, uulgò dicitur diaspro: meminit Dio-

seo. cap. 160. lib. 6. & Galen. 9. de fac. simp.
Paulus lib. 7. Confert non continentibus ci-
bum in stomacho.

Indicus lapis, uulgò endego, naturalis non
habetur: quo uerò utimur, fit ex isatide si-
ue gado. Dioscorid. cap. 61. quinti. Plinius
cap. 6. lib. 35. Paul. lib. 7. Contra hamor-
rhoidas ualet.

Inula, ἐλένιον, uulgò enola ouer iola. Dio-
scorid. cap. 27. primi. & Plin. cap. 5. lib. 19.
& Gal. 6. de fac. simp. Valet pectoris humo-
ribus uiscidis, item sciaticis in modum cata-
plasmatis, & fluxionibus paruis ab humidi-
tatibus factis. Paul. lib. 7. Calida est & sicca
cum excrementitia humiditate.

Ireon, ἐρύσιμον, modò inter segetes, modò
inter herbas nascitur, acuta est ac nasturtiū:
certè puto quòd res sit similis lysamo: nasci-
tur ubique cum folijs erucæ, floribus paruis
& flauis, à quibus corniculæ quædam, in
quibus est semen, proueniunt. Dioscorid. cap.
147. secundi. Plinius duobus in locis 7. &
10. cap. lib. 28. & cap. 25. lib. 22. simili-
ter Gal. 6. de facul. simplic. & primo de fa-
e. iiij.

72 DE CONSEN. MEDIC.

cul. aliment. Paul. li. 7. Erisimi semen igneum calefactoriumque est.

Iris, seplasiarius irios, uulgò zilio morello, de hac nullibi iuxta Galen. nisi in Andromachi theriaca, ubi illyrica commendatur. Dioscorid. cap. 1. primi libri. Et Plin. cap. 7. lib. 21. Paulus lib. 7. Affatim calefacit, extergit, & maturat, tenuis substantiae cussi utilis.

Isatis, uulgò guado da tingere: nam colores in sua uiuacitate omnes conseruat. Dioscor. cap. 107. & 108. secundi. Galen. 6. de facul. simp. Paul. lib. 7. Siccandi uires & adstringendi habet.

Isopyron hucusque non uidi, nec qui uiderit uel cognouerit adhuc intellexi. Dioscor. cap. 116. quarti. Galen. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Abstergit, incidit semen eius.

Iuncus odoratus, ροῖνος, uulgò squinanto, prouocat urinam & menstua. Vide Diosco. cap. 16. primi. Gal. 8. de fac. simp. Plin. cap. 18. lib. 21.

Iuncus, ὄζυ' ροῖνος, uulgò zuncho. Diosco. cap. 50. quarti, & Galen. 8. de facul. simpl.

duas species iunci memorat, ut oxyschenon
 & oligoschenon. Paulus lib. 7. Oxyscheni se-
 men somnificum est, utriusque semen frixum
 desiccatur, & fluxus cohibet.

Iuniperus, ὀξυζύκος, gummi eius sandara-
 ca siue scriptorum uernix est, sandaraca in-
 quam Arabum: nam sandaraca Dioscor. est
 res mineralis, similis auri pigmento. Fit ex
 hoc gummi & oleo de semine lini artificia-
 liter uernix liquida, qua utuntur pictores
 ad illustrandas picturas: ualet combustio-
 ni ignis & doloribus ac tumoribus hæmor-
 rhoidarum: gummi uerò iuniperi ualet ca-
 tarrhis, cohibet menstrua, fistulas exiccat,
 uermes interficit, & resolutis neruis confert.
 Dioscorid. cap. 89. primi. Galen. 6. de facul.
 simplic. Valet etiam scissuris manuum ac pe-
 dum ex frigore factis, & fluxum sanguinis,
 & hamorrhoidarum constringit.

Ixia, uiscus est radicibus chamaeleonis ad-
 hærens, quo pennæ sagittis adglutinantur.
 Diosc. cap. 21. lib. 6.

Ixus est uiscus quercinus, qui paratur &
 pueris in capiendis aubus. Dioscorid. cap.

74 DE CONSEN. MEDIC.

94.tertij. Galen. 6. de facul. simplic. Paul. lib. 7. Calefacit cum acrimonia, & humores ex alto elicit.

Lactuca, res nota est. Galen. 6. de facul. simplic. Frigida & humida, sed non excessiue, tollit sitim, & semen eius fluxum spermatum cohibet. Et secundo de facul. aliment. Generat sanguinem, quàm alia herba, meliorem, sed non omnino laudabilem. Diosco. ca. 125. secundi.

Labrusca, est uitis syluestris omnibus cognita. Diosco. cap. 2. quinti. Plin. cap. 29. lib. 12. Paul. lib. 7. Germina habent uim abstergendi nonnihil & adstringendi.

Ladanum, aromatarij laudanum dicunt. Plin. cap. 17. lib. 12. & Gale. 7. de fac. simp. Diosc. cap. 113. primi. Paul. lib. 7. Calidum in secundo, emolliens mediocriter, discutiens & maturans.

Lagopus, id est pes leporinus, nisi sit garyo phillata, ut Pandectarius: nescio certè quid sit: ualet in potionibus pro uulneribus & menstribus & sputo sanguinis, dysentericis & ramicis per os sumpta, & emplastri modo in

IN COGNO. SIMPLIC. 75

posita: est calida & sicca. Dioscorid. ca. 19. quarti. Galen. 7. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Desiccat.

Lanaria herba, siue radícula, res erat tempore Dioscoridis multum in usu, sed apud nos quid sit, nescio: ualet enim summopere in dealbandis lanis, cuius semen conditi dicitur, quod etiam minimè habetur. Dioscor. cap. 152. secundi. Plin. ca. 3 lib. 19. & Galen. 8. de fac. simp. Calida in quarto quodammodo ordine, siccaque est.

Lapathum siue rumex, uulgò dicitur romice, de quibus plura Dioscor. cap. 106. secundi. Oxylapathon enim & hippolapathon, & oxalida sunt species lapathi: uocatur primum lapathium, acutum: secundum, magnum laparium, quod folia rheubarbaro similia habet ex oxalida, quã acetosam, & uulgò herbam bruscã uocant. Plin. cap. 21. lib. 20. & Galen. 7. de facul. simplic. Paul. lib. 7. Oxylapathum discutit, & pauxillum repellit.

Lapsana, res est incognita, sed iuxta Plin. est species brassicæ syluestris. Dioscorid. cap.

76 DE CONSEN. MEDIC.

107. Plin. cap. 8. lib. 20. Galen. 7. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Abstergit, discutit.

Lacer siue lacerpitium, uulgò assa, quæ in fœtidam & odoratam diuiditur. Assa fœtida est quæ habetur apud aromatarios: odoratus uerò lacer, est quod uulgò dicitur belzoino. Nota tamē non haberi assam dulcem, nec eius loco succū glycyrrhiæ poni, sed potius belzoino uocato. Diosc. cap. 85. tertij. Gal. 8. de fac. simpl. Paul. lib. 7. Probè calefacit, extrahit, emollit. Plin. cap. 3. lib. 19.

Lathyrus, est quæ uulgò dicitur cataputia siue caxxapuzā maior: nam minor est ricinus. Dioscor. cap. 171. quarti. Gal. 7. de fac. simpl. Plin. cap. 11. lib. 27. Paul. lib. 7. Purgandi uim obtrinet.

Laurus, arbor notissima, olim in pretio habita. Sunt qui uelint per se laurum ignem accēdere, dummodo rami simul confricentur & sulphur sursum proyiciatur. Dioscor. cap. 91. primi. Galen. 6. de facul. simpl. Paulus lib. 7. Folia siccant & calefaciūt insigniter.

Laurus Alexandrina, siue laureola, & si rusco & hypoglosso similis sit, imò pro hyp-

MEDIC. IN COGNO. SIMPLIC. 77

poglossio à Fuchfio accipiat, quum re ue-
ra non fit, mihi incognita restat. Dioscor.
cap. 142. quarti. Galen. 6. de facul. simpl.
Paulus lib. 7. Calida, acris & subama-
ra est.

Lemnia terra, est uerus bolus Armenius, o-
rientalis dictus, si bene consideretur Gale-
ni locus lib. 9. de facul. simpl. nec est terra
illa sigillata, quam tanti faciunt. Dioscor.
cap. 67. quinti. Plin. cap. 6. lib. 35. Paulus
lib. 7. Siccat & adstringit mediocriter.

Lentes siue lenticulae, uulgò dicuntur len-
ticia. Dioscor. cap. 98. secundi. Galen. 8. de
facul. simpl. Paul. lib. 7. Siccant in secundo
ordine, medio caloris & frigiditatis tem-
peramento.

Lens palustris, uulgò dicitur Zen uel len-
ticularia, oritur in aqua. Dioscor. cap. 34.
quarti. Gal 8. de facultate simplicium Paul.
lib. 7. Humectat & refrigerat in secundo
abscessu.

Lentiscus arbor, Græcè ξύλον τὸ δένδρον,
est quæ mastichen producit. Dioscor. cap.
77. primi. Galen. 8. de facul. simpl. Plin.

78 DE CONSEN. MEDIC.

cap. 6. lib. 13. Paul. lib. 7. Siccat in secundo, medius in calefaciendo & refrigerando.

Lepidium, est piperitis, ut dictū est de Iberide. Dioscor. cap. 165. secūdi. Ruellius, Her-molaus, & Manardus putant, quod sit Raphanus. Plinius cap. 8. lib. 19. Galenus 7. de facultate simplicium. Calefacit in quarto, & est simile nasturtio. Paul. lib. 7. idem refert, sed ipse inquit in tertio.

Lichen, seplasiarijs hepatica. Plinius cap. 4. lib. 26. duas species commemorat: alteram quæ solum latifolium apud radices habet, alteram quæ petris adhæret, ueluti muscus. Valet lichenis, id est uolaticis. Dioscor. cap. 51. quarti. Galenus 7. de facul. simplicium. Paul. lib. 7. Extergendo purgat, mediocriter siccat & refrigerat.

Ligusticum, ab aliquibus pro leuistico accipitur, sed si litera Dioscor. bene pondere-tur, non est uerum ligusticum: uide Dioscor. cap. 53. tertij. Galenus 7. de facultate simpl. Paulus lib. 7. Excalefaciunt ac probè flatum discutiunt semen & radix.

Lilium uulgare est, quod uulgò marie-

gone dicunt, de uulgari. Dioscor. cap. 107. tertij. Galenus 7. de facultate simpl. Plinius cap. 5. lib. 21. Paul. lib. 7. Flos lilij discutiendi ac emolliendi uireus habet.

Limonium, simile est betæ syluestri. Plin. cap. 8. lib. 20. Quauis affirmet Galenus se nunquam betam syluestrem uidisse. Diosc. cap. 18. quarti. Gal. 7. de facul. simpl.

Lini seminis oleum, neruorum & iuncturarū durities mollit, & est mirabile hæmorrhoidibus, ignis cōbustionibus cum aqua rosacea lotum. Sumuntur & in principio morbi lateralis ex eo uncia quatuor, & sanat. Dioscorides cap. 94. secundi. Galenus 7. de facultate simplicium. Calidum quasi in principio, medium inter siccum & humidum.

Lithargyros ex plumbo & are prouenit, dum argentum & aurum depuratur. Dioscorides cap. 56. quinti. Plinius cap. 6. lib. 33. & Galenus 9. de facul. simpl.

Lithospermō, seplasiarij miliū solis uocāt: crederem ego id esse quod uulgò dicitur lacryme da corone. Miratur Plinius cap. 11.

80 DE CONSEN. MEDIC.

lib. 17. de lithospermio. Dioscor. cap. 149. tertij. Paulus lib. 7. Calculos frangit & urinas elicit.

Lolium, uulgò dicitur loio, nec est pseudomelanthium, ut Fuchsius. Gal. 6. de facult. simpl. Dioscor. cap. 191. secundi. Paul. lib. 7. Calidum in primo tertij, & siccum in fine secundi.

Lotus Aegyptia, uocatur à Serapione handococa, ex cuius semine paratur oleum ad dolorem iuncturarum: uerùm de utraque loro intelligit Serapio. Dioscor. cap. 109. quarti. Galen. 7. de facult. simpl. Plin. cap. 17. lib. 13. & cap. 31. lib. 15. Paulus lib. 7. Lotus arbor extenuat & siccat, ac mediocriter adstringit.

Lotus satina, nisi sit melilotus uulgaris, haud scio quid sit. Lotus syluestris ignota est. Dioscor. cap. 106. & 107. quarti. Paulus lib. 7. Lotus domestica à nonnullis triphyllon appellatur: abstersorias uireis & modicè siccanteis obtinet.

Lupini, quauis amari, coctione tamen dulcorantur & comeduntur, maximè domesti-

IN COGNO. SIMPLIC. 81

ei. Dioscor. cap. 101. secundi, & Galenus 1. de facultate aliment. & 6. de facultate simplicium. Paulus lib. 7. Esculentum obstruit, amarum abstergit, dissipat, & sine morsu desiccatur, lubricos occidit, & viscera purgat.

Lychnis, nisi id sit quod vulgò dicitur rosete, profectò nescirem quid sit: nam Plinius cap. 4. lib. 21. inquit, rosarum speciem esse in aquosis locis nascentem cum quinque folijs. Dioscorides cap. 105. & 106. tertij. Galen. 7. de facul. simpl.

Lycium, aliud est quo seplasiarj utuntur, aliud quod à Dioscor. cap. 117. primi recitatur. Quod uerò in officinis uenditur, alij componunt ex baccis lygustri, alij ex matrissylua, utrisque simul: sed uti possumus pro lycio sumach. uide Galen. 7. de facultate simplicium: nam ex pixiacantha arbore fieri inquit, ualens ulceribus oris malignis & serpentibus. Plinius cap. 7. lib. 12. & cap. 14. lib. 24. Paulus lib. 7. Calefaciendo & refrigerando medium est, desiccatur uerò in secundo abscessu.

f.i.

82 DE CONSEN. MEDIC.

Lycopsis, nisi sit species anchusæ, aut cynoglossa vulgaris, nescio profectò quid sit. Vide Dioscor. cap. 27. quarti. Plin. cap. 11. lib. 27. Paul. lib. 7. Radix adstrictoria.

Lyncurion, est electrum siue succinum plumas siue paleas trahens, ut refert Dioscor. cap. 73. secundi: unde pterygosoron dictum: uide de Electro.

Lysimachia, non est cereta, sed alia longè diuersa herba: nam cereta folia lino similia habet, non salici. Dioscorides cap. 3. quarti. Plinius cap. 7. lib. 25. Galenus 7. de facultate simpl.

Macer, siue macis, est cortex nucis Indica, ut coniectari possum. Dioscorides cap. 95. primi. Galenus 8. de facul. simpl. male interpretatur à Pandectario cortex mali punici. Paulus lib. 7. Inter frigiditatem & calorem medium obtinet, siccatur in tertio ordine, & adstringit.

Malabathron, uulgò folium Indicum, nobis ignotum, pro quo utimur castia uel nar-do Indico, ut Galenus in succidaneis. Diosc.

cap. 11, primi. Plinius cap. 27. lib. 12.

Malua, μαλάχη. Diosc. cap. 109. secun-
di. Galenus 2. de facultate alim. Theoph.
cap. 5. primi. Plinius cap. 21. lib. 20. Paulus
lib. 7. Sylvestris mediocriter discutit & mol-
lit, hortensis uerò imbecillior.

Mandragora pluribus in locis Italiae na-
scitur. Vanum est credere mandragoræ ra-
dices habere formam hominis: uerum pro-
pter pomū, quod cum radicibus euellitur, for-
mā hominis sine brachijs præsefert, unde Py-
thagoras ἀνθρωπόμορφον appellauit Diosco.
cap. 74. quarti, & Galenus 7. de facultate
simplicium. Frigidus est in tertio, sed poma
eius aliquid caliditatis in se habent. plura
habet Serapio in lib. aggre.

Manna, non dico thuris, sed solutium est
in multiplici differentia, ut referunt Arabes.
Duplex est quod ad nos affertur, masticinū
scilicet & bombicinū: masticinū dictū, quia
simile est grano mastice, & est excellentissi-
mū bombicinū nullius ferè pretij. Calabrensis
dictum ualidius est in folijs, q̄ quod in ra-
f. ij.

mis arborum colligitur, unde uulgò dicitur manna di foglia, minutis granis transparen-
rens, graue, album, dulce, & suaue, Arabes
duas species assignāt, Mānam scilicet & Te-
reniabim, nec inter se hæ duæ differunt, nisi
quòd Terenabim est liquidius. uide de man-
na Galenū 3. de fac. aliment. ad eorū confu-
sionem, qui Galenum mannā non cognouisse
affirmant, in capite de melle, ubi multa de
manna pronuntiat. Est & manna thuris, &
est quidam puluis, ut testatur Dioscor. cap.
69. primi: uide de manna Auicen. & Sera-
pionem cap. de tereniabim & menh.

Marrubium, Μαῦρον, Galenus 8 de fac.
simpliciū, & Theoph. cap. 2. de histor. plant.
Dioscor. cap. 110. tertij. Est & alterum mar-
rubium nigrum, ballore dictum, quod adeò
melissæ est simile, ut uix ab ipsa, nisi malus
odor adesset, agnosceretur. Dioscor. cap. 108.
tertij. Paulus lib. 7. Nigrum est, acris &
abstersorie facultatis. Prasion uerò cale-
facit in secundo, siccatur, & uiscera laxat.

Marum, nisi sit quod uulgò dicitur maio-

rana fina, haud scio quid sit: nam bene redolet, ut m. trum. Vide Galenum de antidotis cap. de compos. hedicroi, & Dioscoridem cap. 44. terry.

Medica, herba in Hispania abundantissima, in Italia non habetur, Arabicè alfasar. Ruellius hanc nasci in Gallia adserit, uocarique trifolium maius. cap. 136. secundi. Plinius cap. 16. lib. 18. A' Medis inuenta dicitur.

Medium, quum nec uiderim, nec apud me de eo aliqua sit imago (in Media enim tantummodo nascitur) nescio quid affirmare debeam. Dioscorides cap. 20. quarti. Plinius cap. 12. lib. 27. Galenus 7. de facultate simplicium. Contrariam semini eius habet temperiem: nam menstrua herba constringit, quæ semen prorsus elicit.

Melilotus, quem etiam sertulam campanam uocant, assertur ex Neapoli Venetias: quo uerò utuntur seplasiarij, uerus non est, sed species trifolij: sunt tamen qui dicant melilotum uulgare esse lotum. Dioscorides f. ij.

Plinius cap. 9. lib. 21. Et Galenus 7. de facult. simplic. Dioscorid. cap. 43. tertij, Paulus lib. 7. Diuersis facultatibus pollet, adstringendi scilicet & discutiendi & concoquendi.

Melissophyllon, uulgò dicitur moliserno ouer cedronella, cardiacis & tristibus, ut referunt Arabes, & passionibus cordis ualet & aperit oppilationes cerebri. Dioscor. cap. 109. tertij. Gal. 7. de fac. simp. Paul. lib. 7. Viribus marrubio responder.

Menta & mentastrum excitat Venerem, ut Gal. & Dioscor. quanuis contrarium sentiat Plin. cap. 14. lib. 20. Vide in hoc Galenũ 6. de facult. simplic. & Dioscorid. cap. 36. & 37. tertij. Vermes etiam interficit. Paul. lib. 7. Calida in tertio ordine, tenuis, acris cum humiditate semicocta.

Meon etsi multa copia nascatur in Hispania, nullibi tamen, quòd sciam, in Italia habetur: nam quod passim ostenditur pro meo, est radix saporis pastinacæ similis. Eius nice funguntur myrobalani, uulgo dicti ben

delli profumeri, unde etiam sub nomine nucis
unguentariae appellantur. Diosco. cap. 3. pri-
mi. Plin. cap. 23. lib. 20. Gal. 7. de fac. simp.
Paul. lib. 7. Calefacit in tertio ordine, in se-
cundo siccatur.

Mercurialis herba, ob enæmatum usum
notissima: uide Plin. cap. 5. lib. 25. Gal. 7. de
fac. simp. & Dioscor. cap. 183. quarti. Paul.
lib. 7. Aluum liberaliter subducit, & illitæ
discutit.

Millefolium duo capita habet. Dioscorid.
alterum de stratiote millefolia, & alterum
de myriophyllo. Sunt qui uelint, stratiotem es-
se millefolium uulgare nostrum, quam in my-
riophyllo unus tantum coliculus, & in no-
stro uulgari plures inueniuntur. De stratiote
loquitur Galenus 8. de facult. simplic. &
Dioscorid. cap. 110. quarti: de myriophyllo
cap. 100. quarti, & Galenus 7. de fac. simp.
in fine. Plin. cap. 16. lib. 24. Paulus lib. 7.
Vim siccandi adeò obtinet, ut conglutinet
uulnera.

Mora tam alba quam nigra cognoscun-
tur: habent uim soluendi & constringendi.

f. iij.

Diosc. cap. 147. primi. Gal. 8. de fac. simp.
Paul. lib. 7. itidem ad serie.

Muscus arborū, uulgo dicitur usnea, quæ,
ut refert Serapio, somnum prouocat, uomitum
& fluorem uentris cohibet, & est medicina
cordis, ut Auic. Diosc. cap. 20. primi, Gal. 6.
de fac. simp. Paul. lib. 7. Quod cedris adhæ-
ret, distrahendi simul & molliendi uim mo-
deratam habet.

Muscus odoratus est res quæ in gazellarū
folliculis continetur, recens & immatura, gra-
uis ac pessimi odoris, sed quum maturuerit,
tanquam sanies è folliculis egrediens est gra-
uissima ac pretiosissima, calida & sicca in
secundo ordine. lege Serapionem lib. aggre.

Muscus marinus est uulgaris corallina,
quæ pro enecandis uermibus datur pueris.
Gal. 6. de fac. simp. Diosc. cap. 94. quarti,
Paul. lib. 7. Infrigidat & adstringit.

Mumia uera non habetur, sed posset pa-
rari uera, si corpora mortuorum ex aloe, myr-
rha & croco condirentur: deinde id liquoris
ad tempus exciperetur. Valet ita parata
doloribus capitis frigidis, paralyti, oris tor-

tura, uertigini, si extrahatur per nares cum aqua maiorana, & doloribus aurium cum oleo uiolaceo albo. Est calida & sicca in tertio secundum Arabes.

Myos otis, id est, muris auricula, nisi sit quod uulgo dicitur centone, haud scio quid sit. Gal. 6. de fac. simp. Diosc. cap. 175. secūdi. Plin. cap. 12. lib. 27. Paul. lib. 7. Refrigerat & humectat, & uocatur ab ipso alsine.

Myrrha uera non habetur, nisi fortè nostra communis sit, quæ à Diosco. dicitur caucalus siue ergasine: nam nostra cunctis conditionibus requisitis indiget, quum nec sit uiridis, nec crassa, nec acuta, nec odorata, nec colore unita: quare caueant qui in potionibus ac catapotys eam imponunt. Diosc. cap. 69. primi. Gal. 8. de fac. simp. & in lib. Antid. in compos. Theriacæ. Paul. lib. 7. Calefacit in secundo, & siccatur. uide etiam Plin. ca. 16. & 17. lib. 12.

Myrrhis, herba, nisi sit cicutaria, ut communis est opinio, uel cerefolium, ut Manardus, nescio quid aliud sit. Qui tenent hanc esse angelicam herbam, ualde decipiuntur: si-

90 DE CONSEN. MEDIC.

quidem angelica cicutæ folia non habet sed
potius pastinacæ. Dioscor. cap. III. quarti.
Paul. lib. 7. Calefacit in secundo, & nonnihil
extenuat.

Myrthus, μυρτὸν, frigida est & terrestris.
Gal. 7. de fac. simp. Quod uerò myrtidanum
dicunt, est quoddam gibbosum ueluti adnatū
myrtho. Diosc. cap. 33 primi. Paul. lib. 7. Va-
lentius siccatur.

Naphtha est ueluti oleum petroleum, uel
de monte zibio appellatum: reuera bituminis
genus, quod in mari mortuo, quod est stagnū
minoris Syria, nascitur. Calefacit, exiccat, &
uulnera recentia conglutinat. Dioscor. cap.
86. primi.

Napellus Auicennæ nisi sit toxicon Dio-
scoridis, ut putat Manardus, nescirem pro-
fectò, ni Dioscoridis capita huc referrem: est
enim mortiferum uenenum. Auic. lib. 2. Cali-
dum & siccum est in summo.

Napus, βῆβαια, uulgò Nauon, ex cuius se-
mine oleum in Aegypto extrahitur. Diosc. ca.
103. lib. 2.

Narcissus, similis est hermodactylo, folia

habet porracea, tenuiora tamen & angustiora, caulem sine folijs, concavum, in quo candidus flos existit. Dioscorid. capit. 155. quarti. Theophrastus cap. 6. libr. 6. Plinius cap 3. lib. 21. Galen. 8. de facult. simp. Paul. libr. 7. Vim habet aliquam attrahendi & abstergendi.

Nardus est, quam spicam nardi seplasiarij uocant, & est Syriaca spica, & non Indica. Sed mirari satis non possum, quod si ab una eademque radice multæ ac numerosæ spicæ pullulenti (ut inquit Dioscorides) cur nō spicas, sed radices esse Galenus dixerit in Andromachi theriaca. Nec satis est dicere montanæ spicæ non ita oriri, quum ipsa, teste Dioscoride, non nisi bonitate odoris, torosiorēque spica differat. Quare caueat Mathiolus Senensis, quomodo in Manardum alioqui doctissimum tam aperte latret: nam & Galenus in eodem loco iubet in his & alijs Dioscoridē consuli. Paulus lib. 7. Calefacit in primo, siccatur in secundo. Vide & Gal. 8. de fac. simp. & Plin. ca. 12. lib 12.

Nardus gallica, uulgò spica Celtica, non habetur apud nos: uide Diosc. cap. 7. lib. 1. Quòd uerò non sit saluunca Plinij, non est ut probem. Gal. 8. de fac. simp. Paul. li. 7. Calidior superiori, minùsque adstringit.

Narcaphton, uulgò tignamo, ac si diceretur rhymiana, quod nihil aliud sonat, quàm suffumigium: uide Dioscor. cap. 22. primi.

Nasturtium, καρδάμων, uulgò agretto, est familiarissima herba, de qua Gal. 7. de fac. simp. loquitur, calida est. Dioscor. cap. 144. secūdi. Paul. lib. 7. Semen modo sinapis urit.

Nerion, uulgò dicitur oleandro, est uelut i uenenum, ut Gal. 8. de fac. simp. Enecant etiā (inquit Diosc. cap. 80. quarti) flores & folia omnes quadrupedes, ualent etiam emplastri modo morsibus uenenatorum, non autem sumpta, ut pararant nonnulli. Plin. cap. 2. lib. 24. Paul. lib. 7. Extrinsecus uim habet discusso-riam, & si intus assumatur, occidit. Dicitur etiam alio nomine rhododaphne.

Nymphaea, uulgò nenupharo, potentior est, quæ radicem albam fert: uide Gal. 8. de fac. simp. Diosc. cap. 140. & 139. tertij. Plin. ca.

7.lib.25.Paul.lib.7.Vires habet sine erosione siccas, uentrem reprimat, & genituram arefacit.

Oera est terra gialla, quanquam alij uelint esse terram rubeam: uide Diosc. cap. 62. quinti.

Ocymoides, uulgò basilico saluatico, Diosc. cap.29.lib.4. inuenitur inter frumēta. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib.7. Radix inutilis, semen sine erosione siccatur.

Ocymum, uulgò basilico domestico, Diosc. cap.130. secundi, & Gal. 2. de fac. alimen. & 8. de fac. simp. Calidum in secundo ordine cum superflua humiditate: itidem Paul. lib. 7. adserit.

Ocymum aquaticū, ἐρυος, uocatur. Dioscor. cap. 30. quarti, & est fortè apud Gal. echinum dictum. 6. de fac. simp.

OEnanthe est filipendula, Fuchsi. Theophrast. cap.7.lib.6. & Plin. cap. 24. lib.21. Diosc. cap.126. tertij. OEnāthe etiam accipitur pro flore uitis syluestris, qui insigniter adstringit stomachum, & aluum firmat, sed OEnāthe Dioscorid. eijcit secundinas, stilli-

cidio urinae & morbo regio medetur. uide Paul. lib. 7.

Olosteon, est species consolidæ, & non est pilosella, ut nonnulli putarunt: nam pilosella est herba ualde adstrictoria, ita ut uulnera conglutinet, cohibet fluores uentris & sputum sanguinis, & fluxus mulierum albos. uide Dioscorid. cap. 12. quarti. Galenum 8. de fac. simp.

Olyra, est species zea, uulgo spelta nominata, nec est segala, ut Virgilius Marcellus: nam ex olyra panis dulcissimus conficitur, & ex segala amarus, nec siligo est segala, ut aliqui putarunt, sed potius species grani, ex cuius flore panis albißimus & optimus olim conficiebatur: quod contrarium omnino accidit nostræ segalæ seu ferragini, ut à Plinio uocatur cap. 16. lib. 18. uide Dioscor. de olyra ca. 82. secūdi, & Gal. 1. de fac. alimen. & 8. de fac. simp.

Opium fit ex lacte, quod à papaneris capite destillat, ut Dioscorid. cap. 63. quarti. Paulus lib. 7. tenet, quod sit frigidum in quarto: nihilominus eius amaritudo non

IN COGNO. SIMPLIC. 95

frigidum simpliciter, sed aliquatenus calidum potius affirmaret, quare diligentius res consideretur. uide Gal. 7. de fac. simp. ubi de papaueris specie agit.

Opopanax fit ex panacis herculei liquore. uide Dioscoridem cap. 50. tertij, & Galenum 8. de facult. simplic. calidum in tertio, & siccum in secundo. Mesu. cap. de opo. Pituitam crassam & uiscosam in remotis partibus corporis contentam soluit. Paulus lib. 7. Mollit etiam & discutit.

Origanū, quo urimur, ut refert Brasauola, est heracleoticum, sed iuxta aliorum opinionem, est origanū syluestre & heracleoticum, & onitis nostro tempore non inueniuntur. Dioscorides cap. 29. tertij, Theophrastus cap. 2 lib. 6. Plinius ca. 17. lib. 20. Galenus 8. de facult. simpliciu. Habet uim incidendi, extenuandi, siccandi & calefaciendi in tertio abscessu.

Orminum nisi sit, ut Ruellius, selarea, nescio certè an reperiatur. Diosc. cap. 126. tertij. Plin. cap. ult. lib. 22. Gal. in fine primi,

de fac. alimen. alteram speciem ormini memorat. Paul. lib. 7. Marrubio simile, calidū, mediocriter siccum & abstergens.

Ornithogalos, quanuis ubique inter segetes nascatur, nondum à me uisa est: radices habet quas edūt pueri, ut refert Ruellius. Sūt in Veronensi agro quadam radices dulces, & in sapore castaneis similes, quæ thrasse uocantur. Diosc. cap. 133. secundi.

Orobanche non solum orobum strangulat, sed omnes quæ uicinae sunt, plantas sternit, unde ab aliquibus herba lupa, ab alijs cauda leonis, ab alijs uerò herba taurina, eò quòd à bobus comesta ad coitum eas promouet. Diosc. cap. 131. secundi. Theoph. 8. de histor. & quinto de causis plant. Plin. cap. ult. lib. 22. Paul. lib. 7. Est temperamenti sicci & frigidi ad primum ordinem.

Oryza, uulgò riso, nascitur palustribus & uliginosis locis, aluum compescit: uide Diosc. cap. 86. secundi. Plin. lib. 18. cap. 7. Paul. lib. 7. Vim habet adstrictoriam.

Osyris, uulgò linaria: uide Diosc. cap. 138. quarti Gal. 8. de fac. simpl. Plin. cap. 12. lib.

27. Paul. lib. 7. Amara est, & vires iecoris laxat.

Oxyacantha, Arabia berberi, nec est, si bene huius plantæ notæ considerentur, quod uulgò dicitur crespini. Dioscor. cap. 107. primi. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Fructus ipsius myrthi baccis respondet. Auic. tenet quod sit frig. & sic. in tertio.

Paeonia, fœmina, est notissima, sed mascula non inuenitur. Gal. 6. de facult. simp. Est renuium partium, sed non nimis calida, imò magis temperata, aut à temperie parum in calore distans. Dioscor. cap. 148. tertij. Plin. lib. 25. cap. 4. Paul. lib. 7. Radix acris leuiter, subamara & siccans, cui nōnihil adstrictionis inest.

Paliurus quid sit, re uera nescio: nam omnes antiqui in paliuro discrepāt. Theoph. cap. 17. libri tertij, & capit. 4. lib. 4. Diosc. cap. 113. primi. Plin. cap. 19. lib. 13. & cap. 13. lib. 24. Paul. lib. 7. Adstringit, & semen incidit.

Palma, φοίνιξ, res nota est: nam dactylis, quos ipsa fert, libenter uescimur: in quorum
g. i.

numero ponuntur etiam tamarindi, qui nil aliud sunt quàm dactyli Indiani. Diosc. cap. 129. primi. Galen. 8. de fac. simp. & secundo de fac. alim. Paul. lib. 7. Fructus iam maturus calefacit, reliqua palma ualde adstringit.

Panax quum triplex sit Asclepium scilicet ab AEsculapio, chyronium à Chyrone, & heracleum ab Hercule: & si aliquibus cognitum dicatur, reuera tamen ego non uidi. Sunt qui pro panace Asclepio mōstrant millefolium uulgare, & pro chyronio inulam campanam: uide tamen Dioscor. cap. 50. & 51. & 52. tertij. Gal. 8. de facul. simpl. Plin. cap. 27 lib. 12. & cap. 4. lib. 25. Paul. lib. 7. Herculeum calidum in tertio, & siccum in secundo, mollit & discutit: ex hoc fit opopanax Asclepium & chironium: priora sunt calidiora.

Pancration est minor & rotundior scilla: uide Dioscor. cap. 165. secundi, uide etiam de scilla Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. specie & uiribus scillæ simile est.

Panicum omnibus notum. Galen. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Siccat & refrigerat.

Papauer, *μῆκων*, duplex est, alterum sylue
stre, quod flores puniceos siue rubeos habet,
qui à uulgo in laterali morbo sicci habentur
pro efficaci remedio: alterū domesticū quod
rursus duplex est, album scilicet & nigrum,
quanquam horum à Diosc. tertia species assi-
gnetur: uide Dioscorid. cap. 62. & 63. quarti,
Gal. 7. de fac. simp.

Papauer cornutum, *μῆκων κεραυνός*, se-
pius à me uisum, sed spumeum, quod prope ma-
re nascitur haudquaquam. Theoph. cap. 13.
lib. 9. Qui dicunt glaucium ex hoc papauere
fieri, quod & memithe Arabes uocant, reue-
ra decipiuntur. Diosc. ca. 64. & 65. 4. Gal. 7.
de fa. sim. Paul. li. 7. Adstrigēdi uireis habet.

Papyrus in Italia nō habetur, ut Theoph.
ca. 9. lib. 4. & Plin. ca. 11. lib. 13. sed tantū in
Aegypto. Olim ex papyro chartæ cōficiēbā-
tur, unde etiam nomen adhuc retinet. Diosc.
ca. 100. primi. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib.
7. Siccat, chartæ crematæ modo.

Paronychia etsi à multis herbarijs cogni-
ta, nunquam à me uisa est, scio tamen folia
iuxta radices rotunda habere similia peplo.

g. ij.

uide Diosco. cap. 52. quarti, Gal. 8. de facul. simp. Paul. lib. 7. Extenuat, siccatur, paronychijs medetur citra erosionem.

Parthenium, uulgò *matricaria* ouer *amarilla*, nomen adhuc seruans *amaraci*, nec est secunda species *arremisia*, ut *Brasauola* & *Fuchsius*, nec est *cotula foetida*, nec *helxine*, quam *parietariam* dicunt, ut nonnulli sunt qui dicant *athanasiam* uulgò *daneda* uocatam, esse speciem *matricariae*. Dioscor. cap. 146. lib. 3.

Pastinaca, οὐλίβοι, tā domesticā quā syluestres, uulgò *pastonache* dicuntur, nec sunt *carubia* siue *carotae*, ut *Ruellius*, quum non habeant radices sanguineas, ut *carobae*. Decipiuntur etiam qui pro *dauci semine*, semen *pastinacae* accipiunt, quum alia res sit *daucus* à *pastinaca*. Diosco. cap. 54. tertij, Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. *Vrinas* & *menses* mouet, adstringendi uiribus praedita, syluestris tamen est ualentior.

Pastinaca, piscis est qui uulgò dicitur *pe-sce columbo*, in cauda habet spinam acutissimam & uenenosissimam, unde *Plin.* cap. 8.

lib. 32. Pastinacæ quoque radio scarificare
gingivas, & in dentium dolore utilissimum,
conteritque is, & cum helleboro albo illitus
dentes sine uexatione extrahit. Dioscor. cap.
19. secundi, Ex oleo in quo hepar huius pi-
scis sit decoctum, scabies non solum in homi-
nibus, sed etiam in beluis probè expellitur.

Peplus à Seplasiarijs esula rotunda dici-
tur, & est herba lacte plena. Peplus uerò quæ
in maritimis locis nascatur, nunquam à me
uisus est. Diosc. cap. 162. & 163. quarti. Gal.
8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Eius liquor rithy-
malorum modo purgat.

Peucedanum olim Dioscoridi familiare,
sed quod pro peucedano monstratur, non est
uerum peucedanum, optimū in Sardinia ori-
tur. Dioscor. cap. 83. tertij. Gal. 8. de facult.
simp. Plin. cap. 9. lib. 25. Paul. lib. 7. Calefa-
cit, discutit, & siccatur in tertio ordine.

Phalaris, species lithospermi, maior & mi-
nor reperitur. Dioscorides capite 150. ter-
tij. Plinius capite 12. libr. 27. Paulus libro
7. Calida est & tenuis, doloribus uesicæ
prodest.

g. iij.

Phaselus, vulgò *fasolo*, huius species plures enumerantur coloribus distinctæ. Nam aliqui sunt rubri, albi, alij citrini flauique, & ex diuersis coloribus picti. Dioscorid. cap. 99. secundi. uide de *smilace Auerrhoim*. Declinant ad calidum & humidum, impinguant corpus.

Phu Valeriana duplex, maior & minor. Minor autem lanuginosior & breuior est, flores fert albos & purpureos, simul mixtos, multas radices tenues habet. Maior uerò similis est *olusatro*, caulem habet cubitalem & maiorem, & cætera quæ in *Valeriana* nîsuntur, demptis floribus, quî *Narcisso* nō sunt similes: quanquam locum hunc in Diosc. corruptum putat *Ruellius*, quod fieri potest, quî cætera sint satis manifesta. Dioscor. cap. 10. primi. Gal. 8. de fac. simp. Vim habet *nardo* similem.

Phycus marinus, φῦκος θαλάσσιος, quid sit nescio, algam uertit *Theodorus*, sed non est alga, quæ *Venerijs* in seruandis uictris reponitur. Diosc. cap. 95. quarti. Gal. 8. de fac. simpl. *Plin.* cap. 23. lib. 13. *Paul.* lib. 7. Refri-

gerat, siccatur in secundo, & mediocriter adstringit.

Phyllitis est lingua ceruina, olim pro scolopendria habita, quum reuera nunc sit asplenon siue citrach Arabicè dictū, nec est hemiotitis lingua ceruina, ut Manardus, Leonicens & Fuchsius & Ruellius adserunt, si locus rectè perpendatur. Diosc. cap. 112. tercij. Gal. 8. de facul. simplic. Diarrhoeam cohibet phyllitis. Paul. lib. 7. Acerba qualitate cōstat.

Phyllyrea non est tilia, ut Hermolaus, Ruellius & Marcellus Florentinus interpretantur: nam tilia, Græcè φύλλυρα, & non φύλλυρέα dicitur. De tilia scripsit Theoph. cap. 10. lib. 4. cuius cortex modo emplastri recentia uulnera conglutinat, & folia eius trita inflammationes pedum resoluunt, & facit capillos renasci, prohibens etiam eorum profluuium. Phyllyrea, arbor, ignota est nostro tempore: uide Diosc. cap. 110. primi. Paul. lib. 7. Tiliæ folia adstringunt, iccirco ulceribus oris medentur.

Phyllon, uulgò folio, nisi sit persicaria maior, ut Ruellius: nescio profectò quid sit: uide g. iij.

Diosc. cap. 131. tert. Nullibi à Gal. nec à Paulo mentio habita est.

Pityusa à seplasiarijs Esula maior uocatur, cuius radices ab ijs qui à monte Gargano siue sancti Angeli ueniunt, pro turbit ueduntur, à peritis tamen medicis neglectæ: hæc uerò Esula maior alcebrā & scebram à Mesue nominatur, cuius rei fidem facit Serapio cap. de scebram: uide Dioscoridē cap. 160. lib. 4.

Plantago, *ῥπνὸ γλωσσιν*, maior & minor inuenitur: quanquam non desint, qui lanceolam herbam esse plantaginis affirmant. Maior constat septem neruis, media quinque, minor tribus: habent facultatem aqueam, frigidam, cum aliquali austeritate, ut Galen. 6. de facult. simplic. Dioscorid. cap. 115. secundi. Paulus libr. 7. Refrigerat & desiccatur in secūdo, temperata ex aquea & terrestri substantia.

Platanus in Italia, ut refert Theophrast. non nascitur, uide tamen Diosc. de eius uiribus, cap. 92. primi. Plinium cap. 7. lib. 15. & Gal. 8. de fac. simplic. Exiccatur & infrigidatur,

à latis folijs dicta est quæ habet instar fici folia. Paul. lib. 7. Frigidior & humidior ui constat.

Polemonia, nisi sit galego, siue gearcha dicta, ut refert Brasauola, nescio quid sit: nō habet tamen in summitate corymbos, ut refert Diosc. cap. 9. quarti. uide Gal. 8. de fac. simp. & Plin. cap. 6. lib. 25.

Polium sunt qui pluries uidisse affirmant, scio ego in hoc seplasiarios decipi: nam herbam pro polio ostendunt, quæ caules ualde tenues & lino similes, seminibus rotundis onustos habet, quæ polium reuera non est. uide Plin. cap. 7. lib. 21. & Theoph. cap. 21. lib. 9. Gal. 8. de facult. simplic. & Diosc. cap. 115. tertij. Paul. lib. 7. tertij. Calefacientium & siccantium ordinis est.

Polygonon, herba sanguinalis, tam mascula quam femina omnibus nota, uulgo corrigiola siue centinodia dicitur. Dioscor. cap. 4. & 5 lib. 4. Plin. cap. 12. lib. 27. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Habet uim adstringendi, frigida & humida in secundo ordine.

Polygonaton, uulgo frasinella siue gino-

chiella, cuius radicibus mulieres ad fucum utuntur: ab aliquibus etiam uocatur sigillum sanctæ Mariæ, & sigillum Salomonis. Manardus in hoc deceptus est, credens polygonatum esse secacul Arabum: nam Serapio scribens de secacul, nihil refert quod ad polygonatum attineat. Galenus 8. de facultate simplicium. Dioscorid. cap. 6. lib. 4. Paul. lib. 7. Variæ facultatis est, adstrictoriæ, acris & amara.

Polypodium, inquit Actuarius, purgat bilem nigram & pituitam. Manardus, soluit sine molestia. Mesues, extenuat corpora, quod & Galen. 8. de facultate simplic. ualenter exiccare inquit sine mordacitate. Dioscorid. cap. 179. quarti, Plinius cap. 8. libr. 26. Paulus libro 7. Siccat abunde citra morsum.

Pompholyx, qua utuntur sepalsiarij, est potius cadmia: quod uerò tucia non sit, apparet, quum tucia uera, leuissimus quidam puluis sit, non autem ut lapis ac nostra uidetur. Quare apud pharmacopolas non inueniri ruciam nunc affirmarem, nisi aliam habere

fortè inuestigauerint. uide Dioscor. cap. 43. quinti: nec ausus est aliquis, quòd sciam, hanc in catapotys siue pharmacis, quæ per os deglutiuntur, tuciam imponere. Gal. 9. de fac. simp. Plin. cap. 13. lib. 34. Paul. lib. 7. Siccatur sine erosione.

Populus, αἴγυπος, tam alba quàm nigra, nota est omnibus, uulgò ab Hetruscis dicitur oppi, à Longobardis Piope, ex quibus fabulantur electrum oriri, sed reuera ab insula quapiam olim Austrania dicta à quibusdam arboribus nostro pino similibus effluit, & ad Germaniam per maris inundationem aliquando perfertur. Hoc uulgò dicitur à seplarijs charabe, nec est gūmi populi, ut nonnulli retulerunt. Diosc. cap. 94, & 98. primi. Plin. cap. 24. lib. 16. Paul. lib. 7. Nigra calefacit in primo, modicè siccatur, tenuis substantiæ: alba aquosa est, tepida terrestriſque substantiæ & absterſoria.

Porrum capitatum dictum, quod in tempore transplātationis, si folia & radices porris incidantur, & aliquid quod illud descendere prohibeat, in plantando subterponatur,

facile capitatum euadat. Diosco. ca. 38. lib. 2.

De porro uerò agresti, lege Ampeloprasen.
Paul. lib. 7. Mali succi est & acris, extenuat
& abstergit.

Portulaca, ἀνδράχην, uulgò porcellana.
Galen. 6. de facul. simp. Frigida in tertio, &
humida in secundo, biliosos ac calidos hu-
mores cohibet, & ut refert Plin. cap. 21. lib.
20. rupturas umbilici constringit. Diosc. cap.
113. secundi. Paul. lib. 7. Refrigerat in tertio,
humectat in secundo.

Potamogeton, uulgò beta aquatica, nasci-
tur in lacustribus & aquosis locis, pruriti-
bus ac uetustis & depascentibus ulceribus
prodest. Diosc. ca. 96. quarti. Gal. 8. de facul.
simp. Paul. lib. 7. Refrigerat & adstringit.

Psylj semen, ut refert Gale. 8. de fac. simp.
frigidum est in secundo, humectat & desiccatur
mediocriter. Plin. c. 9. lib. 25. Diosc. c. 68. li. 4.

Ptarmice, uulgò oliuella, ea plerique pro
scopis utuntur, & dicitur ptarmice, eò quòd
odorata planta statim sternutamenta irriter.
Diosco. cap. 151. secundi. Gal. 8. de fac. simp.
Viridis, calida, & sicca in secundo: siccata

uerò in tertio ordine.

Pulegium omnibus notum, inuenitur masculum cum floribus albis, & foemellum cum floribus purpureis. Qui dicunt speciem calamenti esse id quod in usu est, ualde decipiuntur, siquidem calamenti species per se omnes inueniuntur. Diosc. cap. 31. tertij. Gale. 6. de fac. simp. Plin. ca. 14. lib. 20. Extenuat, calefacit, concoctionesque adiuuat, ut Gal.

Pumex, est lapis combustus ex monte *Aetnae*, uel *Vesuuino* monte *Campaniae*, qui si iterum comburatur, non erit *smyra* inferior. Dioscor. cap. 79. quinti, & Galen. 9. de facul. simplic. Habet uim exiccandi & abstergendi.

Pyrethrum sua radice notissimum, habet folia ueluti *daucus* & *foeniculus* agrestis. Dioscor. cap. 78. tertij. Gal. 8. de fac. simp. Facultas eius est caustica.

Pyrites lapis, uulgò *Marchesita*, probatur qui est aëri similis. Diosco. cap. 96. quinti. Gale. 9. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Validè discutit tumores, sanguinemque in grumo concretum.

Quercus, ὄρυς, connumeratur inter arbores glandiferas, sicuti etiam Elix, Fagus, Cerrus, Suber, Farnia, Ischia: uide Dioscoridem cap. 126. primi. Galen. 6. de facul. simp. Paulū lib. 7. Folia ac fructus siccant, ac tepida ui pollent.

Quinquesolium, πεντάφυλλον, maius foliamenta similia habet, & florē in pallido candidū, secūda species à prima tātū in colore differt, tertia per terram serpit, quarta folia similia uiti tenet, ab aliquibus diapensia, uel sannicula dicitur: uide Diosc. ca. 40. quarti, Gal. 8. de fac. simp. Radix eius exiccat in tertio, nec euidentem habet caliditatem. Plin. cap. 9. lib. 25.

Radix, ῥαφανός, uulgò Rauanello. Gal. 8. de fac. simp. Calida est in tertio, & sicca in secundo. Diosc. cap. 104. lib. 2.

Radicula, siue herba lanaria, sicuti tempore Diosc. cognita, ita nūc maximè restat incognita. Diosc. 153. secūdi. Gal. 8. de fac. simp. Paul. li. 7. Calefacit ī tertio, siccatur in secūdo.

Ranunculus, βατράχιον, est apium raninum, cuius species quatuor enumerātur: scili-

IN COGNO. SIMPLIC. III

cet apium, quod est pes columbinus, pes pai-
pi, pes milui, & apium risus, quod herba sar-
donia aliis appellatur: unde Virgilius,
Imò ego sardonis uidear tibi amarior herbis.
Hæc si ab homine deuoretur, ita interficit, ut
contractis neruis instar ridentis moriens ui-
deatur. Diosc. cap. 166. secūdi. Plin. cap. ult.
lib. 25. Paul. lib. 7. Omnia genera sunt excel-
lenter calida, sicca, acria, urentia.

Rhabarbarum, uulgò rheubarbaro, cogno-
scitur differenter ab omni rhapōtico, de quo
satis amplè tractauit Mesues.

Rhamnus, uulgò dicitur spinceruino, aut id
quod Hetrusci dicūt marucho. Diosc. ca. 104.
primi. Galen. 8. de facul. simplic. Exiccat &
digerit in secundo. Plin. cap. 14. lib. 24.

Rhapōticum, Diosc. cap. 2. tertij. Plin. ca.
12. lib. 27. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. cō-
positum ex terrestri frigida & tenui substan-
tia, aëreāque, calida, & leuiter acri.

Rhodia radix, nisi sit quæ garyophyllata
dicitur, certè nescio si unquam uiderim: hoc
scio, eam rosas, unde nomen accepit, redolere.
uide Dioscor. cap. 43. quarti. Galen. 8. de

III DE CONSEN. MEDIC.

fac. simp. Paul. lib. 7. Calefacit in secundo, tenui & discutiente ui prædita.

Rhu obsoniorum, uulgò dicitur sumacho: in condendis enim cibis antiqui hoc, loco salis utebantur, quod etiam nunc in Syria & Aegypto obseruatur. Diosco. cap. 128. primi. Gal. 8. de fac. simp. Paul. lib. 7. Constringit & exiccat in tertio, detergit in secundo.

Ricinus, frutex, uulgò mirasole, dictus est ricinus ab animale ricino, uulgò zecca, quæ in equis & canibus sepe uisitur, quanquam heliotropios sit mirasole, dicitur à seplasiarijs cherua maior, & à Mes. granũ regis. Gal. 7. de facul. simp. Dioscor. 158. quarti. Paul. lib. 7. Purgat, abstergit & digerit.

Rosmarinum, *λίβανωρίς*, habet duas species, quæ à me nondum uisæ sunt: rosmarinum coronarium est, quo passim utimur, & uulgare nostrum. Diosc. cap. 79. & 80. tertij. Gal. 7. de fac. simp. Habet uim incidendi & abstergerendi. Plin. cap. 11. lib. 24.

Rosæ, excellentiores sunt rubræ, post has purpureæ, demum albæ. Componuntur ex diuersis substantiis, ut Galen. Putarem ego ea-

rum infusionem potiore fieri, si ex Damascenis rosis pararetur. Dioscor. cap. 115. primi. Galen. 8. de facul. simplic. Paul. lib. 7. Iuxta constant substantia, aquosa scilicet, calida, adstringenti & amara: flos autem magis adstringit & desiccat.

Rubus caninus, κυνόσβατος, nō est rosa syluestris, ut nonnulli putarunt, teste Theophrasto, qui diuersa capita agit: nam de cynosbato loquitur cap. 18. tertiū, & de rosa canina cap. 6. lib. 6. Diosc. cap. 108. primi. Gal. 7. de fac. simp. Fructus astrictorius, &c.

Rubia, ἐρυθρόδαρον, omnibus nota, cuius caulibus & folijs ob suam asperitatem utuntur fœminæ ad illustrandum stannum. Dioscorid. cap. 151. tertiū. Galenus 6. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Radix acerba & amara ita iecur & renes purgat, ut sanguinem & menses euocet.

Ruscus, ῥυμφοῖον, apud seplasiarios bruscus, herba spinosa, similis myrtho, quam & syluestrem myrthum dicunt: eius germina in acetarijs comesta, ualenter urinam prouocant, & obstructions aperiunt. Dioscorid.

h.i.

cap. 141. lib. 4.

Ruta, *πῆζανον*, duplex est, sylvestris montana, & sativa hortensis, & ambæ species cognoscuntur. Galenus 8. de facul. simpl. Calida in quarto est sylvestris, & sativa in tertio. Contra fascinationes eam commendauit Aristoteles in suis problematis. Dioscor. cap. 47. tertij.

Ruta sylvestris, *πῆζανον ἄγριον*, hanc harmel Arabes uocant, ex Cappadocia & Galatia affertur, nimirum nostris partibus non habetur. Qui uerò pro harmel, semen cicutæ accipiunt, ualde decipiuntur. Volunt aliqui geargam esse rutæ speciem, uulgò galega dictam, cui attribuunt in peste & contra uenena miram quandam uirtutem. uide Dioscoridem cap. 48. tertij. Galen. 7. de facul. simpl. uocat eam moly.

Sabina, *βαφύρον*, ram quæ similis est cupresso, quàm quæ Tamarisco cognoscitur. Dioscor. cap. 89. primi. Galen. 6. de facul. simp. Plin. cap. 12. lib. 24. Paul. lib. 7. Calefacit & siccatur in tertio.

Saccharum Dioscoridis & Galeni nonnulli

MEDIC. IN COGNO. SIMPLIC. 115

li esse ex eodem liquore quo nostrum affirmant, nec à nostro differre dicunt, nisi arte & natura: alij uerò longè à nostro differentem existimant, nec eodem liquore confici, sed ueluti ex rore factum credunt. Dioscorid. ca. 74. ad finē lib. 2. Gal. ca. de melle. Paul. li. 7. ca. de melle. Sachar minus dulce nostro, sed æquales uires obtinet, nec nocet stomacho, nec sitim efficit.

Sagapenum, uulgò serapino, liquor est ferulacea herba: electissimum habetur Venetijs, potentius est orientale. De eius uiribus uide Mesuen & Diosc. cap. 86. tertij. Galen. 8. de facul. simp. Suffusioni oculorum & debilitati uisus ualet. Paul. lib. 7. Calidum & tenue, cui abstersoria uis inest.

Salix, arbor, ἰτέα: eius species tres recitantur à Theophr. & Plin. de tribus succis eius mentionem facit, scilicet de gummi, & de eo qui fit inciso eius cortice, & de eo qui incisis ramis tempore autumnali per se destillar: habent enim uim exterendi quacunque claritati oculorum officiunt. Plin. cap. 38. lib. 16. Galen. 6. de facul. simp. Paul. lib. 7. Folia & h. ij.

flores siccant citra rosionem, & nōnihil adstringunt.

Salvia, ἑλίσφακος, ab Agrippa herba sacra uocabatur, eius succus bibitus facit quæ steriles sunt mulieres, prolificas; & confert spuro sanguinis, uide tamen de his Aetium & Dioscoridem cap. 35. tertij. Gal. 6. de fac. simp. Plin. cap. 6. lib. 26, inquit, quòd succus foliorum capillos generat. Paul. lib. 7. Euidenter calefacit, & leuiter adstringit.

Sambucus & ebulus, ἄκτῆ, succus corticum radicum hydropicis succurrit, & semen ebuli in decocto iuæ, dolores iuncturarum, podagræ, & morbi Gallici tollit: succus etiam eius in sole exiccatus, & in clysteribus injectus, sciaticis medetur. fomentum etiam ex eorum radicibus factum tumores pedum, qui ex longo morbo prouenerunt, optimè resoluit. Dioscor. cap. 168. quarti. Galen. 6. de facul. simpl. Exiccat & conglutinat. Plin. cap. 8. lib. 24. Paul. lib. 7. Desiccat, modicè digerit, & conglutinat.

Sampsuchum, uulgò maiorana: nec miretur quispiam, si per diuersa capita mentio

fiat à Gale. & à Diosc. de sampsucho & amaraco : nam hoc fieri potuit, ut rem melius exprimeret Dioscor. nam in Galeno creditur in eo textu esse menda, ubi pro amaraco legi debeat maro, & non amaraco. Dioscor. cap. 4. tertij. Gale. 8. de facul. simp. Paul. lib. 7. Calefacit & siccatur in tertio, tenuis ac diffusoria natura.

Sandaracha non est uernix, ut aliqui putarunt, quum uernix sit gummi iuniperi: sed est potius res mineralis, quæ ab auri pigmento non differt, nisi in coctura: nam si quis diu auri pigmentum coxerit, facile illud in sandaracham conuertere efficitur, nec arsenicum chrysellinum ex auri pigmento per sublimationem paratur, ut nonnulli crediderunt, sed potius est res mineralis per se oriens. Verum quod uulgò dicitur risagalum, ex arsenici & auri pigmenti pari portione per sublimationem bene conficitur. uide Dioscorid. de sandaracha cap. 76. quinti. & Gale. 9. de facul. simplic. & Paulum lib. 7. Adurantis est facultatis.

Sarcocolla, est gummi cuiusdam in perside
h. iij.

arboris, mirè conglutinat recentia uulnera,
 & ulcera antiqua mundificat, glutinat, &
 carnem inducit, & est mirabilis in oculorum
 destillationibus. Optima cognoscitur, si sit
 amara & alba, ualet etiam ulceribus aurium,
 si in melicrato bōbix intinguatur: deinde pul-
 ueri sarcocollæ inuolutus auri imponatur.
 Dioscorides cap. 90. tertij. Gal. 8. de facul.
 simpl. Plin. cap. 11. lib. 13. Paul. lib. 7. Sic-
 candi ac opplendi uires habet.

Satyrion non habetur nostris temporibus,
 sed eius loco testiculi canis: nec Satyrion ha-
 bet duas radices, ut putarunt nōnulli, sed unā
 tantūm bulbosam pomo similem. Plures sunt
 deinde testiculorum canis species, inter quæ
 palma christi reponitur. Diosco. cap. 134. &
 135. tertij. Galen. 8. de fac. simpl. Paul. lib. 7.
 Calidi & humidi tēperamenti est, unde Ve-
 neris appetentiam facit.

Saxifraga, uulgò sassifragia, uulgaris her-
 ba est, in frangendis lapidibus, & in prouo-
 canda urina summopere cōmendatur. Diosc.
 cap. 17. primi, & Paul. lib. 7. Vrinam mo-
 uet, & calculos conterit.

Scammonia, uera & optima erat quæ ex Mysia Asia olim afferebatur, sed quæ à Dioscoride reprobatur, in Iudæa & Syria oriens, tantummodo nunc in usu est, nec uera sic alacriter soluit ac nostra: nam olim drachma scammoniae cū duobus granis hellebori pro dosi tribuebatur, sed nostra si ad pondus decem uel quindecim granorum exhibeatur, adeo uentrem exonerat, ut etiam quàm maximè superque euacuet. Dioscorides capite 165. quarti. Plin. cap. 8. lib. 26. Paul. lib. 7. Calefacit, digerit, & biliosa extergit, magisque eius liquor.

Scilla, uulgò deflexa uoce à seplasiarijs dicitur squilla: aiunt minutim incisam, & in uase uitreo melle pleno per totam æstatem soli expositam, deinde colatam, præsentaneum esse remedium epilepticis. Galen. 8. de fac. simpl. Incidit scilla, sed non adeo calida, ut secundum gradum transcendat. Dioscorides cap. 102. secundi. Paulus lib. 7. Incidit & calefacit & desiccatur in secundo ordine.

Scordion uerū nunc inuenitur, simile chamædrio, differens tamen odore allij. Creten-
h. iij.

se à Gale. in lib. antid. laudatur. Et 8. de facult. simpl. Componitur ex diuersis substantijs, cōsolidat omnia uiscera, ruptis & spāsmo confert, ualet doloribus, lateris modo emplāstri, & recentia uulnera ac ulcera conglutinat. Dioscor. cap. 116. tertij. Paul. Varijs constat facultatibus, quum amarum, acerbum, & acre sit: purgat igitur & calefacit.

Sedum, αἰζων, uulgò semper uiuo dicitur, cuius species tres numerantur à Dioscor. cap. 85. & 86. quarti. Maius uulgò dicitur orchicella, minus dicitur uermicularis uel pignola, & est mascula & foemella. Gal. 6. de facultate simpl. Frigida in tertio mediocriter adstringit, & siccāt leuiter. Plin. cap. 2. lib. 25.

Senecio, νέρπεων, uulgò speliciosa, coliculus quodammodo rubēs, folijs longis & incisīs ueluti in eruca uisitur, flores lutei citò in pappos desinentes. Galen. 6. de facult. simp. Dioscorides cap. 92. quarti. Nōnulli esse carduum benedictum affirmant. Paulus lib. 7. Mixtas habet uireis, refrigerat enim & modicè discutit.

Serpyllum, Dioscor. cap. 41. terti. Galen. 6. de facul. simpl. Plin. cap. 22. lib. 20. Paul. lib. 7. adeò calefacit, ut urinam & menses moueat.

Sesamum, est simile milio, sed aliquantulo crassius, & altius folia fert rubra cum flore uiridi, & producit in siliquis semen ueluti papauer. Dioscor. capit. 90. secundi. Gal. 8. de facul. simpl. Plin. cap. 10. lib. 18. Paul. lib. 7. Mediocriter calefacit, mollit & opplet. Auer. quinto colliget. Calidum in primo, humidum in tertio.

Seseli, Arabicè siseleos, notum est, præsertim Massiliense: ualidissimè urinam prouocat, & epilepsie ac spiradi difficultati medetur. Creditur à ceruis inuentum: nam à partu id statim comedunt, ut denuò concipiant, sicut refert Arist. 9. de natura animalium, cap. 5. Dioscor. cap. 55. terti, & Galen. 8. de facul. simpl. lib. Plin. cap. 5. lib. 20. Paul. lib. 7. Calefacit, tenuisque substantia est.

Sideritis, non est herba Iudaica, ut Ruelius: nam herba Iudaica est quam uirgam auream appellamus. Hæc caulem fert rubrum

ad duorū cubitorum altitudinem cum folijs modo oliuæ circum circa incis, & floribus in summitate aureis, uulneribus & fistulis mirè confert, similiter in frangendo lapide, ut Arnaldus de uilla noua. Dioscor. cap. 33. quarti. Galenus 8. de facultate simpl. Paul. lib. 7. adstringit.

Sinapi triplex est: syluestre, quod semen habet paruum: commune, folia habet rapo similia: tertiū, uulgò dicitur Rugetta, album semen ferens, & eo utimur in seruanda uinorum dulcedine. Dioscor. cap. 143. lib. 2. Gal. 8. de facul. simpl. Plin. cap. 8. lib. 19. Auic. lib. 2. Calida & sicca in quarto.

Siser, propemodum simile est pastinacis domesticis, nascitur in Germania, & uocatur rapa citrina. uide Pliniū cap. 5. lib. 19. Dioscoridem cap. 106. secundi. Galenū 8. de facultate simplicium. Paul. lib. 7. Calidum in tertio ordine. Radix cocta stomacho utilis, urinam cit, semen tenue & discussorium, cum uino ualet singultui.

Sisymbrium, est seplasiōrū balsamita, uulgò menta Romana, uel menta Florentina.

Sisymbrium uerò aquaticum est id quod uul-
gò dicitur *crescione*. Dioscorides cap. 117.
secundi. Theoph. cap. 7. lib. 6. & cap. 8. lib.
5. de plant. caus. & Plinius cap. 10. lib. 19.
Galen. 8. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Cale-
facit siccátque in primo, humidum in secun-
do abscessu.

Sion, non est quod uulgò dicitur *crescio-
ne*, sed aliud: uerùm unum absque altero ra-
rò inuenitur. *Sion* habet folia lata olusatro
similia, sed *crescionus* habet quales in *eruca*
uisuntur. Dioscorides cap. 116. secundi. Plin.
confundit utrumque *sium*, id est *sium* uerum
& *sisymbrium* aquaticum, ut apparet cap.
22. lib. 22. Galen. 8. de fac. simpl. Paul. lib. 7.
Calidum est, urinam citat, discutit, & renum
cálculos frangit.

Smilax aspera & *lenis*: inuenitur *aspera*,
quæ folia habet *periclymeno* similia, arbori-
bus aduoluitur, & habet innumeras uiticu-
las spinosas cū fructu uuæ, racemi modo rubē-
ri: *lenis* uerò *hederæ* folia habet similia, &
uiticulas similes antedictæ, sed non spinosas,
uulgò *wiluchio*, & à *seplasiarijs* uolubilis di-

citur, flores habet orbiculatos ueluti campana. Theoph. cap. ult. tertij. Dioscor. cap. 139. & 140. quarti. Galen. non similacem, sed milacem uocat 7. de facul. simpl. Plin. cap. 2. lib. 16. & cap. 10. lib. 24.

Smilax, arbor, uulgò deflexa uoce à taxo sic à Romanis appellata, Nasso dicitur. Vide Dioscor. cap. 78. lib. 4. Caue tamen ab huius fructibus, quoniam interficiunt. Plutarchus inquit, quòd sola umbra interficit, sed de ea tu intellige, quæ in Carbonia nascitur. Paul. lib. 7. Est uirose uirtutis.

Smilax hortensis, sunt qui esse existiment phaselum rubeum, qui uulgò fasolo turchesco appellatur. Manardus tenet, quòd sit Galeni dolicus, & uulgò quod dicitur roniglione. sed credo illum decipi, quoniam quod dicimus roniglione, Galen. & Paul. non dolicum uocant, sed potius ocrum. Dioscor. cap. 135. lib. 2. Gal. 1. de facul. aliment.

Smyrnum, uulgò dicitur Macerone, nec est imperatoria, ut nonnulli, quæ commendatur in omnibus frigidis aegritudinibus, sicut in doloribus colicis & stomachi, men-

strua prouocat & urinam, dolores dentium
 tollit, & cum uno strangulatu uulua mede-
 tur, cerebrum masticata purgat, & eius pul-
 uis ad epilepsiam, spasmum, paralysem, & ad
 febrem quartanam ante eius paroxysmum
 per horam utiliter cum uino bibitur: ualet in
 peste, & ad omnia uenena: spiritum refice-
 re, & membra sensuum roborare potest: da-
 tur insuper asthmaticis, ictericis, hydropicis
 & lienosis. Dioscor. cap. 72. tertij. Galen. 8.
 de facultate simplicium. Plinius cap. ulti-
 mo lib. 19. Paulus lib. 7. Calefacit & siccat
 in tertio ordine.

Solanum, σπύχρον, uulgò solatro, cuius
 species à Dioscor. quatuor enumeratur, hor-
 tense, halicacabum, somnificum, & furiosum.
 Hortense & halicacabum nunc passim co-
 gnoscuntur: nam halicacabum est id quod
 Arabes uoce parum deflexa Alchachengi di-
 cunt. Plures etiam species inueniri dicuntur,
 sed de his quasi per somnium loquuntur au-
 thores. Vide Dioscoridem cap. 69. 70. 71.
 & 72. lib. 4. Galenū 8. de facultate simpli:
 Pliniū cap. 31. lib. 21. Paul. lib. 7. Hortense

Et Halicacabum adstringunt, Et in secundo ordine refrigerant.

Sonchos, sunt qui scariolam esse dicunt. Scio apud Hetruscos uocari Circebita. Dioscorides cap. 110. 2. Galen. 8. de facul. simplicium. Paulus lib. 7. Adstringit Et manifestè refrigerat.

Sparganium hucusque non uidi, etsi ab aliquibus reperta esse dicatur: hoc scio, non esse spatulam foetidam, ut Ruellius, ex cuius succo sanatur scabies Et uolaticæ. Dioscorides cap. 23. 4. Gal. 8. de facultate simplicium. Paulus lib. 7. Siccandi uireis habet. Plin. cap. 9. lib. 25.

Spina alba, λευκὴ κάρδα, uulgò bedeguar sicuti Arabice. Sunt qui pro spina alba accipiunt carduum benedictum, alij carduum carlinam dictum, alij alium carduum. Aduerte tamen bedeguar tantum nasci in montibus Et syluosis locis. Dioscor. cap. 12. 3. Gal. 6. de facul. simpl. Radix desiccatur Et modicè adstringit, semen est tenuis essentiae Et calidae facultatis.

Spina Arabica, est similis albæ. Ego eam

non uidi: hoc scio nō eam esse, ut Ruellius putat, spinam arboris acatiæ. Dioscorides cap. 73. 3. Galenus 6. de facul. simpl. Validius adstringit & desiccatur.

Spondylion audiui ab aliquibus esse inuentum: ualet epilepsiæ eius fructus & orthopnœæ. Vide Dioscor. cap. 81. 3. Gal. 8. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Constat uirtute acris & discussoria.

Stachys, nisi sit marrubium album, nescio quid sit. Dioscor. cap. 3. 3. Gal. 8. de fac. simpl. Plin. cap. 15. lib. 24. Paul. lib. 7. 3. In calefaciendo tertium ordinem occupat.

Staete, est styrax liquida. Dioscor. ca. 64. 1.

Staphys agria, ἀστὰ φῖς ἀπρῦπια, uulgè strafusano, siue uua seluatica. Dioscor. cap. 150. 4. Galen. 6. de facul. simpl.

Stribium & stibi, antimonium est, ut placet Auicennæ & Serapionis. Fūditur ipse, & omnia metalla facit fluida, ut ferrum. Dioscorid. cap. 53. 5. Galen. 9. de facul. simplic. Exiccatur & constringit. Plin. cap. 6. lib. 33.

Stæchas, Arabicè stichados, est res notissima. Vide Mes. & Dioscor. cap. 28. 3. Galen.

8. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Aperit, extenuat, detegit & confirmat uiscera.

Stæbe non cōuenit cum scabiosa, ut nonnulli affirmarunt, ex cuius decocto sanantur scabies & pulmonis uitia. Dioscor. de stæbe cap. 13. 4. & Galen. 8. de facul. simpl. Paul. lib. 7. Semen & folia in tertio adstringunt.

Styrax, uulgò storace calamita. Dioscor. cap. 70. primi. Galen. 8. de facultate simpl. Plin. cap. 25. lib. 12. Paul. lib. 7. Calefacit, emollit, & concoquit.

Sycomorus, arbor nostro moro non dissimilis, fructum fert non ramis, sed caudice ficorum grossulis dulciorem. Dioscorides cap. 48. primi. Gal. 2. de alim. Theoph. cap. 2. lib. 4. Plin. cap. 7. lib. 13. Paul. lib. 7. Fructus nullius nutrimenti, liquor arboris emollit, uulnera conglutinat, & tumores discutit.

Tamarix domestica apud nos non inuenitur. Diosc. cap. 101. primi. Gal. cap. ultimo 7 de facul. simpl. Plin. cap. 21. lib. 13. Paul. lib. 7. Incidit, extergit, ita tamē ut manifestè non exiccet, sed adstrictionis particeps sit.

Telephium, est faba crassa, uulgò dicta.

Diosco. cap. ult. lib. 2. Galenus 8. de facult. simplic. Paul. lib. 7. Calefacit in primo, & in secundo desiccatur.

Tamarindi, aliàs dactyli Indi uocantur: uide suprà.

Terebinthus, res est nunc nota, olim quasi incognita recesserat. Nunc eius resina non liquida, sed potius cocta ad nos affertur. Dioscor. cap. 77. primi. Theophr. cap. 15. tertij. Inuenitur tam masculus, quàm foemina. Gal. 8. de fac. simp. Fructus adstrictorium quiddam habent, sed in secundo calefaciunt & desiccant.

Teucrium adhuc non uidi. Plin. cap. 5. lib. 25. duas species teucrij memorat, & secundum habere folia fabæ similia adserit: unde nonnulli id esse uoluerunt, quod uulgò dicitur faba grassa. Dioscorid. cap. 102. lib. 3. Gal. 8. de fac. simp. Exiccat in tertio, calefacit in secundo.

Thaliætron est secundum Ruellium herba Argentina, quæ folia coriandro similia habet. Dios. cap. 93. quarti. Gal. 6. de fac. simp.

Thapsia rarò ad nos affertur. Valet liui-

ditati carnis cum thure & cera, ut refere
 Plin. cap. 20. lib. 13 Gal. 6. de facult. simplic.
 Dioscorid. cap. 151. quarti. Theoph. cap. 23.
 lib. 9. Est radix uomitoria. Paul. lib. 7. Acris
 est & uehementer cum humiditate calefacit,
 ex alto attrahit, & attractum discurit.

Thlassi quid sit, non possum affirmare:
 nam bursa pastoris multum a thlassi differt,
 si quis rationem utriusque perpendat. Dio-
 scor. cap. 145. secundi. Gal. 6. de facult. simp.
 Paul. lib. 7. Semen uiribus acre, ut intestino-
 rum abscessus potu rumpat.

Thymbra siue Satureia, siue cunila, uul-
 go Sauorexo siue penerella, apud Tuscos co-
 niella, pollet ac ipse thymus. Dioscor. cap. 40.
 tertij. Plin. cap. 8. lib. 19. & cap. 20. lib. 20.
 Reperitur domestica & syluestris: quare non
 mirum si Columella inter Thymbra & Sa-
 tureiam, diuersitatem posuerit. Paul. lib. 7.
 Syluestris prestat, quae thymus, horrensis ac-
 ro imbecillior.

Thymus inuenitur albus & niger: at niger
 iuxta Aetij placitum est malus. Dioscor. cap.
 39. tertij. Gal. 6. de facult. simpli. Theophr.

cap. 2. lib. 6. Paul. lib. 7. Calefacit in tertio,
 & desiccat, & glutinosos humores incidit.

Tichymali genera sunt septē, charatias &
 myrthites, quæ sunt nobis incognita: Paral⁹
 uerò ab aliquibus cognoscitur, & uulgò uo-
 catur herba mora, ex qua pisces moriuntur.
 Cyparisius est esula minor: dendrodes, à me
 nunquam uisus. Plathyphylos, apud Tuscos
 dicitur torto maglio. Nota tamen quòd cy-
 parisius uocatur à Mesue alscebram, & ab
 Anic. scebram, alscebram uerò mezecheregi est
 pityusa à Diosc. Lac eorum depilat oleo in
 sole inunctum, & ortum tandem prohibet.
 Diosc. cap. 159. 4. Gal. 8. de facul. simplic.
 Plin. cap. 8. lib. 26. Paul. lib. 7. Omnes è
 quarto ordine calefacientium, acrimoniæ &
 ualida amaritudinis participes.

Tragacantha, uulgò draganti eius gumi
 uocatur, in Creta & Achaia nascitur. Gal.
 8. de facult. simplic. exiccat. Dioscor. cap.
 21. tertij. Plin. cap. 21. lib. 13. Paul. lib. 7. Simi-
 les gumi uireis habet.

Tragion quid sit diuinare nescio, sicut etiã
 de eius secūda specie dicere, nisi fortè sit pim

pinella, uel saxifragia hircina. Galen. 8. de fac. simp. Diosc. cap. 47. & 48. quarti. Plin. cap. 21. lib. 13. Paul. lib. 7. Calidum in tertio, attractorium, discutiens.

Tragum nisi sit species iunci, haud etiam scio quid esse possit: nam sine folijs Plin. eam cum minimis ramentis pingit, cap. ult. lib. 27. Dioscor. cap. 49 libri quarti.

Tragoriganum, ut placet Leoniceno, in acetarijs comeditur, uulgò tragone appellata. Dioscorid. capit. 30. tertij. Plin. cap. 17. lib. 20. Galen. 8. de facult. simpli. Paul. lib. 7. Vireis habet origani, & nonnullam etiam adstrictionem.

Tribulus habet duas species, ut Theophr. cap. 5. lib. 6. quarum una producit fructum spinosum, cuius radices à multis pro iungo condiuntur, & re uera decipiuntur. Diosc. cap. 16. quarti. Gal. 8. de fac. simp. Plin. cap. 16. lib. 21. Paul. lib. 7. Mediocriter refrigerat, sed terrestris siccando ualentior est, aquaticus leuiter humectat.

Trifolium, τεῖ φυλλον, omnibus notum, cuius species apud nos tres enumerantur, prima

habet folia rotunda & magna, secunda longa, tertia rotunda & minuta. Plin. cap. 9. lib. 21. Scripsit etiam de trifolio acuto Scribonius, & est species trifolij acetosi, & vulgò dicitur Alleluia, siue pan cuculo. Decipiuntur qui pro andacocha semen trifolij accipiunt: nam andacocha nil aliud est quàm locus sylvestris siue Aegyptius. Galen. 8. de facult. simplic. Dioscorid. cap. 114. tertij.

Trinitas, herba nota ferè omnibus, habet enim folium in tres partes diuisum, simile folijs cyclaminis cum celestis flore coloris. Cōglutinat uulnera & intestinorum rupturas, & quæ in scrotum descendunt, præsertim si medium huius pulueris cochleare cum nino styptico sumatur.

Tripolium eisi ab aliquibus credatur esse turbit, nihilominus decipiuntur: si quidem nostrum turbit odorem non habet ut tripolium, sed creditur potius turbit nostrum esse alipiam Dioscoridis: sed quum uerum tripolium non habeatur, id quod à monte sancti Angebi affertur, esse cortex pityusæ creditur. Dioscorid. cap. 130. quarri. Galen. 8. de fac. i. iij.

simpl. Plin. cap. 7. lib. 26. Paul. lib. 7. Calida
radix est in tertio, & acris.

Tubera, Græcè ὕσσω, uulgò tartusi, de
quibus mentionem facit Plinius cap. 2. lib. 19.
Galen. 2. de facul. aliment. non habet, ut ipse
inquit, euidentem qualitatem. Auicenn. 2. suo-
rum can. Componuntur ex terrestri & aquea
substantia & sapore priuantur, generant hu-
morem melancholicum, crassum, & quan-
doque paralesim, stomachum aggrauant, &
malè digeruntur. Dioscorid. cap. 134. se-
cundi. Paul. lib. 7. Constant ex terrestri sub-
stantia cum modica uirtute tenui.

Tussilago, Græcè βύχων, uulgò farsara uel
ungula caballina dicitur, nota est: eius fumus
prodest tussientibus, unde nomen accepit. Dio-
scorides cap. 117. tertij. Galenus 6. de facul.
simplic. Paulus, Constat ex calida & aquosa
substantia.

Turbit Mesue est radix alipia, ut dictum
est de Tripolio.

Typha, τύφη, uulgò mazza surda, hæc na-
scitur in aquosis ac palustribus locis. Surda
iccirco dicta, quia eius lanugo si aures ali-

cuius ingreditur, facile ille surdescit, est nota etiam pueris, quum saepe illam primo manibus habeant. Dios. cap. 124. tertij. Theoph. cap. 13. libri primi. Apud Galenum uel Paulū nulla de hac fit mentio. Plin. cap. 10. lib. 18.

Umbilicus ueneris, Græcè κοτυληδών, uocatur apud Tuscos coopertorium. Sunt qui in Lombardia cymbaria quadam pro Veneris umbilico utuntur. Dios. cap. 87. quarti. Gal. 7. de fac. simp. Plin. ca. 2. li. 25. Paul. lib. 7. Refrigerat, repellit, abstergit, dissipat.

Verbasum, Græcè φλόμος, uulgò tasso barbasso, & est omnibus notū. Inuenitur mas & foemina: mas ex folys strictis, foemina ex latioribus: ceteræ species nondum mihi sunt cognita, etsi Ruellius primulam ueris esse unam phlomi speciem crediderit, sese profecto decipiens, quum nullibi de eius flore agat Dioscorides. Succus ex flore huius herbæ omnes faciei maculas abstergit. De uerbasco loquitur Galen. 8. de facul. simpl. Dioscorid. cap. 99. quarti. Plin. ca. 6. lib. 26. Paul. lib. 7. Folium omnium siccantem & mediocriter adstringentem uim referunt.

Verbenacatā recta quā supina, à Græcis
 ῥεῖσπερον dicta, uulgò berbena uocatur,
 nec uirtute hæ species inter se differunt, nisi
 quòd altera mas, quæ raris folijs constat,
 altera femina magis foliosa. Diosco. cap. 58.
 & 59. quarti. Plin. cap. 9. lib. 25. Galen. 8. de
 facul. simp. uim habet siccantem.

Veronica, κέσπων, uulgo notissima est, quæ
 tot uirtutes præ se fert, quot Anto. Musa, Cæ
 saris medicus, illi attribuit. Vide Dioscorid.
 cap. 1. quarti, & Gal. 8. de facul. simp. Mun
 dificat renes, pulmonem, pectus, & hepar.
 Plin. cap. 8. lib. 25.

Viola alba, λευκόνιον, ex qua unguentum
 iasminum fit, nota omnibus est, sicuti & uio
 la lutea, quæ à seplasiarijs uocatur λεῖρι, de
 cuius uiribus Galen. 7. de facul. simplic. tra
 ctat. Diosco. cap. 129. tertij. Paulus lib. 7. Fru
 tex abstergendi extenuandique uires habet,
 magis autem flores.

Vitex, Græcè αἶνος, uulgò agno casto di
 citur, & est duplex, albus & niger, maior &
 minor, ut testatur Plinius cap. 9. lib. 24. Ga
 len. 6. de facul. simplic. Calidum & siccum

est in tertio. Dioscorid. cap. 120 primi.

Vitis alba, Græcè ἀμπελοχόκη, vulgò brionia dicitur, siue zucha saluatica, et est res notissima: uide de eius uiribus Dioscorid. cap. 176. quarti. Galen. 6. de facul. simplic. Radix resoluit splenis duritiem.

Vitis nigra, siue ἀμπελος μέλαινα, vulgò dicitur uua tamina, et apud Tuscos tamaro, et est res nota. Dioscor. cap. 177. 4. Plin. cap. 2. lib. 23. Paul. lib. 7. Poller, sed non ita efficaciter ut alba.

Viricella, quæ ab alijs dicitur momordica, ab alijs balsamina, ab alijs coranzana, inuolucris herba est, florē habens cucumeri simile, à quo postea fructus oritur, ouo gallinæ similis, sed minor satis cū quibusdā ueluti acutis spinis uiridis existens ante maturationem, et rubens post ipsam maturationem: cuius folia neruorum uulnera conglutinant, et oleum ex infusione, eius fructus uulneribus, apostematibus, et ulceribus mamillarum non solum prodest, sed mirum in modum dolores matricis per clysterē iniectum et hæmorrhoidarum, uulnerum, et apostematum maxi-

131 DE CONSEN. MEDIC.

mè leuat ac tollit, cicatrices extenuat, &c. ut uidere poteris iuxta Mathiolū Senensem cap. de uite nigra.

Vitis syluestris, Græcè ἀμπελος ἀγρία, omnibus nota: longas enim ex se mittit uiticulas, uinū uitis modo ferentes, lignosus & asperas. Folia solatro similia, latiora tamen & longiora, florem ceu musculosum capillum, fructum exiguis uuis simile, radices in aqua decoctæ dantur contra cutē subeuntes aqua, acini uuarum asperam & discolorem cutē, omnesque alias maculas repurgant. Diosco. cap. 175. quarti. Galen. 6. de facul. simplic. Paul. lib. 7. Germina abstergunt, & nōnihil adstringunt.

Verrica, Græcè ἀκαλύφη, res notissima est: uide de eius uiribus Dioscorid. cap. 89. quarti, & Gale. 6. de fac. simp. Plin. ca. 15 lib. 21. Paul. lib. 7. Tenuem habet substantiam, citra rofionem siccatur, tumores discutit, abstergit, & uentrem subducit.

Xanthion, uulgò lappa minor dicitur, inuenitur in pinguibus locis, & in paludibus per æstatem siccatur: uide Dioscoridem cap.

IN COGNO. SIMPLIC.

133. quarti. Galen. 8. de facul. simplic. Paul. lib. 7. Fructus discutiendi vires habet.

Xyris, sunt qui cum esse uelint uulgarem acorum, ego eum nuspiam uidi: scio tamen ex Galeno 7. de facul. simplic. quod eius semen est ualidissimum in prouocanda urina, & in duritie splenis. Diosc. cap. 24. quarti. Paulus li. 7. Tenuis & discussoria & extrahens est facultatis ac etiam exiccatoriae.

Zea nil aliud est, quam nostra speltea uulgaris. Dioscorid. cap. 80. secundi. Plin. cap. 8. lib. 18. Gal. 6. de fac. simp. Paul. lib. 7. Viribus tritici respondet, & medium inter calorem & siccitatem obtinet.

Zingiber, res nota est seplasiarijs, & affertur ex Arabia & ex Aegypto, germinat quotannis, folia habens harundini similia. Dioscorid. cap. 149. secundi. Galen. 6. de facul. simp. Paul. lib. 7. Impense calefacit.


Zedoaria, radix est gingiberi similis, odorator tamen & aliquantulum amara, non autem sic acuta ut gingiber, impinguat, flatum discutit, & comesta affert odorem allij, ceparum & uini. Confert etiam moribus animalium


uenenosis, resoluit apostemata matricis, curat uomitum & dolores colichos, & ut refert Auicennas, est theriaca Napelli. Serap. lib. aggr. cap. Zerumbet & Auicen. lib. 2. Calida & sicca est in tertio gradu.


Zythū, siue ζυθος, nihil aliud est quam potus qui ex hordeo & frumento paratur, quemadmodum ceruisia. Vide Dioscoridem cap. 79. secundi. Plinium cap. ultimo lib. 12. Paulum lib. 7. Composita est substantia, acris enim est & frigidus.

F I N I S.

EXCVDEBAT CARO-
LVS STEPHANVS, TY-
POGRAPH. REGIVS,
PARISIIS, AN. M. D.
LIIII. ID. SEPTEMB.







(2)
IOANNIS

BACCHANELLI,
Regiensis, De consen-
su Medicorum in cu-
rādis morbis libri qua-
tuor.

*Eiusdem de consensu Medicorum in
cognoscendis simplicibus liber unus.*

L V T E T I A E.

Apud Carolum Stephanum,
Typographum Regium.

M. D. L I I I L.

AVTHORES, QVORVM CON-
sensus hoc libro producitnr.

Hippocrates	Anicennas
Plato	Anerrhois
Aristoteles	Razes
Galenus	Serapio
Aetius	Haly abbas
Paulus Aegineta	Azaranius
Alexander Tral.	Nicolaus Florentinus
Cornelius Celsus	Conciliator
Oribasius	Mesues
Dioscorides	Gordonius
Theophrastus	Michael Sauonarola
Theophilus	Marcus Catinarinus
Plinius	Arculanus
Philaretus	Guilielmus Placentinus
Platearius	Ioannes Manardus.

Carolus Stephanus
Lectori s.

LICEAT mihi per tuum fauorem, Lector, hoc de Bacchanello non quidem tibi persuadere, sed tantum affirmare, ac liberè pronunciare, nihil in eius libro de Medicorum in curandis morbis, ac simplicibus dignoscendis consensu me reperisse, quod non baccas myrtheas ac laureas potius, quàm Bacchum redeat: adeò sibi constat in veterum authorum productionibus, adeò compositè ac concinnè quæcunque ad Medicinam faciunt, in memoriam tibi reduxisse mihi visus est. Quo (sive laborem, sive industriam appelles) si quid præstantius esse putes, id verò à te vehementissimè requiro. Non enim dubito, quàm sis in recentiorum vigilijs perscrutandis diligens ac curiosus. sed hoc ab humanitate tua lubens exposulauerim: nihil ut ob sermonis venustatem (qui in eo haud ita fortasse tersus atque expolitus esse videbitur) iudicij atque auctoritatis illi adimas. Certè perinde non est, ac si de Rhetoricis, aut bene atque ornatè dicendi ratione conscripsisset. Verùm si tu in huius vigilijs succum enim, qui ad medicandi ra-

A. ij.

tionem faciet, expostulabis, hunc à paucis etiā
veterum in ea re superatum fuisse facile indi-
cabis. Atque hoc quidem est, quod te admo-
nere volui, antequam ad huius vigiliarum le-
ctionem aggrediaris. Vale.

5

IOANNES BACCHA-
nellus, excellentiff. Medico Ioan-
ni Scutellario s.

CERTVM est mi doctissime
Ioannes, quòd olim elegeram quæ-
dam Medicorum dogmata, ad medē-
di normā satis (meo iudicio) oppor-
tuna, tum vt inde labili memoriæ,
quandoque aliis in rebus occupatæ,
succurrerē, cū etiā vt illis satisfacerē,
qui non nisi autoritatibus, etiam si
mille rationes probatissimæ adduce-
rētur, acquiescere nolūt. Certè, vt in-
genuè fatear, quod ex mea inuētio-
ne nō poterā, vt Græcè loquar, Συμε-
ξάμβρος γὰρ πολλὰς τῶν παλαιῶν ἐκείνων βί-
βλοις ἀνδρῶν, ἐν μέσῳ τούτων ἐμαυτὸν ἴδρυ-
σα, ac flores varios veluti ex pratis
relegēs, ita effeci, vt quod prima na-
uigatione non poterā, πρὸς τὸν δεύτε-
ρον πλοῦν me contulerim ac expedi-
uerim. Sed opus adeò vtile ac gratū
esse non potest, vt tuo excellenti in-

A.ij.

genio possit satisfacere : quanquam
 (ni fallor) nihil in eo dictum vel ex-
 cogitatum est, quod autoritate non
 comprobetur, quod planum non sit,
 quod non remediis fultum, quod
 breuitatem etiam non amplectatur:
 in quo multa vno intuitu visuntur
 ac comprobantur, quæ sicco pede
 fortè intacta dimitterentur. Non au-
 derem tamen (quod exoptulas) vt
 formis excusum istud opus in pu-
 blicum prodiret: ne mihi nouo ho-
 mini, & vix intra proprios lares co-
 gnito, id mihi vitii daretur, quòd
 plura voluerim amplecti & expri-
 mere, quæ semidocto cuius homini
 nota ac vulgata sunt, & ita trita ac
 explosa, vt vix de illis mentio fieri
 debeat. Vrget tamen me tua quoti-
 die humanitas, & potissimis præci-
 puè rationibus adhortatur, vt illud
 iam iam in lucē pariam, & alios iu-
 uenes huiusce mei laboris partici-
 pes efficiam. Certè vereor ego, si tuæ

voluntati obtemperare voluero, ne
 velut inter olores anser primū ob-
 strepere videar. Et quū plurimi no-
 minis apud te sim, ne deinceps de
 me id fiat, vt est apud Theocritū, φ
 πάσων ἔχοι λάθας, ὅσων πόκα θασέα φανῇ
 Εν δὲ λαοθῆιδυ εὐπλοκάμου ἀειάδνας.
 Nosti enim (ita varia sunt hominū
 ingenia) quod vni placere solet, mul-
 tis nō placere posse. Nec te præterit,
 φ in diuino illo Platone cōfusionē
 criminātur, in Aristotele tenebrosam
 obscuritatem, in Plinio turbulentā
 quandā congeriē, in Paulo Ægineta
 mirā breuitatē, in Auicenna etiā nu-
 per emēdato quādā nominū barba-
 riē, in Galeno nimīā prolixitatē, &
 ad praxim nō desyderatum ordinē,
 in aliis cōfusionē potius, quā cō-
 positionem: qui dū Latini videri non
 possunt, interdū ita loquūtur, vt vix
 à paucis quid velint intelligantur.
 Quid dicā de Hippocrate, qui mo-
 dō laudatur, modō à Galeno dam-

A.iiij.

natur ac reprehenditur: Hunc dein-
 de Auerrhois plurib⁹ in locis, alio-
 qui doctissimum, etiã redarguit. Po-
 stremò Thessalus omnium placita
 medicorum renuit ac cõfutat, adeò
 vt nihil sit in scientiis ab omni par-
 te beatum. Quare si vera hæc tibi ef-
 se videntur: existimare poteris, pau-
 xilla hæc mea, quæ nec nomine di-
 gna sunt, si in lucem exierint, quo
 tandem appulerint ac peruenerint,
 vt *ἡμιώπερα*, sicut dici solet, *πολύ τῶν
 γραφιστομένων τὰ χρήα εἰσί*. Verùm si
 his rationibus acquiescere nolueris,
 ecce mitto tibi librum, vt tuo arbi-
 tratu eo vtaris ac abutaris: expunge
 ac reseca quod est superfluum: quod
 verò deficit, adiunge: fac vt lubet, mo-
 dò id intelligas animi nostri pignus
 apud te esse, & tenax nostri amoris
 intimi quoddam vinculum. Vale, &
 vt facis, me ama. Ex ædibus nostris,
 5. Calendas Maii, Anno 1550.



IOANNIS

BACCHANELLI,
Regiensis, De cōsensu
Medicorum in curan-
dis morbis, Lib. I.

Quid sit Medicina.



MEDICINA, est scien-
tia corporis humani sa-
nitatem reficiens uel cō-
seruans . uel, Medicina
est adiectio & ablatio.
uel, Medicina est scien-
tia, sanitatis conseruatrix, morborūque re-
pultrix. uel, Medicina est, quæ sanis uictus
rationem præscribit, & agrotos curat. Quæ

definitiones, uerae non sunt medicina: non enim haec ipsa efficit, sed ex illis quae efficit haec proueniunt, idque non semper. Quare Medicina erit scientia salubrium, insalubrium & neutrorum.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Galenus 11. Meth. cap. 12, Medicina appositio est & detractio, deficientium quidem appositio, redundantium detractio. Et haec intelliguntur de prima, secunda & tertia descriptione. De quarta loquitur Gal. lib. finitionum med. in principio. Sed quod haec non sint uerae definitiones, ex sequentibus locis monstratur. Gal. in lib. de sectis, ad eos qui introducuntur, Propositum artis medicae est sanitas, finis uero eius adeptio. Quibus autem quis absentem sanitatem recuperet, uel praesentem conseruet, medicis cognoscere est necessarium. Porro quae absentem sanitatem restitunt, curationes & auxilia uocantur: quae praesentem conseruant, salubris uictus est ratio. Quod si ita est, medicina igitur non erit.

conseruans uel reficiens, sed salubrium, insalubrium & neutrorum scientia. Quod probatur ex Gal. 1. art. med. cap. 2. Auic. Medicina est scientia, qua humani corporis dispositiones noscuntur ex parte qua sanantur, uel ab ea remouentur, ut habita sanitas conseruetur, & amissa recuperetur. Si scientia est, qua noscuntur humani corporis dispositiones, id igitur non erit, quod adiicit uel auferit, quod reficit uel conseruat, nec quod agros ad sanitatem perducit.

Quot sint partes Medicinæ.

Partes Medicinæ sunt quinque. Prima est *φωσιολογική*, id est, rerum naturæ contemplatio. Secunda est *αἰτιολογική* & *παθολογική*, id est, causarum & affectuum consideratio. Tertia est *ὑγιανή*, sanitatis tuendæ ratio. Quarta est *σημειωτική*, id est, signorum obseruatio. Quinta est *θεραπευτική*, id est, medendi modus. Physiologica naturam hominis considerat, & elementa quibus componitur: & generationem eius, & partes corporis tam intrinsecas quam extrin-

12 DE CONSEN. MEDIC.

secas. αἰτιολογικὴν uniuscuiusque morbi causas
 & effectus inquirir. ὑγιαίνῃ sanitatem tue-
 tur, præcauendo ne corpora in morbos inci-
 dant, & ubi inciderint, ad sanitatem reducit.
 σηµειωτικὴν signorum notitiam, præterito-
 rum cognitionem, præsentium inspectionem,
 & futurorum præfagia nobis declarat. Θε-
 ραπευτικὴν tres in partes diuisa est, unam,
 quæ uictu curat, alteram quæ medicamentis,
 tertiam quæ manum admouet.

Loci consentientes de naturæ contemplatione.

Gal. lib. de constit. art. med. cap. 13. φισι-
 λογικὴν non est inter minimas naturalis con-
 templationis partes recensenda, immò opus
 erit medicū in ea esse probè exercitatum. Et
 primo de elem. Naturalis scientia corpora
 quæ generantur ac intereunt, quæ que pro-
 pus sunt exposita transmutationi, contempla-
 tur: quibus deinde ablatiis pariter & medi-
 cina tollitur. Primum quidem ob id, quòd ea
 sūt quasi generationis & interitus ministra.
 Et Meib. tertio cap. quarto, Nihil posse me-

dicum, inquit, de ulla similarium partium
agitare sine naturali sciētia. Et tertio Meth.
cap. 7, In eiusmodi sermonis nostri decursu
perspicuum planè fit, tum agri naturam esse
considerandam, tum cuiusque hominis esse
propriam curationem, &c. Et in lib. quòd
optimus sit medicus & physicus. Hæc ars
docet corporis nosse naturam, tum eam quæ
ex primis constat elementis, tum quæ constat
ex secundis. De cæteris medicinæ partibus
deinceps suis locis loquemur.

Quid sit Natura.

Natura philosophicè sumpta, est quæ
deorum, hominum, syderum, plurimorumque
corporum essentiam, potentiam, viresque cõ-
plectitur.

Natura humana, est temperies, uel quædã
facultas, qua animal regitur.

Loci consentientes de Na- tura philosophica.

Plato loquēs de natura deorum, uim quã-
dam esse dixit rationis atque ordinis parti-

24 DE CONSEN. MEDIC.

cipem, cuius solertiam, inquit Cicero de natura deorum, nulla ars, nulla manus, nemo opifex consequi potest imitando. Gal. lib. finit. med. de mente Platonis, Natura est uis, quæ ex seipsa mouetur, auctor formationis, generationis & perfectionis. Arist. sec. physic. Natura est principium motus & quietis in quo est primò & per se.

Loci consentientes de Natura humana.

Gal. tert. de temper. & secun. aphor. com. 34, Natura humana nihil aliud est, quàm ex primis quatuor elementis conflata temperies, uel facultas quædam uniuersi corporis rectorix. Et quin. de Sympt. cau. in principio, Natura est omnis illa facultas, qua animal regitur, siue illa pendeat à uoluntatis nostræ imperio, siue secus. Et sext. de Sympt. cau. cap. prim. Natura est aggregatio omnium uirtutum, quæ totum corpus regit. Et lib. finit. med. Nam est spiritus calidus, qui ex sese pro seminary rationibus mouetur, ac certis temporibus homines generat, perficit & conseruat.

Quot modis accipitur Natura?

Accipitur Natura quadrifariam, primò pro facultate naturali, secundò pro consuetudine, tertio pro temperie & compositione naturali, quarto pro naturali calore.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Quòd pro naturali facultate natura accipiat, hi sequentes loci attestantur. Gal. quinto de Sym. cau. cap. 2, Nam si morbus facultatem uicerit, id est naturam, membrum haudquaquam poterit transferre: si superior manserit facultas, id est natura, nihil eā impediet. Et paulò inferius, Natura facultates attollit & sustinet, id est, natura hoc efficit. Et quarto de uic. in mor. ac. Scire oportet naturam haudquaquā quiescere, sed interdum contentos humores ita aggredi, ut à bonis eos separet, &c. id est, Naturam esse facultatem qua boni humores retinentur, & pravi reijciuntur. Pro secundo, de consuetudine. Gal. 2. de temper. Consuetudo est natura acquisita,

16 DE CONSEN. MEDIC.

Et Hip. lib. de Aëre & aqua: item Auerrhois
pri. phy. & Arist. in predicamentis, Consue-
tudo est altera natura. Pro tertio, de tempe-
rie: Gal. 2. de temper. Hæc in nostra regione,
quæ utique est temperata, subiectarum par-
tium naturam prodit, id est, temperiem de-
monstrat. Nam temperaturas iuxta regiones
ibi considerat. Et Auic. Humor & natura
mutant animam, id est, humor & temperies.
Pro compositione sic, & intelligitur de na-
tura medicinarum. Vnde citatur poeta in
lib. de natura humana ita loquens,

Sic ait à Maia genitus, medicamē & offerre
Euulsum terra, naturamque edocet eius.

id est, compositionem eius explanat. Pro
quarto, de naturali colore, Gal. lib. de tre. &
pal. cap. 6, Natura & anima nihil aliud
quàm calidum est, quod semper mobile est. Di-
stinguit autem naturam ab ipsa anima pri-
mò de potentijs naturalibus, dum dicit, Et
motor in corpore aut est natura, aut anima.
Hic pro calido intellige calorē innatum, qui
teste Gal. aphor. pri. comm. 15, est facultatis
nos gubernantis robur, & omnium natura-

lium operum causa.

Quid est elementum.

Elementum philosophicè sumptum ita describitur, Elementum dicitur id ex quo quidpiam primò componitur, & est in eo, indivisibilèque existit specie in aliam speciem. Medicè sic, Elementum est minima rei particula cuius est elementum.

Loci consentientes de elemento philosophico.

Arist. 5. Met. tex. 4, στοιχείον λέγεται ὃ οὐ αὐτίζεται ἀπὸ τοῦ ὀνυπαρχόντος ἀδιαρρέπου τῷ εἶδει εἰς ἕτερον εἶδος. Similiter secundo de generatione à principio, & tertio cali, & de sensu & sensato tex. 20.

Loci consentientes de elemento Medico.

Gal. 8. de plac. Hip. & Plat. Nominatur utique elementum, quodcunque minima sit pars illius rei, cuius fuerit elementum. Similis sententia est pri. elementorum cap. pri. item primo elementorum ad medium, Si elementū

B. i.

sit minima & simplicissima rei particula,
 atque hoc si sensu metiri oporteat, profectò
 os & similia omnia erunt humanorum cor-
 porum elementa. Et Auic. pri. cau. cap. 3, Ele-
 menta sunt corpora, & sunt primæ partes hu-
 mani corporis & aliorum, quæ in partes di-
 uersarum formarum diuidi minimè possunt.
 Intellige quatuor elementa sub ratione ele-
 menti hîc definiri: nam dixit, sunt corpora, ut
 primam materiam, facultates, & id genus
 alia excluderet. Dixit primæ partes, ut ne
 quis de humoribus membri sue simplicibus, ut
 caro, os, &c. quæ in componendo nō sunt, pri-
 ma intelligeret. Cætera in descriptione sunt
 nota.

Quot sunt elementa?

Vniuersalia elementa sunt quatuor à pri-
 ma materia, ut Ignis, Aqua, Terra, Aer. Par-
 ticularia erunt duo, membra simplicia &
 humores.

Loci consentientes de vniuersali
 elemento & de particulari.

Arist. secundo de generatione probat per

quatuor qualitates, esse quatuor elementa. nam sicut sunt quatuor qualitates, ut calida, frigida, humida, sicca: ita erunt quatuor coniugationes, ut calidum cum humido, unde aer: calidum cum sicco, unde ignis: frigidum cum humido, unde aqua: frigidum cum sicco, unde terra. Probat etiam hæc esse quatuor per binas essentielles formas elementorum, quæ sunt gravitas & leuitas. Auic. & Auer. similiter iisdem argumentis hoc probant. De particularibus elementis Galenus secundo elementorum, Hominis uerò propria elementa sunt ipsæ particulae minimæ, quæ similes appellantur: de quibus (inquit) paulò post in dissectionum pertractationibus sermo erit. Et secundo element. in primo, Sanguis enim pituita & utraque bilis sunt non modò generationis hominum, sed cæterorum animalium sanguine præditorum elementa. Probatur etiã tali ratione: Id esse elementum dicitur, quod est principium omnium corporis particularum: sed sanguis cum alijs humoribus in utero matris est huiusmodi, Igitur sanguis & cæteri humores erunt elementa.

B. ij.

**Authores erronei dissentientes
circa elementa.**

- 1 Adserere, elementa esse unum, ut plerique philosophi.
- 2 Adserere, duas qualitates in summo in elementis dari.
- 3 Adserere, idem esse principium & elementum.
- 4 Adserere, elementorum doctrinam esse medico inutilem ac superfluum.

**Confutatio dissentientium ex
vera Medicina.**

Confutat eos Galenus primo de elementis, Si unum est, uel erit patibile, uel impatibile: non patibile, quia unum quatenus unum, non habet in quod transmutari, uel à quo pati possit: non impatibile, quia tunc id alteratione & sensu careret, igitur plura quam unum. Arist. primo phys. contra hos inquit, Quicunque ens unum esse pronuntiant, naturalis philosophiae principia tollunt: quum maximè in physica contemplentur corpora, quae generantur & intereunt, & transmuta-

tioni sunt exposita, quæ si auferantur, tum medicina tollitur. Ad secun. Arist. secun. de generatione inquit, Quod ignis est magis calidus, quàm siccus: aer magis humidus, quàm calidus. Igitur duæ qualitates non sunt in summo in elementis.

Obiectio.

Quomodo dicis hoc? nam Galenus quem tantopere sequeris, dari has qualitates in summo docet primo elementorum?

Responsio.

Quod in igne sit summus calor & summa siccitas, uerum est, ut Galenus asserit, si modò intellexeris, in superlatiuo gradu has qualitates reponi non debere, sed quod sint duæ qualitates in summo, id est, simplices & sine ulla admixtione. Ad tertium, Gal. pri. de elementis, Principia sunt eiusdem generis cum ijs quorum sunt principia: sed elementa non sunt huiusmodi: igitur sunt diuersa. Quod principia sint eiusdem generis, probatur ab ipso: nam simplex qualitas ita qualitaris cōposita, sicut simplex corpus corporis compo-

B. iij.

siti est principium. Differunt etiam, quia elementum dicitur de causa materiali intrinseca: at principium de causa finali & efficiente extrinseca, ut Arist. 12. Meth. Quod uerò elementum dicatur de causa materiali, probatur ex Arist. 8. Meta. dum inquit, Elementum est materia, cuius est elementum.

Ad quartum: Quod hæc doctrina elementorum non sit inutilis, neque superflua, probatur à Galeno primo de elementis, tribus medijs: Primo, quia omne quod nostris corporibus offertur, non impermixtum est, sed cum altero semper mixtum: Secundo, quia omnibus elementis, ut aqua, aere, terra, igne, semper utimur: Tertio, quia hæc qualitates possunt omnem substantiam transmutare, unde fit, ut si quid in qualitatibus modum excesserit, comprimatur indigeat, & si quid defluit, restitatur: igitur nec inutilis, uel superflua. De elementorum utilitate lege uberius Auicennam cap. de elementis.

De temperaturis, & primo de earum descriptione.

Temperies, quæ à Grecis κρᾶσις dicuntur.

tur, duplices sunt, quarum altera qualitas est,
 quæ ex elementorum qualitatibus conficitur.
 Altera quæ ex mixtorum etiam inuicē actio-
 ne & passione resultat.

Loci consentientes ex vera Medicina.

De utraq; loquutus est Auic. pri. pri. cap.
 de complexionibus, Complexio est qualitas,
 quæ ex actione & passione diuersarum qua-
 litatum in elementis inuentarum prouenit,
 quorum partes ad tantam paruitatem sunt
 redactæ, ut plurimum cuiusque earum, plu-
 rimum alterius contingat. Ac si dicat, Tem-
 peries est quoddam aggregatum, nō ex actio-
 ne & passione mixtorum, sed ex qualitati-
 bus elementorum, ut res naturales & corpo-
 reas excluderet. Nam dictum est etiam alibi
 ab ipso, quod ex primis elementorum qualita-
 tibus remissis, quædam media qualitas con-
 stituitur, quæ corporis mixti est propria qua-
 litas. Vide fusius de his Arist. quar. Methe.

Quot sunt Temperaturæ.

Nonem sunt temperaturæ, octo inæquales,
 B.iiij.

Et una aequalis : unde inaequalium quatuor sunt simplices, ut calida, frigida, humida, et sicca: quatuor ex his compositae, ut calida et humida, calida et sicca, frigida et humida, frigida et sicca. Aequalis est, qua corpus incolumis cum moderatione quadam seruatur.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Quod nouem sint, probatur ex Auic. pri. pri. cap. de complex. Tum, inquit, postquam de complexionis temperata diximus, ad loquendum de distemperatis redeamus. Igitur datur temperata complexio. Quod uero distemperatae sint octo, paulo inferius dicta resumens, inquit, Vnaquaeque autem harum octo complexionum aut est cum materia, aut sine materia, &c. Gal. pri. de temper. cap. pri. Vnum igitur et primum id est, quod temperatam naturam dicimus, quae tamen non uirtute modo, sed etiam uiribus reliquis praestat. Et pri. de temper. probat etiam, quod detur ista temperata natura, tali ratione, Caliditas stat cum excellenti siccitate et cum ex-

cellenti humiditate, igitur cum medio inter eas, & sic datur natura media contra philosophos. Quod uerò sint nouem temperaturæ, probatur rursus ex Gal. pri. de temp. cap. 8. dum inquit, Etsi quidem hæc sic se habent, sicut certè se habent, cur nouem dicere uniuersas temperamentorum differentias dubitemus, temperatam quidem unam, non temperatas octo? Quarum quatuor simplices sint, calida, frigida, humida, sicca: quatuor compositæ, ut calida, humida, &c. Quid uerò sit temperies æqualis, Gal. pri. de temper. cap. 6, *Æqualis siue temperata ea est, quæ ex contrarijs æqua prorsus inter se portione coeuvibus constat.*

Authores erronei dissentientes circa temperamenta.

1 Adserere cum antiquis, non esse nisi quatuor temperamentorum coniugationes, duas humidis, & duas siccis, atque has à calore & frigore diuisas.

2 Adserere cum Auerrhoistis, simplices non dari temperaturas.

26 DE CONSEN. MEDIC.

3 Adserere, temperatam naturam esse calidam & humidam.

4 Adserere, humiditatem non posse cum abundanti calore consistere, aut siccitatem cum uehementi frigore.

5 Adserere, temperie & mixtionē esse idē.

Confutatio dissentientium ex
vera Medicina.

Confutant antiquorum opiniones loci superius citati de nouem temperaturis ex Auicēna & Galeno. Confutat etiam eos Galenus primo de temper. cap. 3. inquiens, quod antiqui, quum de sanitatis tuendæ uictu inuestigant, calidius iusto corpus iubent refrigerare, ut omne exuberans æquent. Sed quomodo (inquit) hoc fieri potest, nisi temperatā quandam naturam constituent, ad quam sunt intenti? Quam si constituerint, tunc erunt quinque & non quatuor, etc.

Ad secundum: Auerrhois suis met uerbis uincitur, quum tertio colliget, species octo morborū enumerat, inter quas quatuor simplices reponit. Erunt igitur per ipsum quatuor sim-

plices à compositis separatae. Gal. pri. de temper. cap. 8. hanc etiam opinionem improbat hoc modo, Concedis alteram esse temperiem humidam & calidam, & alteram siccam & calidam: si non erit, igitur necesse siccam esse, quæ calida est, quoniam & eam esse humidam licet: tunc igitur eam esse mediam licebit, & sic calida tantum. Quod etiam de frigida & de alijs similiter est ratiocinandum. Igitur quatuor erunt simplices temperatura.

Ad tertium: Hipp. ter. Epidimion, Si totus, inquit, annus calidus & humidus fuerit, tunc necesse est quod magna succedat pestilentia: igitur quod erit calidum & humidum, non erit temperatum. Præterea Gal. pri. de temper. cap. 4. ad hoc probandum tali utitur ratiocinio, Quod est putredini aptum, id est pessimum temperamentum: sed natura calida & humida est putredini apta: igitur erit pessima. unde optimam esse cōcludit temperiem, quæ in quatuor qualitatuum mixtionis æqualitate consistit.

Ad quartum: Impugnat Gal. pri. de tem-

28 DE CONSEN. MEDIC.

per. & omnis schola medicorum, nec non & ipsa experientia: nam aqua ex calore feruēti humida manet. Verūm num calida magis uel humida dicatur, ab eo quod in mixtura pollet (inquit Galenus) appellatio sumitur, ut si maior erit portio humiditatis, quā caliditatis, humida dicetur, &c.

Ad quintum: lege Arist. secun. de gene. cap. de mixtione, ubi omnes dicunt temperiem esse mixtionem, sed non extra. Item mixtio significat motum, unde complexio provenit, & sic idem: non sunt, &c.

Quot modis aliquid dicatur esse calidum vel frigidum.

Bisariam calidum dici potest, absolute, & sic omnes qualitates absoluto sermone inveniuntur in elementis. Aut per collationem, & sic trifariam: aut per collationem ad mediū: siue ad pondus, siue ad iustitiam, aut ad seipsum, aut ad extraneum medium. Ad iustitiā rursus duplici modo sumitur, scilicet secundum genus, ut animal in genere animalis dicitur calidum: uel secundum speciem, ut homo

in specie hominis est temperatus. Calidum etiam dupliciter intelligitur, energia, quum id sit actus: uel potestate, quum id nondum sit, sed id fieri facile possit.

Loci consentientes ex
vera Medicina.

Gal. prim. de temper. cap. 6, Calidum dicitur per collationem: uel per absolutum sermonem: & hoc simpliciter: uel per mixtionem: uel secundum genus, uel secundum speciem, ut Animal in genere animalis est calidum: secundum speciem, ut bos, leo, canis. Vnde medium temperie in toto genere animalium homo est, medium temperie in hominum specie est, quem Græci εὐκρατος, id est, bene temperatum uocant, &c. Quod uero detur temperies ad iustitiam, in hoc capite ad finem ita inquit Galenus, Temperies ad iustitiam est, quæ eo quod pro dignitate conuenit, æqualitatem explorat. Auscennas latius de his omnibus pertractat cap. de complexionibus.

De membrorum temperaturis.

Calidiora in corpore membra uicissim se

30 DE CONSEN. MEDIC.

comitancia sunt spiritus, cor, sanguis, hepar, caro, muscoli, splen, renes, tunicae arteriarum, uenarumque, & cutis.

Frigidiora sunt, pituita, pili, os, cartilago, ligamentum, tendones, membranae, nerui, nuca, cerebrum, adeps, pinguedo.

Humidiora sunt, pituita, sanguis, adeps, pinguedo, cerebrum, nuca, caro mamillaris testiumque, pulmo, hepar, renes, muscoli, cutis.

Sicciora sunt, pili, os, cartilago, ligamentum, tendones, membranae, arteriae, uenae, nerui motrices, cor, nerui sensus.

Locī consentientes ex vera
Medicina.

Gal. pri. de temp. cap. ult. Cor, tum natura, tum omnium animalis particularum maxime sanguineum, tum uero calidissimum, proximum illi iecur. Et sic ibi de singularum partium temperie mebratim pertractat. Auic. pri. cap. 2. de complex. haec diffusius enarrat.

De notis temperaturarum in genere.

Cognoscuntur temperatura ex habitu to-

sius corporis, ex operationibus, ex regione, ex colore, ex tactus ratione, & ex atatibus.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. secun. de temperamentis cap. 4, Pinguiore omnes sunt frigidi, sicut mari fœmina: siquidem adeps ex habitus frigiditate gignitur. Corpulenti calidiores, quia carnis abundantia à multa sanguinis abundantia oritur. Mediocritas uerò, quæ inter hæc reperitur, temperata natura est nota. Et sic ex habitu totius corporis cognoscuntur temperamenta. Auic. prima pri. cap. de complexio. inuestigat etiam ipse notas temperamentorū, ibi, Fœmina frigidiore secundum diuersitatem, &c.

Ex operationibus sic: Gal. sec. de temper. cap. 6, At ubi uaria partium temperies est, ex una earum pronūciare de toto corpore nō licet, sed ad eundæ singulæ sunt, æstimandūque quo temperamento uentriculus, quo pulmo, quo cerebrum, ac reliquarum per se unaqueque seorsum sit: atque hæc ex functioni-

32 DE CONSEN. MEDIC.

bus, &c. & pri. temperaturarū cap. 6, Optime se habere aliquid pro sua natura ex ipsis functionibus intelligitur, quippe animal & stirpem optime se habere dicimus, quum optime suam functionem obeunt: igitur ex operationibus temperies agnoscitur.

Ex regione, Gal. 2. de temper. cap. 6, Pensandus & continentium partium affectus est, quarum omnium extrema cutis est. Sed corporis temperies in his regionibus, quae à temperie recesserunt, inaequalis uisitur, externis scilicet, & internis partibus non ad eundem modum se habentibus. Gallis enim & Germanis, & omni Thracio & Scythico generi frigida & humida cutis est: ideoque etiam mollis, alba, & pilis nuda. Aethiopibus uero & Arabibus, qui ad meridiem incolunt: nam cutis ex ambientī aestu, & naturali calore fortis aëto, iusta, dura, sicca, nigra redditur, toto corpore naturalis quidem caloris exiguam obtinente portionem, sed alieno atque ascitio incalescente. Hoc etiam probatur ex Auicenna cap. allegato, ibi, Septentrionales sunt humidiores, & similiter nautae, &c.

IN CVR. MORB. LIB. I. 33

Ex colore: Gal. de tuenda sanitate, Succorum corporis color est certissima nota: nam rubeus, croceus, luteus, ac pallidus caliditatem demonstrant: luens, plumbeus, albus, frigiditatem. Aetius ser. pri. cap. de uiribus simpli. Amplius uero nihilo magis ex coloribus cōiungere possumus de iisdem: in singulis enim coloribus inueniuntur & calida, & frigida, & sicca, & humida, &c.

Ex tactus ratione: Gale. secundo de temper. cap. 3, Ergo calidi frigidi que corporis solus tactus est iudex: humidi & sicci una cum tactu ratio, &c. Et 2. de temper. cap. 2, Calidum quod in aetatibus cognoscere cupimus, primum & maxime tactu iudicemus.

De notis temperaturæ optimæ.

Temperaturæ optimæ signa sunt, quū corpus neque densum, neque rarū, neque durū, neque molle, neque hirsutū, neque glabrū, sed medio quodā modo se habeat. De temperamento calido, frigido, humido, sicco, in particulari nō me extendā, neque de singulis partibus corporis loquēdo. Nā Gal. in arte med. cap. 52. & Aet. C. i.

34 DE CONSEN. MEDID.

ser. quar. cap. 77. & Paul. A Egi. lib. secun.
cap. 63. usque ad 73. Notato tamen, quòd nò
ex temperie unius particulae tantum est pro-
nunciandum de toto corpore, sed singulae par-
tes per se consideranda sunt.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. pri. de temper. cap. 9, Quod omnium
extremorum, calidi scilicet, frigidi, humidi,
sicci medium est, quod in duritia mollitia' que
medio statu consistit, id corpus erit tempera-
tum. Et in lib. de opt. corp. const. cap. 4, Por-
rò corpus etiam quod conspicuè neque den-
sum, neque rarum, neque durum, neque molle,
&c. optimè temperatum est, &c. Vide etiam
de his Aetium ser. quar. cap. 59. diffusius lo-
quentem.

De ætatum temperaturis, & de earum descriptione.

Ætas siue αἰών, est spatium, in quo ani-
mal crescit, stat, decrescit, & manifestè decli-
nat. Et diuiditur in quatuor partes, in ado-

lescentiam, quæ est calida & humida : in in-
uenturem, quæ est calida & sicca : in sene-
ctutem, quæ est frigida & sicca : & in ulti-
mum senium, quod est frigidum & humidum.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Quod ita describatur Aetas, habes ex Al-
berto Magno in lib. de senectute & inuentu-
re, dum inquit, Aetas est spatium temporis in
uiuente derelictum, in quo uirtus uitæ secun-
dum omnem suæ operationis modum perfici-
tur. Gal. quar. de salub. dieta tex. 7, Aetatis
temperamenta sunt quatuor, humida & ca-
lida puerorum, sicca & calida adulatorum,
sicca & frigida eorum qui in ætate inclina-
ta sunt, humida & frigida senum. Et Auic.
prima pri. cap. 3. de complex. ætatum, Aeta-
tes omnes sunt quatuor, ætas adolescentiæ
quæ durat usque ad 30. annum. ætas consi-
stendi, quæ durat usque ad 40. ætas minuē-
di, cum uirtus non amittitur, quæ est usque
ad 60. annum: & ætas minuendi, cum mani-
festa uirtutis imbecillitas est, quæ durat usque
C. ij.

36 DE CONSEN. MEDIC.

ad finem uitæ.

Obiectio.

Plures uidentur esse ætates quàm quatuor, siquidem Auicennas octo, Galenus & Hippocrates plures etiam enumerant.

Responsio.

Ætates in genere sunt quatuor, sed in specie plures. Nam Hippocrates, teste Galeno, aphor. 3. aphor. 26. mentionem facit de recens natis puerulis: deinde de illis qui dentire incipiunt: deinceps de his qui mediam ætatem habent, quæ ad duodecimum & tertiumdecimum annum progreditur, & est ætas proxima pubertati. Nam pubertatis tempus incipit post quartumdecimum annum, & durat usque ad uigesimumquintum, teste Gal. cõment. aphor. 7. Adolescentia igitur comprehendit sub se infantiam, pueritiam & pubertatem. Sic iuuentus ac senectus alias ætates sub se habent, quæ tãdem ad capita redacta, in genere sunt quatuor. Possent etiam reduci ad duo capita ut philosophi, ad perfectum scilicet & defectum: uel ad trinam

diuisionem, si his addam statum : sed nos ad quaternam diuisionem ætates reduximus, eò quòd temperamenta sunt quatuor.

Authores erronei dissentientes circa ætates.

- 1 Adserere, ætatem per quandam qualitatem describi debere, & non per quantitatem.
- 2 Adserere, senium esse frigidum & humidum simpliciter.
- 3 Adserere, ætates posse præfiniri.
- 4 Adserere, in ætatibus fundari temperaturas, seu dicere, ætates temperatas uel distemperatas absque ullius subiecti intelligentia.
- 5 Adserere, ætatum doctrinam esse inutile.

Confutatio dissentientium ex vera Medicina.

Quòd non per qualitatem, probatur ratione : quia interrogatus, quotennis es, respondetur per numerum, ut biennis, triennis, quæ est quantitas discreta, non qualitas. Præterea ætas nihil aliud est, quàm distantia à primordio uitæ usque ad finem, quæ

C iij.

38 DE CONSEN. MEDIC.

distancia quantitate, non qualitate determinatur. Hanc tamen dico non esse ueram definitionem, sed quandam descriptionem necessitate datam. Nam quod loco generis ponitur, non conuenit rei descriptæ.

Ad secundum: Gal. 2. de temperamentis cap. 2, Senum, inquit, temperies est frigidissima & siccissima, non autem humida. Quod probatur tali ratione ab ipso: Omne id siccum dicitur, quod nutrimentum intra se trahere non potest. Senum autem temperies ob excrementa superflua nutrimentum intra se trahere non potest. Igitur senum temperies erit sicca. Pro exemplo sint arbores: nã quotiens senescunt, magis exiccantur. Et Auic. prima primi cap. de complex. ætatum inquit, Senes & decrepiti præter hoc, quod sunt frigidiores, adhuc etiam sunt sicciores.

Obiectio.

Dictum est superius ex Galeno temperiem senum esse frigidam & humidam. Quomodo nunc probas esse siccam?

Responsio.

Galenus non iuxta propriam opinionem

loquutus est, sed id de mente aliorum disse-
ruisse uoluit, sicuti uberius per totū illud cō-
mentum demonstratur.

Ad tertium: Gal. 3. prognosticorum com-
ment. 28, Ob id igitur Hippocrates quando-
que, inquit, trigesimum commemorat, sæ-
pe etiam trigesimum quintum, quia aliæ alijs
accidunt mutationes: fieri non potest, ut una
mēsurā firma, ac cunctis promiscua finiatur.

Ad quartum: Gal. 2. de tempera. cap. 2, In-
telligamus, inquit, recens formatum animal
in utero matris, quo sciamus, qua ratione hu-
midissimum, calidissimūque sit. Nam prima
eius constitutio ex semine & sanguine est,
quæ humida & calida res sunt: igitur hic de
complexione subiecti, nō autem de ipsa ætate
calida & humida loquitur. Dicitur enim
ætas calida & humida, prout est in corpore
calido & humido. Posset probari hoc ex mil-
le locis, sed tantū hic locus ad probandum
sat sit.

Ad quintum: Gal. 2. de temper. cap. 2, Verū
quum ad ea, quæ nunc sunt proposita, magis
urgeat ætatis consideratio, quæ etiam ma-

C. iij.

40 DE CONSEN. MEDIC.

ximam nobis ad causarum inuentionem facultatem suggerit: huic nunc insistamus, &c. Ex quibus uerbis doctrinam ætatum non inutilem esse nobis demonstrat.

Obiectio.

Quos putas esse calidiores, puerulos an iuuenes?

Responsio.

In calore tria considerantur, quantitas scilicet nativæ humiditatis & sanguinis influentis: qualitas, id est ipsa caliditas, & formes ipsius caliditatis, quæ est caloris essentia. Dico igitur, si iuxta humiditatem nativam quantitas caloris consideretur, quòd pueruli sunt iuuenibus calidiores: at si iuxta sanguinem influentem, quòd iuuenes sunt puerulis calidiores, quia sanguine magis abundant. Sic etiam Gal. 3. de temper. cap. 4. considerat in calore qualitatem & substantiam, quæ legere poteris. Aduerte tamen has diuisiones, quoniam omne dubium remouere circa hæc poteris.

De Humorū definitione
& diuisione.

Quoniam humores ex primis elementis orti, sunt causa generationis & corruptionis hominum, idcirco duplicem etiam definitionem sortiuntur, uniuersalem scilicet & particularem. Vniuersaliter sic, Humores sunt corpora, quæ ex prima ciborum mixtione generantur. Particulariter sic, Humor est corpus humidum currens, quod ad membra conuertitur. Generantur humores ex alimento, quod ab innato calore alteratur.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Gal. 2. de element. Quatuor humores ex primis elementis ortos constat, materiâque esse generationis hominis, causâque esse corruptionis omnimodam, si quid in generatione animalis deesset: quoniam uno quidem deficiente humore, totum animal interit ac perditur. Auic. prima. 1. cap. de membris, Membra sunt corpora, quæ ex prima humorum commixtione generantur: quemadmodum

41 DE CONSEN. MEDIC.

humores sunt corpora, quæ ex prima ciborum commixtione generantur. Et cap. de humoribus, Humor est corpus humidum, fluidum, liquidum, in quod in primis nutriens conuertitur. Ac si diceret, est corpus humidum, id est, actu fluens, id est, substantia fluida. Nam aliquid esse humidum dupliciter intelligitur, natura uel substantia. Nam quedam res dicuntur in substantia humida, quæ natura et potestate sunt sicca, et sic e conuerso: quedam uero utroque modo, tam natura, quam substantia humida dicuntur. Idcirco dixit humidum, fluidum. Gal. aphor. 5. aphor. 39, Superfluum id, quod ex alimento relinquitur, humor existit nature partis similis. Et secundo de facult. naturalibus cap. 8, Demonstratum est, inquit, alimentum, dum in uenis ab innato calore alteratur, sanguinem quidem ex mediocri calore fieri, reliquos uero succos ex eodem, modum non seruante. Et sic habes quomodo generentur humores.

De alia diuisione de his qui nutriunt humoribus.

Ex his qui nutriunt humoribus, quedam

Sunt primæ & secundæ humiditates, quarum
 Primæ sunt humores. Secundæ rursus bipar-
 tiuntur: nam quædam sunt superflue, quædæ
 non. Non superflue erunt, quæ à principali
 dispositione cōuersæ, ad membra relegantur:
 & iuxta Auicennæ placitum erunt quatuor,
 scilicet, nomen non habens, ros, cambium,
 gluten. Humorum uerò, à quibus hæ humi-
 ditates proueniunt, sunt quatuor genera, ut
 genus sanguinis, pituitæ, bilis, melancholia.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Auicennæ prima primi cap. de humi. Hu-
 miditates quædam sunt primæ, quædam se-
 cundæ. Primæ sunt quatuor humores. Secun-
 dæ uerò, quæ non sunt superfluitates, sunt hu-
 mores, qui à dispositione principali conuer-
 si, ad membra relegantur: & sunt, nomen non
 habens, ros, cambium, gluten. Et Gal. 10.
 Meth. ad finē, loquens de hectica, de his mē-
 tionem facit, primam uocans natiuam humi-
 ditatem: alteram, nomen non habens: simili-
 ter de different. feb. Et Auic. prima quarti &

44 DE CONSEN. MEDIC.

dicitur 12. de animalibus. De his etiam uide de hectica. Quòd uerò humorum genera sine quatuor, probatur ex Gal. 2. de elemem. dum inquit, Conabor ea explicare, unde adductus est Hippoc. ut sentiret, humores quatuor materiam esse generando homini. Et lib. finit. Med. Humores quatuor sunt, ex quibus animal consistit, sanguis, pituita, & duæ biles, flaua scilicet, & atra: & sic sunt quatuor humorum genera.

De humoribus in particulari, & primò de sanguine.

Aqua, id est sanguis, humor est calidus & humidus, ex ipsius chyli temperationi parte progrediens: qui naturalis est & non naturalis. Naturalis, qui mediocri substantia, rubido colore, malo carens odore, sapore dulci, mitis ac benignus existit. Non naturalis, qui ab isto degenerat, & hoc bisariam, uel sui, uel alterius ratione. Ratione sui, dum mutatur propria substantia: & hoc dupliciter, uel quia nimis crassa, aut nimis tenuis: uel quia aduritur, & sic pars tenuior in flauam bilē

vertitur : crassior in atram ratione alterius, quum alius humor illi permiscetur, & tunc vario modo hoc contingere potest, prout variae bilis species & pituitae & melancholiae sanguini admiscuntur. Locus in quo consistit, est hepar, in quo perficitur, cor, in quod influit, uenae & arteriae.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Quod sit calidus & humidus, probatur ex Gal. 2. de morb. cau. cap. 4. quum dicat nepe, quod flaua bilis potestate calida est & sicca, atra uero sicca & frigida: sanguis calidus & humidus, pituita frigida & humida. Et primo de naturalibus facul. cap. 9. idem asserit. Auic. prima primi cap. de humor. Sanguis uero natura calidus & humidus existit, cuius duae sunt species, naturalis & non naturalis, &c. Gal. lib. de atra bile cap. 2, Igitur magna ex parte rubeus color in hoc humore exuperat, & talis exacte optimus sanguis existit. Et paulo inferius, Sanguis maioris ex parte dulcis apparet. Et secundo de rem-

46 DE CONSEN. MEDIC.

peram. cap. 3, Succorum optimus, & maxime proprius ac domesticus, sanguis est: igitur à temperationi parte progreditur. Et secundo de facult. naturali cap. 8, Sanguis fit à mediocri calore, bilis ab immodico. Igitur sanguis à parte temperata oritur. Et hæc de naturali sanguine. De non naturali, dum mutatur propria substantia, ut pars tenuior in bilem, habes ex Gal. 2. de differ. feb. cap. 9. ubi inquit, Pars sanguinis subtilior ac pinguior omnino in flauam conuertitur bilem: quæ autem crassior, in atram. Itidem ait 2. de cris. cap. 12, Quod uerò sanguini alius humor misceatur, habes ex Gale. lib. de plenit. ad medium, Quum tumor, inquit, præter naturam, ad quancunque substantiam pertinere possit, siue is syncerus sanguis sit, siue biliosus, siue serosus, siue pituitosus, &c. Id est, quum bilis aut pituita sanguini miscetur. De loco sanguinis, Gale. 1. de temper. cap. ult. Sanguis ipse à corde suum accipit calorem. Et 6. de plac. Hip. & Plat. At qui in dextro sinu continetur sanguis, eandem speciem habet, quam omnis alius, & is qui in iecore

IN CVR. MORB. LIB. I. 47

habetur, &c. Hic etiam ab ipso probatur, cor & iecur esse sedem sanguinis, ipsumque iecur uniuersam sanguinis speciem absolueret: & quod sanguis humidi temperamento, rubri colore, cuius sanè in iecore est prima generatio. Riuuli autem & uenae id toti corpori traducunt distribuuntque. At sanguinis flauus, tenuis, spumosi, prima in sinistro cordis sinu est origo: uerum talem arteriae dispensant, & in totum corpus deducunt, &c. Vide de his etiam Gal. de facul. natural. diffusius.

De pituitæ diuisione & descriptione.

Φλέγμα, id est pituita, duplex est, naturalis & non naturalis. Naturalis, est humor frigidus, humidus, substantia crudus, colore ad albedinem, sapore interdum dulci, quandoque omnis qualitatis expers. Non naturalis est qui à sui natura degenerat: & hoc bifariam efficitur, per se scilicet & per admixtionem. Per se, quum à propria substantia egreditur: nam in substantiam aquosam uel flatuosam uel admodum tenuem conuertitur, unde pituita

48 DE CONSEN. MEDIC.

aquosa, flatuosa, & tenuis dicitur. Si uerò crassior ac uiscosior reddatur, tunc pituita erit crassa, uiscosa, & mucilaginosa. Quæ si magis indurescat, gypsea & uitrea dicetur pituita: quæ si ultrà putrescat & alteretur, fiet salsa, uitrosa, & corrosiua. Per admixtionem, quum illi alius misceatur humor: nã sanguine admixto dulcis efficitur: flaua bile, salsa: melancholia, pontica, acida.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Auic. prima primi cap. de humor. Phlegmatis aliud naturale, aliud non naturale. Naturale est, quod aptum est in aliquo tempore fieri sanguis, quoniam est sanguis non plenè concoctus. Vnde Arist. 6. Topic. inquit, phlegma esse primum indigestorum à cibis proueniens. Gal. 2. de diff. feb. cap. 6, Quicumque humor in corpore frigidus atque humidus fuerit, hunc nos pituitam appellamus: & sic erit humor frigidus & humidus. Et de atra bile cap. 2, Apparet pituita omnis qualitatis expers, ueluti aqua. Verum

naturali qualitate mutata, non modò salsa, sed acida etiã fit, quin & non rarò dulcem qualitatem acquirit. Hunc itaque humorem, qualiscunque fuerit, pituitam appellant, si modò albus extiterit. Et 2. de diff. feb. cap. 6, Alia est pituitæ species, quam plerique cū sreatu expuñt, sensibile habēs dulcedinē, &c. Auic. prima primi cap. allegato, octo species phlegmatis non naturalis enumerat, ut uideré poteris.

Obiectio.

Quomodo octo enumerat, quum iuxta Gal. sententiam ad summum tres tantum sint, ut salsa, dulcis, acida?

Responsio.

Certum est Galenum non nisi tres enumerasse differentias pituitæ, ut 2. de diff. feb. cap. 6. Item 3. de loc. aff. cap. 7, Veruntamen pituitam possumus dupliciter considerare, uel in ratione saporis, uel in ratione suæ substantiæ. Si ratione saporis, tunc erunt tres differentiæ, ut salsa, dulcis, acida: quanquam & insipida addi posset: sed ratione substantiæ

D. i.

50 DE CONSEN. MEDIC.

erunt etiam quatuor, quæ primis copulata, erunt octo. Quod Galenus etiam non negaver: nam in lib. de plenit. ad finem, humorem crudum inter pituitæ species esse reponendum ait, qui crassior ac minus flatuosus est, &c. Præterea 14. Meth. cap. 17. dixit euacuationem bilis esse facilem, sed pituitæ crassioris & glutinosioris esse difficilem. Ergo datur pituita crassa, quæ & mucilaginosa esse potest. Rursus 3. de loc. aff. cap. 7. mentionem facis de vitrea à porracea appellata. Item de aquosa, quæ nulla qualitate infecta, dici potest insipida: & sic ratione substantiæ erunt aliæ species. Item 3. de loc. aff. cap. citato, atram bilem differre facit, ob substantiæ uarietatem. Igitur à simili pituita etiā in substantia uariabit.

Obiectio.

Quomodo concordabis Auicennā Galeno in ijs admixtionibus? Nam Galenus salsam fieri pituitam asserit, aut propter putredinē, aut propter salsæ serosæ humiditatis miscellam: Auicennas uerò ex miscella bilis cum pituita.

Responsio.

Quòd fiat propter putredinem, ut dixit Gal. 2. de differenti. feb. cap. 6. etiam Auic. cōcedit, inquit, Et nos quidem dicimus putredinem ipsum phlegma salsum efficere, ideo quòd in ipso adustionem facit, &c. Nec in humiditate serosa distat à Galeno. nam ipse, sola, inquit, aquositas non facit salsum, quod uerum est. Sed Galenus non solam, sed salsam & serosam dixit, quod Auicennas nō negasset. Quòd uerò à bilis miscella fiat phlegma salsum, uerum. Nam Arist. in lib. de sen. & sensa. & 2. Meth. salsum sapore affirmat esse eiusdem speciei cum amaro: nam terrea partes adusta, & amari saporis, si insipida humiditati equaliter misceantur, fit salsedo: si uerò humiditatem superent, amaritudo. Quare cūm bilis amara quidem natura ac sicca sit, & pituita misceatur, fieri potest, ut inde pituita salsa euadat.

De bilis definitione & diuisione.

Χολη, id est bilis, est humor calidus & sic

D. ij.

cus, ex tenuiori & calidiori parte chyli, uel
 ex sanguine tenui & feruescente proueniens.
 Hæc duplex est, naturalis & non naturalis.
 Naturalis, est humor calidus & siccus pote-
 state, substantia tenui, flauo colore, aut rubro
 ad flauitiem declinante, sapore amaro. Non
 naturalis est quæ à iam dicta degenerat: &
 hoc dupliciter, per se, & per admixtionem.
 Per se adhuc bifariam, quum putrescit &
 aduritur, & tunc dicitur adusta per pu-
 tredinem. Altero modo, quum non natura-
 lis; uitellina dicta, colore quodam igneo, in
 hepate, aut uentriculo, aut in uenis concoqui-
 tur, & tunc fit porracea, quæ & præsina di-
 citur & æruginosa. Per admixtionem non na-
 turalis efficitur, quum illi alius humor ad-
 miscetur, & hoc multifariam. Nam si phle-
 gma tenue & aquosum admisceatur, citrina
 siue crocea efficitur: si crassum & uiscosum,
 uitellina: si adusta melancholia, fit bilis adu-
 sta, & sic erunt sex species.

Loci consentientes ex vera
 Medicina.

Quod bilis sit calida & sicca potestate,

probat ex Gal. 2. de natu. fac. cap. 9, Bilis, inquit, flaua, calida & sicca est, quantumuis sit ab aspectu humida. Quod uerò sint sex bilis species, habes ex Gal lib. de atra bile cap. 2. ubi inquit, Bilis enim flaua fit pallida ex serosa & tenui humiditate, quæ ubi resoluitur, λευκώδης, id est uicellina appellatur. Est & bilis, inquit ipse, πορροειδής, id est porracea: alia icώδης, id est eruginea: alia ισπεώδης, id est glauca: alia rubra, sanguini tenuiori proxima: & sic erunt sex species. Auic. prima primi cap. de humor. hanc totā diuisionem habet: lege eum uberius.

De Melancholiæ definitione & diuisione.

Melancholia duplex, naturalis & non naturalis. Naturalis est boni sanguinis fæx, ac ueluti limosa quedam superfluitas, siue crassior quidam sanguis, cuius color niger est, sapor uerò acerbus uel acidus, in massa sanguinaria existens, ad alendas partes melancholicas progenitus. Non naturalis, qui à naturali degenerat, definiturque in uniuersum,
D. iij.

54 DE CONSEN. MEDIC.

quod sit humor frigidus & siccus, ex crassiori portione chyli proueniens, cuius species sunt quatuor. Prima quum melancholicus humor, naturalis dictus, in sua propria substantia aduritur & putrescit, fitque bilis exquisitè nigra, quæ acida est, & in terram effusa uelut acetum feruet, & terram attollit. Secunda est bilis atra ex adustione aliorum humorum. Quæ enim fit ex flaua bile uehementer adusta, non aliter ac exquisitè atra terram radit ac attollit. Tertia species melancholiæ non naturalis est, quæ à lapidosa concretione oritur. Quarta species, quum alius humor ipsi melancholiæ naturali permiscetur, dumque hoc fit, dulcoratur & mitescit, modò neutra bilis adusta admisceatur: quia tunc uel acescit, uel amarescit, & erosionis fit particeps.

Loci consentientes ex
vera Medicina.

Gal. 2. de temper. cap. 3, Sanguis optimus succorum ac proprius, huius ueluti sedimentum ac sex atra bilis est: quæ idcirco tum fri-

gidior, tum crassior sanguine est, sicuti flaua bilis longè calidior. Et 3. Prognost. comment. 29, Atra bilis generatio duplex, altera à sanguine crassiore, qui proportionē in uenis subsidenti in dolio uini fecula respōdet. Altera à flaua bile uehementē assata, quæ atra bilis aliqui malefica est, ac derodit partes, in quibus abundē collecta est. Altera mitior quàm hæc est, maximè quoties nondum traxit in animali moram cum aliquo calore abundanti præter naturam. Et 3. de loc. aff. cap. 7, Melancholicos, inquit, esse, in quibus siccitas & frigiditas dominatur. Et paulò inferius, Atra bilis ob substantiæ uarietatem non obscuras habet differentias: nam alia est ueluti fæx sanguinis quæ admodum spissa, & fecibus uini non absimilis: alia uerò, quàm superior, essentiæ est multò tenuioris, atque uomentibus causa, & olfacientibus acida uidetur: quæ etiam terram radit, attollit & fermentat. Sed ea, quàm crassæ fæci similem esse dixi, in terram effusa non inducit feruorem, nisi fortè in ardente febre ipsam præassari contingat. Hanc nominare consueui succo.

D. iij.

56 DE CONSEN. MEDIC.

cum melancholicum aut sanguinem melancholicum. Vide etiam de his plura iuxta Gal. de atra bile cap. 2. & 2. de naturalib. facul. cap. 9. ad finem. Auic. prima primi cap. de humor. Cholera nigra alia naturalis, alia non naturalis. Naturalis est boni sanguinis fex & turbulentia, & superfluitas in comparatione ad sanguinem. Melancholia non naturalis, non est ad modum hypostasis & facis, imò est ad modum adustionis & cineritatis: & tunc est multiplex, uel est phlegmatica, uel cholera, uel sanguinis, uel melancholia cinis: & sic erunt quinque species.

Obiectio.

Quomodo dici potest cinis phlegmatica, quum Marardus dicat non posse ex pituita tantam assationem fieri ut nigra euadat?

Responsio.

Dico, quòd pituita, si aduritur, melancholia in qualitate, si non, in colore fieri potest.

Obiectio.

Quid est frigidius, pituita an atra bilis.

Responsio.

Si considerentur iuxta earum essentiam,
frigidior est pituita: si uerò iuxta earum im-
pressionem, atra bilis, quia pituita est dērior.

Authores erronei dissentientes
circa humores.

- 1 Adserere cum Aristotele, solum sangui-
nem nutrire, & ceteros humores esse su-
perfluitates.
- 2 Adserere, humorem naturalem esse malū,
quum nutrire non possit.
- 3 Adserere, sanguinem dari ab alijs humo-
ribus in aggregatione distinctum.
- 4 Adserere, uirium robur sequi ad sangui-
nis copiam, & ad eius paucitatem minui.
- 5 Adserere, non dari quartam temperiem
in succis, quæ est frigida & sicca.
- 6 Adserere, humorum generationem esse re-
ciprocam, ita ut ex sanguine fiat pituita.
- 7 Adserere, humorum cognitionem esse inu-
tilem cum Erasistrato.

DE CONSEN. MEDIC.

Confutatio dissentientium
circa humores.

Confutat primam Gal. 3. de temper. cap. 2. dum inquit, Omne animal conueniente sibi nutritur alimento. Conueniens cuique alimētum est, quicquid assimilari potest corpori, quod nutritur. Et primo de natur. fac. cap. 2, Nutritio est ad id quod nutritur eius quod nutrit assimilatio. Igitur melancholica membra, melancholia: pituitosa ipsa pituita in nutritione indigebunt, & sic solus sanguis nō nutrit. Auic. prima primi cap. de humor. Qui solum sanguinem dicit nutrire, mentitur: si enim solus sanguis esset humor qui membra nutrit, omnia in suis complexionibus & essentiis similia forent, &c. Igitur solus sanguis non nutrit.

Ad secundum, probatur tali ratione, Humor malus potest nutrire, ergo bonus & naturalis. Quod malus nutrire possit, probatur, quia ad benignum potest reduci.

Ad tertium: Gal. lib. de plenit. ad finem, Nam neque fieri alioqui potest, ut adeo syn-

cerus in uenis reperiatur sanguis, quin illi aliquid aut bilis aut pituitæ aut serosi humoris permixtum sit: siquidem syncerus ab alio humore sanguis & impermixtus inueniri nusquam habetur. Et lib. de atra bile ca. 5, Quod igitur in uenis & in arterijs humores omnes unâ cum sanguine continentur, ostendit ipsius uarietas tum in colore, tum in consistentia, &c. Probatur & ex Hippocrat. lib. de natura humana, quem citat hoc in loco Galenus. Igitur sanguis ab alijs humoribus non distinguitur.

Ad quartum: Auic. prima primi cap. de humor. Sunt quidam, inquit, qui opinantur, corporis uirtutem sequi ad sanguinis multitudinem, & ipsius debilitatem sequi eius paucitatem, sed non est ita. Quod uerò attenditur, est dispositio eius quantitatis, quæ de eo corpus ingreditur.

Ad quintum: Gal. 2. de natural. fac. cap. 9. contra Erasistratum probat authoritate medicorum & philosophorum, qui humores quatuor anni temporibus compararunt. Unde, inquit, sicut quatuor sunt anni tempora,

60 DE CONSEN. MEDIC.

ita quatuor erunt humorum temperaturæ. Præterea sicut dantur morbi frigidi & sicci, ita in humoribus quarta temperies, quæ est frigida & sicca.

Ad sextum: Gal. 2. de uic. in mor. ac. comment. 31, Pituita processu temporis coquitur, & sanguis efficitur. Sed nec flaua bilis, nec atra in sanguinis substantiam redeunt: igitur eorum generatio non erit reciproca. Vel tali ratione: Frigidum à calido fieri non potest, regulatis à natura humoribus: igitur nec à sanguine fiet pituita, & sic non erit reciproca generatio.

Ad septimum: Gal. 2. de nat. fac. cap. 8, Nunquid quæso quemadmodum cibi concoquuntur in uentre est utile sciuisse, ita nonne paris momenti est, uel sanguinem bonum gigni, uel nutrimentum in uentre probè in chylum uerti? Et paulò inferius, Nonne generandæ hydropis causa ex sanguificationis defectu prouenit, sicuti ex ciborum coctionis defectu diarrhœa? Ac si diceret, Quomodo hæc capi possunt, nisi humorum cognitione contemplatus fueris, &c? Et sic humorum cognitio

non erit inutilis.

De diuisione Membrorum in genere.

Membrorum alia sunt homœomera, id est similaria. alia organica, id est instrumentaria. Homœomera dicuntur, quæ communicant cum suis partibus in nomine & ratione, ut os, caro. Organica uerò sunt, quorum nulla pars nec in nomine, nec in ratione cum toto communicat, quum manus, siue capitis pars, nec manus sit nec caput: quæ diuisio à naturali operatione sumitur. Naturalis enim operatio his tribus perficitur, scilicet temperie, compositione & unitate: quarum temperies simplicibus membris attribuitur, compositio instrumentarijs, & horum utrisque unitas. Cōpositorum igitur quædam sunt principalia, quorum unum ad speciem conseruandam, ut testiculi, reliqua ad indiuiduum seruandum attribuuntur. His seruiunt, ut cerebro nerui, cordi arteria, hepatis uenæ, testiculis uasa spermatica: ab his quoque tanquam à principio dependent, stomachus, renes, intestina,

2 DE CONSEN. MEDIC.

omnesque musculi, quæ præter proprias uirtutes sensu & uita cum uoluntario motu fruuntur.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. de consti. ar. med. cap. 4, Nimirum quum corpora, quæ similaria appellantur, ex dissectione apprehenderimus, compositorum pariter membrorum, quæ instrumentaria nonnunquam nominare solemus, scientiam assequemur: & sic duplicia sunt membra, simplicia & composita. Auic. prima primi cap. de memb. Membrorum alia sunt simplicia, alia composita. simplicia sunt, quorum quancunque sensibilem partem assumpseris, in nomine & definitione erit toti communicans. Composita sunt illa, quorum quancunque partem acceperis, in nomine & definitione communicans non erit, sicut manus & facies. Gal. in lib. art. med. cap. 9, Vniuersæ partium differentie sunt quatuor, nonnullæ earum principia, aliquæ ab his originem habent, aliquæ nec aliarum gubernationi præ-

IN CVR. MORB. LIB. I. 6;

sunt, neque aliunde gubernantur, quum insi-
tas habeant à natura potentias, à quibus re-
guntur : quedam sunt quæ insitas simul &
aliunde emanantes habent. Principia igitur
sunt cerebrum, cor, hepar, testiculi: ab his o-
riuntur & subministrant nerui & spinalis
medulla cerebro, cordi arteriæ, hepatis uenæ,
testiculis uasa seminaria. Et cap. 8. art.
med. Vitiis genera eadem sunt his, quæ
uirtutem perficiunt. Temperies quidem in
consimilibus, numerus, formatio, magnitudo
& situs in instrumentariis, utrisque uerò cō-
munis unitas. Et de tot. morb. temp. cap. 7.
Tria facultatum totum corpus gubernantium
principia sunt, cor, hepar, cerebrum, ex qui-
bus oriuntur nerui, uenæ, arteriæ. Hi & si-
miles loci ea quæ dicta sunt probant.

De facult. naturalibus & de
earum definitione.

Potentia siue facultas est cuiusvis operis
& actionis causa : & hæ duplex, ἐνεργεία
id est actus, altera potestate. Hæc potentia
siue facultas etiam dicitur uirtus, & tunc

64 DE CONSEN. MEDIC.

quadrifariam describi potest. Primò, quòd uirtus sit habitus, penes quem aliquis dicitur bonus. Secundò, quòd sit quædam actiua qualitas, sicut dicimus elementa habere quatuor uirtutes, id est quatuor qualitates, scilicet calidas, frig. &c. Tertiò describitur, quòd uirtus sit quædam forma specifica, sicut dicimus Eupatorium habere uirtutem ad iecoris morbos. Quartò describitur, quòd uirtus sit anima facultas, qua suas peragit operationes.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Arist. 2. Ethic. Virtus est dispositio quædam animæ, per quam inter duo extrema tenemus medium: & hæc spectat ad moralem philosophum. Gal. 1. de cau. pulsuum, loquens de generibus pulsuum, inquit, Quando essentia incognita nobis est, hoc nomine facultatis eam appellamus. Alicuius enim est facultas, & eius notio est relationi subiecta. Ac si diceret, eam facultatem dici de omnibus, ad quæ referri potest, & sic de habitu & de qualitate actiua dicitur. Gal. 1. de fac. simp. cap. 1, Fa-

cultras, causa quæ est effectrix, eaque partim actu, ut calefaciendi in igne: partim in futuro tempore, ut calefaciendi pyretro. uel sic in animalibus describitur: Virtus siue facultas est animæ potentia, membris essentialiter attributa, ad suas operationes peragendas.

De facultatum alia diuisione.

Facultas etiã triplex est, naturalis, uitalis & animalis: triplex inquam in ratione, non in substantia. Nam sicut in citro color, odor, & sapor inueniuntur diuersi in ratione, idem in substantia: ita in his facultatibus, naturalis locatur in hepate, & est facultas, quæ nutrens in similitudinem nutriti trãsmutat. Hæc duo præsupponit, generationem scilicet & auctiõem: nã generatio ita alteratione & formatione, sicuti auctrix habet alteratricem & nutricem auxiliatrices. Auctrix facultas est potentia, qua corpus in omnem dimensionem augetur, usque ad augmenti finem: uocatur ab Auicenna Crescitua. Naturalis siue nutritrix facultas similiter agglutinationem & appositionem præsupponit. As-

E.i.

66 DE CONSEN. MEDIC.

similatio, quæ in nutrice reponitur, quatuor
 has facultates supponit, attractricem scilicet,
 retentricem, alteratricem siue concoctricem,
 & expultricem. Facultas vitalis siue animosa
 est quæ uiuificat, & locatur in corde, à quo
 procedit uita, ad singula corporis membra ui-
 uificanda. Facultas animalis est potentia
 ipsius animæ, in cerebro locata, quæ in mo-
 tricem & sensibilem, aut in quaternas cere-
 bri facultates diuiditur, quæ sunt, sensus cõ-
 munitis, imaginatrix, ratiocinatrix, quam co-
 gitatiuam etiam dicunt, & memoratrix.
 Sensus communis est, qui solus omnium alio-
 rum sensuum sensata percipit. Imaginatrix,
 quam Græci φανταστικὴν uocant, dicta est, eo
 quòd inde nobis uisa proueniant. Ratiocina-
 trix est quæ reuocat species sub sensum ad
 iudicium, atque rerum imagines de potentia
 abstrahit. Memoratrix est quæ omne quod
 à cæteris facultatibus elaboratum est & re-
 ceptum, ueluti tutrix conseruat & fouet.

Loci consentientes ex ve-
 ra Medicina.

Gal. 9. meth. cap. 10, Gubernant ani-

mal tres diuersi inter se generis facultates, toti corpori ex suo ueluti fonte quæque distributa (eas Plato uocat animas) Est enim earum quadam ad nutriendum animal necessaria, ac cum stirpibus communis, quæ iecur pro fonte habet : hanc appetitricem, seu naturalem, seu altricem appellare licet, sicuti et animam aut facultatem. Altera est, quæ non modò ut stirpibus aut uita præditis, sed etiam ut animalibus est anima insita: hæc in corde collocatur, ceu insiti caloris fonte. Tertia anima ratiocinatrix in cerebro domicilium habet, ea uoluntariis actionibus unà cum sensibus præsidet.

Loci de virtute nutrice.

Aristo. 2. de anima, Virtus nutritiua est potentia saluare suscipiens ipsum secundum quod est eius. Gale. 1. de naturalibus fac. cap. 12, At quòd necesse sit, nutritionem esse assimilationem nutrientis ei quod nutritur, dare liquet. Auic. prima primi cap. de uirr. Virtus nutritiua est illa, quæ nutriens in nutriti similitudinem conuertit, ideo ut per
E. y.

ipsum restorationem eius recuperet, quod dissolutum fuit. Quod primum in naturæ operibus sit generatio, probatur ex Gale. 1. de fac. nat. cap. 5, Generatio simplex quadam actio naturæ non est, sed ex formatione alterationeque composita. Et cap. 8, Vbi animal magnitudinem perfectam adeptum est, usque ad ætatis uigorem nutritrix uirtus dominatur, cui auxiliatrices & ministræ sunt alteratrix & nutritrix. Et cap. 11, Ad hoc ut fiat nutritio siue adhærentia præcedat oportet: sicuti etiã ut illa fiat appositio. Exemplum habes de uirilagine, quæ nutrimenti est adhærentia, sed non est assimilatio.

Loci de quatuor facultatis nutritiux ministeriis.

Auic. prima primi cap. de uirt. minist. Virtuti nutritiux ministrantes sunt quatuor uirtutes, attractiua, retentiua, digestiua & expulsiua. Quæ uerò sit unaquæque, poteris ab ipso ediscere. Gal. 3. de temper. cap. 1, Quatuor nimirum dicimus totius corporis proprias facultates esse, attractricẽ, alteratricẽ,

retentricē, & quartam quæ alieni sit segregatrix, easdēque facultates effectus esse totius in quouis corpore substantia, &c.

Loci de virtute auctrice.

Arist. 2. de anima, Virtus augmentatiua est uirtus factiua quanti. Gal. 1. de fac. nat. cap. 7, Auctio est solius naturæ opus, ut corpus quod continuitatem suam & speciem, quam prius habuit, uniuersam seruet, in omnem partem extendere: quæ sine nutrimento affluente adhærentēque fieri nequit. Auic. prima primi cap. de uirt. ministr. Virtus augmentatiua est uirtus, quæ addit in diametris totius corporis secundum proportionalitatem, quousque corpus ad augmenti finem perducatur per illud, quod ipsum ingreditur ex nutrimento. Idem ait in sexto de naturalibus.

Loci de facultate vitali.

Gal. 5. de locis affe. cap. 1, Cor innati caloris ueluti fontē esse, neq; animal mori posse, nisi cor afficiatur, iā declaratū est. Igitur cor
E. iij.

70 DE CONSEN. MEDIC.

est membrum uiuificans. Auic. prima primi, cap. allegato, Virtus uitalis est, quæ cū recepta fuerit in membris, præparat ea ad recipiendum uirtutem sensus & motus & operationes uitæ, &c.

Loci de facultate animali.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 1, Ostensum est, sensum & motum uniuersis corporis partibus à cerebro suppeditari, &c. Et tertio de loc. aff. cap. 7, Rationi consonum uidebatur, animam in cerebri corpore sedem obtinere, atque in ipso & rationis uim & sensibiliū imaginum memoriam residere, &c. Et sic animæ facultas in motricem & sensibilem potentiam diuiditur. Arist. tertio de anima cap. 2, Sensus communis est qui solus sensata aliorum sensuum percipit. Auic. primo can. cap. de uir. animali, Phantasia, id est imaginatiua est uirtus, quæ formas perceptas à sensu communi custodit, & retinet eas post sensus absentiam. Themist. unā cum Aristotele Imaginatiuam esse potentiam animæ à sensibus ortā dicit. Arist. primo Ethic. facit

differre uirtutem ratiocinatricem ab intellectu, eo quòd causas cum effectibus conferre possit, sed intellectus causas tantum comprehendat. Gal. lib. fin. med. Sensus est affectus animæ per corpus, nuncius rei quæ mouere idonea est. Arist. lib. de memoria & reminiscen. Memoria, inquit, est habitus phantasmatis, id est, imaginis. Auer. ibi, Memoria est reuersio in præsentis intentionis iam in præterito comprehensæ. Auic. primo can. Memoria est thesaurus eius quod peruenit ad extinctionem de intentionibus perceptis à sensu extra formas perceptas à sensu. Gal. lib. fin. med. Memoria est præteriti comprehensio, cuius præsens fuit ex sensu perceptum.

Dissentientes circa facultates dictas.

- 1 Adserere, facultates naturales non esse in qualibet parte corporis.
- 2 Adserere, facultates esse remediorum indices.
- 3 Adserere, facultatem nutricem & auctricem esse idem.

E. iiij.

4 Adserere, facultates non alibi, quàm in animato corpore posse reperiri.

5 Adserere, facultatum cognitionem esse medico inutilem.

6 Adserere, facultatem uitalem non esse naturali priorem.

Confutatio dissentientium circa facultates naturales.

Ad primum: Gale. 5. de loc. aff. cap. ult. Est igitur communis sermo, quem inuenire proposui de naturalibus facultatibus, quas in qualibet parte quatuor generatim esse didicistis: primam uoco attractricem, quæ parti peculiares succos alendi ipsos gratia, & appetere & attrahere potest. Altera est, quæ alteratrix dicitur, quæ succus attractus similis euadit parti, quæ aliter Crescitina: huic duæ aliæ ministrant, retentrix & expultrix, &c. Et sic in qualibet parte erunt facultates. Similis sententia est in lib. de plenit. circa medium.

Ad secundum: Gal. de opt. secta ad Thra-
lybu. cap. 42, Si constans uis remedium in-

dicat, in sanis quoque quoniam constat, remedium indicabit: sed in sanis remedium non indicat, ergo nec in agris constans remediū indicabit.

Ad tertium: Gal. primo de natural. facult. cap. 9, Quippe summa rei sic habet, generatio, auctio & nutritio prima naturæ operū, ac ueluti capita sunt. Vbi distinguit auctione à nutritione, igitur idem non sunt. Præterea tali ratione probatur: Quæcunque in fine & in quantitate materiæ differunt, non sunt idem: sed auctrix & nutritrix sunt huiuscemodi, igitur idem non sunt. Quòd differant in fine & in quantitate materiæ, probatur ex hoc, quia nutritrix indiuiduum tantum cōseruat, auctrix uerò auget. Veruntamen dicimus unam & eandem substantiam esse, quæ duo hæc efficit.

Ad quartum: Galen. primo de natur. fac. cap. 13. probat in magnete & in succino esse vim attractoriam, sicuti & in purgantibus medicamentis, & in stirpibus, & in similibus esse alias facultates: igitur alibi quàm in animato corpore reperiuntur.

74 DE CONSEN. MEDIC.

Ad quintum: Gal. 2. de naturali fac. cap. 3, Nisi enim à natura facultas quædam naturalis unicuique instrumento statim ab initio sit tributa, durare animalia non poterūt, non modò tantum annorum, sed nec paucissimorum dierum: igitur scire has facultates non erit inutile. Præterea probat Galenus citra facultatem attractoriam de urina secretionem, neque de alimenti distributione, aut de nutritione non medico licere loqui: igitur harum cognitio non erit inutilis. Rursus quinto de loc. aff. cap. ult. Has facultates, inquit, in qualibet affecta parte, utrum ualide sint, an infirmæ consideretis hortor: & sic earum cognitio non erit inutilis.

Ad sextum: Auic. prima primi cap. de uirt. uit. inquit, quòd præparat ad recipiendum alias uirtutes: igitur erit prior. Præterea id prius est, cuius instrumentum est primum: sed instrumentum uirtutis uitalis, scilicet cor, est prius factum quàm hepar, igitur erit prius.

De sanitatis ac morbi definitione.

Sanitas est harmonia siue concinnitas

quatuor primorum elementorum, quæ secundis naturam in nobis sunt. Vel, Sanitas est omnium nostri corporis partium naturalis quædam constitutio, ex qua actiones naturales edimus. Vel, est naturalium uirium actio minimè impedita. Ad sanitatē requiruntur, pulchritudo, bonus habitus, integritas. Pulchritudo erit, si proportio membrorum cum coloris probitate adsit. Bonus habitus sit, non qualis exercitatorum: nam ne salubris quippe hic habitus est, sed sicut superius à nobis descriptus. Integritas erit, si ne quid circa animum, mores, & robur ac symmetriam corporis desit. Morbus uerò cum ex diametro sanitati opponatur, erit inconcinnitas, siue intemperies primorum elementorum quæ in nobis sunt. Vel erit partium præter naturam constitutio, ex qua actio uitiata prouenit. Vel erit naturalium uirium præpeditio.

Locī consentientes ex vera
Medicina.

Quòd sanitas sit harmonia, &c. probatur
ex Gale. 1. de temp. cap. 1, Nam indicium, in-

quit, *sani hominis ac temperati est elementorum portionis æqualitas*. Et tertio de mor. diff. cap. 1, *Sanitas est affectus secundam naturam, ad faciendam actionem idoneus*. Nec refert si dixeris constitutionem siue affectū, sicut nec actionem, nec actionis causam. Et primo meth. cap. 9, *Sanitatem, inquit, esse ipsarum functionum constantiam, aut affectum siue constitutionem partium, cuius ope functiones secundum naturam edimus*. Et tertio meth. cap. 3, *Quippe monstratum est, sanitatem in similaribus corporibus ipsarum quatuor qualitatum esse iustam temperiem*. Auic. secunda primi cap. de diuisione dispositionum corporis, *Sanitas, inquit, est dispositio, per quam corpus hominis in sui complexione & compositione tale existit, ut ex eo operationes eius omnes proueniant incolumes*. Quod uerò pulchritudo requiratur, &c. Gal. in art. med. cap. 8, *Signa optima constitutionis sumuntur à commensuratione, pulchritudine, ab optimo colore, ac præterea ab earum, quæ ipsis insunt, uirtute operationum*. De morbo uerò sic Gal. de constitutione art.

med. cap. 12, Id quod excellenter sanum est, sit modò illud simile uel instrumentarium, omni ex parte moderatum existet, agrum uero immoderatum: siquidem morbus immoderatio quædam est. Et secundo de natu. hum. comment. 1, Morbus est affectio quædam in animantis corpore, quæ primùm actionem lædit. Et 3. de sympt. differ. cap. 1, Morbus est constitutio quædam præter naturam, à qua primò actio uitiatur: quin si affectum dixeris, à quo actio uitiatur, idem est, &c. Et meth. 2. cap. 1. & 3. Nam contrarium sanitati affectum, à quo lædi actionem diximus, morbum tantum appellamus. Et similiter cap. ult. Quicumque affectus functioni officit, is est morbus.

De sex morborum generibus.

Sicuti naturalis operatio in his tribus consistit, scilicet intemperie, compositione, & unitate, ut dictum est, ita morbus erit in triplici diuisione: nempe in complexione, compositione, & unitate soluta. In complexione, ut calid⁹, frigidus, humidus, & siccus, aut ca-

lidus siccus, calidus humidus, frigidus siccus, frigidus humidus. In compositione quatuor-
 pliciter, in positione, magnitudine, figura & nu-
 mero. In unitate simpliciter, nempe in simi-
 laribus & instrumentarijs simul: & sic sex
 erunt in uniuersum morborum genera, unum
 quippe in similarium partium intemperan-
 tia, in organicis quatuor, in utrisque unum,
 quod est soluta continuitas. Læditur etiam
 operatio tripliciter, debiliter, uitiosè, aut
 quia nullo modo fit operatio.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Auic. secunda primi cap. 2, Dicimus quòd
 ægritudinum genera sunt tria, loquendo de
 simplicibus ægritudinibus. Primum est simi-
 larium, & est species malæ complexionis. Se-
 cundam est membrorum officialium, quæ sunt
 ægritudines compositionis. Tertium est ægri-
 tudinum communium, quæ ægritudines acci-
 dunt membris similaribus & instrumentarijs,
 &c. Gal. 1. de differ. mor. cap. ult. Nempe di-
 ctum est, quòd alij sunt primorū similariumq;

IN CVR. MORB. LIB. I. 79

corporum morbi, alij instrumentorum compo-
sitorumque, alij utrorumque, ut phlegmone,
etc. Et lib. de opt. corp. constitutione inquit,
quod temperamentum ex calido, frigido, hu-
mido, sicco, coagmenti mensura definitum,
similarium membrorum est sanitas, & quod
constructio partium ex positione, magnitudi-
ne, & figura, & numero constituitur, etc. Si
igitur sanitas in ijs consistit, simili modo &
morbis in his erit, quum in eodem genere am-
bo constituantur, teste Gal. meth. 1. cap. 7.

Quod uerò sex sint morborum genera, pro-
batur ex Gal. 2. meth. cap. 6. dum inquit, Er-
go sunt sex in uniuersum morborum genera,
unum ipsorum similarium proprium, nempe
intemperies: quatuor, ut modò dictum est, in-
strumentorum cuiusque, & cum his sextum,
quod tum similaribus, tum instrumentalibus
est commune, ipsius unitatis solutio.

De causis salubribus & in-
salubribus.

Causarum alie sunt conseruatrices, alie
effectrices. Conseruatrices sunt, quae corpus

in optima constitutione præservant. sed quia corpus alteratur & corrumpitur, idcirco quot modis alteretur dicamus. Alteratur corpus sextupliciter, primò ex aere ambiente, secundò ex motu & quiete, tertio ex somno & uigilia, quarto ex cibo & potu, quintò ex his quæ excernuntur & retinentur, sextò ex affectibus animi. In his causæ salubres & insalubres conservatricēsque consistunt. nā in his si modus seruetur, cōservatrices sunt: sed ubi à modo recesserint, insalubres reddūtur. De his sex rebus non naturalibus in morbis à capite usq; ad pedes deinceps pertractabim⁹. Causa etiam dispositionum corporis rursus alteratur ex frigore, calore, siccitate, humiditate. Causæ uerò morbi effectrices sunt tres, procatarticae, & antecedentes, & coniunctæ, quæ diuiduntur per se, uel per accidens.

**Loci consentientes ex vera
Medicina.**

Gal. in art. med. ca. 84, Quia salubriū nōnullæ sunt cōservatrices, nōnullæ effectrices. Et paulò infra, si corpus esset impatibile &

inalterabile, semper optima cōstitutio perdu-
raret: sed quia corrūpitur & alteratur, idcir-
co eūdē prioris status tenorē nō seruat, &c.
Et cap. 85. eiusdē lib. Quot igitur numero sine
ea, quæ ex necessitate corpus alterāt, distin-
guentes, propriū in singulis eorū causarū sa-
lubriū genus inueniemus. Vnum igitur erit,
ex ambientis aëris adhæsū, secundum ex mo-
tu & quiete, &c. ubi sex res non naturales
enumerat. Auic. secunda primi doc. secunda,
cap. 1. causæ dispositionū corporis, &c. sunt
tres, antecedentes, primitiue & coniunctæ:
& paulò inferius dicemus, quòd causæ quæ
mutant dispositiones corporis, & quæ conser-
uant, aut sunt necessaria, à quibus impossi-
bile est hominem egredi in toto tempore uitæ
sue, aut non necessaria. Necessariarum sunt
sex genera, genus aeris circundantis, genus
motus & quietis, &c. Gal. in art. med. cap.
80, Alteratur uerò substantia à caliditate,
frigidityte, humiditate & siccitate.

De causis morborum partium
instrumentalium.

Dictum est, quòd ad composita membra

F. i.

82 DE CONSEN. MEDIC.

quatuor spectant, positus siue situs, formatio, magnitudo & numerus. Primum situs uel est optimus, uel parum uariat, uel à modo recedit, uel agrum plurimo recessu reddit. Formatio quoque tripliciter leditur, uel in figura, quum à cursu naturali mutatur in meatu uel orificio, & hoc ratione obstructionis aut dilatationis: in membrorum superficie, quum adest asperitas & lenitas. Magnitudo dupliciter, excessu & defectu. Numerus similiter aut deficit aut superabundat, ut sextus digitus in manu. Hæ omnes causæ si modum excesserint, insalubres dicuntur: si uerò à mediocritate non recesserint, erunt salubres. De soluta unitate, quum de chirurgia tractabimus, fusius loquemur.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Anic. secunda primi cap. 3, Compositionis ægritudines quatuor cōprehenduntur generibus, ut ægritudines creaturæ, ægritudines quāritatis, ægritudines numeri, & ægritudines situs. AÆgritudines creaturæ, id est for-

mationis uel sunt in figura, uel in uis, uel in receptaculis & uentriculis, uel in superficie, &c. Gal. in art. med. ca. 87, Instrumentaliū partiū causa salubres, alia sunt salubres erroribus, qui in foramine cōsistunt: alia his quī in magnitudine, uel numero, uel positu, &c. quae fusius uidere poteris. Lege etiam de his Gal. I. de diff. morb. cap. 7. exempla in omni morbo afferentem.

De Morborum calidorum, frigidorum, siccorum, & humidorum causis.

Causae morborum calidorum sunt quinque, putredo, uicinitas ad corpus calidum, obstructio, cibus & potus calidus, & motus uehemens. Causae frigidorum sunt quatuor, uicinitas frigidorū, cibi potūsque qualitas & quantitas, obstructio & raritas, ociū & motus immodicus. Causae siccorum sunt sex, plurima transpiratio & pauca nutritio, alimenta siccātia, sollicitudo & uigiliae, aeris constitutio sicca, aquae nitrosae & sulphurose, aluminosae, & medicamenta exiccantia. Causae humidorum sunt his econtrario oppo-

F.ij.

sita, ut alimēta humida, quies, somnus, potus plurimus, &c. ex quibus facile morborū cōpositorum causæ intelliguntur.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gale. 2. de morb. cau. cap. 2, Corpora quæ plus satis incalescunt, ita uidentur affici, uel ob motum aliquem aucto calore, uel ob putredinē, uel ob calidioris corporis uicinitatem, &c. redditque rationem de unoquoque. Et cap. 3. eiusdem lib. Frigidi morbi causæ sunt, ut frigidorū uicinitas, cibi potūsque quantitas & qualitas, constipatio & raritas, &c. reddens de singulis rationem. Et cap. 4. & 5. Similiter de sicci & humidi morbi causæ etiam rationem reddit. Auic. secunda primi doc. secunda, summa secunda cap. 2. 3. & 4. idem asserit ut Galenus, quæ longum esset recensere: uide tu, si lubeat, eum fusius. Vide etiam Galenum primo de diff. feb. cap. 3. & 2. eiusdem cap. 9.

Authores erronei dissentientes
circa sanitatem & morbu.

- 1 Adserere, sanitatis cognitionem non esse medico necessariam.
- 2 Adserere, morbos posse cognosci, non cognito affectu secundum naturam.
- 3 Adserere, morbos similariu partium non distingui ab instrumentalium morbis.
- 4 Adserere, scire morborum numerum non esse necessarium.
- 5 Adserere, morbu in numero ab eo quod est in quantitate non differre.
- 6 Adserere, causas morborum non esse semper considerandas.

Confutatio dissentientium circa
sanitatem & morbum.

Confutat primum Gale. meth. 2. cap. 3. inquit, quod sanitatis egemus omnes ob actionem quæ est secundum naturam. Nam sine sanitate actionem integram habere non possumus. Et nono meth. cap. 9, Sicut primu propositu est in methodo, morbi sublatio, ita in opere de sanitate tuenda, est sanitatis institutio.

F. iij.

Igitur erit necessaria.

Ad secundum: Gale. meth. 2. cap. 4. Necessse tibi erit, eo quod secundum naturam est prius præsumpto, ita quod est præter naturam inquirere. Nam si ipsum quod secundum naturam est, non nosti, nec quod egressum est à natura nosti. Igitur primum sanitatem cognosces, antequam morbum cognoscas.

Ad tertium: Gale. 2. meth. cap. 6. exemplo probat, Nam quum crystallinus humor ex intemperie laborat, omnino leditur oculorum functio. Cæterum non est, ut eorum organa sint morbus. Præterea Hippocrates constituit aliud esse in corporibus similaribus morbi genus, aliud in instrumentariis: Igitur distinguuntur.

Ad quartum: Gal. meth. 1. cap. 5, Quoniam omnis morbi curationem inuenire propositum est, necesse est, morborum numerum prius sciri.

Ad quintum: Gal. de consti. art. med. cap. 12, Differt numeri morbus à quantitatis morbo, ex eo quod in hoc morbi genere particula nonnunquam integra: in illo uero portio quæpiam alicuius particulae aut amputanda est,

aut adiuuenda.

Ad sextum: Gal. primo meth. cap. 8. tria rerum genera enumerans, primum genus corporum, alterum actionum, tertium inquit esse genus causarum, quæ hos affectus creant, quæ ad medendi artem incipiendam primum sunt noscenda.

De cura singulorum sex morborum in genere.

Morbus in complexionem per sui contrarium aufertur. Nam si calidus sit, frigido, si frigidus, calido, si humidus, sicco, & econuerso remouebitur: si ex utroque sit compositus, utroque contrario indigebit: siquidem contraria contrarijs curantur. Morbi in formatione, in nuper nato animali ad habitum naturalem tantum reducuntur, posthac emendari non possunt. Similiter morbi in cavitare parui, quum adhuc augetur animal, per quietem & alligationem redduntur: magni uero per partium operationem & spiritus retentionem. Morbi in numero si ex aliqua particula deficiente fiant, eam efficere studebi-

F. iiij.

88 DE CONSEN. MEDIC.

mus subministrando naturæ, si ex superabundanti hanc refecabimus, hæc omnia sanare possumus. Sed quòd omnia generentur, non æquè possumus: morbis in magnitudine similiter excedentibus naturæ modum: ablatio & abolitio cōuenit: deficientibus, refectio uel generatio. Morbos in situ, si quæ particula à suo situ dimoueantur, ad suum locum reduciendo, sanabimus.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. in art. med. cap. 89, Curatio unam præcipuam ac communissimam habet intentionem, ad id, quod est dispositioni contrarium auferendæ. Calido enim affectui causa frigida contraria est, frigido calida, eademque in cæteris proportionem seruata. Et cap. 93, eiusdem libri, in his igitur qui adhuc crescunt, possibile est plurimum partium figurâ emendare: in his autem qui iam aucti sunt, minimè. Et cap. 96, Quum morborum in numero duplex sit differentia, quibus aliqua particula deficit, his intentio alteram effi-

cere subministrādo naturæ. At quibus super-
 abundat, hanc refecare oportet aut scal-
 pello, aut igne, aut medicamento quod uren-
 di uim habeat. De alijs morbis lege cap. 97.
 & 98. eiusdem libri. Gal. 8. meth. cap. 3, Illud
 esse uerissimum omnium, inquit, quòd contra-
 ria contrariorum sunt remedia. Et cap. pri-
 mo eiusdem libri, Omnis excessus per contra-
 rium excessum sanatur. Similiter lib. 7. cap.
 tertio. & lib. 4. cap. 2, Curabis, inquit, cali-
 dum refrigerando, frigidum calefaciendo,
 &c. similis sententia est aphor. 2. aphoris. 22.
 & in mille alijs locis.

Obiectio.

Obstructio ad quem horum morborum re-
 ferenda erit?

Responsio.

Obstructio est compositionis morbus in
 meatu siue in orificio, fitque ex lentis ac
 crassis humoribus, curátque per apertionem,
 quæ fieri solet per abstergentia atque inci-
 dentia medicamina.

Obiectio.

Intelligisne per apertionem, uulgarem medicorum digestionem, an aliud ab hac distinctum? Nam digestio Auicennæ est tenuis materie incrassatio, uel crassæ & lentæ extenuatio.

Responsio.

Intelligo per apertionem, humorū ac meatuum preparationem. Nam humores oportet esse non tam fluxui paratos, quàm etiam aperta esse foramina, per quæ debet purgatio fieri, ut Gal. aphorif. primo, comm. 24. Et secundo aphorismo, comment. 9. Nam tunc fluidum esse corpus pronunciat, quum tam in humoribus, quàm etiam in meatibus reseratis fuerit apertum.

De Morborū indiciis in genere.

Indicia morborū uel à ratione temporis sumuntur, & sunt tria, præsentia, præterita, & futura. Nam uel morbum præsentem indicāt, uel futurum esse prænunciant, aut memoriæ subiiciūt. hæc omnia interdum à medicis præ-

nunciatiua uocantur. Vel sumuntur à ratione suæ essentia, & sic erunt quatuor. Primum ab exeuntibus in quantitate & qualitate mutatis, & cognoscuntur à multitudine excrementorum, siue per urinam, per sudorem, per uomitum, per sputum, & per secessum, & per qualitatem mutatam, sicut est totius corporis rubor uel pallor, uenarum ac membrorum tumor, &c. Secundum ab operatione laesa, & cognoscitur à grauitate, à pigritia, à sensuum imbecillitate, à pulsu magno & pleno, ab anhelitu, à corporis extenuatione, &c. Tertium à propriis morborum accidentibus, sicut in pleuritide, à tussi, à dolore, à febre. Quartum à membrorum positu, ut à capite, à uentre, & ab aliis locis affectis. Vel sumuntur indicia à uiribus corporis, & hoc trifariam: uel à uirtute animali, & cognoscitur ex motu, ex ratione, & sensibus. Vel à uirtute uitali, & cognoscitur ex pulsu & ex spiratione: uel à uirtute naturali, & cognoscitur ex urinis & ex egestionibus. Horum quædam sunt salubria, quæ salutem, quædam insalubria, quæ mortem pradicere solent.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gale. in art. med. cap. 7, Signa sunt salubria & insalubria, quæ præsentem indicant ægritudinem, & futuram prænunciant, atque præteritam memoriæ subiiciunt. Et paulò inferius, Hæc quoque secundum tria tempora salubria & insalubria dicuntur, quorum usus maior est de indicatiuis, quàm ex his quæ memoriæ subiiciunt. Galenus in artic. med. capite 81, Quæcunque excernuntur, nonnulla quidem sunt ueluti partes patientium locorum, nonnulla tanquam excrementa: quæ uerò in ipsis continentur, singula propriam faciunt iudicationem, & sic ab exeuntibus sumitur indicium. Gal. primo de loc. aff. cap. 5, Locorum notæ, ab actione læsa, & excrementis, & positu, & doloris proprietate, & à propriis accidentibus sumuntur: affectuum uerò ab excrementorum specie, à loci natura, & doloris proprietate, & propriis accidentibus. Sane actio læsa affectam partem indi-

care potest, &c. similiter 3. de Symptomatu
 diff. cap. 3. de his indicia habentur. Gal. me-
 thod. 9. cap. 13, Hæc itaque cùm vires indi-
 cent, maxima harum erit dignitas. Nam ui-
 vere ipsum nobis ex harum custodia constat,
 utpote quum uitam, aut ipsas esse vires, aut
 earum actiones sit necesse, &c. Hippoc. apho-
 rism. 2. aphorism 33, In quouis morbo mente
 constare & bene se habere, ad oblata bonum,
 contrà uerò se habere, malum. Et Gale. in hoc
 comment. Ex his constare mente cognosces,
 quæ ad cerebrum & omnes membranas, sicuti
 ad uentrem attinent hepar & cor, ubi adest
 promptitudo ad ea quæ offeruntur, &c. Gal.
 I. de art. curat. ad glauc. Virtus uitalis, quam
 ex corde prodire ostendimus, ex pulsum de-
 bilitate cognoscitur: at quæ ex hepate oritur,
 naturalis dicta, ex sanguineis egestionibus,
 aquosis & tenuibus, & quæ ex cerebro
 originem ducit, animalis dicta, ex mor-
 tuum uoluntariorum imbecillitate deprehen-
 ditur, &c.

De alia signorum di-
uisione.

Sumuntur etiam indicia à complexionē,
ab humorum dominio, ab ætate, à tempore,
consuetudine & uictu præterito complexionē
cognoscuntur per decem genera. Primo ex
tactu, ut si calidus, frigidus. Secundo ex adi-
pe & carne addita: nam multa caro calidi-
tatem, pauca cum multo adipe, frigiditatem.
Tertiò ex celeri ac tardo capillorum ortu:
nam celer caliditatem, tardus frigiditatem.
Quartò ex corporis colore: nam color cro-
ceus, rubeus, luteus ac pallidus caliditatem,
albus, liuens, plumbeus, frigiditatem. Quinto
ex membrorum forma: nam ampla, lata cali-
ditatem: angusta uerò, frigiditatem. Sextò ex
membrorum sensu: nam citò sentiens, calidi-
tatem: tardè, frigiditatem. Septimò à cogita-
tione hominum. Octauo ab operationibus: nā
celeres operationes caliditatem, & ecōtra frigi-
ditatem. Nono ex superfluitatibus corporis: nā
siquid egrediens acutū habeat odorem, calidi-
tatem indicat: si minus, frigiditatem. Decimo ex

accidētibus animi, ut ira, audacia, inquietudo, impietas, & similia caliditatē: contrā uerò, frigiditatem. De ætate id dictum est, pueros & iuuenes esse calidos: senes & decrepitos, frigidos. Similiter ex tempore & consuetudine & uictu præterito iudicandū est.

Locī consentientes ex vera Medicina.

Gal. lib. de sectis ad eos qui introducuntur cap. 4. & 5, Hoc igitur modo illi ab ipso affectu eius quod confert, indicationem eliciunt: similiter ab ægrotantis uiribus, ab ætate, ab anni tempore & regione, &c.

Auic. secunda primi cap. 3, Signorum genera, quibus complexionum dispositiones cognoscuntur, sunt decem, & ea enumerat, exemplā singulorum afferens, ut dictum est suprà.

De urinæ definitione & diuisione.

Lorium, est sanguinis aliorūque humorū sereā quædam redundantia. Id tamen existi-

mandum est optimum lotium, in quo residet candidum, leue, & æquale, per omne tempus: uel id optimum est, quod urinae sanorum est simillimum. Tria in lotio considerantur, substantia, color & hypostasis. Substantia sit tenuis, crassa: nam si tenuis & alba sit, uel uirtutis imbecillitatem, uel renum obstructionem significat. Si tenuis & pallida, uel tenuis & rufa, uirtutis imbecillitatem, & quo ad substantiam, cruditatem significat. Tenuis uerò & flaua incoctionem, & alimenti defectum, uigilias ac animi pathemata significat. Tenuis rubra, sanguinem incoctum: tenuis & nigra, melancholiam, uel nimiam frigiditatem, aut sanguinis adustionem indicat. Crassa uerò & alba, maximam crudorum humorum copiam demonstrat: si crassa & rubea, plenitudinem sanguinis: si crassa nigra, euacuationem atrae bilis significat. Color flauus, rubeus, caliditatem: albus, liuens, ater, frigiditatem denotant. Hypostasis uerò diuiditur secundum situm: nam si in fundo non diuulsa residet, sed pyramidalis, bonam indicat concoctionem: si in supremo loco, diuulsa &

inequalis, imbecillitatem uirtutis: si in medio loco, malum portendit, maxime si diuulsa sit: nam naturam defecisse in cōcoctione ob distractionem significat. Consideratur etiam urina iuxta suum colorem: nam rubea, sanguinis incocti copiam, & morbi cruditatem indicat: idcirco morbum facit diuturnum. Nigra, cui antecessit liuiditas, frigiditatem: cui uerò croceitas, calorem. Liuida frigiditatem, & uirtutis interitum: oleosa, totius corporis adipis colliquationem indicat. Rursum si sedimētum citò crassum fiat, citò morbum solutum iri significat. Si residat crassum, aßistente uirium robore, longum fore morbum: si uerò imbecillitas adsit, agri mortem prænunciat.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Theoph. de urinis cap. i, Lotiū est sanguinis aliorūque hamorum aquea quædam colatura. Gal. lib. finit. med. Urina est superfluitas ex colatu sanguinis in magna uena, quæ per renes & ureteras in uesicam

G. i.

98 DE CONSEN. MEDIC.

delabitur. Hippocrat. prognost. 2. tex. 16,
 τοῦδε ὅρον ἀειδόν ὅτι εἰ λευκή ἢ ὑπόσα-
 σις καὶ λεῖν ἐὶ ὁμαλή ὅτι πάντα τὸν χρόνον.
 Gal. 1. de cris. cap. 12, Ex his igitur illa
 optima est, quæ urinæ sanorum est simillima:
 quæ uerò non est talis simpliciter, uel incocta
 est, uel præter hoc perniciosa. Gal. 1. de
 cris. cap. 12, Oportet urinam optimam dis-
 cedere tantùm suâ crassitudine ab aquosa,
 quantum colore, si bene concoqui debeat, po-
 nens differentiam in substantia & colore,
 &c. Gal. loco citato, Præua autem sufficiẽ-
 ter est, quæ tenuis & alba est, sicuti aqua:
 nam simplex quidem dispositio est, sed ulti-
 mæ imbecillitatis est indicium. Huic proxi-
 ma est altera urina uini tenuis albi colore,
 quæ in multis apparet morbis. Post hanc
 est subpallida, &c. Hippo. 2. prognost. tex.
 30, Dum urina tenuis fuerit ac rufa, crudam
 esse significat ægritudinem. De lotij colore
 Hippo. 2. progno. tex. 32, Exitiosior urina
 est, si aquosa, sætida, nigra, crassâque est.
 inde in hoc latius Galeni comment. Quod
 situs hypostasis considerandus, & eius color,

lege Hippo. 2. progno. tex. 36, Consideranda, inquit, in urina nubecula, utrum sursum fuerit an deorsum, item color quem obtinet, &c. De oleaginosa urina Hippoc. 2. progno. tex. 35, Si pingue de super natet, araneorū speciem referens, damnandū: indicat enim consumptionem. Et Gale. de cris. cap. 12, Quod si ueluti oleum mingatur, colliquationis est signum. De colore Hippoc. 2. prognost. tex. 27, Urina subrubra cum sedimento subrubro admodum salutaris, sed morbum diuturnum fore indicat. Et tex. 33. eiusdem lib. In mulieribus & uiris urina nigra, in pueris aquosa, deterrima est. lege fusius Galenum. De urinis, quæ uel turbida minguntur, & paulò post resident, uel quæ semper turbida mictæ permanent, aut quæ pura minguntur, & postea conturbantur. habes plura ex Gal. 1. de cris. cap. 12. & aphorif. 4. comment. 7. & 4. super primam epidemiam.

Authores erronei dissentientes
circa vrinam.

- 1 Adserere, renum nutritionis excrementum
G. ij.

tantum esse lotium.

2 Adserere, per urinam cognosci posse morbos ex succis ortos, qui in uenis non continentur.

3 Adserere, sedimen in urina esse semper bonum indicium.

4 Adserere, ex Galeno non posse per urinarum coniecturam in sectionis uenae cognitiones peruenire.

Confutatio dissentientium ex vera Medicina.

Confutat primam opinionem Gal. 1. de nat. facult. cap. ult. contra Lupum quendam dum inquit, Quod autem soli renes tantillas corpora quatuor interim totos, uel etiam plures habeant excrementi congios, id nec confessum, nec rationi consentiens.

Ad secundum: Gal. 4. de sanit. tuend. circa principium, Quoniam lassitudo uitio acrium excrementorum oritur, ante omnia considerandum, in solidisne tantum corporibus, an intra uenarum sinus, succus contineatur. De his quae intra uenas sunt, nullum

planè, nec manifestum, nec evidens signum, præter solam urinam conijcere licet: in reliquis, quoniam qui affligitur usus sit uictu examinandum, id est, per alia signa quàm per urinam coniecturandum, quum urina in hoc casu sit exiguum signum. Et quarto de uic. ratione in morb. ac. Non tutò, inquit Galen. comment. 83, morbi facilitas ex urinarum cōcoctione prænoscutur: nam etsi febris cruditates per urinas manifestè indicentur, morborum tamen musculos infestantium, non securà est per urinas significatio, &c.

Ad tertium: Gal aphoris 4. comment. 69, Contigit aliquando uel per initia morbi, uel paulò pòst, urinas factas crassas propter grauitatem habere sedimen, quod bonum signum non est, sicuti in alijs quæ ab initio tennes existentes, ratione coctionis totius morbi sedimen capiunt.

Ad quartum: Gal. 2. prognost. cōment. 27, Quoties serum sanguinis pariter cum urina excernitur, colore subrubra apparet: indicat enim exuperantiam sanguinis non exquisita ratione confecti, & sic sectionem uenæ. Et
G. iij.

meth. 9. cap. 4, Mittendus est sanguis, etiam si
nec in lotio, aut in ipsa caloris qualitate hu-
morum putrescentium signum apparuerit.
Interdum igitur signum in urina de mittendo
sanguine apparet.

De pulsuum definitione & diuisione.

Σφύζμός, id est pulsus, est cordis arteria-
rumque dilatatio ac contractio. Considera-
tur pulsus uel ratione uirium, & tunc est tri-
plex, uehemens, quando scilicet tangente ma-
nus ualide repellitur: languidus, quum inua-
lidè imbecillum ictum edit: mediocris, mediā
seruans proportionem. Vel ratione arteriae,
& est duplex, durus & mollis. Vel ratione
diastoles, & est trinus, ut altus, longus, latus.
Vel ratione plenitudinis & euacuationis, &
est duplex, plenus & uacuus. Plenus, qui ar-
teriam solidiorem undosamque in compres-
sione ostendit: uacuus, qui inanitatem suo di-
gito repraesentat. Vel ratione rhythmi, in
quo proportionales temporis metiuntur, &
sic est duplex, deficiens uel intercidens. Vel

ratione temperaturarum ætatum, anni, temporum, regionum, sexuum: de quibus satis loquuti sumus infra, ubi Galeni loca citauimus. Vel ratione somni & uigiliae, uel aliarum causarum non naturalium: nam in somno languidiores minoresque sunt: quum à somno expergiscuntur, uehementes & crebriores sunt.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. 4. de diff. puls. Pulsus est distentio & contractio cordis & arteriarum. Et ibi varias pulsuum descriptiones ex antiquis recitat. Quod uerò ratione uirium cōsideretur pulsus, habetur ex Gale. 4. de præsag. ex pulso cap. ult. Quum, inquit, pulsus per se sine languidi, infirma est facultas: ubi earum arteriarum languidus nunc pulsus sit, nunc uehemens, facultas non est per se imbecilla, sed ex copia humorū degrauatur, &c. & ibi omnia ad uirtutem spectantia per pulsuum declarat. Et 3. de diff. pul. Pulsus qui cum renisu quodam pulsat, Uehemens uocatur, cuius causa

G. iiij.

est facultatis robur. Quod uerò ratione arteriæ pulsus consideretur, habes ex Gal. primo de caus. puls. Reliqua, inquit, & tertia gignendorum pulsum continens causa, ipsum est arteriarum corpus, &c. Et cap. de puls. causis ex diff. instrumentorū, Quā durius aut mollius euaserit corpus arteriæ, ipsos pulsus duros uel molles reddit. Similis sensus est primo de differ. puls. & in lib. finit. med. Gal. primo de diff. puls. Iam quia arteriæ tres dimensiones obtinet, longitudinem, latitudinem & profunditatem, non potest in singulis dimensionibus non fieri quantitas aliqua distentionis & contractionis. Galenus primo de different. pulsum cap. de reliquorum diff. generum, Plenus est pulsus, qui pleniorē arteriam ostendit. Vacuus, qui arteriæ elevationem facit bullosam, ut digitorū impressioni gressus per uacua occurrat, & sic plenitudinis & euacuationis pulsus datur. De rhythmo genere pulsum habes Gal. 1. de diff. puls. cap. de diff. quietis & rhythmī, dū plures species rhythmorū pulsum enumerat, quem fusius leges. Omnibus enim naturis, lo-

cis, anni temporibus, omnibꝫque alijs suum
 rhythmũ tribuit, & inter eos rhythmos alios
 pari proportionẽ, alios impari constare in-
 quit. De temperie, Gal. 3. præ sag. puls. Ex in-
 temperie cordis calida fiunt pulsus imbecil-
 les: ex intemperie uerò frigida planè efficiũ-
 tur contrarij, parui, tardi & rari. De intem-
 perie sicca & humida cordis tractat eodem
 lib. cap. ult. & lib. de introductione puls. Ca-
 lidiores natura pulsum habent maiorem, ce-
 lerio rem, ac longè frequentio rem, non multò
 tamen uehementio rem: gracilio res uerò, ma-
 iorem ac longè rario rem, uerũ non multò
 uehementio rem. Vide de his similiter de usu
 pulsum circa finem. De pulsibus ætatum,
 Gal. in introduct. puls. cap. 9, Mutantur per
 ætates: sic puerulo nuper nato pulsus est fre-
 quenti ssimus, senum rari ssimus: qui uerò in
 media ætate sunt inter hos, ijs pulsus ad pro-
 portionem respondent. De pulsu anni tempo-
 rum Gal. loco nuper citato, Per anni tẽpora
 pulsus mutantur: nam in medio uere maximi
 ac uehementi ssimi, celeritate uerò ac frequen-
 tia moderati, similiter medio autumno ha-

bentur. Progrediente uere magnitudo ac uehementia ipsius minuuntur, augentur autem celeritate ac frequentia. Autumno progrediente omnia minuuntur, magnitudo scilicet, uehementia, celeritas ac frequentia: Adueniente uerò æstate, fiunt languidi & parui, celeres & frequentes: contrà uerò in hyeme, in paruitatem, languorem, tarditatem ac raritatem mutantur, &c. De regione, Gal. loco citato, Per regiones mutantur: siquidem in calidis, pulsus sunt, quales in æstate media: in frigidis ualde, quales hyeme media: in medijs ad proportionem se habent, &c. Quòd pulsus uirorum à fœminarum pulsu differat, habes Gal. loco citato: Viri enim, inquit, mulieribus pulsum habent multò maiorem & uehementiorem, paulò tamen tardiolem ac longè rariorem. De somni pulsibus ac de expergefacto à somno, similiter de mutatione pulsus per exercitium, balnea, cibos & potus, aerem ac accidentia animi: nam ab ira pulsus fiunt alti, magni, uehementes, celeres ac frequentes: à mœsticia parui, tardi, languidi, rari: à metu celeres, turbulenti, inordinati, inæqua-

les, &c. habes in hoc loco citato plura ex Galeno.

Authores erronei dissentientes
circa pulsum doctrinam.

- 1 Adserere, utilitatem pulsum esse magis necessariam, quàm respirationis.
- 2 Adserere, certius esse indicium ab urina sumptum, quàm à pulsu.
- 3 Adserere, cor & arterias moveri tantum ex motu pulsus.
- 4 Adserere, pulsum genera esse, quàm decem pauciora, cum Auerrhoe.
- 5 Adserere, ex repletione pulsum dilatari, & non econverso.

Confutatio dissentientium circa
pulsum doctrinam.

Ad primum : Gal. de usu puls. Si respirationem cuiuspiam adimes, illico mortem afferes: at pulsu si per multas particulas priues, non magnopere lades, & sic maior erit respirationis utilitas, quàm pulsum. Præterea ex Hippocrat. totum corpus est conspirabile

atque confluxile. Quare si non per arterias, saltem certè per alia, & potissimum per uenas, &c.

Ad secundum: Haly Abbas 7. suæ practices inquit, quòd pulsus est præco uerus qui multa refert. Præterea id certius est, quod ab operatione sumitur, quàm quod ab exercitiis: sed pulsus sumitur ab operatione: igitur certior. Probatum etiam ex uulgari quodam carmine sic dicto,

Vrinae fraudes aperit discretio pulsus. Gal. 1. de different. respirationis, cap. 18, Plus indicat pulsus, quàm ipsa respiratio. Et lib. de const. art. med. cap. 18. hoc idem affirmat, &c.

Ad tertium: Galen. 4. de diff. puls. probat de mente antiquorum, non solum cor & arterias moueri motu pulsus, sed etiam per se, sicuti etiam cerebrum. Vnde 8. de usu partium cap. de usu instrumenti odoratus, probat cerebri interiores uentriculos aerem se dilatando attrahere, & se constringendo expellere, &c.

Ad quartum: Phylar. de puls. cap. 9, Ha-

bentur genera pulsum decem, quorum primum, &c. Et Gal. I. de differ. puls. decem etiam enumerat: igitur non pauciora quam decem.

Ad quintū: Gal. de usu puls. inquit, Neque enim eā quod impletur, idcirco dilatatur: uerū ex eo quod dilatatur, impletur, contra Erasistratum.

De signis repletionem indicantibus.

Plethora est succorum aequaliter se habentium exuperantia: differtque a cacochymia, quum hæc uitiosorum humorum non referat, sicuti cacochymia. Plethora igitur duplex est, quoad uires scilicet: altera quoad capacitatem uasorum, cuius signa sunt uasorum distentio, rubor, totiūque corporis grauitas, & in mouendis membris pigritia, cutis extensio, pulsum plenitudo, uisus debilitas, & somnia quæ grauitatem portendunt. Hæc nisi sanguinis missione curetur, calorem natium strangulat.

110 DE CONSEN. MEDIC.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. 13. meth. cap. 6, Vbi autem equaliter inter se succi adaucti sunt, id est plethos et plethorā Græci uocant, nos succorum plenitudinem siue redundantiam dicimus. Vbi uerò flaua bile, uel nigra, uel pituita, uel serosis humoribus refertum corpus fuerit, cacochymiam, id est succorum uitium dicimus. Et lib. de plenit. ad finem, Plenitudo, est copia humorum in uniuerso animalis corpore. Et paulò post, quid intersit inter cacochymiam et plethoram, apertiori sermone demonstrat.

Gal. lib. de plenit. inter indicia, uenarum eumorem, ac earum tensionem, ruborem, corporisque grauitatem et in mouendis membris pigritiam memorat. Iridem meth. 9. cap. 5, obstructionem, distentionem, tumorem, ruborem, in ea, quæ ad uasa refertur, repletionem, recenset. Auic. secunda primi doct. tertia, ca. 6, Repletio secundum duos modos existit: est enim repletio secundum foramina, et est repletio secundum uirtutem. Repletio secundum

IN CVR. MORB. LIB. I. III

foramina est, ut sint humores & spiritus in qualitate boni, sed in quantitate sui sint superflui, ita ut foramina impleant & extendant. Repletio secundum uirtutem est, ut humores sui quantitate non noceant, sed sui qualitate. De duplici hac plenitudine habes ex Gale. lib. de plenit. & meth. 9. cap 5. & 10. eiusdem lib. cap. ult.

Hippoc. aphor. 1. aphor. 3, Habitus exercitatorum qui ad summum bonitatis attingunt, &c. Ibi in comment. Gal. Nimia repletio, inquit, calorem natium extinguit, &c.

Gal. meth. 13. cap. 6, Ergo plethora tum sanguinis missione curatur, tum frequenti balneo, exercitatione, frictione, & digerentibus medicamentis. Vide fusius 3. & 6. de sanit. tuenda.

Authores erronei dissentientes
circa plenitudinis indicia.

- 1 Adserere, plenitudinem mensurari posse tantummodo ex ipsis uiribus.
- 2 Adserere, plenitudinem tantum esse quo ad uasa, non quo ad uires.

III DE CONSEN. MEDIC.

Confutatio dissentientium circa
plenitudinis indicia.

Confutat primum Gal. lib. de plenit. circa
principium, dum inquit, Qui ex ipsis tantum
uiribus plenitudinem metiuntur, hi uidentur
nunquam utres præter modum repletos ui-
disse, nec se etiam plus quam par est unquam
implenisse cibo, ita ut uenter inde disten-
deretur, &c.

Ad secundum: Gal. loco nuper citato, Ita-
que, inquit, subiecimus duas esse tum notio-
nes, tum relationes multitudinis: alteram ad
robur uiræque illius qui desert, alteram ad
eius qui suscipit capacitatem, &c.

De signorum notitia uniuscu-
iusque humoris.

Sanguinis superabundantiam indicant, re-
pletio, grauitas capitis circa oculos, oscita-
tio, nausea, lassitudo absque labore, dulcedo
in ore, rubor, & sanguinis à quocunque loco
facilis fluxus: indicant & tēperies, uictus præ-
cedens, ætas, consuetudo & insomnia circa
res rubeas. Pituitæ indicia, albedo, mollities,

frigiditas, sputi copia, sitis pauca, somnus multus, otium, pigritia, pulsus tarditas, & quaecunque de uictu & ætate & consuetudine indicare possunt. Bilis indicia sunt, color flauus siue citrinus, oris amaritudo, sitis copiosa, narium ac linguae siccitas, pulsus crebritas, nausea & uomitus biliosus, & quaecunque dici possunt de ætate, temperie, uictus ratione. Atra bilis indicia sunt, corporis macies, uigilia multa, crassities ac nigredo sanguinis, multa sollicitudo, corpus nigrum, fuscum, pilosum, insomnia terrorem inducētia, in tenebris timor, similiter ætas, consuetudo, ars, tempus & uictus ratio præterita de atra bile indicant.

Locī consentientes ex vera Medicina.

Faciunt ad sanguinis signorum probationem quaecunque dicta sunt ex Galeno lib. de plenit. circa principium, ut uasorum distentio, rubor, grauitas uniuersi corporis, pigritia ad motum, membrorum tentio, lassitudo, prior uita in otio, uictus ratio transacta, & sup-

H. i.

114 DE CONSEN. MEDIC.

pressa euacuationes solita. Auic. secunda primi cap. 7, Sanguinis significationes cum dominantur, significationibus repletionis secundum foramina uicina existunt, &c. Nam de singulis humorum signis ibi diffusè pertractat. Dictum est etiam de his fusiùs de febribus, & ubi de humoribus pertractauimus, & de morbis à capite usque ad pedes: nam ibi non solum de his, sed de obstructionum, flauorum, abscessuumque signis apertè declarauimus.

De artis curatoria diuisione.

Ars curatoria trifariam diuisa est, in διατροφικὴν, id est, in uictus rationem: in φαρμακευτικὴν, id est, medicamentorum rationem: & in χειρουργικὴν, id est, in eam quæ manu medetur. Prima auxiliorum, quæ digerendi, apponendi & concoquendi facultatè habent, est administratio, confertque non solum sanis, sed etiam omnibus aegris, & maxime febricitantibus. Secunda est φαρμακεία, id est, medicatio dicta, quæ nudis medicamentis interiores affectus & exteriores, in cor-

IN CVR. MORB. LIB. I. II

porum cognitionem, & remediorum naturā
diuisa, sanat. Tertia est quæ incisionibus,
adustionibus, & osium instauratione homines
curat.

Loci consentientes ex
vera Medicina.

Corn. Cels. lib. 1. cap. 1, Medicina in tres
partes diducta est, ut una esset quæ uictu, al-
tera quæ medicamentis, tertia quæ manu me-
detur, &c. Auic. quarta primi, Res medica-
tionis ex uno trium rerum completur regimi-
ne, potione & chirurgia. Gal. primo de uic.
in morb. ac. commem. 6. de triplici hac diui-
sione etiam ipse loquitur, scilicet de diæta,
chirurgia, quæ per sectiones, adustiones per-
ficitur: & de pharmaceutica, quæ per medi-
camenta perficitur, accusans priscos, qui ni-
hil de uictus ratione scripserint. Gal. lib. fi-
nit. med. Medicina uictus institutrix est, quæ
in sanis atque egrotis, rationi uictus instituē-
da studet. Gal. de art. curat. ad glauc. cap. 1,
Ars curatiua qualitate & quantitate singu-
lorum medicaminum perficitur. Et lib. de cō-

H. ij.

stitur. artis med. Hac ars in duo capita red-
acta est, in corporum nempe cognitionem,
atque ipsam remediorum naturam. Gal. 4.
meth. cap. 1, Vnum esse morborum genus ipsam
quoque continuitatis solutionem diximus, hac
in animalis ferè omnibus partibus accidit,
etc. Vbi docet quibus curandum sit inten-
sionibus, etc. de hac plura, quum de chirur-
gia dicemus.

De victus diuisione in genere.

Victus ratio sumitur uel à ratione morbi
tantum, uel à ratione uirium agrotantis et
materie morbi simul, uel à ratione temporis
anni, ætatum, uel à ratione sue quantitatis
uel qualitatis, aut in uniuersali, uel in par-
ticulari.

De victus ratione in morbis.

Morbus uel peracutus est, uel acutus, uel
longus. In peracuto, qui in quatuor diebus
iudicatur, uti oportet tenuissimo victu, sicuti
meliorato: ratio est, quia totus hic morbus
status est: idcirco in statu tenuissimo victu

utendum est, præcipuè si vires consentiant: in longo, pleniori victu, ut ovis, alicæ, piscibus, sed nõ eodem quo in sanis modo utendum: in acuto uerò tenui, ut ptisanae succo. Quare duo in victu extrema dantur: primum quòd sit victus tenuissimus: secundum quòd sit crassissimus: mediat uerò inter hæc tenuis. Ratione igitur status morbi semper victus ratio instituenda est.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. aphoris. 1. comment. 12, Nam morbus uel est acutus, uel peracutus, uel longus, & quando maxime, &c. Hippocr. aphorism. 1. aphoris. 4, Victus tenuis atque exquisitus, in morbis quidem longis semper, in acutis uerò, in quibus non conuenit, periculosus. Gal. in comment. Nunc dixisse sufficit, ut in omnibus morbis, quibus morbi uigor & indicatio primis quatuor diebus futura sit, modò natura sit fortior, integram inediam seruare debeamus: in quibus uerò non ultra primam septimanam protrahatur, forti existente natura, H. ij.

solo utendum est melicrato, solus autem hic tenuissimus uictus esset, non tamen in extremo, &c. Et post hæc uictum tenuem appellas prissanæ hordeaceæ succum, & plenum uictum, qualis est qui fit per oua & alicam & pisces. Quod uerò morbus peracutus totus sit status, probatur ex aphorif. 7. primi lib. ubi inquit Hippocrates, Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extreme tenuissimo uictu utendum est. Ex quo aphorismo probatur etiam, quod ratione status morbi instituenda sit uictus ratio. Si uires cōsentiant, notanter dictum est: nam Gal. aphorif. 1. comment. 9. inquit, Quod si in ipso morbi uigore aliquis casus interuenerit, naturæ robur dissoluens, nutrire cogimur: quod uerò in longo morbo, pleniori uictu utendū. Gal. loco nuper citato, Cū morbus cōsistit, uictu tenuissimo oportet uti: in alijs morbis, qui suum uigorem sunt posterius accepturi, nō licet asferre statim ab initio tenuissimum uictum: nam prius homo morietur, quā morbus in uigore consistat, &c. Auic. 4. can. de cib. feb. Si uideris agritudinem chronicam,

aut propinquam chronicæ, non subtilies regimen, &c.

Obiectio.

Quum morbus non possit cognosci, an statum habere debeat in quarta, uel in septima, quomodo instituendus erit uictus?

Responsio.

Vera præcognitione status morbi non cognoscitur, sed iuxta æstimationē, quæ proxima est ueritati, præcognoscitur, ex qua tunc uictum ordinamus. Nam Gal. de uirium robore primo aphoris comment. 12. idem refert esse coniecturandum.

De ratione uictus à viribus & à materia morbi Hip.

Uictus uel respicit uires tantum, uel materiam morbi tantum. Si solum uires, tunc uictus plenus conuenit: si solam morbi materiā, tunc nullus cibus conuenit, quia cibare prohibet naturam in morbum agere. Hac ratione duo erunt uictus extrema, quorum alterum solam uirtutem conseruat & auget, & talis H. iij.

uictus erit sanorum: alterum solum uirium ro-
bur in materiam excitat, & talis uictus erit
morbi peracutissimi, in quo pene nihil datur.
Medium uero inter hac extrema duplex erit,
uel maiorem uirium partem seruabit, & mi-
norem partem in morbum excitabit, & talis
erit uictus crassus, qui in longis morbis con-
uenit: aut minorem uirium partem seruans,
maiorem in morbum reijcit, & talis erit ui-
ctus tenuis, qui in morbis peracutis institui-
tur: aut tantum uirtuti, quantum morbo tri-
buit, & talis uictus est mediocris, qui in mor-
bo acuto exhibetur. Si igitur uires sint debi-
les, & humores pauci & corrupti, parum &
sepe cibandum: si uires debiles, & humores
temperati, uel abundantes, parum & raro: si
uires multæ, humores pauci non corrupti,
multum & sepe: si uires multæ & corpus
plethoricum, paucum & raro.

Loci consentientes ex ve-
ra Medicina.

Gale. aphorismorum primo, comment. II.
eius morbi uictus rationem in unoquoque

morbo à duabus intentionibus iussit assume-
 re, ex futuro totius morbi uigore, & ex uiri-
 bus agrotantis, &c. Hippocrat. aphoris. 1.
 aphoris. 9, Coniectari autem oportet, an æ-
 ger cum uictu sufficiat perdurare. ubi de ui-
 ctu, quoad uires, intelligit Hippocrates. Ga-
 lenus in eodem comment. Est autem hæc in-
 tentio uis ipsa agrotantis, cuius gratia nu-
 trimus: neque enim morbi causa: igitur ratio-
 ne morbi nullus cibus conuenit. Auic. prima
 quarti, cap. 8, Et scias, quod si non esset il-
 lud quod pertinet uirtuti, esset magis neces-
 sarium, ut subtiliaretur cibus ultima subri-
 liatione, sed uirtus non suffert, &c. Gal.
 aphorismo. 1. comment. 4, In sanis corpori-
 bus semper oportet naturæ robur seruare uel
 augere alimentis, non demoliri. Est autem
 augere potens alimentum, quod plenum uo-
 catur: conseruans, quod modicum existit:
 quod uerò comminuit, tenue. Igitur dantur
 duo uictus extrema: alterum augens uires, al-
 terum in quo nihil datur. Et in eodem com-
 ment. Magna uerò ex parte properamus in
 longis quidem morbis fouere uires, in acutis

uerò parum debilitatas conseruare. Igitur
 si fouere uires uolumus, uictu crasso utemur,
 & sic partem maiorem uiribus condonabi-
 mus, & minorem in morbum concitabimus.
 Et sequitur in textu, In acutis si uires sint
 parum imbecilles, conseruamus. Igitur non
 minus uiribus, quàm morbo dabimus. Auic.
 cap. citato, Nam si aegritudo fuerit ualde a-
 cuta, & uirtus nō deficiat usque ad statum,
 tunc eam incitabis super materiam, & non
 facies eam occupari in cibo spisso, immò sub-
 tilia regime statim cū dimissione cibi omni-
 no. Igitur minus dandum est uirtuti, & ta-
 lis uictus erit tenuissimus. Gal. aphorismo. 1.
 commen. 17, Nam si sapius, aut raro, siue o-
 mnino nutrire oporteat, ab aegritudine & ui-
 ribus primū maximè accipitur. Post hæc
 autem singula recitat, quæ à me prius enar-
 rata sunt, ut si humores corrupti & uires de-
 biles sint, parum & sæpius cibandum, &c.

De ratione uictus per ætates.

Ætas puerilis minus inter alias ætates in-

ediam sustinet: deinde qui in aetate consistē-
te sunt, post hos decrepiti: senes uerò, qui
nondum ad extremam senectutem peruene-
runt, facillime in ediam tolerant. Nam pueri
ob id quòd crescunt, plurimum innati calo-
ris obtinent, idcirco plurimo indigent cibo:
senibus uerò parum caloris inest, quam ob rē
paucis egent fomitibus. Medio modo se ha-
bent qui inter has aetates consistunt.

Loci consentientes ex ve- ra Medicina.

Hippocrat. aphorif. primo, aphorismo
13, Senes facillimè ieiunium ferunt, secundo
loco qui aetatem consistentem habent: minus
adolescentes, omnium minimè pueri, præsēr-
tim qui inter ipsos sunt uiuidiores. Et hoc
probat inquit, Qui crescunt, plurimū habent
calidi innati: plurimo igitur egent alimen-
to, alioqui corpus absumitur, &c. Auic. quar-
ta primi cap. de cib. febr. Omnis, cuius calor
innatus fortis est ualde, aut plurimus, aut
calor innatus est debilis ualde, non potest di-
mittere cibum, &c. Gale. primo aphorif. cō-

124 DE CONSEN. MEDIC.

ment. 14, Omne id eget alimento, cui plurimum ex corpore defluit: sed humidioribus & plus aeris participantibus plurimum defluit: igitur plurimo egent alimento. Quare pueri quum humidiores & aerei sint, plurimum cibum expostulant. Senes uerò & iuuenes sicci & terrestres non sic resolvuntur, idcirco ieiunium facile ferunt.

De ratione victus ex temporibus anni sumpta.

Conducunt anni tempora mirum in modum ad victus rationem instituendam: nam in hyeme plus dare expedit, quam in aestate: siquidem hyeme, calore innato ad interiora se recipiente, cibi facilius concoquuntur: contra uerò, in aestate ad exteriora se protendere non fit tam ualida concoctio, quare minus dare conueniet. In aestate igitur saepe & pauca exhibeantur: in hyeme, rarò & multa: in uere, rarò & pauca: in autumno similiter, sumpta à roboris uirium indicatione: si uire ualida, saepe & multa: si uerò imbecilles, pauca & saepius offerimus.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Hippocrat. primo aphorismorum, aphorif.
15, Ventres hyeme & uere natura calidissi-
mi sunt, & somni longissimi, quare per ea tē-
pora alimenta copiosiora sunt exhibenda.
Etenim tunc calor innatus plurimus est, un-
de & pluribus eget alimentis. Indicio sunt
ætates & athletæ. Gal. in comment. huius
aphorif. Non parum, inquit, conducunt anni
tempora ad uictus rationem inueniendam:
nam hyberno tempore plus appetūt homines,
& cibum facilius concoquunt: contrā in æ-
state, &c. Hippocrat. aphorif. I. aphorismo.
18, Aestate & autumno cibos difficillimè fe-
runt, hyeme facillimè, secundū locum uer hā-
bet, &c. Hippocra. aphorism. I. aphorif. 17,
Et quibus semel & bis, & quibus plura, ne
cur pauciora particulatim oporteat afferre
considerandum, condonandum est aliquid
tēpori, ætati & consuetudini. Gal. in cōmen.
huius aphorismi, A tēpore & ætate, & aliis,
quæ sunt proportionalia uictus, accipitur hoc
modo æstiuo tempore, quantum ad temporis

226 DE CONSEN. MEDIC.

rationem attinet, sepius & pauca danda sunt. Hyberno tempore ob uirium robur multa, sed raro, &c.

De victus ratione à ciborum qualitate sumpta.

Quaecunque præter naturam sunt, contrarias in uictus ratione indicationes exposcunt: quæ uerò secundum naturam sunt, similes. Nam morbus calidus & siccus, cibum frigidum & humidum exposcunt: calidus & humidus frigidum & siccum, frigidus & siccus calidum & humidum, & sic de reliquis. Similiter similia similibus conseruantur, seruata tamen quantitate & qualitate eadem inter se.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Hippocr. aphor. 1. aphor. 16, Victus humidus omnibus febricitantibus confert, maxime uerò pueris, & alijs qui tali uictu uet. cōsueuerunt. Gal. in comment. Primum qualis sit

adhibendus uictus febricitantibus monstrat,
deinde quod uictuum ὕγια νόστων indica-
tiones ijs quæ præter naturam sunt contra-
rias: ijs uerò quæ sunt secundum naturam
similes facere oporteat, &c.

Gal. 8. meth. cap. 9, Dictum sæpenumero
est, id quod secundum naturam est, similia
semper postulare: quod præter naturam est,
contraria: siquidem quod naturaliter se ha-
bet, custodire: quod præter naturam est, tolle-
re oportet. Porro febris præter naturam est,
ideòque uictus rationem frigidam & humi-
dam exigit, &c.

De vniuersali ac particulari uictus ratione.

Vniuersalis totius uictus ratio est, quæ ad
duos medendi scopos, ad morbi scilicet uigo-
rem, & ad egrotantis uires respicit. Sed par-
ticularis est, quæ morborum accessiones in ci-
bando cauere studet, ita ut nec quando ac-
cessiones adsunt, nec quando futuræ sunt,
quicquam exhibeatur, cauendo tum ea inte-

rim quæ in ediam ferre non possunt corpora,
nam & in ipso febris principio cibanda sunt.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Gal. aphor. 1. aphor. 11. totius uictus rationem à duabus intentionibus, ex totius morbi uigore, & ex uiribus agrotantis assumere iussit. Quod autem quispiam particulatim cibum afferat conuenienter, in hoc docet sermone, cauere iubens morborum accessiones. Et comment. 12, Totius uictus figuram ad duas respiciens intentiones faciebat, quarum altera uis agrotantis, altera constitutio morbi: particulares autem oblationes ex accessionibus cōiecturabatur, &c. Hippoc. aphor. 1. aphor. 11, In accessionibus abstinere oportet: nam cibum dare, nocuum: & quibus per circuitus fiunt accessiones, in ipsa accessione abstinere oportet.

Auic. quarta primi, cap. de cib. feb. Et de corporibus sunt corpora cholericæ, quæ requirunt regimen diuersum ab illo quod diximus. Ipsi enim quum non cibantur in ipso fe-

bris principio, aut in hora status, quæ est prauior, tunc non uacuae sunt dispositiones eorum à duabus rebus: nam si sunt debilius uirium, superuenit syncopis, & moriuntur in paroxysmo: si uerò fortius uirium, cadunt in extenuationem. Igitur hæc corpora cauenda sunt, quæ ferre in ediam non possunt. Galen. meth. 10. cap. 5, Aliquos uerò eorum cibabis, & quum inuasura adhuc est febris, & quum incipit: sint porro hi sicco ac calido temperamento, &c.

Authores erronei dissentientes
circa rationem victus.

1. Adserere, plenum uictum in omnibus morbis conuenire.
2. Adserere, tennem uictum in omnibus morbis esse pleno præferendum.
3. Adserere, uictum plenū ut crassum in diuturnis morbis non esse necessarium.
4. Adserere, uictum tenuissimum in nullis morbis esse exhibendum.
5. Adserere, uictus scopum sumi tantum debere à uiribus, non à morbo.

130 DE CONSEN. MEDIC.

6 Adserere, esse incipiendum à tenuiori victu in principio morbi, & procedendum ad pleniorē.

7 Adserere, qualitatem & non quantitatem esse tantummodo considerandam, & econuerso.

8 Adserere, in febris carnem, præsertim delicatam, non esse præbendam.

Confutatio dissentientium circa rationem victus.

Ad primum: Hippoc. aphor. 1. aphor. 7. Vbi morbus peracutus est, statim extremos habet labores, & extremè tenuissimo victu utendum. Igitur plenus victus in omnibus morbis non conuenit. Galenus præterea hoc ipsum attestatur in commento.

Ad secundum: Hippoc. aphor. 1 aphor. 4. Victus tenuis atque exquisitus in morbis quidem longis semper, in acutis uerò, in quibus non conuenit, periculosus. Igitur in omnibus morbis pleno non est præferendus. Præterea Gal. in hoc comment. In sanis seruandum robur uel augendum monet, in agris rarò au-

gendum, in longis morbis conseruandum, in acutis mediocriter debile seruandum. Quare sicuti in acutis tenuis, ita in longis plenus erit praferendus.

Ad tertium: Hippoc. aphor. I. aphor. 7. Tantum cibi indulgendum est, quanto morbus extremis mollior est. Galenus in comment. precipit tātum à uictus tenuitate declinare, quantum morbus ab extremis recedit. Igitur quanto tardiozem ferè morbi statum iudicabimus, tanto magis crassiori uictu utemur.

Ad quartum: Hippoc. aphor. I. aphor. 6. Extremis morbis extrema exquisitè remedia optima sunt. Vbi Gal. inquit, Hippocratem precipere, exquisitissimam curationem & uictum pariter adhiberi tenuissimum. Igitur uictus tenuis in his morbis erit exhibendus.

Ad quintum: Gal. I. aphor. comment. 12. Cum igitur tres essent intentiones ad perfectam & indeficientem uictus rationem, Prima quidem sumpta ex uiribus agrotantis: Secunda, ex morbi constitutione: Tertia ex particularibus accessionibus, assumi debet, &c. Igitur non tantum à uiribus, quantum à

morbi constitutione, scopus rationis uictus assumi debet.

Ad sextum : Gal. aphor. 1. comment. 7, In morbus, qui sunt suum uigorem posterius accepturi, non licet ab initio afferre tenuissimū uictum. Nam prius homo è uita migrarit, quàm morbus in suo uigore consistat.

Ad septimum : Hippoc. aphor. 1. aphor. 9, Coniectari oportet, an aeger cum uictu sufficiat perdurare, &c. Et aphor. 13, Senes facillimè ieiunium tolerant, &c. Et aphor. 15, Ventres hyeme & uere natura calidissimi, &c. in omnibus his locis loquitur de quantitate uictus instituendi, quæ à uirtute, ab ætate, à tempore sumenda est. Igitur quantitas est consideranda. Et particulariter Gal. 1. de art. cur. cap. 9, Quantitas cibi tanta sit, ut bene concoqui ualeat. De qualitate iam dictum est superius.

Ad octauum : Gal. 1. de art. cur. ad Glau. cap. de feb. tertiana, concedit ex piscibus saxatiles, ex uolatilibus quæ molli carne consistunt, ita & gallorum testiculos, & suum pedes & cerebra, præsertim deliciosis.

De parte Pharmaceutica.

Medicatio bifariam diuisa est, in euacuationem & in alterationem. Euacuatio fit multifariam, uel per sectionem uenæ, per clysteres, per urinas, per secessum, per sudores, per diuersionem & deriuationem, per menstrua, per hæmorrhoidas, per nares, per palatum. Alteratio uerò erit duplex, uel secundum qualitatem, uel secundum locum. Alteratio secundum qualitatem nihil aliud est, quàm mutatio eius, quæ prius fuit, qualitatis: mutatio uerò secundum locum non alteratio dicitur, sed potius latio, quæ est prioris loci mutatio: alterationis uerò species concoctio existit.

Loci consentientes ex vera
Medicina.

Indicatio huiusmodi est euacuatio & alteratio, inquit Gal. in art. med. cap. 89, Euacuationes uerò fiunt & per sanguinis missionem, & clysteris usum, & per urinae uias, atque eam, quæ fit per cutem, transpirationem, ac per eam, quæ fit ad partes oppositas,

I. ij.

attractionem, & ad aliū propinquas derivationem, &c. Gal. primo de naturalibus fac. cap. 1, Nec ea modò quæ in colore & sapore mutantur, alterari dicimus, sed si quid ex calidiorē sit frigidius, & econtra: nam commune nomen alteratio est. At genus aliud est in corporibus quæ situm mutant, cui latio nomen est: hi duo motus sunt simplices, scilicet alteratio & latio, sed compositi: ex quibus alteratur substantia, sunt diminutio, augmentio, generatio & corruptio, &c. Vide etiam de his secundo meth. & primo de loc. aff. Quòd verò alterationis species sit concoctio, vide Galenum in art. med. cap. 89. & fusius secundo, & tertio de nat. fac.

Quomodo alteratio, concoctio,
& humorum præparatio ac
digestio inter se differant.

Quid sit alteratio iam dictum est. Concoctio verò duplex est, altera quæ penes alimenta perficitur, & est mutatio in propriam eius quod mutatur qualitatem: altera, quæ improprie maturatio dicitur, est quædam im-

concoquentis substantiam eius quod concoquitur deductio: unde Cōcocta etiam dicuntur, quacunque à natura eueicta sunt, Cruda uerò quae nondum eueicta. Digestio uerò est ueluti quaedam alimenti distributio. Nam Graeci ἀνάδοσις, id est, cibi distributionem per totum corpus à nativo calore facti dicunt. Interdum sumitur digestio pro discussione excrementorum seu pro segregatione, quae à facultate expulsoaria & attractoria perficitur, unde à concoctione differt in particula. Differt etiam, quia concoctio ad digestionem praere solet, uel quia à diuersis facultatibus utraque fit: alteratio autem, quum sit humorum in qualitate mutatio, quomodo ab his differat, iam notum est. Solum enim in ijs morbis alteratio conuenit, qui non amplius ab aliqua causa fouentur, sed tantum contrarijs remedijs indigent, ut hectica & diaria febris: & haec perficiuntur absque concoctione, digestionem, & preparationem. Quid autem sit preparatio, uide de obstructione superius.

I. iij.

16 DE CONSEN. MEDIC.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. 2. de fac. nat. cap. 4, Concoctio est alteratio quaedam, ac nutrientis in propriam qualitatem eius quod nutritur, mutatio. Similiter 3. de nat. fac. cap. 4. & 7. & 8. eiusdem libri asserit. Quod uero cōcoctio significet maturationem, uideri potest aphorif. 1. comment. 12. unde Galenus, Si aliqua fuerit inflammatio cum tanta meatuum angustatione, ut nihil extra effundatur, necesse est illam esse & concoctū difficilem, & longo tempore perdurare, ubi terminos cōcoctionis paulo inferius docet. Nam crudissimus, inquit, morbus est, in quo nihil expuitur: secundus in quo sanies tenuis est: tertius in quo crassior: quartus in quo perfectam habet cōcoctionem, id est maturationem. Vide tamen etiam Galenum de hac maturatione secundo de uictu in morb. ac. comment. 45. fusius loquentem. De digestionē Gal. 6. de sympr. cau. cap. 2, Igitur alimenti per corpus digestio, Græci ἀνάδοσιν uocant, inter naturalia opera numeratur, quum ex uentriculo in iecur,

atque ex hoc in uniuersum corpus alimentū digeritur : & sic digestio sumitur pro distributione. Gal. 3. prognost. comment. 23. in fine comment. Humores tenuiores ac calidiores ad excretionem parati sunt, crassi uerò & crudi ad abscessum uel ad digestionem: porro idipsum ut per concoctionem medeatur, excretio quædam est, quæ ex urina plerunque, raròque per aluum efficiatur. Quòd concoctio præcedat digestionem siue segregationē, hoc habes ex primo aphor. comment. 22, Siquidem, inquit Galenus, ante concoctionem non medicari oportet: nam post concoctionē natura euacuationi adminiculans humores discernit, & superfluitates expellit: quare concoctio ad digestionem præcedit. Præterea Gal. aphor. 4. comment. 22, Quando aliquis morbus incipit, si quid excernitur, nihil excernitur tunc naturæ ratione: quia cū à causis morbum facientibus grauatur, & cruditās humorum adest, tunc aliquid bene euacuari est impossibile: siquidem oportet concoctionem præire, subsequi uerò discretionem, deinde euacuationem, &c. Gal. meth. 11. cap.

9, Quum dictum sit contrariorum contrariis esse remedia, quid uetat omnibus febricitantibus frigidam uno ordine exhibere? Nam ostensum est, ipsius febris, prout febris est, aquā frigidam semper esse remedium: quod uerō ad alia spectat, nō semper, id est, febris prout calor est, frigido indiget, id est, alterari ad frigidum: sed ubi alia fuerit causa quā calor, non alteratione, sed & preparatione indigebit, &c.

Obiectio.

Quum quis dixerit excrementum crudum uel concoctum, de qua concoctione intelliget, praesertim si tale excrementum mutatum nutrire non ualeat.

Responsio.

De universaliori significato intelliget: nā Gal. 2. de uic. in morb. ac. comment. 45, Generali, inquit, concoctionis significato utimur, quum uel catarrhum, uel coryzam, uel fluentes ex his humiditates, uel eas quae ex oculis manant, aut crudas aut coctas esse dicimus, quae concoctio est, quam natura humores euacuat.

Authores erronei dissentientes
circa digestionis, conco-
ctionis, & humorū
præparationem.

1 Adserere, digestionem esse humorum alter-
vationem.

2 Adserere, concoctionem à frigidis fieri.

3 Adserere, præparationem à digestionem &
à concoctione non esse alienam.

4 Adserere, humores calidos ac tenues non
præparatione prius indigere, quàm ena-
cuentur.

5 Adserere, humores crassos cum extenuan-
tibus ac inuidensibus esse maturandos &
concoquendos.

Confutatio dissentientium circa
concoct. & digest.

Gal. lib. finit. med. Digestio est concocti ac
confecti, & in sanguinem conuersi alimentū
in corporis particulis omnes attractio, quam
natiuus calor molitur. Igitur non humorum
est alteratio.

Obiectio.

Quum duplex sit digestio, altera alimen-
torum, altera humorum siue excrementorum,
cur exemplum tantum affers de digestionem
alimentorum?

Responsio.

Exemplum tantum adduxi de alimentis,
quoniam digestio etiam excrementorum est
ueluti segregatio, quæ non minus quam pri-
ma à calore innato perficitur: nec per alte-
rationem, ut nonnulli putarunt, conficitur,
sed per ea quæ calorem innatum roborant.

Ad secundum: Galen. 3. de ratione uic. in
morb. ac. comment. 29, Concoctioni perpetuò
calidum opitulatur, confertque: frigidum ue-
rò renititur & aduersatur.

Obiectio.

Ergo biliosi humoris concoctio non fiet à
frigidis.

Responsio.

Circa nomen deciperis: nam biliosi humo-
ris non dicitur concoctio, sed potius altera-

tio, quæ nullo pacto uel concoctio uel digestio dicitur: nam nec flaua bilis, nec atra in sanguinis substantiam redire possunt, teste Galeno 2. de uict. in morb. ac. comment. 31. sed in contrarium alterari, nisi fortè pro digestionem uel concoctionem intellexeris à natura euinci, quæ euictio dici potest maturatio, siue imperfecta concoctio.

Ad tertium: Quæcunque fiunt à diuersis causis, inter se sunt aliena: sed præparatio, concoctio & digestio fiunt à diuersis causis: ergo sunt inter se aliena. Quòd uerò fiant à diuersis causis, probatur: nam concoctio & digestio fiunt à natura, præparatio autem tantum ab arte.

Ad quartum: Gal. 1. de sanit. tuend. circa finem, Quòd si uel crassitudinis, uel abundantie, uel lentoris excrementorum uicio meatus obstructi sunt, tenuatoria uictus ratio his competit.

Obiectio.

Non possum capere, quo pacto in humore tenui præparatio fieri debeat, quoniam huic hu-

mori nec incisio, nec alia preparatio competat, sed ratione sui possit euacuari.

Responsio.

Preparatio quatuor in partes diuisa est, quarum prima est crassorum humorum prauiusio siue extenuatio: secunda est meatuum obstructorum reseratio: tertia est quae humectantibus ac laxantibus, utputa quiete & alimentis, & balneis perficitur, de qua loquitur Hippocrat. aphor. 4. aphor. 13, ubi iubet ante epotum ueratrum corpus prahumectandum esse cibus, balneis & quiete. Quarta est humorum multitudinis obstruentis, ac omnia uasa replentis apertio. Quare dicimus si nō ratione humoris craffi, uel ratione meatuum obstructorum, siue à craffitie, siue à copia, saltem ob eam quam nobis monstrauit Hippocrates, ut mollius corpus reddamus, preparationem molimur.

Ad quintum: Quaecunque maturantur, coguntur ac incrassantur, teste Galeno 4. de ratione uict. in mor. ac. ubi inquit, Necesse est, quaecunque concoquuntur ac euincuntur,

cogi ac incrassari. Igitur non extenuari nec
 incidi debent. Præterea Gale. lib. de totius
 morbi temporibus, adserit, urinam, sputum,
 lippitudines, & omnes humores, qui à cere-
 bro per palatum & nervos defluunt, esse ab
 initio aqueos tenuésque: quum uerò temporis
 processu concoctionem adsumunt, crassiores
 euadere & pauciores. Et sic quæcunque ma-
 turantur, crassiora euadunt. Similis sententia
 habetur ab ipso Hippoc. prognost. 2.

De euacuatione per sectio- nem venæ.

Venæ sectio, est uniuersalis euacuatio, quæ
 auctiorem humorum super æqualitatem ue-
 nis exuberantium euacuat. Verum est, quòd
 plenitudo non semper de sectione uenæ indi-
 cat: nam hæc ipsa ab humoribus crudis fieri
 potest, qui sectionem uenæ haudquaquā ex-
 poscunt. Indicatio sectionis uenæ sumitur à
 magnitudine morbi, à uirium robore, consi-
 derata tamen ætate puerili uel senili, & æ-
 re nos ambiente calido uel frigido. Sumitur-
 que indicatio ab ipsa patientis temperie, ab

144 DE CONSEN. MEDIC.

habitu totius corporis, à loco habitationis, ab anni temporibus. Fit sectio uenæ ob duas causas: aut quia sanguis inutilis est, & suam qualitatem non seruans, nutrire non ualeat: aut quia uires premit, aut uenas & arterias distendit, findit & obstruit. Tempus incisionis erit, si fieri potest, à principio morbi: si minus, dummodo morbus sectionem requirar, nullus dierum numerus erit considerandus, sed usque ad quatuor dies erit factitanda sectio. Quantitas extrahendi sanguinis erit, quousque color mutabitur, aut uirium robur sustinebit, & in uirium imbecillitate aut dimittenda est, aut partiri expediet. Venæ secandæ sunt in capitis passionibus exteriores, à collo infra interiores, à renibus infra quæ per malleolos ac poplites decurrunt.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Auic. quarta primi, cap. de phlebot. Phlebotomia est euacuatio uniuersalis, quæ multitudinem euacuat. Multitudo est augmentum humorum super æqualitatem ipsorum in ue-

nis. Gal. de cur. ratione per sang. missionē,
 Sin infesta sit degraūās plenitudo, haud sem-
 per sanguinis mollienda detractio est, cuius
 rationem paulò inferius reddit. Anic. loco
 allegato itidem asserit, inquiens, Et debes sci-
 re, quòd quotienscunque fuerit plethora, non
 debes phlebotomare, quoniam repletio quan-
 doque ex humoribus crudis fieri potest: quòd
 si minueris, non maturabis eos, & timebitur
 ne ager perdatur, &c. Gal. de cur. ratione
 per sang. miss. cap. 20, Scopi in mittendo
 sanguine sunt, morbus ingens, robúrque uiriū,
 excepta aetate puerili, & aere nos ambiente
 ualde calido. Et cap. 13. eiusdem lib. Mor-
 bi itaque magnitudo cum uirium robore, pri-
 mi erant mittendi sanguinis scopi. Idemque
 asserit meth. 4. cap. 6. & meth. 9. cap. 5. Iri-
 dem quarto de ratione uict. in mor. ac. com-
 ment. 24. Similiter Hippoc. eodem lib. cap.
 19. aetatur. Gale. de cur. ratione per sang.
 miss. cap. 13 Deinde considerandum, quæ sit
 naturalis hominis temperies: nā quibus am-
 ple sunt uenæ, qui que modicè graciles sunt,
 nec candidi, nec tenera carne præditi, copio-
 K.i.

sius euacuabis, &c. Et meth. 9. cap. 17, enu-
 merat consuetudinem, aetatem, locum habita-
 tionis, anni tempus, & laborantis vires. De
 tempore sectionis habetur Galeni textus de
 opt. sect. ad Thrasib. cap. 37, Plerumque,
 inquit, remedia ut purgationem & sanguinis
 missionem adhibemus, quum morbus quidem
 non adest, sed futurus timetur. Et paulò in-
 ferius, Age enim, inquit, in decremento inun-
 ctio, cataplasma & cibus adhibetur, & isto-
 rum cuiusque est proprium tempus: sed in ini-
 tio ac morbi incremento sanguis mittitur. Et
 de cur. ratione per sang. miss. Non numero
 tantum animaduertes, quod quidam faciunt,
 sed & corporis habitui: nam sunt qui septua-
 ginta annos nati sunt, & sectionem perferunt.
 Gal. 9. meth. cap. 11, Sanguis, inquit, natura
 inutilis fieri potest bisariam, uel sui qualita-
 tem non seruans, ut amplius nutrire non pos-
 sit, aut vires premat, aut uenas & arterias
 distendat, findat & obstruat. Gal. de cur.
 ratione per sang. miss. cap. 20, Igitur uni-
 uersim hoc sciendum in sanguinis missione,
 licet numero haud attendendum, &c. Et

paulò inferius, Quocunque die mittendi san-
 guinis scopos in laborante inueneris, in eo
 auxilium illud adhibero, etiam si is uel uige-
 simus ab initio extiterit. Et Auic. quarta pri-
 mi, cap. de phleb. Non attendas quod quidam
 dicunt, quòd non est bonum post quartum diem
 ut fiat phlebotomia, quoniam bonum est, ut
 fiat etiam si fuerit post quadraginta dies.
 Hippoc. 2. de ratione uict. in morb. ac. ca. 10,
 Eousque auferendus est sanguis, donec rubi-
 dior multò, uel pro puro rubidòque linidus
 fluxerit. Similiter Auic. quarta primi, cap. de
 phleb. à coloris mutatione, & à lenitate &
 laxitate pulsuum signum ponit. Almanfor
 lib. 7. cap. de phleb. & Haly Abbas lib. 9.
 cap. de phleb. dicunt, quòd non debemus con-
 siderare mutationem sanguinis, nisi in calidis
 apostematibus, ut in pleuresi, quod uerum est.
 Nam Gal. lib. de curandi ratione per sang.
 miss. cap. 14. inquit, In quibus iuxta sectam
 uenam phlegmone est ingens, opimum est san-
 guinis & in colore & consistentia mutatio-
 nem expectare, &c. Et paulò inferius, Non
 semper hæc expectanda est, sed antequam
 K. ij.

mutatio fiat, cessare conuenit, tum ob infirmas uires, tum ob phlegmones paruitatem. Gal. de curandi ratione per sang. miss. cap. 12, Vbi multa euacuatione est opus, & uires sunt imbecilliores, in his euacuationem pariri expedit. Et Auic. cap. de phleb. Cum phlebotomia fuerit necessaria cum debilitate uirtutis, partire phlebotomiam sicuti diximus. Gal. loco allegato cap. 16, Igitur interior utilis est in his, quibus inferiores collo partes patiuntur: exterior uero in ijs, quibus quæ his superiores sunt, ut facies & caput, &c.

Authores dissentientes circa
sectionem uenæ.

- 1 Adserere, sectionem uenæ non nisi mane esse committendam.
- 2 Adserere, obstructionem & putredinem esse causam mittendi sanguinem.
- 3 Adserere, sectionem uenæ non competere morbo non assistente.
- 4 Adserere, in die indicatoria sectionem uenæ fieri debere.
- 5 Adserere, sanguinis detractionem uisum

hebetare.

6 Adserere, in plenitudine sectionem uenæ
semper esse perpetrandam.

7 Adserere, fluente aluo esse mittendum
sanguinem.

8 Adserere, nullum esse temporum anni dis-
crimen in secanda uenæ.

Confutatio dissentientium
circa sectionem venæ.

Ad primum: Gal. de cur. ratione per sang.
miss. cap. 12, Quamobrem nec per noctem san-
guinem mittere uerearis: siquidem ridiculum
est, quod quidam faciunt, à secunda diei ho-
ra ad quintam aut sextam solummodo san-
guinem mittentes, haud alio quouis tempo-
re, &c.

Ad secundum: Gal. 2. meth. cap. 14, Nec
obstructio, nec putredo causa est mittendi san-
guinem, sed succorum redundantia: nam nec
obstructio, nec putredo per sanguinis misio-
nem curari possunt, ut quæ alia remedia de-
siderent.

Ad tertium: Gal. de opt. sect. ad Thrasyb.
K. iij.

cap. 37, Plerunque, inquit, remedia, ut purgationem & sanguinis missionem adhibemus, quam morbus quidem non adest, sed futurus timeatur.

Ad quartum: Auic. quarta primi, cap. de phleb. Neque phlebotomia, neque uentris solutio fieri debet in die motus aegritudinis, neque quum aegritudo est crissim habitura, sed si possibile fuerit, quies est habenda. Habes etiam in hoc aphorismum uigesimi primi, ibi, Quae iudicantur uel indicata sunt, &c.

Ad quintum: Gal. de curatione per sanguinis missionem cap. 7, Sunt quidam imbecillioribus oculis aut scotomacis, in quibus sanguis abundare dicitur: hos omnes euacuabis, uel medicamento purgante, si alij à sanguine humores sint, aut diminutione sanguinis. Et sic sanguinis detractio conuenit, nec hebetat, sed uinidiores reddit.

Ad sextum: Gal. 4. de uict. in morb. ac. comment. 19, Plethoria non semper sanguinis missione curanda, sed & frictione, balneis multis, abstinentia: faciunt etiam quacunque recitata sunt superius ex Galeno & Auicenna.

na ad hoc probandum.

Ad septimum: Hippoc. 4. de uict. in morb. ac. cap. 118, Si cuiusdam sanguinem auferre confert, uentrem confirmare oportet, & ita auferre, &c. Et Gal. hoc in loco, Fluere aluo, inquit, sanguinem ne detrahes, ne perseverare fluore uirtus prosternatur.

Ad octauum: Gal. ad Glauc. cap. 14, Qui omnino de temporum statu nihil cogitantes sanguinem abstulerunt medici, hos omnes interemerunt. Et quarto de uict. in mor. ac. comment. 19, Si abunde aer calidus & siccus fuerit, tunc à sanguinis missione abstinemus, etiā si morbus magnus fuerit & ætas florens.

De purgatione per medicamenta soluentia.

Purgatio est humorum, qui sua qualitate molestant, euacuatio, ob idque purgans dicitur, quia sanguinem ab excrementis purgat. Hac purgatio ab ipso Hippocrate uocatur nasorum inanitio, ab euenit: nam omnia nasfa inaniri euenit in omni euacuatione. Intētio euacuationis non solum humorem supera-

K.iiij.

bundantem respicit, sed & vires & naturam
 illius qui debet euacuari. Ad euacuationem
 quatuor requiruntur: primum, robur virium:
 secundum, quod materia non sit crassa nec
 viscosa: tertium, quod meatus non sint obstru-
 cti, sed aperti: quartum, quod nullum adsit
 apostema intrinsecum, nec illa sint extensa,
 nec materia sit in aliqua parte firmata, sed
 à natura sit euicta. Quantitatem purgantis
 medicamenti, quæ præberi debeat, ignora-
 mus. Verum tantum medicamenti erit propi-
 nandum, quantum in plurimis mediocriter
 euacuari noueris. Non fiat igitur euacuatio
 nimia, quoniam periculosa est. Qualitas uerò
 medicamenti ea sit eligenda, prout natura
 redundantis succi exposcit: nam si flaua bi-
 lis, uel pituita abundet, quæ flauam bilem uel
 pituitam educat, tempus purgandi erit ab
 initio morbi, si humores turgeant: si uerò in
 aliqua parte firmentur, uel crudi sint, cons-
 que morandum in purgando, donec à natura
 euincantur siue concoquantur: uel eo tempo-
 re euacuandum, quo superfluitates natura
 expellere conatur: nam tunc ad id, in quo

natura deficit, supplere debet medicus. Tempus uerò particulare erit, ut purgationes in accessionibus morbi fiant per superiora, & in remissionibus per inferiora. Si multa simul purgantia pharmaca miscueris, fac sint congenera, ut simul eodem tempore soluantur: uitandaque est medicamenti insuauitas, & eius uehementia moderanda: quanquam decem sint, quae in purgatione sunt considerata, ut repletio, uirtus, complexio, accidentia, figura, aetas, tempus, dispositio aeris & regionis, consuetudo euacuandi, &c.

Loci consentientes ex vera Medicina.

Gal. aphor. I. comment. 2, Euacuatio est humorum, qui sua qualitate molestant, purgatio. Et in lib. de purg. med. fac. Purgans pharmacum ob id dicitur, quia à recrementis purum sanguinem reddat. Gal. aphor. I. comment. 3, Intentio quantitatis euacuationis nō solum humorem respicit superabundantem, sed & uires hominis, qui debet euacuari. Nam alij minus, alij magis perferunt euacuationes.

154 DE CONSEN. MEDIC.

Idem etiam asserit aphor. 4. comment. 2. Gal. aphor. 1. comment. 24, Considerare oportet, nunquid ager idoneè se habeat ad purgationem. Nam quicumque multa cruditate laborant, vel qui tenaces ac crassos cibos assumpserunt, & quibus *ἰσχυρὸς πικρὰ* extenta atque inflata sunt, aut aliqua uiscerum adest inflammatio, omnes ij non sunt apti ad purgationem. Et aphor. 1. comment. 3, In omni euacuatione vires aegroti oportet attendere, & donec laborans tolerat, humorem exuberantem educere: quum uerò dissoluuntur, etiamsi remaneant superfluitates, cauere oportet eorum euacuationem. Itidem Auic. quarta primi, cap. 5. asserit. Adiungit etiam, quòd fastidium habentibus molesta sint purgationes. Gal. de cur. ratione per sang. miss. cap. 12, Quòd laboranti prabendum sit medicamentum, aut bilem tum flauam tum atram, aut pituitam, aut serosum excrementum euacuans exactè nouimus. Caterum quantum praberi debeat, nescimus. Similiter in lib. de sect. ad eos qui introducuntur, cap. 5. asserit. Et aphor. 1. comment. 23, Quantitatis euacuationis

nullum habemus indicium, nisi ex tolerantia
 facilitate. Gal. aphor. 2. comment. 22, Eua-
 cuatio nimia morbum parit. Et Hippoc. aphor.
 1. aphor. 3, Sic & euacuationes, quæ ad ex-
 tremum deducunt, periculosa. Et Avic. quarta
 primi, cap. 3, Et scito, inquit, quod residuum
 materia dimittere, quod necesse erat euacua-
 re, est minus nocuum, quam exquisitè euacua-
 re: ibi etiam omnis euacuatio superflua secun-
 dum plurimum febres generat. De qualitate
 euacuationis Hippoc. aphor. 1. aphor. 2, Si
 talia purgentur, qualia purgari oportet, con-
 fert, & leuiter ferunt. Gal. in comment. Ser-
 mo est de eorum qualitate, quæ euacuantur.
 Si igitur pituita superabundet, hanc omnino
 oportet euacuari: flaua autem bile uel atra
 infestante, demissa pituita, bilem euacuandam,
 &c. Hippoc. aphor. 1. aphor. 22, Concocta
 medicari, atque mouere non cruda, modò non
 turgent, plurima uerò non turgent. Et Gal.
 in comment. Tales humores euacuare conue-
 nit, qui agitantur, & de loco ad locum mo-
 uentur ac transfluunt: qui uerò in aliqua par-
 te firmati sunt, neque alio auxilio moueri

oportet, neque medicari ante concoctionem.
 Et paulò post, Si natura mediocrius atque
 imbecillius agat, id quod deficit, oportet sup-
 plere: nam natura expellente, & medicamēto
 attrahente, humoris noxij euacuatio fiet. Et
 Auic. quarta primi, cap. 3. In acutis egritu-
 dinibus maturationem expectare melius est,
 quàm euacuare, præcipuè si quietæ fuerint.
 Quòd si moueantur, ad euacuandum festina:
 nam impedimentũ eius motus est maius, quàm
 suæ euacuationis. Gal. in lib. quos purg. oportet,
 Purgandi occasio à temporibus morbi su-
 mitur, utputa purgationes in accessionibus
 per superiores partes, in remissionibus per in-
 feriores conueniunt. Gal. in lib. quos purg.
 oportet, Purgantia medicamenta, si simul
 misceantur, congenera esse debent, id est,
 eiusdem naturæ, ut eodem tempore soluant.
 Gal. lib. de comp. med. Per genera purgantis
 medicamenti insuauitas ac eius uehementia
 moderanda est. Auic. quarta primi, cap. 3,
 Decem sunt in euacuando considerata: &
 enumerat omnia quæ dicta sunt. Primum est
 repletio: nam nisi repletio supponatur, nullus

opus esset euacuatione. Robur uirtutis : nam
 ubi uirtus deficeret , inanis esset euacuatio.
 Complexio: nam ubi nimis calida uel frigida
 foret , non competeret euacuatio . Similiter
 accidentia uehementia prohibent euacuatio-
 nem: sic figura si sit rara textura, ne spiritus
 resoluantur: sic etas nondum parata, sic ho-
 ra regioque nimis calida uel frigida , ut se-
 ptentrionalis & meridionalis, sic ars labo-
 riosa euacuationem non admittunt . Et Gal.
 lib. de sect. ad eos qui introducuntur, cap. 5.
 Euacuatio est plenitudini contraria, & con-
 traria contrariorum sunt remedia: uerum ui-
 res, etatem, tempus anni, & regionē, & alia
 antē enumerata prius considerare oportet,
 &c. Et de feb. ad Glau. cap. 14, Vbi fuerint
 uigiliae uehementes, aut dolor intensus agro-
 rum infestans, cauenda sunt subita ac mala
 euacuationes, &c.

Authores erronei dissentientes circa purgationem.

I Adferere, pharmaca non proprios humo-
 res attrahere.

158 DE CONSEN. MEDIC.

2 Adserere, purgantia medicamenta à nutrimento non differre.

3 Adserere, nullo modo purgantia pharmaca in principio morbi esse exhibenda, nisi materia eugeat.

4 Adserere, purgantium pharmacorum usum ariam non ualde indigentibus esse utilem.

5 Adserere, in die critica nullo modo pharmacum esse præbendum.

6 Adserere, pharmacum nulla habita temporis anni ratione posse exhiberi.

7 Adserere, ob igneam caliditatem in febris principio esse uerenda pharmaca, etiam si materia copia adsit.

8 Adserere, pharmaca purgantia æquè omnes indifferenter humores purgare.

9 Adserere, euacuationem optimam esse, si copia humorum peccantium extracta sit.

Confutatio dissentientium circa purgationem.

Ad primum: Gal. de element. 2. circa finem: Exeuntia ostendunt quàm proprium humorem quodlibet pharmacum attrahat. Quo-

rescunque enim quis medicamentū hauserit,
quod vim habeat bilem euacuādi, uomitu hu-
iuscemodi humorē eiiciet. Et paulò infra, Ex
quibus licet manifestè inferre, unumquodque
medicamentum, cui vis purgatoria inest,
propriū attrahere humorem. Hoc idem etiā
asserit primo de fac. nat. cap. 14. & de a-
tra bile cap. 6. & 9.

Ad secundū: Gal. 3. de nat. fac. ca. 7, Porro
in hoc dissidet medicamentū à nutrimento:
nam medicamentum vim corporis vincit, nu-
trimentum uerò ab hac vincitur. Et 3. de
temp. cap. 2, At quæ quidem assimilantur,
omnia nutrimenta uocantur, reliqua omnia
medicamenta: unde quatuor species medica-
mentorum enumerat. Prima, quæ non muta-
tur à corpore, sed corpus mutat ac vincit. Se-
cunda, quæ initium mutationis habet à cor-
pore, deinceps putrescit, & putrescendo cor-
pus corrumpit ac putrefacit: & hæc duæ spe-
cies medicamentorum uenenosorum sunt. Ter-
tia est, quæ corpus alterari facit, sed mali
nihil infert. Quarta species eorum est, quæ
agunt & patiuntur aliquid, sed per spaciū

temporis uincuntur & assimilantur: & hæc sunt tam medicamenta, quàm nutrimenta, &c.

Ad tertium: Hippoc. aphor. 2. aphor. 29. Cum morbi inchoant, si quid uidetur mouendum moue: cum uerò consistunt ac uigent, melius est quiescere. Vnde Gal. in comment. Vt melius hoc eueniat, melius est circa principium euacuare, quò minorem factam materiam natura possit facilius concoquere. Vnde hic de multitudine loquitur Galenus, quæ euacuari in principio expostulat. Verum est, quòd etiam euacuatur in principio, si humorum mala qualitas adsit, ut in pestilenti morbo uidetur. Nam Gal. 9. de meth. præcipit, in corruptela humorum cum uiribus imbecillis paulatim quod uitiosum est euacuare. Similiter quarto de sanit. tuend. Sin, inquit, uires imbecilliores dehortantur, sanguis haud mittendus est, sed deiectio mediocris adhibenda. Euacuatur quoque in principio morbi, si locus læsus urgeat, ut pleuritis, aut si in aliquo alio principe loco materia decumbar. Nam Hippoc. 2. & 4. de uict. in morb.

ac. tex. 76. Si dolor sub thorace fuerit, & ualde infestauerit, pleuretico uentrem subpurgabis. Similiter Gal. in comment. Si uehemēs febris non sit, hominisque naturam noueris, ad medicamenti purgantis potum te conferes, &c. Euacuatur etiam maximè si uehemēs dolor alicubi fuerit. Nam Gal. aphor. 1. comment. 23. In maximis doloribus nullum maius inueni remedium, quàm usque ad animi defectum euacuare, &c.

Ad quartum: Gal. aphor. 3. comment. 15. Euacuatio per purgantia pharmaca ualde indigentibus & ex longo interuallo uix utilis est. Nam si quis uti uoluerit bis uel semel in mense, ueritus ne superfluitatum multitudo aggregetur, prater id quod nocebit, corpora etiam in malam trahet consuetudinem (quàmquam Gal. de pharmaco ualde purgatorio intelligat) sed uti solutiuis, quæ sunt ueluti siliquæ Aegyptiæ, Māna, Dactyli, Indi, quos Tamarindos uocant, succus rosarū uiolarum, Myrobalani, Rheubarbarū & similia, nō esset tā grande peccatū, maximè si morbus fieret, factus uel faciendus hoc exposceret.

L. i.

Ad quintum: Hippoc. 4. de uict. in morbo ac. tex. 76. pharmacum exhiberi in quarta iubet. Vnde, inquit, si dolor ualde infestauerit, pleuretico uentrem subpurgabis: ueruntamen purgans medicamentum quarta die ministrabis, & tribus primis diebus clysteres exhibebis. Et Gal. in comment. non tantum in prima, sed in tertia, & quarta se praeuissse pharmacum ait. Verum id nota, quod ipse inquit, Si minus dies indicatorius expectetur, quocunque die hac tuto praebebitur, &c.

Ad sextum: Hippoc. aphor. 4. aphor. 5. Sub cane & ante canem difficiles sunt medicationes. Vnde Gale. reddens rationem, inquit, Nam purgatio praua fiet, quum calor aeris ambientis in partem trahat extrinsecam, contrariam ei, ad quam medicina ducit humores. Ex quibus dictis Galem collige duos motus contrarios esse in medicina uerendos.

Ad septimum: Gale. 9. meth cap. 5. In quo morbo adest humorum abundantia & calor uehemens, ibi est inter ipsa sanandi remedia discrimen, ut si abundantiam euacuare uelis,

febrem augeas : si febrem refrigerare, abundantiam moreris: & in hanc consilij inopiã deueniunt, qui statim ab initio non euacuantur, &c.

Ad octauum: Gale. de atra bile cap. 6. At si uerum esset, omnes humores qui in uasis continentur, alteratos quidem à medicamento pro illius facultate æquè euacuari, simile utrique fuerit auxilium, ab aliquo horum medicamentorum purgari, & secta uena exinaniri. Cur igitur ὕδρῳ γαλῆ hydericus exhibemus, quum liceat uena secta sanguinem euacuare? Similis quoque sententia habetur eodem in lib. cap. 9.

Ad nonum: Hippocrat. aphor. I. aphor. 23. Deiectiones non multitudine sunt exstimaandæ, sed si talia deiciantur qualia conueniunt, & ægri facillè tollerant. Vnde Gal. in comment. Quare non promptam eorum quæ euacuantur quantitatem oportet attendere, sed duas, quæ dictæ sunt, significationes, si qualia oportet euacuentur, & si facile tollerant.

L. ij.

Obiectio.

Antequam pharmacum soluat eritne dormiendum? Aut si solutionem tardauerit, eritne aliquid ultra exhibendum?

Responsio.

Auic. quarta primi, cap. 5. respondet tua obiectioni, inquit, Si medicina sit fortis, super eam dormiat, alioquin natura medicinam digeret, nec illico se mouere debet, sed cum sedata fuerit anima, ambulet & moueatur.

Ad secundam, Auic. Si solutionem prolongauerit, bibat hydromel, uel supponatur clystere, cauendo tamen, ne duas medicinas uentrem soluentes in una die coniungas: quoniam periculosum est & extra rectitudinem iudicij.



IOANNIS

BACCHANELLI
Regienfis, De cōfenfu
Medicorum in curan-
dis morbis, Lib. 2.

Cephalææ descriptio.



EPHALAEA est do-
lor diuturnus, difficul-
térque solubilis, qui per
quosdam circuitus in-
tolerabilem capitis pas-
sionem affert.

Loci consentientes de Cepha-
lææ descriptione.

Gal. 3. de loc. aff. cap. 9, Est enim affectus
L. iij.

hic, dolor diuturnus difficulterque solubilis, qui à parua occasione uehementes habet accessiones, ut neque strepitum, neque uocem neque luminis splendorem, neque motum tollerare possit infirmus, sed tranquillitatem obscurumque cubiculum quærat, &c. Similis sententia est in Gal. 2. de comp. med. per loc. cap. 2. Hanc passionem uocat Auic. prima tertij, cap. 35, Ouum & Cauchati siue Alchude quod interpretatur Galea, ut in correctione ex Andrea Belunensi, uel potius ex suis Auic. commentatoribus apparet. Nam huic illa omnia tribuit, quæ à Galeno de cephalæa recitantur. Aët. ser. 6. cap. 48. ita bellè imitari Galenum uidetur, ut nil aliud quàm mera Galeni uerba exprimat, quod identidè, sed breuiusculè agit Paulus A Eg. lib. 3. cap. 5. Cornel. Cels. lib. 4. cap. 2, In capite interdum acutus ac pestifer morbus est, quem κεφαλαία Græci uocant, dolorque est intolerabilis circa tempora uel occipitium, &c.

De loco affecto.

Cerebrum afficitur aut eius membræ quæ Græci μνίνας uocant: interdum dolor

intra caluariam se continet, interdum extra.

Loci consentientes de loco affecto.

*Gal 3. de loc. aff. cap. 9, Quæ cephalæa à
Medicus nominatur, nemo dubitat quin cere-
bri sit morbus. Alex. lib. 1. cap. 17. Fit ab in-
flammatione in caluariae membranis ac ce-
rebri pelliculis orta. Paulus lib. 3. cap. 5, Qui-
bus intra caluariam morbus consistit, his do-
lor ad oculorum radices porrigitur: quibus
extra est, circa caluariam dolent. idem Gal.
2. de comp. med. per loc. cap. 2 asserit. Auic.
prima terrij, cap. 35, Fit ab ipso phlegmone
in cerebro, aut eius uelaminibus existere, &c.*

De causis cephalææ.

*Causæ sunt uel per se, uel per consensum. Si
per se, uel erit primitiua, à Græcis ἀρχαία
dicta, uelut est ardor, frigiditas,
ebrietas, plaga, &c. Antecedens, à Græcis
προγεννητική dicta, erit sextuplex: prima, hu-
morum multitudo: secunda, partium capitis
imbecillitas: tertia, obstructio meatuum:*

L. iiij.

quarta, humerum mala qualitas: quinta, intemperies simplex: sexta, sensus exuberantia. Vel causa erit coniuncta, à Græcis οὐ αἴτιον, id est, concausa, cephalæam actu efficiens, & erit triplex: mala complexio, soluta continuitas, uel utraque simul. Rursus mala complexio uel erit calida, uel frigida, sicca uel humida. Causa mala complexionis calida, sunt sanguis, bilis, pituita salsa. Causæ malæ complexionis frigida, sunt humores & uapores frigidi. Causæ malæ complexionis sicca, sunt dies caniculares, motus corporei & animales. De causis humidis nulla fit mentio, ex eo quòd dolorem non pariunt, nisi cum aliqua acrimonia, uel alia mala qualitate coniuncta sint, &c. Solutæ continuitatis causæ sunt omnia quæ continuitatem dissolunt, &c. Si uerò causa sit per consensum, tunc uel erit ab aliquo membro mittente, sicut à uentriculo uteròue, aut ab hepate, & reliquis: aut à præcedentibus morbis.

Locī consentientes de causis cephalææ.

Gal. 2. de comp. med. per loc. cap. 1. Causæ

producentes sunt quinque : prima est iuxta
 intemperiem simplicem, citra humorum com-
 plexum: alia iuxta humorum qualitatem: alia
 iuxta multitudinem tantum ipsorum humo-
 rum contingit : quarta, quum multitudo hac
 transitus humorum ac uaporum obturat:
 quinta, quum in quibusdam capitis partibus
 ob imbecillitatem spiritus flatuosus innasci-
 tur. Sexta quam adiunximus habetur ex Gal.
 3. de loc. aff. cap. 9. ibi, Neque absurdum est,
 inquit, ut quosdam ob sensus exuperantiam
 dolor infestet, quemadmodum in ore stoma-
 chi accidit, &c. Auic. similiter prima tertij,
 cap. 35. huius agritudinis causam ponit cere-
 bri imbecillitatem, & fortitudinem sensus
 eius, &c.

De causa procatartica loquitur Gal. 2. de
 compos. med. per loc. cap. 1, ibi, Quandoque
 etiam ob causam aliquam externam proca-
 tarticam laceffentem, uelut est ardor, frigi-
 ditas, ebrietas, plaga capitis, dolor contingit.
 Auic. prima tertij, de uniuers. ser. Causae pri-
 mitiue calefacientes sunt, sicut sol, ignis, ui-
 num, potus & crapula, &c. De causa coniu-

Et ibi etiam loquitur Auic. loc. citato dicēs,
quòd causa doloris immediata aut est mala
complexio, aut solutio continui, aut utraque,
sicut in apostemate, &c. De mala comple-
xione loquitur Gal. 2. de compos. med. per
loc. cap. 1. ibi, Vehementissimi dolores fiunt
iuxta caliditatem & frigiditatem, moderati
iuxta siccitatem, ad humiditatem nullus cō-
sequitur dolor, &c. Gal. aphor. 4. comment.
70, Fiunt enim dolores capitis etiam ex ca-
lore solo, nonnunquam ex flava bile, quæ uel
in capite uel in uentriculo continetur, ut ex
abundantia humorum caput opprimente: uel
propter aliquam loci obstructionem, uel à spi-
ritu flatuoso, habente in parte ipsa genera-
tione. De causa per consensum loquitur Auic.
prima tertij, cap. 35. ibi, Et multotiens con-
tingit à morbis antecedentibus, qui substan-
tiam cerebri, & eius uelamina tam intrinse-
ca quàm extrinseca debilitarunt. Fit etiam
ex uaporibus stomachi ad caput elatis, &c.
Alexand. lib. 1. de dol. cap. Dolor, inquit, ca-
pitis non semper primario affectu efficitur,
sed per consensum nonnunquam alterius mē-

bri: unde si ad nimium iecinoris calorem dolores capitis oriantur, multo uehementiori cruciatu laborantem adfligunt, ob fumos eiusdem uisceris caput petentes, &c.

De signis cephalææ.

Primum si dolor fuerit à causa procatartica, cognoscitur ex affectu derelicto. Si dolor fuerit per essentiam in capite, dolor continuo agrum lader, læsionemque in aliqua cerebri parte comprehendemus, & cum reliquis cerebri operationibus manifesta læsio apparebit, sicuti in sensu uisus uel alijs sensibus. Quod si dolor capitis per consensum fieri contigerit, tunc per consentientis membri læsionem magis uel minus intensam, dolor magis ac minus crescet minuèturque. Cognoscitur etiam à primordio ipsius læsionis: nam quod primum læditur, alteri læsionem infert. At si ab intemperie fiat dolor, citra humorum complexum, tunc manifestus calor uel frigus absque ulla in capite grauitate sentietur. Quod si ab intemperie humoralis, tunc uniuscuiusque humoris aderunt particularia signa:

nam sanguinis sunt septem, rubedo, tensio, grauitas, tactus calidus, pulsus magnus, somnus ob uaporum copiam, urina crassa, rubea. Bilis signa sunt sex, dolor acutus, mordicans, punctorius in anteriori & dextra capitis parte, uigilia, coloris flauities, parua grauitas, tactus acris, calidus, pulsus uelox, & sitis. Pituita signa sunt quatuor, color albus, dolor obtusus & perseuerans in occipite, somnus profundus & pigritia. Melancholia signa sunt, liuor, in facie nigrities, sensuum corruptio, dolor obtusus perseuerans in parte occipitis sinistra. Flatus signa sunt loci extensio, nulla adest grauitas: interdum fit cum sonitu & tinnitu, permutatur dolor de loco ad locum, & multiplicato uapore maior fit in capite pulsus: imaginatio interdum corrumpitur, & sequitur uertigo. Dolorem qui fit a soluta continuitate, ipsa solutio indicat, quae nisi extrinsecus appareat, per puris ac sanguinis excretionem cognoscitur. Si fiat dolor ab aliquo abscessu, aderunt signa lethargi uel phrenitidis: si fiat a febre, tunc ipsa crescere dolor augebitur, & declinate minuetur.

Loci consentientes de signis cephalæ.

Gal. 2. de comp. med. per loc. cap. 2, *Habet hæc affectio interdum continuos dolores, interdum exacerbationes & interualla, sine ordinata siue inordinata: intermittunt exacerbationes ueluti in comitiali morbo correptis. Dolores igitur cum grauitate humorum multitudinem significari: cum mordacitate, aut humorum uel uaporum acredinem: cum pulsu, inflammationem: cum tensione citra grauitatem ac pulsum, tenuis ac uentosi flatus multitudinem demonstrant: si uerò cum pulsu, membranosi corporis inflammationem: si uerò cum grauitate distentio fiat, humorum multitudinem intra membranas contentam. Et eodem in lib. cap. 1, Qui ex ardore caput dolent, cutis tactus aridior, oculosque rubros habent, frigidis que tum perfusionibus, tum illinitionibus gaudent. Quòd si ob biliosum humorem caput doleat, accedit maior morbus, & faciei pallor, & aliquando oris amaritudo contingere solet. Porro signa dolentium caput ob frigiditatem contraria sunt ex, quæ*

ex ardore oriuntur, &c. Lege de his Paulum
lib. 3. cap. 5.

Obiectio.

Ob quam rationem hac affectio dolores
per internalla habet uelut morbus comitialis?

Responsio.

Hac ratione, quia hoc contingere potest
ex specifica proprietate in humoribus inuen-
ta: nam ex bile extra uasa mota fit dolor ter-
tianarius, & in uenis contenta mota & al-
terata prouenit dolor continuus: & hoc cō-
tingit ex specificabilis proprietate, uel hoc
euenit ob quantitatem auctam aut diminutā
humorum, uel propter eorum crassitiem, re-
mitatem, fluxibilitatem & uiscositatem. Et
hoc habetur ex Gal. 2. de diff. feb. de febre sex-
tana, & ab Auic. prima quarti, tra. 4. ca. de
feb. apostematum, &c. Auic. prima quarti de
feb. Ephemeris causa primitiua cognoscitur
per eius presentiam & ablationem, & ab
effectu derelicto, &c. Et prima tertij, cap. de
signis ostēdentibus, species soda, habet omnia
quæ antè recitata sunt, &c. Lege etiam Aët.
ser. 6 cap. 48.

De cura cephalæ ab humore calido.

Eliciuntur ex Gal. quinque ad curandum intentiones: prima est uniuersalis euacuatio, quum à multitudine dolor fiat: secunda est reuulsio: tertia malæ qualitatis repulsio: quarta capitis particularis purgatio: quinta capitis roboratio, & si quid derelictum est, resolutio, &c. Vniuersalis euacuatio fit per sectionem uenæ: primò per saphenam, si in causa sint hæmorrhoides, uel menstrua retenta: uel per uenam basilicam uel communem, si adhuc sanguis abundare uideatur: deinde per cephalicam: postremò per uenas frontis, aut eius loco applicentur naribus sanguisugæ. Reuulsio fit pluribus modis, sicut per enematæ, per extremarum partium frictiones, ligaturas, per sanguinis detractionem, per cucurbitulas, per hirundines ad hæmorrhoidas & ad nares applicitas, per suppositoria. Nā interdum sub reuulsione etiam derivatio cōuenit, quæ ad uicina loca tantum fieri solet: unde per ἐπὶ πύλας id est, per nares euacuantiæ, ut sternutatoria, gargarismata, masticatoria,

aurifusoria & similia fiunt. Repulsio mala qualitaris fit dupliciter, per exteriora, & per interiora. Exteriora fiunt per repellētia episthemata, inunctiones, cerata, cataplasmata, odoramenta, suffumigia, instillationes, lorio- nes, & similia: ita tamen ut repellentia sint adstringentia & frigefaciētia primū, deinde repulsoria, quibus addendum est aliquid ex mitigatorijs ac concoctorijs medicamentis: deinceps ad discussoria paulatim acceden- dum, detractis omnino repellentibus. Interio- ra malam qualitatem remouentia sunt syru- pi, Zulapia siue Iuleb, eclegmata, apozemata siue decocta, pulueres, &c. Syrupi sunt, aceto- sus simplex, uiolaceus de endiuia, rosaceus de succo acetosæ, de agresta, de granatis, de li- monibus, de acetositate citri, &c. Zulapia uaria sunt, ut uiolacea, nenupharina. Fiūt etiā cum ptisana & uino granatorum, cydoniorū malorum, uel cum Iuleb rosaceo, aqua hor- dei, & aqua coriandrorum præparatorum, &c. Electuaria sunt diarrhodon Abb. Tria- sandali, conserua uiolacea, rosacea, confectio de prunismes. Manuscripti, diacoralis, &c.

Decocta sunt ex rebus frigidis ad caput spectantibus, ut sunt viola, nenuphar, rosa, salix, cucurbita, mala granata, lactuca, sandali, myrthus, plātago, semperuiua, portulaca, & similia. Capitis purgatio multifariam fieri potest, siue per simplicia medicamina, uel per composita. Simplicia sunt rheubarbarum, aloes, agaricus, succus rosarum, diagridium, myrobalani citrini, cassia, siliqua, succus uiolarum, manna, succus iridis, tamarindi, succus fumi terræ, & similia. Composita sunt uaria, sicuti electuaria, confectiones, pilulæ, trochisci, potiones, boli, pulueres. Electuaria sunt electuarium de succo rosarum Nic. electuarium ros. Mes. Diaprunis sol. Nic. Diaphenicon Mes. electuariū de psyllo sol. Mes. Cassia & manna cum rheubarbaro, cum agarico, cum scamonio præparato. Confectiones sunt, cydoniata solutiua, nebula solutiua, & mille confectiones quæ parari possunt, sicuti passulæ cum diagridio, &c. Pilulæ sunt aureæ Nic. de hiera simplici Gal. pilulæ lucis Mes. de hiera cōposita Nic. De Rheubarbaro Mes. Aggregatiua Mes. aleophangina Mes. M. i.

Trochisci sunt, Trochiscus de diarrhodon, de rheubarbaro, de camphora. addendo aliquid rheubarbari uel diagridij. Portiones fiunt ex electuarijs ac decoctis suprascriptis: similiter boli cum electuarijs & saccharo. Pulveres sunt ex rheubarbaro, aloë, agarico, cucumere sylvestri, &c. Apis roboratio perficitur cum stypticis infrigidantibus ac constringentibus, ut oleo rosaceo, myrthino, &c. Residui resolutio fiet cum resoluentibus modicè calefacientibus, sicut sunt semina Altheæ, fœnugraci, lini, meliloti cum camomilla, anetho: aut cum oleis camomillæ, anethi, &c. uel cū pulmone agni uel arietis catulorum, & pullorum columbarum, &c.

Loci consentientes de cura cephalææ.

Auic. prima tertij, tra. 4. cap. 36. Si causa est sanguis, phlebotoma: & si tu in principio administraſti id quod repellit, demum utere embrocis ex aquis, in quibus resoluentia sint modicè calefacientia cum percussione modica & stipticitate, ut flos squinanti, ca-

momilla, &c. Deinde euacua cum eis quæ
 eueniunt: & scias, quòd quum purgasti, su-
 perest ut confortes cerebrum & eius uelami-
 na, &c. Ex quibus uerbis omnes intentiones
 à me iam dictæ eliciuntur. Præterea Paulus
 Aeg. lib. 3. cap. 5. & Aet. ser. 6. cap. 50. &
 Mes. cap. de soda, & Arcul. de cura cepha-
 læ: similiter Michael Sauonarola de cura
 soda cali. Gerardus de solo, Gordonius ac
 ipse Marcus Catinarius omnes in has inten-
 tiones curandi concurrunt. De reuulsione
 loquitur Gal. 2. de compos. med. per loc. ca.
 2. inquit, Reuulsio itaque fit per clysteres,
 per extremitatum ligaturas, & per plures
 infernarum partium frictiones: interdum per
 sanguinis ex cubito detractionem, & ex na-
 ribus, aperta uena & apophlegmatismis &
 medicamentis quæ naribus induntur, &c. Si-
 militer Hippo. 3. de morbis circa principium,
 Si dolor capitis permanet, ut sternutet cura-
 ro, lenibusque ac odoratis caput & uentre
 purgato, prisanae succum sorbero, uinum ne
 potato, &c. De repulsione male qualitatatis
 loquitur etiam Gal. loco citato, ibi, Repellis

M. ij.

oleum rosaceum omphacinum per se, & cum
 aceto ex capitibus papaueris, &c. Et. 2. de
 compos. med. per loc. cap. 1. Quod si in capi-
 te ipsa affectio calida existat, in primis re-
 pellendum cum refrigerantibus, deinde ex
 mitigatoriis ac concoctoriis aliquid admis-
 cere ad repulsoria oportet, deinde discussoria
 adhibenda, ita ut paulatim repulsoria phar-
 maca detrahantur. De interioribus exhiben-
 dis consule neotericos authores. De purga-
 tione capitis retigit Gal. 2. de compos. med.
 per loc. cap. 2. ibi, Dabimus hieram exacu-
 tam, &c. Quomodo uero hiera exacuatur,
 docuit Galen. eodem in lib. cap. de Alopecia,
 dicens se ueratrum nigrum addere, si atra-
 bilis sit expurganda, aut scamonium, si ama-
 ra bilis sit euacuanda. Vnde Græcè habe-
 tur τὸν ἰεγὲν ὀζύραντες δοτέον. Et 2. de
 composit. medicam. per loc. cap. 1. Euacuan-
 dus est biliosus humor per absinthij cremo-
 rem, aut per aloem, & per ipsam picram
 antidotum, aut modica addita scamonia,
 aut per catapotia ex aloe confecta, &c.
 De capitis roboratione & residui resolu-

tione satis habes ex Avicen. Mes. & Almans. capite de soda calida. Gal. cap. cit. Discutit oleum dulcissimum calidum & magis inueteratum, itēque Sycionium. Nota non dici Sycionium $\Sigma\pi\omicron\sigma\upsilon\kappa\iota\omicron\nu$ id est, à cucumere, ut nonnulli putant, sed potius à Sy-
 tionia patria ubi parabatur: nam Dioscor. 1. lib. de oleo Sycionio loquens nullam de cucumere mentionem facit, & hoc prius annotavit Cornarius in suis annotationibus. Discutiunt etiam inquit Arcul. pulmo arietis, agni, item catuli lactentes, ac pulli columbarum, &c.

Observationes de venæ sectione.

Avic. prima tertij, de cura soda calidæ absque materia, in sectione uenæ primū caue, ne uenter sit stypticus: ibi tu ad curandas agnitudines capitis lenificatione multū naturæ indiges, &c. Similiter Razes lib. diuis. cap. 3. asserit. Secundo caue ne adeo uehemens sit dolor, ut curandi ordinem permuet: & hoc uoluit Mes. & Auicē. quarta primi, cap. 3. ibi, Quūque ad diuersum tra-
 M. ij.

here uolueris, dolorem illius membri prius sedare. Gal. meth. 12. cap. 1. Qui dolori neglecta curatione tantum est intentus, non id ex topicis artis ratione, sed in aegri gratiam facit: at si ex dolore uires resoluantur, atque ex eo periculum impender, & mitigari prius dolor & uires roborari debent. Similis sensus est eodem in lib. cap. 7.

Observationes de repulsione.

Gal. 2. de compos. med. per loc. cap. 1. Aptissimus locus est ad applicanda remedia iuxta capitis sinciput: siquidem ob laxitatem coarticulationis iuxta coronalem suturam, & ob ossium tenuitatem & raritatem facile, tum caliditatem cum frigiditatem omniumque adhibeatur, intro distribuit.

Auicenn. de uniuers. cur. sod. Alienanda sunt haec frigida à posteriori cerebro, quod est origo neruorum. Gale. loco citato, A' papaueris succo & mandragoræ est abstinendum: non enim citra damnum refrigerant, uitandâque quæ cum refrigeratione manifesta adstringunt, ut solani succus, mali punici, co-

ronci, & mespili: & si quando necessitas ex-
postulat, parum ex eis admiscere oportet.

Mesues cap. de cur. sod. cal. Quum topi-
pici usus fueris, fac ne priuentur his tribus
uirtutibus: prima, quòd in gradu alterationis
competant: secunda, quòd membri uirtutem
coadunent, ne superfluitates caput recipiat:
tertia, quòd sua proprietate caput roborent,
&c. rursus idem Mesues, Adhibenda sunt
alterantia frigida, praterquam in quatuor
casibus. Primò, quum soda calida sit in feбри-
bus materialibus: nam sodam multiplicat u-
sus epithematum, uapores exire non permit-
tentium, ut testatur Auic. prima tertij, cap.
ii. Secundò, quum soda sit propter uapores
acutos, qui ex totius corporis consensu, uel
partis, ad caput perueniunt, etiam caput eos
recipit: nam diuersio ad oppositum ex una
parte competit, & ex alia receptorum reso-
lutio, non autem alteratio. Tertiò, quum so-
da sit à multitudine materiae, & tunc eua-
cuatio sedat. Quartò, quum sit à multitudi-
ne uaporum, existentium in capite per con-
sensum totius uel partis: tunc resolutio &
M.iiij.

184 DE CONSEN. MEDIC.

particularis euacuatio conuenit, & non alteratio.

Gal. 2. de compos. med. per loc. cap. 1. notat, quod ubi frigidior & crudior fuerit humorum multitudo, tepida applicentur: ubi calidior & biliosior, frigida. Arcul. Præsentente rheumate fomentationes, sternutatoria, & gargarismata, & lotiones pedum & capitis non sunt omnino, nisi post perfectam euacuationem admittenda. Auic. prima tertij, cap. de can. uniuers. cur. Cauendum est in cerebri inflammationibus, ne maturantia adhibeamus, &c.

Observationes de purgatione capitis.

Auic. prima tertij, de euacu. cur. A' facili-
loribus est inchoandum. Similiter Mes. cap.
de sod. cal. Auic. prima quarti, cap. de cura
putridarum in genere, Ad euacuationem præ-
cedat digestio. Et Hippoc. aphor. 1. aphor.
22. Concocta medicari atque mouere, non
cruda, modo non turgeant, &c. De his uide
de purg. sup.

'De cura Cephalææ ex humore
frigido.

Curationis scopi erunt quinque: primus, modus regiminis: secundus, materia preparatio: tertius, humoris preparati euacuatio: quartus, diuersio: quintus, cerebri roboratio ac residui resolutio.

Modus regiminis, si materia sit pituitosa, frigida scilicet & humida, erit circa sex res non naturales calefaciens & exiccans. Materia preparatio fiet, si pituita fuerit crassa ac uiscosa, per incidentia ac attenuantia capiti conferentia, ut est rhodomel, oxymel simplex, compositum & scilliticum, syrupus de duabus radicibus, syrupus de quinque rad. syrupus de stechade, de betonica, cum decoctis incidentibus, ut ex hyssopo, origano, pulegio, salvia, maiorana, betonica, ruta, peonia, satiregia, stechade, sileri montano, ex chamædrio, chamæpithi, castorio, cinnamomo, ligno aloes, laudano, melliloto, calamo aromatico, uerbena, fœniculo, folijs lauri, cum mosco, ambra, nuce myristica, rosmarino, quæ omnia summopere capiti oportuna esse uidentur. Si

uerò materia fuerit tenuis & fluens, calidis
 stypticis, quæ crassiorem materiam reddant,
 utemur, sicuti est mastiche, nux mosch. lignū
 aloës, &c. Posset etiam fieri materiae præpa-
 ratio cum cataplasmate ex rebus prædictis,
 minus calido & frigido, prout expedire ui-
 debitur. Euacuatio fiet, ut supra dictum est,
 per simplicia ac composita pharmaca. Sim-
 plicia sunt, colocynthis, agaricus, aloes, uebu-
 li, sarcacola, turbit, chartamus, esula, polypo-
 dium, hermodactylus, scilla, radices ireos, ci-
 clamen, &c. Composita sunt, cōfectiones, ele-
 ctuaria, pilula & pulueres. Confectiones
 sunt diarob, diaturbit, & mille aliæ, quas per
 te cum melle & saccharo poteris componere.
 Electuaria sunt, diaphinicon Mes. electuariū
 indum Mes. diacartami magist. egetea Mes.
 electuarium elefscoph Mes. diarob cum turbit
 & rheubarbaro & similia. Pilulae sunt cho-
 chia Almans. pilula foetida Mes. de serapino
 Mes. de rheub. Mes. de sarcacola Mes. hiera-
 logodion nic. pilula aggregatiua Mes. sine
 quibus nic. pilula de hiera magna Gal. de
 hiera cum agarico magist. pilula aleophan-

gina Mes. pilula de agarico & de hermodactylis Mes, &c. Pulveres componi possunt ad libitum, sicut pulvis turbit, preparati rheub. agarici, cartami, &c. Diuersio & deriuatio, quæ est altera euacutio, fit per extremarum partium ligaturas, per suppositoria enemata, cucurbitulas, lotiones, frictiones. Deriuatio fit per gargarismata, sternutatoria & masticatoria, caput purgantia. Ligations fient ualidiores quàm in calida cephala. Suppositoria parantur ex specierum hieræ compositæ 3. ij, salis gemmei 3. i. cum melle, quibus addi potest colocynthis, agaricus, fel tauri, stercus muris, euphorbium, esula, diagridium, &c. Enemata parari possunt ex decocto saluæ, stachados, mercurialis, maluæ, furfuris lib. i. cassiæ, hieræ, logodionis añ 3. 5. Rhodomellis, olei communis añ. 3. ij. salis 3. 5. Validiora fiunt cum colocynthide, agarico, centaurio, cartamo, &c. Cucurbitula applicantur cum scarificatione, prout tibi uidebitur. Frictiones fiunt manibus oleis, mantili aspero uel leni, uino albo & decocto asparagorum & herbarum cali-

darum, &c. Gargarismata fiunt cum oxymelle simplici & composito & scillitico, cum decocto origani, hyssopi, cui addi potest, ut sit validius, synapis, piretrum, cortices thuris, ac piper, &c. Sternutatoria cum pipere, condisi, helleboro albo fiunt. Caputpurgia cum nigella per. 24. horas infusa in aceto & exiccata & in pulverem redacta fiunt, aut ex felle taurino aut caprino cum modico castorei & parte una croci, cum aqua maiorana fiat collyriū. Masticatoria fiunt simpliciter cum mastice, addito pipere uel piretro, uel radice capparorū, &c. Capitis roboratio fiet cū calidis stypticis. Residui resolutio fieri potest per linimenta, epithemata, attractiones, sacculos, instillationes, confectiones, & suffumigia, & cerata. Linimenta fiunt ex oleo camomillino, rutaceo, laurino de spica liliorum alborū, de cheiri nardino sansucino, de amygdalis amaris, de croco: quibus addi possunt oleum rosaceum, uiolaceum & similia: uel si calidiora desiderantur, cum oleo de castorio, de euphorbio, de piperibus. Epithemata fiunt ex aquis maiorana, uel oleis, aut ex decocto stecha-

dos, foliorum lauri, camomilla, rosarum cum oleo ad caput spectantibus. Attractio per nares fiet cum aqua maiorana muscho addito uel ambra (quanuis odorifera in mulieribus sint vitanda, ob conuersionem uteri ad superiora) uel cum alijs aquis capitalibus, addendo calamum aromaticum & nucem myristicā. Sacculi fiunt ex camomilla, maiorana, stechade, folijs lauri, pulegio, origano, corticibus cedri, cinnamomo, spica, mace, gallia muschata, &c. Instillationes fiunt ex laudano, storace cal. cum oleo camomillino, rutaceo, &c. Confectiones fiunt ex diambra, diamargaritone, diamuscho dul. confectiones de gētis aromatico ros. moschato electuario regum myrridato theriaca, diacoro, &c. Suffumigia fiunt ex thure, sandaraca, ligno aloes, laudano, muscho, storace, calamite, caryophyllis, &c. Cerata fiunt ex camomilla, maiorana, stechades, rotarum ana. p. i. corticum citri, garyophyllorum, cinnamomi, nucis muscha. ana. p. 5 gallie muschata, laudani parum, cū oleo de spica & resina pini ad libitum fias cerasum, &c.

Loci consentientes de cura cephalæ ab humore frigido.

Gal. 2. de comp. med. per loc. cap. 1. Si viscosus aut crassus humor, aut flatu vaporosus in angustiis meatuum infarcitur, ita ut multo tempore opus sit ad curationem, tunc quæ sic infarcta sunt, attenuare oportet, meatusque dilatare, per quos excernantur, habita providentia, ne quid humoris uel flatu amplius infarciatur, & ad hæc corroborandum est affectum membrum. Ex quibus uerbis curandi intentiones elici possunt. Consule tamen in iis omnes neotericos practitantes. De sex rebus non naturalibus loquitur Paulus lib. 3. cap. 4. ibi, Vinum, inquit, subtilius propinandum, corporis motio adhibenda, item balneum prodest, &c. Quod materiæ preparatio fiat per incidentia ac extenuantia, habes in. 9. aphor. 2. libri: nam in fine commen. Gal. Erit fluidum corpus omnibus refferatis meatibus, humoribus uero incisis, abstersis atque extenuatis, si quis fuerit humor in corpore crassus ac glutinosus. Quod

uerò tales syrupi iam enarrati sint ad pro-
positum, lege ex Mesue, uel ex Gale. 2. de
comp. med. per loc. cap. 1. ubi acetum, mul-
sum in potu aut simplex aut Iulianicum
appellatum ex origano hyssopo commendat.
Auic. prima tertij, de cura sodæ frigida, Et
administrentur subriliatina uel maturatina
& euacuatiua determinata, &c.

De diuersione loquitur Auic. loc. cit. ubi
eam fieri in principio imperat, si humor
in eo fuerit communicans. Quòd uerò hæc tot
modis, quot iam diximus, fiat, expressè habe-
tur ab Arcul. Marco Catinario & ab omni-
bus practicantibus. De roborando capite le-
ge Gal. loco nuper citato. Item Auic. prima
tertij, ubi modos epithematum caputpurgio-
rum oleorum ac herbarum docet: inde enim
omnia ex me dicta intelliges. Auic. de cur.
sodæ frigida. Omnes qui habet sodam ex fri-
gore post purgationem, si ea indigent, iuuant
unctiones, caputpurgia, suctiones nariū, odo-
ramenta, embrocæ & emplastra calefacien-
tia, &c. Habes similia ex Gal. 2. de compos.
med. cap. 2. de cura cephalæ ex Archigene

Et Asclepiade, Et plurimis alijs, ut apople-
gmatismos, sternutatoria, Et amuleta, qua ca-
piti circumponuntur: similiter irrigationes,
masticatoria, pastillos, Et c.

Observationes de regimi- ne in cephalæa.

Auic. prima tertij de uniuer. regimine in
soda, Tu scis quod soda est exemplum reliquis
ægritudinibus in necessitate abscissionis sue
causæ Et oppositione ei cū contrario. Et post
hæc scis, quod ex rebus in rememoratione so-
da iuuamibus est paucitas comestionis, Et
potus propriè uini, Et multitudo somni: ue-
rùm nimia paucitas comestionis in soda ca-
lida nocumentum affert, augmentum in ipsa
faciens. Et in uniuersali can. Et scis, quod
qui conqueritur de ægritudine frigida in ca-
pite, nocetur à uino, Et qui habet ægritudi-
nē in uelaminibus, nocetur ab aqua frigida.

Arcul. Fercula sint facilis concoctionis Et
paucarum superfluitatum: item comedantur
aliqua styptica post cibum, uapores reprimē-
tia, sicut cydoniata cum speciebus, uel pira,

vel fructus styprici . Somnus sit minor quàm
in alijs sodæ speciebus: dormiat leuato capi-
te, loco exercitiij fricationes uicem suppleant,
animi accidentia uitentur excessiua, &c.

Obseruationes de materiæ præparatione.

Marcus Catinarius de cura sodæ phleg-
maticæ, Ab imbecillioribus, inquit, inchoan-
dum ad ualidiora procedendo . Ratio est,
quia ualde extenuantia in principio exhi-
bita magis naturam dilatant, quàm in dige-
rendo adiuuent, &c.

Obseruationes de euacuatione.

Mesues de sod. frig. ab humore melan-
cholico, Tria considerata sunt in euacua-
tione, primum, quòd nō semel, & multam &
subitam faciamus euacuationem, sed per in-
terualla, habentem temperiem, ut natura eua-
cuationem, nō autem euacuatio naturam re-
gulet: nam ex subita ac uiolenta euacuatione
uix natura regulariter operatur, sicut im-
petus flammæ, quæ subito agit in subtile, &

N. i.

prætergreditur crassam. Secundum est, quod euacuatio sit cōmensurata, non excedens mediocritatem, sed sit extensio eius elevationis non recedens à gradu medicinarum incolumium. Tertium est, quod non expolientur solutiva à rebus lenificatiuis & humectantibus, nam hæc operationem beatificant. Itidē asserit Auicen. prima tertiij de can. uniuers. curat. Adde tamen his tu quartum, quoniam quum phlegmagoga indifferenter ab omnibus partibus euacuant, idcirco aliquid quod membrum euacuandum respiciat, his semper addere conuenit, ut uirtus pharmaci ad id tendat, quod euacuare intendis, ut si caput, capitalia, si pectus, pectoralia, &c.

Observationes de topicis applicandis.

Gal 2. de comp. med. per loca, ca. 1, In inueteratis capitis affectionibus ac doloribus ualidis ac frigidis necessario capillos radimus, aut ualde usque ad cutem resecamus. Paulus lib. 3. cap. 4, Topica murentur singula continē, nam uerustate sunt inefficacia. Galen.

2. de cōpos. med. per loc. cap. 2. inquit, quòd in principio morbi à debilioribus est auspicandum, quum statim efficacissima adhiberi non conueniat, ut suprà dictum est.

De Hemicrania.

Ημικρανία siue ἐπεροκρανία est, ubi uel in parte sinistra uel dextra dolor capitis accidit, qui interdum intensiorem, quandoque remissionem infert. Locus doloris interdum extra caluariam percipitur, aliquibus ad capitis usque profunditatem penetrat, quibusdam uerò temporum musculos uehementer infestat, &c.

Loci consentientes de Hemicrania.

Gal. 2. de compos. med. per loc. cap. 3, Hemicrania est affectio dolorosa, circa dimidiã capitis partem, aliquando dextram, aliquando sinistram, quæ iuxta suturã secundum eius longitudinẽ terminatur, & ut plurimùm exacerbatur. Auicẽ. prima tertij, Hemicrania est dolor in una medietate capitis exci- tus, &c. Razes, quem multi sequuntur, nul-

N. 4.

196 DE CONSEN. MEDIC.

lum agit de hemicrania caput, uolens fortasse pharmaca, quæ inueterato capitis dolori medentur, hemicranicis etiam affectionibus auxiliari: sed non mirum, quum nec Apollonius Archigenes, & Asclepiades unâ cū Critone, ut refert Galen. scripserint. De loco affecto loquitur Galen. loc. citat. ibi, Quidam circa temporum musculos dolitant, & pleraque sanè ipsorum pars hoc modo affligitur: quidam uerò dolorem longè ulterius progredientem habent, & quidam adeò uehementer dolent, ut neque manus contactum facile ferant. Aet. ser. 6. cap. 49, Et aliquibus contingit, ut extra caluariam doloris sensum perceptent, quibusdam in capitis profunditatem penetrat, &c. Similiter Paulus lib. 3. cap. 5, Quāquam unum & idem caput de cephalæa & hemicrania ipse faciat.

De causa Hemicraniae.

Causa est plenitudo, uel humorum aut uaporum influxus. Fit nonnunquam etiam hemicrania ab intemperie nuda, absque humorum complexu: saepius tamen fit ex aliarum

corporis partium consensu, & denique ab his omnibus quæ dicta sunt superius de cephalæa.

Loci consentientes de causis Hemicraniæ.

Gal. 2. de compos. med. per loc. cap. 3, Hemicrania fit ex influxu humorum, siue multorum, siue calidorum, siue frigidorum, causam doloris suggerente. Hoc idem asserit Aet. ser. 6. cap. 49. itidem Paulus. Alex. lib. 1. cap. 18, nonnunquam fieri, inquit, ex solo temperamento, sæpius ex consensu aliarum corporis partium, &c. Negat tamen Auic. posse fieri hemicraniam à malitia complexionis singularis, id est, ab intemperie nuda, sed quum nullam adducat euidentem de hac re rationem, plus tribuendum esse Alexandro authoritatis assererem in hac re, quàm Anicenna.

De Hemicraniæ indiciis.

Quauis uberius de indicijs suprà dictum sit, quum de Cephalæa uerba fecimus, nihilominus, ut in summa referam, grauitas mo-

N. iij.

198 DE CONSEN. MEDIC.

lesta, plenitudinem indicat, dolores cum erosione, humorum uel uaporum acrimoniam, dolores cum pulsibus, inflammationem, dolores uerò ad radices oculorum se extendentes, intra caluariam morbum denotant: si uerò circa caluariam doleat, dolores extra sunt. De humorum qualitate sumi potest indicium à inuantibus & nocentibus applicitis, &c.

Loci consentientes de Hemisphericæ indicia.

Aet. ser. 6. cap. 48, Dolores cum gravitate humorum multitudinem indicant, cum mordacitate, humorum uel uaporum acredinem, cum pulsu inflammationem, &c. Et paulò inferius, Dolores quidem in superficie hærentes membranae os caluariæ ambiens affectionem significant: quibus uerò affectio intra caluariam est, dolores usque ad radices oculorum procedunt, &c. Hoc idem asserit Galen. 2. de compos. medic. per loc. cap. 2. & Paulus Aeg. lib. 3. cap. 5. Avicen. prima tertij, cap. 37. Quum fias hemisphæria modò à frigidis, modò à calidis, frigidos esse dices, si cum calefactis

etione quietem inueneris : calidos, si quietem cum in frigidantibus, &c. Vide etiam de his latius Gal. 3. de loc. affect. cap. 9.

De cura Hemicraniae.

Tres sunt in cura hemicraniae intentiones medendi, prima est euacuatio, secunda est reuulsio ac deriuatio, tertia mala qualitatis permutatio. Euacuatio fiet uel pharmaco, uel uena sectione, prout ager magis opus habuerit : & de his superius uberrimè dictum est in capite cephalae. Reuulsio ac deriuatio per eadem perficientur, ut suprà dictum est. Verùm ante accessionis tempus hac perpetranda sunt : iuuat in hoc fricare partem, quæ circa temporum musculum est, tam diu, ut excalefiat, præsertim si à frigida causa dolor proueniat. Mala intemperies, siue humorū qualitas per sui contrarium permutabitur, ut calida cum frigidis, frigida cum calefacientibus : utrisque tamē semper ea addenda sunt, quæ adstringentem facultatem habent, eo tamen seruato, quòd in uehementi caliditate modicè refrigeres, in frigida mul-

N.iiij.

tum excalefacias, dolor uerò sine humorũ cõ-
plexu per alterãtia tantũ extrinsecus ad-
hibita, curabitur.

Loci consentientes de cu- ra Hemicrania.

Galen. 2. de comp. medic. per loc. cap. 3,
Vbi quis hemicraniam curare aggreditur,
prius quali purgatione, aut uenæ sectione æ-
ger opus habeat, consideret, atque ita ad ca-
pitis auxilia progrediendo, tum per digitos
sua manus, tum per linteum dimidiam fron-
tis partem, & eam maximè quæ circa tempo-
rum musculus est confricando excalefaciat:
atque id ante accessionis tempus faciendum
est, post exacerbationem uerò pharmacis he-
micranicis utendum. Quòd si multa calidi-
tas in doloribus percipiatur, ijs quæ modicè
refrigerant: citra uerò hanc, ijs quæ multum
excalefaciunt: uerũ utrisque ex his quæ fir-
mitatem ac robur addunt, misceantur quæ
adstringentem habeant facultatem, &c.

Auicē. prima tertij, cap. 38, Eius cura est
phlebotomia, & propria uenæ frõtis & tem

poris, & solutio, & chysteria, & attractio, & totum cum eo quod conuenit ipsi, ut dictum est. Quum periodus adest, oportet ut purgetur corpus ante ipsum, & permutetur cōplexio post purgationem. Quòd si materia fuerit calida, pones narcotica super tempora, &c. Et paulò infrà, A Egritudo, cuius tempus est prolongatum, est frigida secundum dispositionem, & indiget resolutione, & quod calefaciat cum fortitudine, &c. Alex. lib. I. cap. 8, Si hemicrania citra materiam ab intemperie fiat, solis extrinsecis utendum est praesidijs. Si uerò cū materia, considerandum est, quisnam humorum adauctus redundet: quòd si sanguis modum excesserit, sectione uenæ utendum, si alius humor sortito medicamine statim euacuandus est, &c.

De cura cephalææ & hemicranie per consensum.

Si ab uniuerso corpore caput afficiatur, quatuor erunt curandi intentiones. Prima, euacuatio aut purgatio: secunda, reuulsio & mala qualitatis impressæ repulsio: tertia erit

eius, si quid adsit in capite, cōcoctio: quarta erit partis affecta roboratio ac discussio. Si uerò uni alicui parti condoleat, binæ tantum erunt intentiones, altera scilicet ad mēbrum, ex quo humores uel uapores mittuntur, altera ad mēbrū in quo recipiuntur. Euacuatio fiet, si multitudo humorum in uenis fuerit, per sectionē uenæ: si uerò qualitate tantum humores inualeant, purgante pharmaco utemur, &c. Renulsio fiet in partem contrariam reuellendo. Repulsio malæ qualitatis impressa fiet per sorbitiones aut irrigationes moderatè refrigerantes. Concoctio eius quod capiti impactū est, fiet per attenuantia & incidentia, ut dictum est supra. Roboratio fiet etiam per eadem, ut supra dictum est. Quod uerò attenuatum est & incisum, tunc discutiendum erit. Si uerò una pars mandet, & altera suscipiat, quod altera non trāsmittat, stypticis refrigerantibus procurandū, & quod caput ne recipiat, ijs quæ firmitatē ac robur induunt, utendum erit. Quot modis autem aliquid per consensum fiat, lege fusius ex Auic. secunda primi, cap. de complendis dispositionibus, &c.

Loci consentientes de cura Cephalææ & Hemicranix.

Gal. 2. de compos. medic. per loc. cap. 1, Si ab uniuerso corpore caput afficiatur, prospiciendum intemperiei & materie prædominanti, instando, easque urgendo: & si multitudo humorum circa uenas fuerit, uenâ secabimus, si qualitas magis inualuerit, purgare pharmaco utemur: quòd si uni alicui parvi condoleat, existente calida intemperie, panem ex diluto uino dabimus, exhibendo etiam sorbitiones ex alica, & foris irrigationes moderatè refrigerantes, & firmitatē addētes, ut dictum est, &c. Et paulò superius dixerat, Si aliunde humor uel uapor deriuat, influentem in primis repellere necessariū est, in pactūque cōcoquere & attenuare, idque ipsum discutere, & circa partem affectam firmitatem inducere, ut ne quid influens amplius suscipiat. De reuulsione loquitur Hippoc. aphor. 5. aphor. 68. ibi, Dolenti partem capitis posteriorem in fronte uena incisa prodest. De coctione, Gal. 2. de compos. med. per loc.

cap. 1, ubi inquit, Si uerò ob crassos & uiscosos humores in stomacho cōtentos caput doleat, hos extirpabimus, acetum mulsum exhibendo, aut simplex, aut Iulianicū appellatum ex hyssopo & origano potionibus, &c. Quòd uerò membrum ne transmittat, iubet Razes buccellas panis in succo granati, aut uinæ acerbæ, aut horum similium exhiberi: qua de re frigidis stypticks opus est in his uti, &c.

De his quæ lædunt caput.

Galen. 2. de compos. medic. per loc. cap. 1. iuxta finem, Viticis semen, absinthij succus, lac in potu, glandes quercinæ, oliuæ nigrae, eruū: hoc enim articulos dissoluit. Offendūt etiam caput myrrha, thus, hederæ cacumina. Perturbant etiam mentem lentisci fructus, crocus, peucedanū, cyclaminus sicca cū uino potata, styrax. Medicus potus tristitiā discutit, multius autem turbulentos somnos efficit, &c. Dioscor. Lædunt præter hæc, palma, arbutus, ferula, meu, mandragora, uinum gypsatum, &c. Auicē. præter hæc damnat lac, allium, cepas, & omnia acrumina. Et pri-

ma tertij, de ser. uniuers. sod. omnia aromata
sive calida sive frigida. Item dānat carnem
uaccinam, & reliquas carnes crassas, fabas,
auellanas, &c.

De prognosticis cephalæ & Hemicranie.

Hippoc. aphor. 6. aphor. 10, Caput dolēt
& circundolenti pus, uel aqua, uel sanguis
effluens per nares aut os aut aures, morbum
soluit. B. Intellige, si dolor ab inflammatio-
ne, aut ab humorum multitudine fiat, alio-
qui si à flatuoso spiritu, aut ab intemperie
contigerit, non per hos modos sanaretur, ut
Gal. in comment. Et aphor. 3. aphor. 13, Si
æstas sicca fuerit & aquilonia, autumnus ue-
rò pluuiosus & australis, dolores capitis ad
hyemem fiunt. Hoc idem etiam adserit Auic.
prima tertij, cap. de uniuers. sermone soda. Et
aphor. 4. aphor. 70, Quibus urine perturba-
te, quales sunt iumentorum, ijs dolor capitis
uel adest uel aderit. Ba. Nota ex Galeni com-
ment. quòd quedam urine longo tempore
manent perturbate, quedam citò sedimen-

crassum habent, & citò morbum finiri deno-
rant: quæ uerò non resident, si uires adsint,
longum fore morbum prænunciant, si imbe-
cilles, ægri mortem prædicunt. Auic. similiter
de his pertractat, de signis nunciariis soda
cap. 8. ibi, Urina similis asinorum urinis, si-
gnificat, quòd soda fuit, aut fit, aut erit, &
similiter rubedo urinæ, & subtilitas eius in
febris, & hora crisis significant permuta-
tionem ad caput, &c. Hippoc. aphor. 6.
aphor. 51, Quicumque sani dolore capitis re-
pentè capiuntur, & statim muti fiunt & ster-
tunt, in septem diebus pereunt, nisi febris ap-
prehēderit, &c. Et 3. prognost. cap. 7, Capi-
tis dolor uehemens & cōtinuus cum febre, si-
quidē ex indicijs extiterit exitiosus, lethalis
admodum est, &c. Hoc idem etiam habet de
coactis prænotionibus, & plura multa. Et 3.
prognost. cap. 12, Si quis per febrem nō exi-
tiosam dixerit caput dolere, aut etiam tene-
bricosum quid ob oculos obuersari, si uentri-
euli dolor in eo extiterit, biliosa uomitio ade-
rit, &c. Et post hæc tres capitis dolorum dif-
ferentias assignat, ibi, Si quibus horum cœpit

dolor, &c. lege fusius, & plura inuenies ad hanc rem utilia. Arcul. Dolor capitis continuus, prolongatus, frequenter ad cerebri abscessum, aut cecitatem agrum perducit. Itē, Cephalalgia in febribus continuis, quæ non inclinante febre remittitur, phrenitidem pronunciat. Hippoc. 3. de morbis circa principiū, Quum grauis capitis dolor repentē per exordia matum facit, præsertim cum temulentia, hic in septē diebus perit. Habes etiam plurima prognostica ex prædictione secūda ipsius Hippocratis: quanquam esse Hippocratis librum falsò ascribant nonnulli, &c.

Authores erronei dissentientes
circa dolorem capitis.

- 1 Adserere, cephalæam à cephalalgia non differre.
- 2 Adserere, alterationem esse solam tantummodo causam doloris, cum Auerrhoe.
- 3 Adserere, humidum quatenus humidum nullo modo efficere dolorem.
- 4 Adserere, solutionem continui esse solam tantummodo causam doloris.

5 Adserere, quòd tenues urinæ dolores capitis significant.

6 Adserere, sectionem uenæ non in omni capitis dolore conuenire.

7 Adserere, reuulsionum modos esse sextāsum, & non plures.

Confutatio dissentientium circa dolorem capitis.

Ad primum: Gal. 3. de loc. aff. cap. 9, Constat quòd sicut in cephalalgia, ita & in cephalæa caput facillimè afficitur, arque hoc est ipsis commune: uerùm per cephalæam affectæ partes multò debiliores quàm in cephalalgia redduntur. Igitur intensè differunt.

Ad secundum: Gal. 2. de comp. med. per loc. cap. 1, Dictum est, ob dissolutionem continuitatis simularium partium dolorè oboriri: dissoluunt enim erodentia, disseccantia, distendentia, & uehementer calefacientia & refrigerantia, &c. Si igitur dissolutio continuitatis causa est doloris, non ergo sola tantummodo alteratio, &c.

Ad tertium: Gal. in arte med. cap. 80, Al-

teratur substantia à caliditate, frigiditate, humiditate, siccitate. Itidem adserit secundo de uic. in morbis ac. comment. 1, Igitur humiditas alterando efficiet dolorem, quod intelligendum est, si non per se, saltem hoc efficere per accidens.

Ad quartum: Auic. prima tertij, de uniuersis. sod. Causa doloris aut est mala complexio, aut solutio continui, aut utraque, sicut in apostemate. Itidem ait Gal. 12. meth. cap. 7, Necesse est, ut affectus, qui dolorem excitat, uel diuisio sit, uel alteratio, &c. Itidem in art. med. cap. 80, Igitur non sola solutio continui est causa tantummodo doloris, sed etiā alteratio.

Ad quintum responder Gal. aphor. 4. comment. 70. esse falsum, quòd urinæ tennes sint κεφαλιχικά, id est, dolorem capitis significantes, &c.

Ad sextum: Hippoc. aphor. 5. aphor. 68, Dolenti partem capitis posteriorem in fronte recta uena incisa prodest: qua de re si non ratione euacuationis, ratione tamē auersionis, ne aliquis abscessus fiat, semper conueniet.

O. i.

210 DE CONSEN. MEDIC.

Ad septimum: Gal. 5. meth. cap. 3, Reversio
in his quæ supra sunt omnibus, deorsum sem-
per agitur, sursum in ijs quæ sunt infra. Præ-
terea à dextris ad sinistra, sicuti ab ijs rur-
sus ad illa, similiter ex ijs quæ intus sunt ad
ea quæ foris habentur: & sic sunt sex modi.
Sed hic Gal. reticet modum de antè & retrò,
quem aphor. 5. comment. 68. recitauerat, &
sic sunt octo.

De Phrenitidis descriptione.

Phrenitis duplex est, uera & notha. Vera
est inflammatio membranarum cerebri, cum
febre acuta, delirium & mentis percussione
inducens. Mendosa, quæ paraphrenitis dici-
tur, est non inflammatio cerebri uera, à con-
sensu totius uel alicuius partis dependens.
Phrenitidis tres sunt differentia, una, qua læ-
ditur cogitatio, & seruatur ratio & memo-
ria: secunda, in qua solum læditur ratio, ser-
uata imaginatione & memoria: tertia, in
qua læditur memoria, ratione & imagina-
tione seruata. Quarta etiam addi potest, in
qua nihil horum seruatur. Si igitur imagina-

sio leditur, tunc pars sincipitis laesa est: si memoria, pars occipitis: si ratio, medius uentriculus, &c.

Loci consentientes de Phrenitide & eius diff.

Gal. lib. finit. med. Phrenitis est mentis delirium, cum febre acuta, ac floccorum collectu & mentis emotione. Paulus lib. 3. cap. 6, ἡ φρενίτις φλεγμονὴ τῆς μνώγων ἐστίν. Auic. prima tertij, tra. 3. cap. 1, Charabitus, id est, phrenitis est apostema calidum, in uelamine cerebri, subtili ac crasso, absque corpore cerebri, licet quandoq; cerebro accidat. Vocatur etiam ab ipso sirsen calidum. Quod uerò fiat cum acuta febre, lege Hippoc. lib. 3. in epidemicis morbis, ibi, φρενιτίζειν Græci dicunt, quī cum febre acuta desipiunt: μαινέσθαι uerò, qui citra febrem insaniunt. Hoc idem sentit Gal. 5. de sympt. cau. ubi inquit, delirium esse motum principis facultatis deprauatum à prauis succis, siue à cerebri intemperie ortum habens: cui si febris accesserit, phrenitis uocatur, si citra febrem, mania, &c. Quod uerò

O. ij.

tres sint uel quatuor phrenitidis differentiae, innuit Gal. 4. de loc. aff. cap. 2. ubi inquit, Tres sunt differentiae, duae quidem simplices, ex quibus tertia componitur. Prima quaecunque oculis offeruntur, quantum ad sensitivam notitiam pertinet, rectè iudicat, cogitando uerò à naturali iudicio aberrat. Secunda rectè cogitat, sed à sensibus difformiter mouetur. Tertia, quae simul & sensus & cogitationis uitio laborat. De memoria amissa in hoc casu habes ex Galeno exemplum de quodam, qui cùm matellam petiuisset, meiere tamen neglexerit, aut quum lotium emisisset, matellam prodere non meminerit, &c. Quod uerò quarta species siue differentia addi possit, habes ex Auicenna capite de signis charabiti. De his etiam mentionem facit Aet. ser. 6. cap. 2. ibi, Proinde anteriore cerebri parte laesa, imaginatio solum peruertitur, &c.

De causis phrenitidis.

Causarum aliquae antecedentes, aliquae coniunctae. Antecedentes sunt, succi calidi, ue-

luti sanguis & utraque bilis, in cerebri membran. is penetrantes. Coniunctæ sunt ijdem & succi inflammationem ad actum deducentes. Paraphrenitis uerò fit à uaporibus calidis & mordacibus, à toto uelut in febre acuta ad caput elatis. Interdum fit etiam à simplici & nuda alteratione, interdum affecto diaphragmate, uel alia quapiam corporis parte. Verùm ea quæ à septo transuerso prouenit, adeò similis ueræ phrenitidi existit, ut quis facile in hoc decipi possit, &c.

Loci consentientes de causis phrenitidis.

Gal. 5. de sympt. cau. cap. ult. Phrenitis non solum ob calidos succos, uel calidiorem cerebri temperaturam accidit, sed quum phlegmonen in cerebro, uel in ipsius membran. is succi pariunt, &c. Paulus lib. 3. cap. 6, Causa morbi est sanguis exuperans, uel biliosus humor, interdum flaua bilis adeò perusta, ut in nigram degenerauerit, quæ etiam grauissimā phrenitidem contrahit, &c. Gal. 5. de loc. aff. cap. 4, Atque delirare etiam solent non-
O. ij.

214 DE CONSEN. MEDIC.

nulli ob uitium, quod in ore uentriculi consistit, & febribus ardentibus, & pleuritide, & peripneumonia: sed quæ ob septi transuersi accidunt deliria, non multum distant à phrenitide.

De Phrenitidis indiciis.

Quum tria sint phrenitidis indicia, præcedentia scilicet, demonstratiua ac rememoratiua, de præcedentibus ac demonstratinis hic tantum mentionem facimus. Signa præcedentia sunt, uigiliæ prolixæ, somnus turbulētus, obliuio agrestis, dolor capitis, promptitudo ad iram & odium, aluus adstringitur, urinæ sunt tenues, biliosum humorem ad superiora petentem demonstrantes. Signa demonstratiua sunt sex, ut febris continua conclusa, magna capitis & oculorum grauitas, uehemens in facie & oculis rubor, dolor capitis, horror luminis, & pulsus frequentia cū duritie. Signa inter ueram & spuriam interstinguentia sunt, ut si quid ex dictis sex defecerit, non amplius sit uera, sed spuria. Præterea si ab altera corporis parte, uel à toto,

ut in febris, fieret, tunc mendosa est: nam febre curata etiam ipsa curatur. Præterea mendosa statim fieri solet, uera autem paulatim accedit. Signa causarum sunt, nam sanguine peccante, oculorum aderit rubor, uenæ sanguine tumefactæ, risus, motus morbi uniformis (uniformiter moueri inquam, quum nec de tertio in tertium, nec de quarto in quartum accessionem habet) sanguis destillat è naribus, somnus longus, imaginationes rubeæ. Signa bilis sunt audacia, temeritas, oculorum nultusque flauities, uigilia multæ, linguæ ariditas: qui uerò tam immaniter seuiunt, ut coerceri nequeant, ijs ab atra bili phrenitis procedit. De signis quæ affectam particulam demonstrant superius dictum est. Signa inflammationis in cerebro, aut in eius membranis, sumuntur ex dolorum ac oculorum affectionibus: nam maior est dolor, quum in membranis inflammatio existit, quàm in cerebro, &c.

Loci consentientes de signis
Phrenitidis.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 4. de omnibus his si-
O. iij.

gnis mentionem facit, ibi, Interdum uigiliae praecedunt, & somnus manifestis imaginibus turbatus, ita ut clament & exiliam: interdum adeo agrestis obliuio, ut ne meiere, sed nec matellam prodere meminerint, &c. Lege fusius, & inuenies multa à me pridem recitata. Leges etiam in hoc capite differentiam inter ueram & mendosam phrenitidem.

De signis sex demonstratiuis loquitur Razes. 9. Almans. ibi, Quum aliquem febris conclusa continua inuaserit, cum forti capitis & oculorum grauedine, & in facie atque in oculis uehemens fuerit rubedo, & capitis dolor, & horror luminis fuerit, & in pulsu uelocitas, & frequentia superfluitas, sunt certissima phrenitidis indicia. Quod si lingua fuerit nigra, uel citrina, & permisceatur intellectus, & multum fuerit alienatus, & multum uigilauerit, iam phrenitis perfecta est, &c. Sed Gal. 1. prorrh. comment. 4. à principio usque ad finem methodum inueniendi phrenitidis indicia docet, ubi quae propria, quae in separabilia esse signa dicantur, facile intelliges. De paraphrenitide loquitur Pau-

lus lib. 3. cap. 6. ibi, Quæ consensu stomachi
gignitur, non est phrenitis, sed hoc solum pu-
ta delirium. Facit etiam mentionem de signis
causarum, ibi, Quibus sanguineus humor mor-
bum facit, ij cum risu insaniunt: quibus flaua
bilis, ferociter, quibus atra, tam immaniter
sæuiunt, ut coerceri nequeant, &c.

De uera ac mendosa phrenitide loquitur
etiam Cornel. Cels. lib. 3. cap. 18. ibi, Phrenitis
tum demum est, quum continua dementia esse
incipit: sed perfecta est, ubi mens imaginibus
addicta est, &c. Idem Gal. aphor. 7. com-
ment. 14, Desipientia agnoscitur loquentibus
agentibusue nihil consentaneum rationi, &c.
lege etiam de his Hippoc. 3. de morbis circa
principium, &c.

De cura ipsius phrenitidis.

Considerandum in primis, num facta uel
fienda sit inflammatio: quod si non facta,
prohibendum ne fiat, his uidelicet quinque
modis. Primò, cum uictu tenui, ac alijs sex re-
bus non naturalibus in contrarium ordina-
tis. Secundò, reuulsione & deriuatione, uel si

adsit plethoria, euacuatione. Tertiò repul-
sione. Quartò, sanguinis & aliorum humorũ
alteratione. Quintò euacuatione. Regimen
sex rerum non naturalium tale sit, primũ
quiescat in aëre puro ac temperato, nec in
thalamo sint picturæ: uictus sit in primis te-
nuis, ad frigidum declius, abstineat à potu
aquæ frigida, præsertim si morbus in septo
transuerso fuerit, sed potus sit aqua hordea-
cea cum oxymellite. Reuulsio fiet per sectionẽ
uenæ cephalicæ. Deriuatio per hyrudines na-
ribus applicitas, uel per sectionem uenæ in
fronte, uel per caustica quædam, uesicatoria
nuncupata. Euacuatio nimia existente ple-
thoria fiet incipiendo à saphenis, deinde à
communi & à basilicæ. Repulsio fiet per
epithemata, instillationes, & cetera topica,
prout supra relatum est in cura cephalæ
calidæ. Epithemata fient cum oxyrhodino,
quod uario modo parari solet. Nam aliqui
aquæ rosacæ ad alia ingredientia portio-
nem duplam immittunt, sicut R̄. aquæ ros. 3.
viij. olei ros. & aceti ana 3.ij. Alij uerò uo-
lunt, ut ex his tribus aliud sit subduplum ad

reliquum, ut uerbi gratia, R̄. aqua ros 3. viij. olei ros. 3. iiij. aceti 3. ij. Alex. uerò trac. quintam aceti partem oleo ros. adiungit. Alteratio sanguinis uel bilis fiet per infrigidantia styptica, & hæc perficitur per cibum aut potum, per Iuleb aut Syrupos uocatos aut confectiões. Cibi sint frigidi styptici. Potus sit uinum granatorum malorum, uel cydoniatus succus, omphacium, limones, & arantia mala. Iuleb sit rosaceum, uel cum aliquibus Syrupis concinnatum, miscendo unà aquas uel decocta plāraginis, solatri, portulacæ, cichoriij. Vel sic paretur: Accipe syr. de aceto citri 3. iiij. sy. de papauere 3. ij. aqua ros. florū nenupharis, cichoriij ana. 3. v. uini granatorū 3. i. uini cotoneorū malorum 3. v. fiat Iuleb cum sandalis rubeis aromatizatum. Syrupi sunt sy. de ribes, de limonibus, de succo acetosæ, sy. rosaceus, uiolaceus, de papauere, de citro, de agresta, oxysachara. sy. de granatis. Confectiões sunt, conserua ros. uol. boraginacæ, diacoralis, diarhodō Abb. &c. Euacuatio fiet si morbus sit sanguineus, per sectionem uenæ, ut supra retulimus: si uerò biliosus, per phar-

macum cholagogum, quod fiet per electuaria, uel pilulas, uel potus, prout opus fuerit, de quibus supra in capite cephalæe fusius pertractauimus. Peculiaris tamē est aqua fructuum Mes. distin. 7, Antidotarij & infusio rheubarbari, &c. At si inflammatio facta sit, tunc duo erunt medendi scopi: alter ad materiæ fluxæ resolutionem, alter ad tollenda symptomata. Resolutio materiæ ita fiet, primò, euacuando materiā exuperantē cū rheubarbaro, myrobalanis, uel pilulis iam dictis. Secundò, resoluendo cum topicis temperatæ caliditatis, sicut cum columbis, pulmone arietis, & catulis scissis ac euisceratis, cum natua eorum caliditate, aut aduentitia, præsertim parata cum rebus anodinis, modicè calidis, ueluti sunt uiolæ, maluæ, mellilori, folijs lauri, corticibus papaueris, camomilla, anetho, folijs senæ, & stechade, &c. Remotio symptomatum fiet, si uigiliæ adsint, cum somnum prouocantibus, ueluti cum syrupo de papauere, cum lotionibus extrinsecis soporiferis, ut cum corticibus capiti papaueris albi, cum hiosciamo, floribus nenupharis, uiolis, ane-

tho, & cum folijs uitium, salicis, lactuca, man-
dragora, rosarum, populi, &c. Vel cum semi-
nibus papaueris albi, aut semiscrupulo pilu-
larum de cynoglossa, &c. Quòd si retineatur
urina, eam prouocabimus cum oleo scorpio-
num, inungendo circa uesicæ regionem, uel
cum cataplasmate ex parietaria, &c.

Loci consentientes de cura, &
primo de regimine.

Auicē. prima tertij, cap. de charabito lo-
quēs, De regimine sex rerum naturalium in-
quit, Et fac eum quiescere in domo tempera-
ta, & in aëre puro.

Obiectio.

Aër esse debet frigidus, quum sit morbo cō-
trarius, & cordis intemperiem magis euen-
tet. Quomodo igitur erit temperatus, ut
Auicenna?

Responsio.

Aër ratione morbi potestate debet esse fri-
gidus, sed non actu, quia poros ac meatus cu-
is nimium constiparet: calidus uerò nimium

DE CONSEN. MEDIC.

caput repleret, & resoluendo vires debilitaret. Quare magis temperatus esse debet quam frigidus. Hoc etiam habes ex Gal. 10. meth. & ex Alex. & Raze. 1. continentis. Mesues cap. de phrenit. & Auicen. loco citato, Domus in qua locatur patiens, sit exuta à for-
mis & sordiditate: nā phreneticus intueri eorum. magis diligit, & ex earum intuitu laeditur cerebrum.

Obiectio.

Quomodo hīc luciditas prohibetur, quum Alex. cap. de phrenit. dicat, quod magis lucidus debeat esse aër, quam obscurus?

Responsio.

Si patiens ex tenebris timorem concipit, aut amoto lumine in imaginationes incurrat, aër esse debet lucidus: si uerò econtrā, in obscuro quiescat. Vide in hoc casu Cornel. Celsum lib. 3. ca. 18. De uictu loquitur Paul. lib. 3. cap. 6. inquit: Cibus primū esto aqua mulsa, deinde ptisana cremor, & sorbitiones ex condro cum quadam dulci portione, ut rhodomellite. Panis quoque aqua locus re-

cte exhibetur, similiter intubum, lactuca elixa. Ab aquæ frigida potu arcendi sunt, præsertim si septum transversum consortij lege malo dedisse originem cognoveris. Razes similiter 9. alman. Nutrimentum eius sit aqua hordei, semel aut bis in die sumpta, secundum consuetudinē, quam in tempore sanitatis habuerit. Arcul. iubet prisanam quater in die esse sumendam. Auicen. Incipe nutrire ipsum subtili nutrimento, ita ut sis contentus oxymellite: deinde permuta ipsum ad aquā hordei subtilem cum oxymellite, deinde permuta ad crassum, & cōsidera ægritudinem & uirtutem. Et loquens de potu, Aliena, inquit, eos ab aqua uehementis frigoris.

Obiectio.

Dogma Auicēnæ de cibandis aëris omnino contrariū uidetur Hipp. I. aphorif. Nam iubet quod à principio morbi uictus sit crassior, & uersus statum sit tenuior: hic uerò econtra iubet primū quod sit tenuior, & uersus statum crassior.

Responsio.

Modus cibandi in morbis acutis cum apo-

sternate est diuersus ab eo, qui tantum in morbis acutis sine aposternate fieri solet. Nam morbus acutus cum aposternate requirit in principio uictum tenuiorem, ut mēbra magis conficiant & retineant, & motus humorum ex hac retentione supprimatur: hocque habetur ex ipso Auic. fen. 16. cap. de cura fluxus cum excoriatione, & cap. de tinesmo. Sed in alijs morbis acutis seruatur dictum Hippoc. De diuersione ac sectione uenae loquitur Gal. 13. meth. cap. 21. ibi, Itaque incidenda est in talibus affectibus uena statim ab initio, si modò tam ualens fuerit uirtus, ut sine noxa missionem sanguinis toleret. Et paulò post, Et hoc utrique uitio cōmune est, & ei quod cum sopore, & ei quod cum uigijs incidit, &c. Similiter Mes. cap. de phren. In primis si nihil prohibeat, phlebotometur cephalica, deinde phlebotoma uenas frontis, uel sanguisugas naribus applicato, &c. Razes. 9. alman. A Egro igitur, antequam praedicta compleatur accidentia, est subueniendum ex sanguinis detractione, & uentris solutione cum succo fructuū, &c. Aduerte quòd

Azaravius non vult fieri sectionem uenæ in biliosa phrenitide, sed tantum hemorrhoidarum prouocationem. Auic. prima tertij, cap. de cura charab. Fiat phlebotomia ex cephalica, & egressio sanguinis aliquantula, imò multa ualde: deinde phlebotoma uenas frontis, &c. & cum phlebotomaueris, tum oportet ut ipsum clysterizes clysteri ualde leni, cum oleo scilicet rosaceo & aqua hordei, deinde trahere materiam ad interiora cum fricatione pedum, &c.

Obiectio.

In principio morbi conueniuntne frictions?

Responsio.

Dico, quòd repletionem imminente, ne materia plus agitur quàm auertatur, non cōducatur, sed remota hac causa, si fuerint debiles frictions, & à longinquis partibus inceptæ, fortè conducent, &c. De hac sectione omnes ferè practici loquuntur. Similiter Cor. Cel. lib. 3. cap. 18. ibi, Quòd si uires patiantur ægri, sanguis quoque mittendus. Itidem ait Aët. ser. 6. cap. 2. &c. De repulsione lo-
P. i.

quitur Gal. 13. meth. cap. 21. ibi, Commune
 præterea utriusq; est, ut oxyrrhodinū in prin-
 cipio admoueat, &c. Similiter Auic. prima
 terti, cap. cit. ibi, Et pone super caput eius
 in principio oleum rosaceum cum aceto, in-
 frigidatum niue, &c. & oportet ut in prin-
 cipio administres repercussiva pura, nisi sit
 de genere magno, ex quo apostemantur uenæ
 quæ sunt extra caput, &c. Nam in morbi
 augmento pura non conueniunt, sed cum re-
 soluentibus mixta, &c. Itidem fateretur Cor.
 Cel. loco citato, ibi, Conuenit caput ad cu-
 tem tondere, &c. De alteratione per syrupos
 & confectiones habes plura ex Mes. Arcul.
 Marc. Cat. sauonarola, &c. Similiter de e-
 uacuatione: nam Arcul. Si cholera fuerit in
 causa, euacuabis eam cum medicina leniente,
 quæ etiā digesta materia erit reiterāda, &c.
 De remotione accidentiū loquitur Cor. Cel.
 lib. 3. cap. 18. ibi, Si nihilominus uigilent hi,
 quidam somnum moliuntur, potui dando a-
 quam, in qua papauer aut hyosciamos de-
 cocta sit. Et paulò post, Seruanda est alius
 quàm tenerrima, remouendi terrores, & po-

rius bona spes afferenda, quærenda delectatio ex fabulis ludisque, quibus capi maximè sanus assueuerat. Paul. lib. 3. cap. 6, Quòd si urina ipsis delirij uitio cohibeatur, calen-
tis hydrelei imbre pubem & uesicam fouebi-
mus. Itidem ait Auic. loco citato, Inurgens
oleo pubem tepido.

Observationes de venæ sectione.

Auic. prima tertij, cap. de charab. inquit,
quòd phlebotomia fieri debet ex cephalica,
seruatis quatuor conditionibus. Prima, quòd
nihil sit quòd prohibeat, sicut tempus anni,
ætas, robur uirtutis, &c. Secunda, quòd co-
piosa fiat, si à sanguine phrenitis depende-
ret: pauca si ab alio humore, ibi, Cholericum
indiget in sui cura educatione cholerae pluri-
ma, & phlebotomia minore, & cum caute-
la, &c. Tertia, quòd cauenda est syncopis,
ita ut ne actu accidat. Quarta, quòd sit
cautela in ligando, ne ex magna commotio-
ne fieret hypospasma, id est uenæ ruptio.
Haly abbas unum cācūm aduertit, ut ne post
P. ij.

228 DE CONSEN. MEDIC.

tertium diem sui euentus fiat uenæ sectio. Hoc idem uidetur attestari Hippoc. in eo aphorismo, Medicari in ualde acutis, si materia surget, eadem die: tardare enim malum est. Auic. loc. cit. uidetur etiam innuere, quòd uniuersalis uenæ sectio particularem precedere debeat, obseruatis tamen tribus conditionibus: prima, quòd uirtus sit ualida: secunda, quòd dispositio capitis hanc requiratur: tertia, quòd seua accidentia non adsint, &c.

Obseruationes de repulsione.

Auic. de cura charab. Conuenit oxyrhœdium niue in frigidatum & non calidum.

Obiectio.

Quomodo frigidum, si Aët. ser. 6. cap. 2. dicat, Caput rosaceo tepido irrigetur, nam in cerebri membrana inflammata frigiditas rosacei non est tuta?

Responsio.

In phrenitide duplex esse potest medendi scopus quatenus ad topica, alter scilicet ad

inflammationem, alter ad reliqua indicantia. Si igitur ad inflammationem tantum sit tua intentio, tunc oxýrrhodium cōuenit a-
ctu frigidum, si ad reliqua indicantia, tepidum, &c.

Obseruationes de euacuatione.

Mes. in cholericā phrenitide, Statim fiat euacuatio cum aqua fructuum, nec in mora sit medicus: nam induciā nō dantur in præparanda materia: unde uersus,
Sinocha cum colica, phrenesis, squinantis & anthrax,

Materias crudas euacuare iubent.

Et de topicis loquens, inquit: Scito quòd sanguinea indiget resolutione plus, & extinctione minus, cholericā uerò econtra: hoc idem ait Auicennas.

De prognosticis phrenitidis.

Hippocr. aphoris. 6. aphor. 53, Desipientia, quæ cum risu fiunt, securiores: quæ uerò cum studio, periculosiores. B. Securius, id est, minus periculosa, & hæc fit à sanguine: sed quæ fit à flaua bile, timor est ne exusta insa-

P. iij.

niam satis furiosam generet, &c. Et aphor. 2. aphor. 2, Vbi somnus delirium sedat, bonum. B. Hoc delirium non fit patiente cerebro, sed tantum à caliditate nuda. Vnde mirum non est, si id somnus de medio tollat. Et aphor. 7. aphor. 12, A pulmonis inflammatione phrenitis malum. B. Etiam econtra malum est, si ex phrenitide inflammatio pulmonis sequatur. Verum quòd tunc phrenitis mala est, quum ad cerebrum permuratur, uel si adeò excresecat, ut meningæ cerebri patiantur. Galen 3. de loc. aff. cap. 7, Phrenitis mitior est, quum à pallida bile ortum contraxit: uehementior, quum à flaua: ferina uerò, quum à flaua bile perassata. Hippo. prognost. 1. cap. 9, Qui in febre acuta, aut delirio, aut pulmonia, aut capitis dolore, manus subinde ad os fert, aut frustra uenatur muscas, aut colligit festucas, aut euellit pilos, id exitiale est. B. Lege fusius Gal. comm. de delirio. Et Hippo. aphor. 4. aphor. 72, Quibus urine albæ & perspicuæ, malæ, præsertim si in phreneticis appareant. Et Auicenn. prima tertij, cap. de charab. Nullus uisus est habens apostema in partibus ce-

reberi, cuius urina fuerit aquosa, qui euaserit. Nā tunc aquosa esse dicitur urina, quā, teste Gal. perspicua simul sit & alba. Hæc enim magnam cruditatem ac flauam bilem ad caput solummodo rapi ostendit, &c. Mesu. cap. de phrenit. Cura huius ægritudinis, si iam impressit, cassa est: si uerò adhuc perfecta nō est, curatur, sed non apud negligentes & stultos medicos, &c.

Authores erronei dissentientes
circa phrenitidem.

- 1 Adserere, cerebri substantiam nullo modo posse inflammari, ut Serapio.
- 2 Adserere, phrenitidem absque febre fieri posse.
- 3 Adserere, paraphrenitidem à nuda caliditate non posse effici.
- 4 Adserere, phrenitidem à sanguine exortam, non esse signum periculosum.
- 5 Adserere, aquam frigidam in phrenitide posse exhiberi, ut Razes.
- 6 Adserere, in omni phrenitide sectionem uenæ non conuenire.

P. iiij.

Confutatio dissentientium circa phrenitidem.

Confutat primum Auicen. cap. de charab. dicens: Quidam medicorum existimant, quod ipsum cerebrum non apostematur, quia quod lene est ut cerebrum, uel durum ut ossa, non extenditur, & sic non apostematur. Sed hic sermo est erroneus, quoniam lene uiscosum extenditur, & ossa etiam apostemantur, &c. Quod intelligendum est per uiam congestionis, non autem per uiam rheumatis: & hoc idem sentit Auer. 4. collig. & Gal. 6. aphor. comment. 53. ibi, Fiunt omnes patiente cerebro, &c.

Ad secundum: Gal. 3. de loc. aff. cap. 7, Igitur quemadmodum phreniticis febris unum quoddam accidens dispositionem cerebri cēsetur, sic econuerso in ardentium febrium dementia, multis elatis ad ipsum uaporibus. Idē sentit Hippoc. in Epid. mor. & Galen. 5. de Sympt. cau. &c.

Ad tertium: Gal. 6. aphor. comment. 53. loquens de paraphrenitide, inquit, Quaecunque enim ex sola caliditate sine humore uitioso

fiunt, similes quodammodo sunt eis, quæ ex ebrietate contingunt. Igitur quædam fiunt à nuda caliditate.

Ad quartum: Gal. aphor. 2. comment. 2, sed satis fuit ei periculosissimum morbum phrenitidem nominare. Et aphor. 6. comment. 53. Nulla, inquit, desipientia secura est. Igitur nec à sanguine exorta.

Ad quintum: Auic. prima tertij, cap. de charab. & Alex. cap. de phrenit. Gelida autem aqua, quoniam parum frugi, omnino uitanda: nam internæ phlegmoni nocet, deliriumque auget, & omnia in deterius conuertit, materiaque resolutione prohibet, & nervus nocet: & sic nullo modo conuenit.

Ad sextum: Conueniunt Alexan. Razes & denique omnes, quod fieri debeat, si non euacuandi, saltem reuellendi gratia, & hoc in principio morbi, cauendo ut supra.

De Lethargi descriptione & loco affecto.

Lethargus est dormiendi inexpugnabilis quædam cupiditas, eoque λήθαργος dictus

est, quod ab accidente, id est, ab obliuione frigidum cerebri apostema sequente fiat. unde & aliàs. Veteranus morbus uocatur, eò quòd qui tali egritudine laborant, aeterno ueluti sopore afficiantur. Fitque hic morbus uel in meatibus substantiæ cerebri, & hoc ut plurimum: uel fit in pāniculis, uel in eius substantia, & hoc rarò admodum contingit, in uentriculis uerò cerebri nequaquam. Quòd si fieri contingat, non amplius lethargi nomen, sed potius apoplexiæ uel epilepsiæ obtinet, fitque ut plurimum in occipitio, interdum in sincipiti, uel in medio, sed rarò admodum.

Loci consentientes de lethargo.

Gal. lib. finit. med. Letharg⁹ est delatio in somnum non facile excitabilem, quæ cum coloris uitio & flatuoso œdemate, nec sine ipsarum quoque solidarum partium repulsifici spiritus languore prouenit fere indebili febre ac maligna. Auicē. prima terti, cap. 16, Lethargia dicitur apostema phlegmaticum intra cranium factum, & est sirsēn pituitosum, &c. Et hæc quidem egritudo nominatur no-

mine sui accidentis, id est ab obliuione apostema cerebri sequente, &c. Cel. lib. 3. cap. 20, In lethargo marcor est, ac inexpugnabilis penè dormiendi necessitas, &c. De loco laeso loquitur Paul. lib. 3. ca. de leth. ibi, τὸ πον μὲν ἔστι τὸ αὐτὸν τῇ φρενίδι φημι τὸ ἐκκέφθον, &c. Auicenn. prima tertij, cap. 16, Et plurimum quidem fit in meatibus substantiæ cerebri, & rarò in uelaminibus & substantia cerebri, quia phlegma rarò penetrat panniculos cerebri, propter eorum duritiẽ & propter eius uiscositatẽ, &c. Galen. 3. de loc. aff. cap. 5, In lethargo & in omnibus soporosis affectionibus ratio & memoria perẽunt. Quare quum memoria in occipitio, & ratio in medio uentriculo reponatur, hoc sequi necesse est, lethargum scilicet plerunque in his duobus locis contingere, &c.

De lethargi causis.

Quum cerebrum primario affectu laborat, binas tantum causas antecedentes & coniunctas habere dicitur, ex quibus procatareticæ intelliguntur. Antecedentes sunt uehe-

236 DE CONSEN. MEDIC.

mentia frigora cum multa humiditate complexa, sicut in pituita & in nimia repletione cernitur. Vel antecedentes dicuntur quęcunque pituitosum humorem generare possunt, sicut comestio fructuum & ceparum, aut nimia potio. Cause uerò coniunctę sunt humores lethargum ad actum producētes: si uerò cerebrum per consensum afficiatur, tunc uel fit ex mutatione alicuius acuti morbi, uel à phrenitide & à febre continente, uel à stupefaciētibus pharmacis nimis refrigerantibus cerebro adhibitis, aut fit à diaphragmate, uel ab aliquo alio uiscere affecto. Verum igitur lethargus à pituita tantum fit, notus uerò à pituita cum bile admixta, in capite putrescente, oboritur, unde symptomata habet etiam admixta.

Loci consentientes de causis
lethargi.

Gal. 3. de loc. aff. cap. de morb. comit.
Lethargus or um trahit à uehementi frigore.
Et 2. ap Ebor. comment. 3, Somnus, inquit, fit
refrigeratio primo sensitivo, id est, cerebro,

quæ refrigeratio si mixta fuerit humiditati,
facit lethargicas passionēs, si cum siccitate
καταλήψας. Et 4. de sympt. cau. cap. 8, Fit
Lethargus à frigida multaque humiditate
grauante. Vide etiam Gal. 2. de loc. aff. cap.
ult. . Nam ibi quotquot, inquit, affectus sunt
soporosi ac somnolenti, tot omnes à frigida
causa oriri. Idem 3. de loc. aff. cap. 5, Pau-
lus lib. 3. cap. de leth. Ex pituita quæ frigore
nimio & humiditate cerebrum imbuerit, con-
trahitur. Auicēn. prima tertij, cap. 16, Et hæc
ægritudo generatur ab omni quo generatur
humor phlegmaticus, & in quo sunt euapo-
ratio & putrefactio, &c. Et plurimum, in-
quit, generatur ex comestione ceparum, & ex
nimia repletionē stomachi, & multitudine
potus, & comestione fructuum intellige frī-
gidorum humidorum.

Obiectio.

Quur damnat cepas Auicēn. quum ex sua
caliditate potius proficere, quàm nocere de-
berent?

Responsio.

Considerat in cepis duas esse partes, quas-

dā scilicet crassas, ex quibus pituita generatur, & quasdam acres, quæ euaporationē ad caput mittunt, quæ simul unitæ potius capiti nocēt, quàm prosunt. De causis per cōsensum loquitur Aët. ser. 6. cap. 3, Fit lethargus ex mutatione alicuius acuti morbi, ut ex phrenitide, & à continente febre, & ex alijs plurimis morbis, in quibus præsertim euacuationes sequuntur sunt, &c. Galen. lib. finit. med. Lethargus euenit partim affecto principio, id est, cerebro, partim abscessu. Alexan. lib. 1. cap. 20, Si pituita sola deliquerit, lethargiam ueram introducit: notham uero pituita cum bile mixta in capite putrescente, & sunt in ea symptomata permixta.

De lethargi indiciis.

Indicia lethargi sunt 13. ut dolor leuis quasi extendens, febris lenta, somnus grauis, obliuio uehemēs, respiratio imbecillis & rara, crebra oscitatio, singultus ob stomachi cōsensum, albedo linguæ, pigritia in motu palpebrarum, pulsus rari & tremuli, aluus interdū humida, interdū, sed raro, arescit, uri-

na quales iumentorum, interdum tremores & sudores apparent, &c.

Discrimen phrenitidis & lethargi ex Auicenna.

Uterque affectus similis in hoc esse uidetur, quod patientes aliena ac uaria loquuntur. Differunt uero quadrifariam: primo, quia in lethargo somnus est grauis, in phrenitide paucus uel nullus: secundo, lethargici in suis lectis precipitati iacent, phrenetici resurgunt: tertio, in lethargo pars posterior, in phrenitide anterior laeditur: quarto, in lethargo est febris lenta, leuisque dolor capitis, in phrenitide uero uehementia sunt omnia, &c.

Discrimen lethargi & apoplexiæ, syncopis & ueri strangulatus.

Differt lethargus ab apoplexiâ ex eo, quod lethargus paulatim ac pederetim fiat: apoplexia uero statim. Differt ab ueri strangulatu, quum excitatus respondeat, strangulata a minimè. Differt à syncopi, quum in le-

rhargo facies sit uiuida, in syncope ueluti moriua. Differt à subet & congelatione per febrem, quæ nec in subet uel congelatione accidit, intellige, præsertim si ægri tudines & non accidentia per se sint.

Loci consentientes de signis
lethargi.

Paulus lib. 3. cap. 9, In lethargo adest febris lenta, non admodum acris, cum animi in somnum profunda delatione, pulsus magni, turbulenti, respiratio rara & imbecillis, & cætera omnia à me exposita. Auic. similiter prima terciij, de signis leth. ibi, Soda leuis, febris lenta, necessaria enim est febris in omni apostemate factò ab humore putrefacto: & propter hoc separatur à subet, &c. Vide insuper Gal. 5. de loc. aff. cap. de septi transuersi affectibus, & 3. de loc. aff. cap. 5, Itidem Aer. ser. 6. cap. 3. ibi, Proinde considerare oportet speciem delationis in somnũ, &c. De signis discriminũ lethargi cũ phrenitide, apoplexia, & cæteris similibus lege ex Auicenna. Arcul. Sauonarola, & ab ipso Gordonio.

De lethargi cura.

Scopi in curando lethargum quinque enumerantur, primus euacuatio, secundus reuulsio, tertius materiae repulsio, quartus symptomatum emendatio, quintus uictus ratio instituenda. Euacuatio, si adsit repletio, aut pituita cum sanguine abundauerit, fiet per sectionem uenae cephalicae: quod si minus sanguis redundet, per phlegmagogum, per secesum, uel per uomitum educens moliri potest. Educunt pituitam hiera simplex, hiera composita; pilulae chochiae, electuarium indum, & quaecunque in cephalaea ab humore frigido exarata sunt. Vomitus fiet ex decocto raphani cum sesquiuncia oxymellitis scillitici. Reuulsio fiet per cucurbitulas, lotiones, clysteria, quae multum in hoc casu laudantur, per frictiones, ligationes, &c. Clysteria parantur ex rebus ad caput spectantibus, sicut ex decocto salviae, maioranae, ruta, betonica, stechados, cui mellis rosacei tres unciae, & eorundem olei communis adiectae sint: uel si acris uolueris, adde praedicto decocto radicem cyclaminis, colocynthidos, cartami, centaurij

Q. i.

quantum lubet, additio etiam sale gumeo, an-
 hiera composita, electuario indo, &c. Lo-
 tiones fiant ex predictis rebus à cubito ad
 extremam manum, & à genu usque ad plan-
 tas pedum, &c. Repulsio materiæ perficitur
 per exteriora & interiora. Per exteriora in
 principio repellentia, per interiora materiæ
 præparantia. Exteriora in principio repel-
 lentia sunt oxyrrhodinū: in augmento repel-
 lentibus adde resoluentia, ut est aliquid ca-
 storei, & à medio statu usque ad lethargi
 declinationem resoluentibus puris utendum,
 sicuti est emplastrum Mesues, quod recipit
 piperis, sinapis, scillæ, castorei, euphorbi,
 &c. Interiora materiam præparantia sunt
 Syrupus de stechade, oxymel scilliticum, rho-
 domel, & cetera quæ dicta sunt in capite ce-
 phalæ ab humore frigido, cum aquis uel
 decoctis saluie, stechados, maiorana, hyssop-
 pi, betonica, &c. Emendatio symptomatum
 fiet per ea, quæ à somno profundo agrum re-
 uocant, ut est fumus humorum capillorum, itē
 frictio pedum cum aceto, sale, uel farina sy-
 naps, uel cum succo rutæ, aceto & sale. Re-

uocat etiam à somno pilorum euulsio partiũ
 inferiorum, clamor & tumultus: obliuio uerò
 loquendi, mingendi, ac egerendi, incitando,
 uesicam comprimendo, oleiſque aſpergendo,
 membráque inferiora uehementer comprimẽ-
 do, reuerſitur. Victus ſit tenuis, inciſorius ac
 reſecans, cum condimentis quibuſdam para-
 tus, ut panis contritus in aqua cum ſaluia,
 pauco pipere, uel cinnamomo, uel priſana, ſa-
 le uel pulegio uel oxymellite parata, uel
 aqua cicerum uel lupinorum: potus ſit hy-
 dromel. In declinatione morbi uictus ſit qui
 uires recolligat ac recreet: unde dandum eſt
 uinum aquoſum, tenue, album, ſubadſtringẽs.
 Carnes ſint gallinarum, columborum, mon-
 tanaarũque anicularum, piſces petroſi, olera
 ſint porri, aſparagus, petroſelinum, &c. Aër
 ſit lucidus, ſplendidus, domus tepida, ſomnus
 non permittatur niſi per mediam horã, dein-
 de excitetur, ita ut de media in mediam ho-
 ram dormiat & excitetur: frictiones uicem
 ſuppleant exercitiũ, &c.

Q.ij.

Loci consentientes de cura
lethargi.

De omnibus his ferè intentionibus loquitur Galen. 13. meth. cap. 21. & primum de euacuatione, ibi: Incidenda est in talibus affectibus uena statim ab initio, si uirtus ualeat, &c. De humorum præparatione, ibi: Excitare eos oportet, & crassitiem humoris incidere & excalescere, incoquemes in aceto thymum, & pulegium, & origanum, &c. De deriuatione, ibi: Mox palatū ualentibus & acribus medicamentis ungemus, deinde sternutamētis utemur. De repulsione, ibi: Tum capiti similes præsidiorū facultates imponemus, ad aucta semper eorum usque ad ipsum sinapi uehementia. De reuulsione, ibi: Quinetiam cucurbitulis utemur, &c. De euacuatione loquitur Auicē. etiam prima terciij, cap. de cu. leth. ibi: Si nō fuerit quod prohibeat, phlebotometur prius: & si alia fuerint tibi necessaria, da ei ad potandum hieræ picræ, 3. i. & quartam unius drachmæ de pulpa colocynthidos, & tres drachmas myrobalanorum & dauid unum mastice. Aer. ser. 6. cap 3, Si san

guis fuerit redundans, secetur uena, & pro uiribus euacuetur. De reuulsione loquitur Paul. lib. 3. ca. 9, ibi, Si minus sectio uenae competit, eius loco clysterijs acribus aluū ducemus. Acria enim huc spectant, quia tū febris mitis est & lenis, tum quia materia crassa, non apta fluere, in uentriculo continetur, à quo clystere acutum diuertit & euacuat. Similiter Auicē. loc. cit. Administra eis clysteria acuta, & trahatur materia ad inferiora, & fac cum uomere cum penna melle & sinapi illita, & frica extremitates eius donec rubescant & doleant, &c. De repulsione & materia preparatione loquitur Auicē. cap. cit. & in principio, Repelle materiam cum oleo rosaceo & aceto, & post duos dies à principio sui misceatur eis castorium, &c. Alex. lib. 1. ca. 20, Vniuersam curationem capiti applicare oportet, quò uapores, qui eò deferuntur, promptius supprimantur. Danda est insuper opera, ut humores ibi coacti concoquantur, incendantur, & dissipentur, &c. De sympt. emendatione facit mentionem Cels. lib. 3. cap. 20. ibi: Hos quidam excitare nituntur ad mortis

Q. iiij.

his, per quæ sternutamenta euocantur, & his
 quæ odore fædo mouent, qualis est pix cruda,
 lana succida, piper, ueratrum, &c. Auicē.
 loco cita. Quum in subet profundi fium, uel
 le capillos eorum, & pone apud nocram uen-
 rosas multas cum igne & absque incisione,
 & quum eis acciderit obliuio urinæ & ster-
 coris, embroca utraque emunctoria, & uen-
 trem cum decocto camomillæ, melliloti, uio-
 larum, & comprime uescicam, &c. De uictus
 ratione instituēda lege Aet. ser. 6. cap. 3. ibi,
 Cibi porrò sint renues, & incisoriij, ac rese-
 cames, & cum condimentis parati, aniso, cu-
 mino, apio, pipere: sunt tamē qui anisum dam-
 nent, quum sit somniferum. Paul. lib. 3. ca. 9.
 etiam de his loquitur, ibi, Alimentum sit cre-
 mor ptisanæ cū oxymellite, uel salibus, uel pu-
 legio, & hoc in principio. Nā in declinatio-
 ne uictus sit qui uires recolligat, &c. Auic.
 loco cita. Et quum nutris, nutri eos cum ali-
 quibus quæ sint sicut aqua lupinorum, cice-
 ris cum hordeo fracto: deinde quum finitur
 ægritudo, administra restaurantia. Lege su-
 sius hos authores, & plura, quæ hīc recitari

non possunt, inuenies, &c.

Lethargum generantia.

Cepe, orimum, semina nigri & albi papaueris, poma mandragoræ.

De prognosticis lethargi.

Hippocr. aphor. 2. aphor. 1, In quo morbo somnus laborem facit, mortale: si uerò iuuat, non mortale. B. intellige somnum, quatenus somnum, non esse mortalem, sed quatenus accidens alicuius morbi. Et aphor. 2. aphor. 3, Somnus atque uigilia si modum excefferint, malum. B. Excedit modum tripliciter: primo ex parte quantitatis, unde multus uel deficiens malus: secundo ex parte qualitatis, qualis est somnus inexpugnabilis & superfluous, cerebrum infrigidans & humectans: tertio, ex parte temporis, qualis meridianus & nocturnus. Auicennas prima tertij, cap. de signis lethargiæ, Quumque fortia fuerint accidentia lethargiæ, & multiplicatur sudor ualde, est tunc perimens, propterea quòd sudor deijcit uirtutem, & quum spiritus dilatatur & fit bonus & declinane

Q. iij.

accidentia, tunc tēdit ad salutem, & propriē
 si apparēt apostemata post aures, &c. Cels.
 lib. 3. ca. 20, Lethargus est de genere acuto-
 rū, & nisi succurratur, celeriter iugulat, &c.
 Authores dissentientes circa leth. &
 vertig. quære infra.

De vertigine.

Τὸ σκοτοματικὸν πᾶθος, id est affectus sco-
 tomaticus, qui & uertiginosus dicitur, quid
 sit, ex ipsa appellatione manifestatur. Est e-
 nim scotomaticus is dicendus, cui obtenebra-
 tiones contingunt, ac ei uidetur caput circū-
 ferri, ita ut firmari non possit, sed parua oc-
 casione cadat. Differt uerò uertigo à scoto-
 matico affectu, eò quòd omne scotoma uerti-
 go sit, sed non econuerso. σκότμα dictam
 Latine turbo, à σκοτῶμαι, id est uertiginor,
 siue à uerbo σκοτῶ, id est obtenebro, siue à
 σκοτίζω, id est obscuro: obscuratur enim præ
 caligine oculi, ut nihil uideant. Sed in uerti-
 gine simpliciter dicta res uidetur tam uim
 circumuolui, absque casu & tenebris. Diffe-
 runt etiam in causis, ut infra uidebitur.

Loci consentientes de vertigine.

Galen. aphor. 4. comment. 17, Vertigo est quando simul videtur circūuolui quacunque conspiciamus, & sensus uisus derepente destruitur, quam uideatur tenebrae circumfusae. Auic. prima tertij, tra. 5, Vertigo est, ut habens ipsam imageretur quod res super ipsum uoluantur, & quod eius cerebrum & corpus ipsius reuoluamur: quare non regit se ita ut firmeretur, imò cadit, &c. Ba. Intellige scotomaticū affectum (& si nulla de tenebris fiat mentio) hīc ab Auic. definiri, sub quo uertigo tanquā minor dispositio cōtinetur. Definitur uerò uertigo à Raze hoc modo, Razes 1. comment. ca. 2, Vertigo est dispositio, in qua apparet res reuolui, & tamē homo non cadit, sed regit se, &c. Ba. Adde, sed perseverāte morbo diutius ex facili occasione concidit, maximè ubi in circulū circūuertatur. Vnde Gal. 3. de loc. aff. A parua occasione hebetantur, ita ut interdum cadant, si circūrotentur. Hoc idem adserit Paul. cap. proprio, &c. & Aët. ser. 6. cap. de uertig.

De vertiginis causis.

Causæ uertiginis primitiue sunt omnes sex res præter naturales, ex quibus uapores crassius egredientes, ut cepa, uinum, cerebrum male afficiunt. Similiter uua in sole, mala intemperies, capitis percussio, aut cranij fractura solita, excretiones retentæ, cruditates, ebrietates, & consideratio rerum quæ circumaguntur. Antecedentes sunt omnes humores, à quibus uapores eleuantur, qualis est utraque bilis, pituita & sanguis. Coniunctæ sunt uapores spiritibus admixti, existētes actu in regione uisus. Hæc affectio etiam per consensum alicuius partis uel totius fieri potest, ex uaporibus ad caput elatis, aut ex ore uentriculi à malis humoribus morso, ab iisdem causis denique prodeunt uertigines, à quibus morbus comitialis, & easdem sedes occupant, &c.

Loci consentientes de causis vertiginis.

De causis primitiuis loquitur Galen. 3. de locis aff. cap. 8. ibi, Id maximè accidit, quum

uel sub sole aestuauerint, uel aliam ob causam
 calefacto fuerint capite, aut ex calido uapo-
 rosoque spiritu caput opplente, &c. Aët. ser.
 6. cap. 7, Facile capiuntur ab hac affectione,
 quibus consueta excretiones sunt oppressae,
 sed & cruditas & ardores assidui, & ebrie-
 tates affectionem hanc efficiunt. Auic. prima
 tertij, cap. de cau. uertig. Fit propter consi-
 derationem ad res quae uoluuntur, ita ut fi-
 gatur forma illa sensata in anima. Et pau-
 lo post inquit, Interdum fit à malitia com-
 plexionis, & fit ex motore spiritus exterius,
 sicut ex percussione capitis & fractione cra-
 nii, &c. De antecedentibus causis lege Gal.
 aphor. 3. comment. 27. ibi, Quotidianae con-
 stitutiones, &c. ubi inquit, Fit uertigo ab hu-
 more cum spiritus crassitie in capite moto,
 ideoque proxima est comitialibus morbis &
 apoplexijs, &c. Paul. lib. 3. cap. 12, Nascitur
 uertigo, quum frigidus & glutinosus humor
 cerebrum occupat, &c. Auic. prima tertij,
 tra. 5, Vaporis materia quandoque est cho-
 lera, quandoque phlegma, & uertigo phleg-
 matica similis est epilepsiae, &c. De atra bile

Et sanguine non meminit, nisi ubi de signis
 uertiginis loquitur. De causis coniunctis lo-
 quitur Gal. aphor. 3. comment. 31. ibi, Verti-
 gines accidunt propter spiritum uaporosum,
 qui in partibus cerebri inordinato motu cie-
 tur, &c. Auic. prima tertij, cap. cit. Ex causis
 fit corporeis presentibus in uacuitatibus ce-
 rebri, contentis in ipso ex uaporibus prone-
 nientibus in uenis, quæ sunt in ipso & ner-
 uis, &c. De causis per consensum plura ha-
 bes ex Gal. aphor. 4. comment. 17. ibi, Fit ab
 ore uentriculi à malis humoribus morso, &c.
 Item aphor. 3. comment. 31. ibi, Aut in uen-
 triculo uitiosis superfluitatibus acernatis ad
 cerebrum fertur exhalatio uaporosa. Item
 3. de loc. affect. cap. 8, Oribasius aphor. 3.
 comment. 20. de hac re mentionem & ipse fa-
 cit, ibi, Sicut uentus sese eleuans, & puluerem
 in sublime rapiens, &c. Auic. prima tertij,
 tra. 5, Et quandoque fit ex uaporibus ascen-
 dentibus ad cerebrum, &c. lege eum fusius,
 nam ibi enumerat omnes partes, à quibus se
 extollere potest. Gal. in lib. qui introductio
 siue medicus nuncupatur, Caligines, inquit.

oculu offuse & uertigines cognata sunt uitiis morbo caduco, ab ysdemet causis prodeunt, atque easdem sedes occupant, &c.

De signis vertiginis.

Indicia quæ distinguunt utrum primario affectu, an per consensum efficiatur uertigo, hæc tria sunt: primum non præcessit alterius membri nocumentum: secundum est uertigo assidua, quæ non excitatur ex repletione alterius membri, nec remouetur ad alterius membri euacuationem: tertium, quia omnes ferè sensuum actiones laesæ sunt. Si igitur alterius membri læsio præcesserit, ad cuius incrementum uertigo augeatur, & ad eius decrementum decrescat, & ad eius ablationem auferatur, tunc per consensum est. Vbi igitur per consensum uentriculi fieret uertigo, tunc præcedet praua concoctio, appetitus deiectio, grauitas, nausea, uomitus, & anxietas quædam stomachica, dolorque erit in anteriori parte cerebri usque ad medium, propter neruorum reuersiuorum consensum, &c. Si uerò primario affectu, tunc præcedunt hebetudines in oculis, aurium sonitus, auditus grauitas, do-

lor capitis, & sic uniuscuiusque sensus obla-
sio aderit. Indicia humorum, præcipuè san-
guinis sunt, uenarum inflatio, oculi rubet, ca-
pitis grauitas, somnus & pulsatio. Bilis sunt
uigiliae, inflammatio sine grauitate mul-
sa, imaginationes citrinae, &c. Pituitæ, sunt
grauitas, tumor, & multitudo somni: & sic
de reliquis humoribus etiam intelliges, &c.

Loci consentientes de signis
vertiginis.

Galen. 3. de loc. affect. cap. 8. loquens de
signis primarij affectus & per consensum in-
quit, Vertigo quæ per se fiat, aut per uentri-
culi cōsensum, sicut & Archigenes fatetur,
sic signa distinguere oportet. Nam si uertigo
ex primaria cerebri affectione fiat, tunc au-
rium soni, & capitis dolor, & grauitas, &
sic olfactus & cuiuscunque sensus à capite
prodeuntis oblaesio aderit. Vbi uerò per con-
sensum oris uētriculi, præsentietur cordis mor-
sio, quam Græci dicunt *καρδιασμός*, & nau-
sea, &c. hæc eadem recitat Paul. lib. 3. cap.
12. Auic. prima tertij, tra. 5, Vertigo facta
ex reuolutione hominis, aut cōsideratione ad

res reuolutas, nota est per se, & similiter, quæ fit à percussione & casu. In ea quæ fit à retentione materierum in cerebro, signa sunt, quod ægritudo est assidua, non sequens ægritudinem aliorum membrorum, nec est excitata cum repletionem, nec sedata cum euacuatione, & antecedit ipsam dolor capitis, sonitus & tinnitus, & grauitas est in capite, & inuenit tenebrositatem in uisu, & in sensibus abbreviationem, &c. Lege cum fusius: nam si omnia uellem in unum congerere, essem longitudine longè longior. Lege etiam ipsum de signis cuiusque humoris, ibi, Et si fuerit humor, &c.

De cura vertiginis.

Primum id in cura notato, an per se, an per compatiendi rationem morbus fiat. Si per se, an actu uertiginosus sit, an facultate. Primo expedit curatio, alteri præseruatio. Præterea etiam id intueri, num in ipsa uertiginis accessione sit patiens, an extrâ. Si in accessione, tunc frictionibus, cucurbitulis, ligationibus & medicamentis odore mouentibus æger

excitandus est: si uero extra accessionem, tunc primum causa diligenter considerata, curandus erit. Vnde si fuerit causa primitiua, qualis est uisus rerum circūuoluentium, aut auditus uocum ingētium, aut percussio & crafpula, tunc ita remouenda erit causa, ut nec res mobiles uideat, nec sonos ingentes audiat: & tunc motus spirituum & eorum disiunctio moderetur cum quiete animi & corporis in loco obscuro, interim remouendo si quæ mala fuerit intemperies in cerebro derelicta, cum contrarijs intra & extra applicatis. Si uero aliquis humorum causa fuerit, tunc quintuplici medio indiget, primò euacuatione, secundò reuulsione simul & deriuatione, tertio alteratione siue humorum præparatione, quarto accidentium remotione, quinto uictus ratione. Euacuatio fiet per sectionem uenæ, si sanguis superabundauerit, per remotas uenas, incipiendo à saphena, deinde à basilica, postremò ab ipsa cephalica & à uenis, quæ post aures locantur, præsertim si purgationes menstruorum uel hæmorrhoidarum oppressæ sint. Si uero sanguis cum alijs humoribus

bus in qualitate redundet, prout natura humoris requirit, euacuabitur cum rheubarbaro, myrobalanis, cassia, &c. Reuulsio fiet cum omni reuulsionum genere, ut supra dictum est in cap. cephalææ, procedendo usque ad cauteria. Alteratio, siue humorum preparatio perficitur per exteriora & interiora. Exteriora parantur in principio cum his quæ repellunt ac infrigidant, quale est oleum rosaceum & acetum. In medio tempore cum repellentibus ac resoluentibus mixtis, & in fine cum puris resoluentibus, prout habuisti in capite cephalææ. Interiora per ea quæ immobiles reddunt spiritus, sicuti sunt frigida styptica, qualis est syrupus ros. de granatis, de ribes, de citonijs, & quæcûque apozemata ex his parata, ubi materia sit calida, & spiritus in motu fuerint. Valer etiã in hoc casu eclegmata ex saccharo rosaceo, mina cydoniorû, item cotoneata à prandio statim uel ab ipsa cœna comesta. Remotio accidentium erit, si nec apud ignem, nec in scalis, nec prope flumina patientes sint, ne interdum ex uertigine oborta præcipitentur: si uerò aliqua etiam

R. i.

tenebrae adhuc remaneant, cum his quae clarificant, statim curabuntur, &c. Victus ratio, si ab humore calido fieret uertigo, erit quae bilis aut sanguinis feruorem extinguat, sicut sunt acetosa, styptica, qualis est succus coroneorum malorum & granatorum, in quo buccella panis immergi potest, sitque uictus non flatuosus, non caco stomachicus, sed facile concoctilis. Aer sit magis obscurus, quam lucidus, ne spiritus agitentur. Potus sit modicum uini albi reuissimi, praesertim si uertigo per compatiendi rationem fieret. Somnus sit notabilis. quies non solum corpori, sed etiam animo confert. Vitanda insuper sunt accidentia animi, sicut ira, tristitia, nimia cogitatio, &c. Veneris quantum potest se abstineat, &c. Si causa fuerit per consensum, tunc triplici scopo curabitur, primo cum causae remotione, secundo cum membri mittentis & recipientis roboratione, tertio cum reuulsione uaporum, adhibito tamen regimine congruo, ut supra: quae omnia longè uberius habita sunt in cap. cephalae per consensum, &c. Quare non est ut hic de nouò recitentur, &c.

Loci consentientes de cura vertiginis.

Paulus lib. 3. cap. 12, Vertiginosos in accessione excitabimus cum medicamentis quæ odore mouens, item frictionibus, & id genus alijs, &c. lege etiam de hoc Marc. Cat. Auic. prima tertij, tra. 5, Vertigo facta à reuolutione hominis super ipsum, & consideratione eius ad reuolutiones, & consideratione à loco alto, cum quiete & tranquillitate curatur & somno, si non citò sedatur.

De cura à causa humoralis, & primò de ipsa euacuatione loquitur Auicem. loco nuper cit. ibi: Quæ uerò facta est ex sanguine, aut ab humore contento in corpore, curat phlebotomia ex cephalica, deinde ex uena quietis, quæ est post aurem. Et Paul. loc. cit. Vbi morbus conquieuerit, sanguis discutiendi gratia extrahatur, & purgatio ex hiera prestanda. Et Razes 9. almā. Quòd si non appareat, & facies sit rubra, sanguis ex cephalica uel basilica erit minuendus. De reuulsione etiam loquitur Paul. ibi, Interpositis diebus acri clystere & cucurbitulis ad occipitiū cum scari-

R. ij.

ficatione, mōxque apophlegmatismis & ster-
 nutamentis uti debemus, &c. Auic. loc. cit. Et
 cauterizatur arteria, & propriè ea cuius cau-
 sa est ascēſio vaporū: & uentose cōferunt no-
 crati, &c. Si uerò fuerint humores diuerſi à
 sanguine, incipe ad curandum cum pilulis de
 hiera & infusione aloes, uel in humoribus
 calidis cum decoctione myrobalanorū, epithi-
 mi, pilulis stomaticis, &c. De alteratione plu-
 ra habes ab Aet. ser. 6. ca. 7. ibi, His uerò qui
 calidū caput habent, etiam rosaceū cum ace-
 to adhibeas, &c. Et Auic. cap. cit. Et cōfor-
 tabis caput cū oleo rosaceo & aceto & oleo
 camomillino, & post cōfirmationē cum oleo
 camomillino singulari, &c. Loquēs etiam de
 interiori inquit, Et malicia cōplexionis cura-
 tur per cōtrarium, ut tēperetur cōplexio na-
 turalis, ubi Hugo Senēſis utitur syrupo de ste-
 chade, de epithimo, oxymelle cōposito & scil-
 licet cum decocto: hasce origani, hyssopi, ste-
 chadis, &c. De accidenium remotione lo-
 quens etiam Auic. inquit, Et habens uertigi-
 nem alienet à se considerationem ad omnem
 rem citò reuolubilem, & ab aspectu profun-

ditatum fouearum, & uerticū montium. Le-
ge etiam de his omnibus Arcul. Marc. Cati.
Michaellem Sauo. & Gordonium. De uictus
ratione fit mentio ab Aetio ser. 6. ibi, Ci-
bi sint boni succi, facile concoctiles, flatus ex-
ortes omnino stomacho ac uētri cōmodi, uri-
nam cientes, uinum modicū sit, album & te-
nuissimum, & non ualde uetus. De cura per
consensum, Mes. cap. de uert. inquit, In pri-
mis materiā abscinde, deinde mēbrum man-
dans rectifica, & regimen ad æqualitatem
administra, cerebrum & caput confora, ne
recipiat, deinde diuerte uapores & fumos
cum constructione dolorosa, uentosatione,
clysterijs, &c.

Observationes de sectione venæ.

Aet. ser. 6. cap. 7. monet, ne acervatim
euacues, nā ex facili occasione concidūt, &c.

Vertiginem generantia ex Diosc.

Cardamomū, hyosciamus, mandragora, sa-
lernum, aconitum, cicuta.

Remedia ad vertiginē ex eodem.

Valent peucedanum, galbanū, ampelos leu-

R. iij.

ce acetum scilliticum, uinum scilliticum.

De prognosticis vertiginis.

Auic. prima tertij, tra. 5, Quandoque fit uertigo & scotomia secundum semitam crisis, & uertigo frequens, & propriè in decrepitis nunciat apoplexiam: & similiter uertigo eueniens successione stuporis comunicatis membrum, & quãdoque soluit uertiginẽ soda accidens. Ille cui frequenter accidit scotomia, de seipso sollicitus sit, & humorem euacuet crassum, ne ad epilepsiam aut apoplexiam perueniat. Quum uertigo prolögatur, signum est quòd fiat à causa frigida, &c.

Authores dissentientes circa lethargum & vertiginem.

- 1 Adserere, lethargum non principaliter in cerebro, sed in corde fieri, ut Aristoteles, qui primam uim sentiendi in corde esse dicebat, & non in capite.
- 2 Adserere, lethargum à melancholia generari posse, ut Razes.
- 3 Adserere, in lethargo à frigiditate & hu-

miditate proueniente, sectionem uenæ non competere.

4 Adserere, in lethargo occipiti esse adhibenda repellentia.

5 Adserere, scotomaticum affectum non differre à suffusionibus oculorum, quum utrobique imagines uideantur.

6 Adserere, uertiginem quæ fit per consensum, non esse attribuendam capiti.

7 Adserere, omnem uertiginem per arteriarum sectionem esse curandam.

Confutatio dissentientium circa lethargum & uertiginem.

Impugnat primum Gal. 4 de Sympt. cau. cap. 8. ibi, Caterū quòd capitis repletio somnum conciliet, iam Aristot. satis monstrauit: sed quamobrem oppleto capite prima sentiendi uis quiescat, quum ipsa (ut ille putat) in corde resideat, nullam probabilem inuenire potuit rationem, igitur, &c.

Ad secundū responderet Auic. prima tertij, cap. 16. ibi, Sunt quidam Medici, qui nomināt lethargiam omne apostema frigidū in cere-

R. iij.

bro, siue sit melancholicū, &c. quem uidere poteris. Præterea Gal. loco citato, Lerhargus, inquit, fit à frigiditate & humiditate: sed melācholia frigida est & sicca, igitur, &c.

Ad tertiu: Alex. lib. 1. cap. 20, Si nec uires agrotantis, nec ætas, regio & tēpus obsistere uideatur, sanguinē detrahare in principio statim expedit, &c. Auic. Si non fuerit quod prohibeat, phlebotometur: intellige saltem reuulsuā sectionē cōpetere, si non euacuatiuā.

Ad quartū: Gal. 13. meth. cap. 22, Sed quoniam sutura & præsertim coronaria, nō solum impositi medicamēti qualitates, sed etiā substantiam, (si tenuis est) intrò transmittit: nam præter reliqua, tenuissimum est hoc loco cranium & rarissimum: ergo quotiens medicamenti cuiusque uim uehementer descendere uoles, hoc maximè loco impones, &c. igitur non occipiti, &c.

Ad quintū: Gal. in lib. qui Introductio siue Med. nuncupatur, respondet dicens, quòd caligines oculis offusæ & uertigines cognatæ sunt uitiis morbo caduco, sed inter se differūt, quod experiētia demonstratur: nā in scotoma-

rico affectu leui occasione hebetatur & cōci-
dum, sed non in suffusionibus oculorum, &c.

Ad sextū: Gal. 3. de loc. aff. cap. 8, Verūm
ut iā antea saepenumero monuimus, licet ca-
put per alterius partis consensum afficiatur,
affectio tamen ipsi ascribenda est, &c.

Ad septimum: Galen. 3. de loc. aff. cap. cit.
Quamobrem nonnulli horum ab arteriarū se-
ctione praesidiū petierūt, arterias pone aures
secantes, sed constat non omnes huius auxiliij
beneficio fuisse curatos, &c. Nam fieri potest,
quod inaequalis cerebri intemperies huiusce-
modi spiritum producat, &c.

De morbo comitiali.

Morbus comitialis, Graecè ἐπιληψία dictus,
est totius corporis non omnimoda conuulsio,
ex qua operationes, motus & sensus in mem-
bris prohibetur, per tēporum intervalla acci-
dens, sitque cum repētino casu ac exitu spumæ
oris. Talis uerò conuulsio sequi solet uel à
multitudine grauante, uel ab acri materia
cerebrum mordicante: quod quum tale mo-
lestum reycere conatur, tali motu conuulsio
concutitur, &c.

Loci consentientes de morbo comitiali.

Gal. 3. de loc. aff. cap. 7, Morbus comitialis est omnium corporis partium cōuulsio non perpetua, sicut in emprosthotono, opisthotono & tetano, sed quæ ex temporum accidiis interuallis. Et lib. finit. med. Comitialis morbus est oppressio mentis sensoriorūque cum repētino casu, ac spuma oris exitu. Auic. prima tertij, tra. 5, Epilepsia est agritudo, prohibens mēbra animata ab operationibus sensus & motus in erectione non integrè: & illud est propter oppilationē cōtingentiē, &c.

Obiectio.

Quum Gal. de sympt. diff. cap. 3. dicat, Si non totū corpus cōuellitur, sed principes functiones detinētur, hoc symptoma morbus comitialis appellatur: si igitur symptoma est, quomodo ab Auicen. agritudo dicitur? Præterea cōuulsio est symptoma, sed morbus comitialis est cōuulsio: igitur symptoma & non morbus, ut Auic.

Responsio.

Morbus comitialis sumi potest primò pro

obstructione cerebri uentriculos opplente, uel pro mala intemperie, uel pro mala compositione, & sic his tribus modis est aegritudo: ac sumptus pro motu conuulsio, est symptoma siue accidens, &c. Quur motus conuulsio fiat in cerebro, reddit rationem Galen. 3. de loc. aff. cap. de mor. comit. ibi, Proinde existimauimus similem motum cerebro euenire, qualis stomacho interdum a re quapiam molestato accidere solet, &c. Vide etiam de hac re Aet. ser. 6. cap. 13. De generatione spumae uide Gal. aphor. 2. comment. 43. ibi, Strangulati, &c. & Auic. ibi, Spuma uero accides in epilepsia est propter agitationem motus, &c.

De causis morbi comitialis.

Causae primitivae sunt uictus deprauatus ac potus multitudo, mora in sole nimia, coitus plurimus, exercitium super repletionem: accidentia animi, ut tristitia, ira, timor, euertus, tumultus, auditus uocum terribilium, odor hepatis cerui usti & gagates lapidis, bitumen & cornu ceruinum. Causae antecedentes sunt, insemperies mala totius corporis, complexio cerebri frigida & humida, ex qua flatuosus

Spiritus generatur, uel malus humor, ut pituita, atra bilis, sanguis uel materia ueneno-
sa. Causæ coniunctæ sunt, uapor uel flatus
crassus, uel talis humor actu obstruens. Cau-
sæ uerò per consensum, omnia membra, à qui-
bus uapores ad cerebrum mittuntur, sicut to-
tum corpus, stomachus, lien, & cætera mem-
bra, à quibus uapores eleuari possunt.

Loci consentientes de causis
morbi comitialis.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 6, Iam alios uidi-
(mus (loquens de causa primitiua) cōuulsione
comitali ob oris stomachi uitium correptos,
quos aut nō probè concoxissent, aut uini me-
racioris plurimum potassent, aut Veneri im-
modicè operam dedissent. Auicenn. prima ter-
tij, tract. 5, Et causas mouentes epilepsiam
plerunque adiuuant causæ extrinsecæ, sicut
immoderantia cibi & potus, & satietas nau-
seatina, & mora plurima in sole, & coitus
plurimus, & exercitium super repletionem,
& id quod debilitat cor ex timore, &c. Aet.
ser. 6. ca. 14, Epilepticos collabi faciunt suf-

IN CVR. MORB. LIB. II. 269

fit, bitumen, lapis gagates, cornu ceruinum,
 odor hepatis caprini assati, & ipsum hepar
 dum editur. Hoc idem habet Paul. lib. 3. cap.
 13. Gal. aphor. 2. cōm. 45, Magna ex parte
 uictus deprauatus hanc passionē generat.
 Matthæus de Grado historiam de suo filio re
 citat, qui ex magno tubarum sonitu in epi
 lepsiam ceciderit. De causis antecedentibus
 & coniunctis loquitur Gal. 3. de loc. aff. ca.
 7. ibi, Non ab ariditate uacuationēque, sed
 à crasso semper humore hanc affectionem
 induci argumento est, quod & subito fit, &
 soluitur confestim: nam subitariam meatuum
 obstructionem à crasso uiscosoque humore
 fieri constat. Paulus lib. 3. cap. 13, Morbus
 comitialis habet causam partim in ipso cere
 bro, partim in uniuersis uentriculis subsistē
 tem, modò humorem pituitosum, modò melā
 cholicum. Itidem ait Gal. 3. de loc. aff. ca. de
 Mania. Auic. prima tertij, tract. 5, Tunc
 restat ut eius causa sit, aut contractio cere
 bri ad expellendam rem impediētem, quæ
 est aut uapor, aut qualitas mordicatiua, aut
 humectatiua malæ substātiæ, aut humor fa

ciens oppilationē & spasmum non integrum
 in uentriculis cerebri, & principys originis
 neruorū, &c. B. Nota quod hæ tres causæ, sci-
 licet uapor, humor & qualitas uel mordicās
 uel substātia uenenosæ, mutuā adeò beneuo-
 lentiā in se agunt, ut una sine altera effici nō
 possit, & sic intelligitur Auic. Ipse uerò lo-
 quens de causa materiali inquit, Fieri à san-
 guine plurimo dominante, aut à phlegmate,
 aut à melācholia, aut à cholera, & est par-
 ua ualde, &c. Hippoc. de sacro morb. Pitui-
 rosis fit natura non biliosis. Gal. 4. de loc.
 aff. loquēs de sopore, apoplexia, & morbo co-
 mitiali, inquit, Horū trium morborū frigid-
 itas, ac crassus, aut omnino uiscid⁹ humor cau-
 sa est. Similiter 2. aphor. comm. 45. dixit. De
 causis per consensum habes plura ex Gal. 5.
 de loc. aff. cap. de affectu oris uentriculi, ubi
 exemplū de grammatico affert, qui quotiens
 doceret, cogitaret, irasceretur, morbo comi-
 tiali corripiebatur. Item differentias huius
 habes ex Gal. 3. de loc. aff. cap. de morb. co-
 mit. Similiter habes exemplum de puero, qui
 principiū affectionis sentiebat in crure. Præ-

zerea quomodo ille humor ad caput ascēdat,
habet etiā exemplū de ictu scorpionis, quāvis
hæc tertia species rarò contingere soleat,
prout notavit Aer. ser. 6. cap. 13. Paulus lib.
3. cap. 13, Ore ventriculi inquit affecto con-
forty lege oboritur, quemadmodum in colicis.
Itē & ab alijs inquit partibus nascitur, quū
ueluti aura quædā frigidior ad cerebrū ascē-
dat, aliàs à crure, aliàs à man⁹ digitis, aliàs
ab utero mulieris grauida, &c. Auic. prima
tertiū, tra. 5. Membra ex quibus vapores ele-
uantur ad cerebrum, epilepsiā facientes, sunt
aut totum corpus, aut splen, aut stomachus,
aut myrach, & contingit etiā illud in re-
liquis membris, &c.

• De signis morbi comitialis.

Signa cōmuniter præcedētia, sunt mutatio
corporis à complexione sua, grauitas capitis,
tristitia, & eorū quæ iuxta sunt, obliuio, ima-
gines insomniorum turbulentiæ, pallor faciei,
inordinatus linguæ motus & ira. Signa mor-
bū demonstrātia, sunt spuma oris, repētinus ca-
sus, oris ac faciei distractio, cernicis ac totius

tremor, dentium constrictio, stercoris ac urine ac etiam spermatis inuoluntaria emissio. In uehementi morbo si spuma ab ore abstergetur, denuo resurgit, in debili uerò non amplius reuertitur, uel in debili citò resoluitur, in uehemēti nequaquam. Signa pituitæ sunt, si spuma sit crassa ac multa, si urina uitro liquefacto sit similis. Cognoscitur etiam ex uomitu, ab ætate, à regione, à regimine præterito, à colore faciei, & ab alijs ut dictū est in primo lib. Signa demonstrantia morbum esse in capite uel in alijs membris sunt, quia si in capite, præcesserunt sensus & motus læsiones, aut obliuio, aut amentia, &c. Si in stomacho, cognoscitur ex nausea, uomitu, erosionē, & sic de reliquis morbis, &c.

Loci de signis morbi comitialis.

De signis præcedentibus Auic. ibi loquitur & plurimū antecedit mutatio corporis à cōplexione sua, &c. Paulus lib 3. cap. 13, Præcedunt quedā, animi tristitia, eorum quæ iuxta sunt, obliuio, turbulentiæ insomniorū imagines, dolor capitis, cuiusque repletio cōtinua,

Et ob iracundiam faciei pallor, inordinatus
linguae motus, &c. De signis morbum demō-
strantibus loquitur Razes 9. alman. cap. de
epilep. Quum aliquis cadit in terram, & tor-
quetur, & commouetur, & intellectum amit-
tit, dicimus esse epilepticū: quod si spuma exi-
per os, aut se commingit, aut sperma egredi-
tur, aut egestio, passio tunc est grauior ac ue-
hementior, &c. Paul. cap. cit. Quamprimum
morbus inuadit, concidunt aegri, uoxque in-
terrūpitur: peculiari morbi nota est oris spū-
ma. non desunt quibus urina & stercus prae-
ter uoluntatem excernitur, &c. B. Haec signa
de uehementi epilepsia intelliguntur: nam in
debili non omnia adsunt. Vide de ijs tamen
fufius Arcul. Sauonarolam, Gordonium & ca-
teros practiçantes.

De signis humorum lege Auic. prima tertij,
era. 5. ibi, Et signa eius cuius causa est phle-
gma, &c. uide eum fufius: nam omnia anno-
tasse longum ac prae ter rem foret.

De signis per consensum loquitur ibi, Qui
non ex propria cerebri affectione, sed per cō-
sensum comitiali morbo laborant, ij citra
S. i.

perpetuā conuulsione, ueluti saliendo per interualla cōcuti uidentur. Manardus in epist. 6. lib. 3, Quando per consensum paritur, non accidunt uehementēs & assidue cōuulsiones, sed per interualla breuibus quibusdā saltuosis motibus patiens concutitur. Gal. 5. de loc. aff. cap. de oris uētriculi affectione. & Paul. lib. 3. cap. 13. Similiter Alex. ca. de sacro morbo, Si per consensum stomachi eueniat, cognoscitur ex nimia uentriculi repletionē, aut ex inedia, aut syncopi, ex nausea, uomitu, erosionē, &c.

De cura morbi comitialis.

Id in primis prauidendum est, an in ipsa morbi exacerbatione aeger actu sit an extra. Si in exacerbatione, tunc unica tantū curādī intētio erit, scilicet ab exacerbatione liberatio, quæ fieri potest cū reuulsione uaporū ad alia loca per cucurbitulas, frictions, clystres, suppositoria, aut per odores sensum irritantes, cū castoreo, succo, cirenaico, id est, assa foetida, succo rutæ, &c. Si uerò patiens fuerit extra exacerbationem, tunc conside-

ra nū inceptit, uel incipienda sit agritudo:
 quæ si non inceptit, sed incipienda timea-
 tur, tūc una tantū erit curandi intētio, præ-
 seruare scilicet ne patiens dispositus in hanc
 agritudinē incurrat, quod fiet si superuaca-
 neas humiditates abstulerimus cū electuario
 ex saccharo & amygdalino oleo aut sisami-
 no: parato, aut si ea quæ à proprietate comi-
 tialē morbum expellūt, dederimus, sicut peo-
 niā, &c. aut infantes ab omni strepitu & ti-
 more custodierimus: aut si nutrix à coitu, à
 crapula, & ab his quæ lac malum generare
 possunt, sese abstinuerit, &c. Si uerò morbus
 iam dudū inceptit, causam tūc primū in-
 quirito, quæ si fuerit pituita tanquā maiori
 ex parte cōtingens, uide num per primariarū
 affectionē, aut per consensum efficiat: si affe-
 ctio primaria sit in cerebro uel in uentricu-
 lis eius, tunc quinque erunt medendi inten-
 tiones. Prima, uictus ratio. Secunda, humoris
 preparatio. Tertia, euacuatio. Quarta, reuul-
 sio. Quinta, cerebri roboratio, ac residui reso-
 lutio: quāquā si ad Galeni dogma accesseri-
 mus, unic⁹ tantū erit curādi scop⁹, qui est ob-

S. ij.

structionis remotio. Victus ratio sit incidens ac extenuans, qualis est capparum usus, sitque laudabilis chymi, non superflue humectans. Cauenda est insuper repletio, et mala digestio, semel in die reficiatur ager si tolerat. Cave etiam ne uentriculo pleno superueniat exacerbatio, caueant etiam à crassis carnibus multa superfluitatis, et à leguminibus uinoque copiosiori: nam paucitas uini dilatat animam, inquit Auic. et excusat à multitudine. Item à ueneris liberalioribus, à balneis ante purgationem, à sinapi, eo quod cerebrum sua acrimonia percutit. Caueant insuper à calore et frigore superfluo, à uentis, si possibile sit regionem permutantes. Quies et tranquillitas laudatur, et exercitium post euacuationem. Somnus super repletionem uitandus, et uigilia superflua: nam spiritum resoluunt ac debilitant. Preparatio humoris perficitur per ea, quae incidendi ac extenuandi uires habent, quale est oxymel simplex et compositum et scilliticum, syrupus de absinthio, apozema ex hisso-po et origano, syrup. de stechade, de hisso-po, rhodomel, et c. cum decoctis saluiae, hisso-pi, ru-

*te, maiorana, radicū iridis, scillæ, uisci quer-
cini, peonia, florū rosmarini, stachados, gly-
cyrrhizæ, acori, passularum, nucus moschata,
cinnamomi, betonica, &c.*

Euacuatio erit, si repletio uniuersalis exi-
stat cū pituita, & nihil aliud prohibeat, per
sanguinis à cubito missionē: si minus, fiet cum
turbito agarico, cum hiera Ruffi, cum pilulis
chochijs fœtidis, polypodio. Si uerò fuerit af-
fectio atrabilaris, cum helleboro, pilulis in-
dis, de lapide lazuli, cum myrobalanis & si-
milibus, &c. Vel euacuatio fiet cū electua-
rijs dissolutis in aliquo decocto, sicut cū dia-
phinicone, electuario indo, &c. ut suprà rela-
tum est in capite cephalææ. Reuulsio, id est,
ad inferiora materia deductio, perficitur cū
eucurbitulis dorso & præcordijs etiam cute
incisa affixis, aut enemate ex cœtaurio, colo-
cynthide, additis quibusdā electuarijs ad hoc
propositū facientibus, ut hiera diacolocyn-
thidos, hiera simplici, & oleis, & rhodomel-
le, deinde frictionibus, lotionibus circa crura,
quib⁹ annecte deriuationes quæ sūt per ster-
natoria, masticatoria, gargarismata, &c.

S. ij.

278 DE CONSEN. MEDIC.

Roboratio ac residui resolutio fieri possunt per exteriora & interiora, remouendo malam intemperiem derelictā, ne ipsa remanēte, noua materia denuò aggregetur. Interiora sunt diacorus, diamusculus dul. cōfectio pliris, arcotico Nic. theriaca, mitridatū, acorus conditus, & quacūque à proprietate occulta conferre dicuntur, de quibus plura à nobis dicta sunt in fine capituli, & sunt, peonia, ruta, corium frontis asini, &c. Exteriora sunt sacculi, commissura coronali & sagittali appliciti ex maiorana, stechade, ruta, peonia, nucem moschata: uel fiat eodem in loco sinapismus, aut cauterium aliquod potentiale uel actuale usque ad ossis superficiem, & ulcus per aliquot dies apertum conseruetur. At si per alicuius partis consensum morbus comitialis acciderit, procurandum, ut membri, à quo malus uapor ad caput reptat, mala dispositio remoueatur, uel ascensus prohibeatur cum ligatione arcta, uel cucurbitulis, uel loci apertione, prout magis expediet: deinceps cerebrum, ne uapores suscipiat, roborādum, & quod susceptum est, resoluendum, &c.

Loci consentientes de cura
morbi comitialis.

Aet. ser. 6. ca. 13, Cura tempore exacerbationis erit, partes obtortas deligare, inūgere, & dirigere odoribus, sensum irritare & perseverante exacerbatione castorium aut succum cyrenaicum ori cum aceto mulso infundere, &c. B. Intellige de his qui post annos pueriles in morbum concidunt. Arcul. de cura epilepsiae, Quaedam administranda in tempore paroxysmi diuertendo cum fricationibus, ligaturis, & suffumigium ex assa citò remouet paroxysmum, &c. Vide in hoc ceteros practicantes, sicut Gord. Marc. Cat. Sa-uona. itidem habes Auicē. ibi, Et finis actionis causae eius est, alleuatio à prauitate paroxysmi, &c.

De praeservatione lege Mesuen, ibi: Praeseruant quaecunque à proprietate retardant paroxysmum, aut prohibent aduentum eius omnino, aut occultant, sicuti dicemus, &c.

Auicē. prima tertij, tra. 5, Epilepsia in infan-
tibus curetur ita, ut nutrimentū lactantis re-
s. iij.

Etificetur, unde lactās alienet à se omne quod generat lac aquosum, aut corruptū, aut grossum, & prohibeat sibi coitum & pragnationem, & alienetur infans ab omni re, in qua est timor, & uoces magni sensus, ut uox tonitruui, fulguris, &c.

Razes primo comment. cap. de epilep. scribit plures medicinas morbum prohibentes, calesfacientes scilicet & exiccantes, quas etiam habet Auicen. loc. cit. & sunt peonia, quam Gal. 6. de fac. simp. tantopere laudat, suspensa uel in potu data, & quaecunque infra ex mente Dioscor. recitabuntur, &c. Quod primum in omni morbo inquirenda sit causa, habes ultra Auicen. & Galeni textum, etiam duos Ausonij uersus, in quibus omnes ferè intentiones curandi habentur, & sunt,
Quis morbus, quæ causa facit, qui casus ab illo

Nascantur, quæ cura modo, quis deniq; finis.

Mesu. in cura epilep. Sunt quinque intentiones: Prima regimen in uita ponit, secunda aequat & coaptat materiam, tertia abscindit eā, &c. in hoc consule nō solūm Græ

cos omnes, sed etiam ceteros Arabes: nam fu-
 sius de his pertractant. De victus ratione lo-
 quitur Paulus lib. 3. cap. 13. ibi: Victus ratio
 utilis est, quæ incidit & extenuat, idcirco
 capparis esus & salsamentum prodest. Auic.
 prima tertij, tract. 5, Commune est omnibus
 epilepticis, ut utantur cibis laudabilibus, qui-
 bus inest humectatio laudabilis, nō superflua,
 caueant à repletionē, & custodiant se à ma-
 litia digestionis. Qui uerò non tolerant ut
 semel reficiantur, diuidant cibū suum in tres
 partes, & sumant duas tertias in prandio, &
 tertiam in cœna, &c. B. Hic Auicenna locus
 effecit, ut discrimen illud inter neotericos na-
 sceretur, utrum cœna maior prandio esse de-
 beat: sed quum utrinque robustæ ac ualida
 rationes afferantur, tu tamē aduerte, ne ad-
 ueniente exacerbatione siue uesperis, siue ma-
 nē, quòd uentriculus sit ualde plenus. Vnde
 Auicen. Et oportet ut occurrat paroxysmus
 cum inundatione stomachi, &c.

Paul. lib. & cap. cit. Fugere, inquit, oportet
 carnes, legumina, uinum copiosius, Vene-
 rem liberaliorem, balnea, sinapim, &c. Auic.

cē. loc. cit. Oportet ut alienent omnes fructus
humidos & grossos, nisi stypticos super cibū,
qui roborant stomachū, & repletio uini mul-
tum nocet, sed parum ex ipso sumptū dilatat
animā, & confortat spiritum &c. Mes. Hy-
dromel est potus elegantior, quā uinum. A-
uicē. Et oportet ut alienent à se omne acre &
uaporosum, & uitent cibos graues, ut sunt ra-
phanus, caules bauciæ, id est pastinacæ, &c.
lege hunc locum fusius, & plurima à me di-
cta inuenies. Celsus lib. 3. cap. 25, Cauendæ
sunt cruditates, loci que præcipitis cōspectus,
omnia terrentia, uomitus, lassitudo, sollicitudi-
nes & negocia omnia, &c. De humorū præ-
paratione loquitur Auicē. loc. cit. ibi, Et ex
syrupis est oxymel squilliticum, & similiter sy-
rupus de absinthio, & apozema hissoi cum
origano, &c. Itidem Mes. ibi, Adaptant ma-
teriam, ut eius facilis fiat expulsio, qualia
sunt squilla & acetum eius & oxymel, &c.
Et Paulus, Auxiliatur his oxymel scilliticum
quotidie potum, &c. De euacuatione loqui-
tur Aet. ser. 6. cap. 14, Si nihil dicens prohi-
beat, uenā secare oportet, & intermissis qua-

tuor aut quinque diebus corpus reficere, ac sic infra euacuare, maxime per ueratrum nigrum aut colocynthidem, &c. Itidem adserit Paulus & Auicenn. ibi, Melius quod purgetur illa, cuius causa est phlegma, est hiera & pulpa colocynthidos, & hiera hermetis. Quod si cum phlegmate est repletio uniuersalis, tunc phlebotomia, secundum quod narrauius, est ei iuuatiua, &c. De reuulsione & deriuatione uerba facit Mes. cap. de epilepsia, ibi, Competunt gargarismata & sternutatoria, & proprie uomitus, & masticatoria, & fricationes, & ligaturæ in extremitatibus, & ueniosationes in eis, & emplastra rubificantia super membrum mandans, &c. Itidem Auicenn. & Paulus ibi, Synapismus capiti inducatur, &c. Et Auicenn. ibi, Ex eis uero quæ materiam ad inferiora trahunt, &c.

De roboratione cerebri ac residui resolutione habes plura ex Auicenn. prima tertij, trac. 5. ibi, Et post illud permuta complexionem cerebri cum confortatiuis, calefacientibus, ex emplastris & sinapi, &c. Paul. lib. 3. cap. 13. iubet ad hoc caput esse tondendum, & ex

peucedani liquore, cui spondylium sit inco-
ctum cum aceto diluto, perungendum, &c.

Mes. Et in omnibus his rectificatio cerebri de-
bet esse intentio prima, &c. Arcul. Vnum est
ut fiat attractio materierum de profundo ca-
pitis ad cutim, ad quod valet hoc emplastrum.
Rz ammoniaci dissoluti cum pinguedine ana-
tis vel milui uncias duas, fermenti unciam
unam, sinapis unciam semis, cantaridarum
3.5. peoniae 3.ij. fiat emplastrum, quo remoto,
inungatur cum pinguedine milui, & iterum
apponatur & auferatur, donec crusta appa-
uerint, &c.

Quæ excitare possunt mor- bum comitiale.

Excitant epilepsiam apium, & in hoc con-
sentiunt Plinius lib. 20. Auicen. Serapio, &
Mes. Item allium, asphaltum, nidor, cornu ca-
præ, uel hirci, uel cerui. Item ostracorum, &
sulphuris suffumigium, lacque omne nocet se-
cundum Serapionem.

Morbum comitiale curantia.

Cardamomum, balsamum, populus nigra,

IN CVR. MORB. LIB. II. 285

ficus, iuncus odoratus, lepus terrestris, muste-
la, iecur, & unguis asini, lichen equi, iecur
birici, hirundines, lac humanum, coagulum,
fel, sanguis, finum, plantago, eryngion, ruta,
seseli, libanotis, spondylium, peucedanum, la-
serpitium, galbanum, segapenum, ammoni-
cum, trifolium, coniza, anhyllis, symphyron,
cestron, pentaphylon, viola purpurea, helle-
borum nigrum, ampelos leuce, oxymel, ace-
rum scillite, lapis selenites, lapis aëtites, &c.
Confectiones ad hunc morbum idoneae sunt,
aromaticum moschatum, confectio Nic. confe-
ctio de moscho, diacastoreum Nic. potio san-
cti Pauli, pliris arcoticon Nic. pilula inda, pi-
lula Alex. de sex rebus, pilula ex artemisia,
&c. Si quis scire uoluerit, quo pacto applica-
ri debeant simplicia legat de singulis, Diosc.

Quae curant à proprietate.

Hugo, Curatua à tota specie sunt, hepar lu-
pi, hepar milui, pellis frontis asini portata su-
per carne nuda, cingulum ex pelle caudae lu-
pi, aut frontis eius, mesica apri cum urina pul-
uerizata, omnia coagula & propriè leporis.

pyretrum conditum, peonia, uiscus quercinus,
caput cuculi, oua corui, far, smaragdus por-
tatus, lapis spongia, phylipendula in cibis, os
hominis, &c.

De prognosticis morbi comitialis.

Hippoc. aphor. 2. aphor. 45, Quicumque in-
uenies morbo comitali laborat, mutatione æ-
tatis, temporum & locorum, & uictuum quo-
que liberatur. B. id est, Quæcunque possunt
patientis temperaturam permutare, ea à morbo
ipsum liberant. Et aphor. 5. apho. 7, Quibus-
cunque morbi comitiales fiunt, ante puberta-
tem, mutationem accipiunt: quibus autem ui-
gesimo quinto, commoriuntur. B. Nota quòd
pubertas durat à 14. usque ad 25. annum.
Gal 3. de loc. aff. ca. de morb. comit. Porro in
his omnibus affectibus, in quorum numero est
epilepsia, periculi magnitudinem ex anhel-
tus nocumento conicere oportet. Paul. lib. 3.
ca. 13, Si acutissimus fuerit affectus, tum ob
crebras accessiones, tum ob symptomatum ue-
hementiam statim iugulat. Itidem Aet. &
Avicen. ibi, Et quando continuantur paroxysmi

mi epilepsia, interficit, &c. Paul. lib. de dynamidijs, Si quis lunaticus spumat, & oculos conuertit, & fremit, & mugit, & cadit, & membra contraxerit, & colorem similem croco habuerit, moriturus est. Razes 1. comene. authoritate Hippoc. Multi pueri moriuntur ex eo, quia eorū uenæ arctæ sunt, & phlegma plurimum recipere non possunt. Auic. prima tertij, tract. 5, Et quando apostemata apparent in ea, fortasse resoluunt eā, & minuunt materiam eius, & multotiens mutatur epilepsia ad melancholiam, & multotiens resoluitur propter febres, quæ sunt longæ, & epilepsia melancholica est deterior, quàm phlegmatica, &c. Michael Sauonarolus inquit, quòd si infans est genitus tēpore menstruorū, uel præsente epileptico, quòd incurrit in epilepsiam incurabilem, sed quur ita sit, diuinare non possum, & fortè pace sua diexerim, hoc somniauit. Hippocr. de mor. sac. Quum inueterauerit, amplius medicabilis non est, quoniam cerebrum pituita consumitur & liquefit, quo liquefacto, crebrius corripitur, &c.

Authores dissentientes circa mor-
bum comitiale.

- 1 Adserere, in epilepsia sensum & motum
omnino integrè auferri.
- 2 Adserere cū Auerrho, causam immedia-
tam epilepsia esse uaporem absque materia
fouente.
- 3 Adserere, epilepsia causam & locum af-
fectum non idem esse cum apoplexia.
- 4 Adserere, epilepsiam per consensum post
pubertatem non posse curari.
- 5 Adserere, omnem mutationem ad cali-
dam complexionem & siccam curare epilep-
siam.

Confutatio dissentientium circa
morbum comitiale.

Ad primum respondet Genilis & Auer. 3.
collig. ca. ult. quòd in epilepsia in relationem
ad apoplexiam, non auferitur sensus & mo-
tus omnino integrè, quia cuiuslibet epilepsia
obstructio non est integra, seu omnimoda, ut
in apoplexia, uidem Galenus & Auicem. ut
suprà.

Ad secundum, Auic. prima tertij, tra. 5. impugnat ipsum Auerrhoim, probans quòd pura qualitas sine materia fouente hoc per se efficere non possit. Vide tu eius rationes. Hoc idem ait Gal. 3. de loc. aff. ca. 7. ibi, Planè constat hanc in cerebro affectionem consistere impediende humore animale spiritum, quo minus possit exire, &c. Ex quibus uerbis nò puram qualitatem, sed potius humorem causam esse conijcere possumus, &c.

Ad tertium, Gal. aphor. 2. com. 45, Morbus comitialis, inquit, est proximus quodammodo apoplexiæ, quò idem locus in utroque patiatur, & idem humor in causa sit, &c.

Ad quartum, Gal. 5. de loc. aff. ca. 6. exemplum affert de quodam grammatico, qui ex affectu oris uentriculi morbo comitiali corripiebatur, cui proba concoctionem procurans, & robustum uenterculum efficiens, simulque purgans cū hiera, uiginti annis, quibus postea superstes fuit, integra uale tudine uitam exegit. Quæ si uera sunt, sequitur, quòd ea quæ per consensum fit, saltem si non quæ per essentiam curari possit.

T. i.

Ad quintum, Gal. 2. aphor. commē. 45. respondet, quod non qualibet mutatio morbum soluit comitiale, sed ea tantum, quæ calidior rem & siccior corporis habitum efficit, &c. Igitur non qualibet mutatio, sed quæ corpus tantum ad has qualitates peruertit, &c.

De apoplexiæ descriptione.

Apoplexia, est quædam uentriculorum, cerebri, obstructio, per quam membra motu & sensu priuantur. uel ἀποπληξία, quæ Latine dici potest Syderatio, est priuatio motus & sensus totius corporis, unâ cum læsione principalium actionum derepente incidens, in qua non tantum motus & sensus, sed etiam interdum ipsa spiratio uehementer impeditur, & hæc acutissima est apoplexia.

Loci consentientes de descriptione apoplexiæ.

Auic. prima tertij, tract. 5, Apoplexia, est otiositas membrorum, a sensu & motu propter oppilationem contingentem in uentriculis cerebri, & in cursibus spiritus sensibilis & motiui, &c. Paul. lib. fini. med. Apoplexia, est

detectio mentis cum priuatione sensuum & corporis resolutione, &c. Cels. lib. 3. ca. 27. mentionem facit de apoplexia simul & paralyti. Paul. lib. 3. ca. 18. & Aet. ser. 6. ca. 27. describunt etiam apoplexiā, ibi, Est affectio cerebri, priuatio motus & sensus totius corporis, &c. Similiter Gal. aphor. 2. commēt. 42. ibi, Vbi in apoplexia totū corpus sensu & motu priuatur, solus restat anhelitus. Qui si etiā ipse prohibeatur, maxima est & acutissima hæc apoplexia, &c. Auer. 3. collig. ca. ult. Apoplexia est, quum homo cadit in terram, & cessat eius uox, & priuantur omnes operationes motus totius corporis, &c.

De causis apoplexiæ.

Quā apoplexiæ causa sit obstructio, ut dictum est, duplex erit obstructionis causa, uel clausio, uel repletio. Clauditur cerebrum, uel ex causa uirtutem stimulante, unde fugit & contrahit: uel ex causa dolorem inferente: uel ex mala qualitate, frigida, styptica, uentriculos cerebri opprimente. Repletur cerebrū uel ab apostemate calido uel frigido, uel ex mate

T. ij.

ria pituitosa uel melācholica uel sanguinea,
rarò fit à pallida bile: fit etiam à percussio-
ne, aut casu, aut per consensum, &c.

Loci cōsentientes de causis
apoplexiæ.

Auic. prima terrij, tra. 5, Hæc quidem op-
pilatio fit aut propter clausionem, aut pro-
pter repletionem. clausio fit, quum id ad cere-
brum perueniat, quod dolorem facit, aut im-
pediat, & moueatur motu contractionis, aut
qualitas perueniens ad ipsum stypticum, faci-
ens, &c. Repletio aut est apostemans, aut nō,
&c. lege fusius, & cætera habebis. Gal. apho-
ris. 2. cōment. 42, Omnes autē apoplexiæ fiunt
in animali non potēte ad partes infra caput
existentes defluere, aut propter aliquam dis-
positionem inflāmationi similem, quæ sit in
ipso cerebro constituto, aut uentriculis ipsis
humore pituitoso oppletis, &c. Paul. lib. 3.
cap. 18, Origo uitij est ex frigidiorē pituita,
quæ principalissimo cerebri uentriculos una
uice & cumulatiim replet, &c. Gal. aphor. 6.
com. 56, Apoplexiæ & cōuulsiones fiunt pro-

per humorem pituitosum aut melancholicū,
 quoniam cōmunis utrisque est crassitudo. B.
 Hac ratione motus Hippoc. in aphor. 57. eius
 dem dixit apoplexias fieri à quadragesimo
 usque ad sexagesimum, quoniam in his maxi
 me temporibus abundat uterque humor, &c.
 In reliquis lege Aet. ser. 6. ca. 27. in princi
 pio: item Galen. 4. de uict. in morb. acut. com
 ment. 27. & 3. de loc. aff. ca. 7. Item Alex. &
 Arcul. & Gord. &c.

De signis apoplexiæ.

Signa præcedentia sunt, dolor capitis, uer
 tiginēs & scotomiæ, uenarū circa guttur in
 flatio, totius corporis tremor, & stridor den
 tium in somno, grauitas ac pigritia, frigus ex
 tremarum partium, motus difficilis, urina æ
 ruginosa, atra, & modica. Signa actualis a
 poplexiæ sunt, quia subito infirmus cadit, &
 ueluti attonitus iacet, uox amittitur cum to
 tius corporis sensu & motu citra febrem, in
 somno sterit, uocatus non respondet, nec di
 uulsis pilis uel stimulo punctus non sentit.

Signa apostematis sunt, febris superueniens

T. ii.

dolor, &c. Signa loci affecti sunt, quia si fuerit in uentriculis prioribus, aut in meatibus qui ἰατρὸς δέει dicuntur, tunc resolutæ erunt faciei partes, aut odoratus uitiatur: si in uentriculis posterioribus, tunc resolutio erit in spinæ principio. Signa humorum non est ut totiens repetantur, quum à nobis aliàs satis superque relata sint. Signa quibus apoplexia à suber, syncopi, epilepsia, uteri stragulatu, & à defuncto corpore differat, intelliges ex locis allegandis infra. Signa eius quæ fit à percussione, aut à casu, cognosces ex narratione infirmi, &c.

Loci consentientes de signis apoplexiæ.

Paul. lib. 3. ca. 18. loquens de signis præcedentibus, inquit: Præcedunt capitis turbatio, acutus dolor, & iugularium uenarum suspensio, tenebræ oculis offusæ, extremarum partium sine ratione algores, totius corporis palpitatio, motus difficilis, & dentium in dormiendo stridor, urina æruginosa, atra, modica, &c. Et Auic. prima tertij, tra. 5. ibi, Antecedunt sôda & inflatio guidex, &c. qua

habet Paulus, sed rudioribus uerbis expressa. De signis presentibus habes locum in Raze, 9. alman. ibi, Quum aliquis quasi dormiens iacet, & sine somno stertit, & quum pungi-
tur, nō sentit, tunc iam patitur apoplexiam: quantitas aegritudinis est secundum quod for-
titer aut debiliter stertit. Oribasius 2 aphor. comment. 47, Cognoscimus esse apoplexiam, dum spumam edit, & extēsiōem molitur & oppressiōem, &c. Itidem Paul. ibi, Procumbunt, id est, attoniti iacent, uox intercipitur, &c. Gal. 1. meth. ca. 9. ibi, Si quis tribus ho-
ris, siue quatuor, siue horæ dimidio, toto cor-
pore sit uehementer arreptus, ut neque sen-
tiat, nec moueatur, hunc apoplecton siue at-
tonitum esse dicimus. Signa apostematis ha-
bes etiam ex Auicenna prima tertij, tract. 5. ibi, Quæ autem est ex apostemate, non eua-
cuatur à febre, &c. B. Idcirco febris fit, quia dum pus conficitur, dolores & febres accidunt, teste Hippocrate aphor. 2. aphor. 47. Signa humorum peccantium similiter ab eodem et Auicenna recitantur ibidem, & il-
la quæ fit ex sanguine, significant signa san-
T. iiij.

guinis prædicta multis uicibus, & est facies rubea, &c. Illa uerò quæ fit ex phlegmate, significat color & forma oculi, &c. lege de his Alex. Arcul. & Gord. De signis quibus apoplexia differt à subet, &c. loquitur primū Auic. ibi, Differētia inter apoplexiā & subet est, quòd apoplecticus clamat, &c. Arcul. Differt à syncopi, quia facies ueluti mortui & pulsus debilis ualde & summersus: in apoplexia uerò facies & pulsus cōsuetus. Differt ab epilepsia, quia hæc cū periodis, & cū motu cōuulsio citò soluitur, & ad paralesim non terminatur ut apoplexia. Differt à uulue strangulatu, quia præfocata sentit, audit, & habet omnes interiorū sensuū operationes, nō autem apoplexia. Differt à mortuo per quatuor signa ab ipso recitata, sicuti per cotum subtilissime carminatū ori admotum, aut per speculū lucidū ac tersum naribus appositū, &c. Vide Marc. Catin. Auic. loc. cit. Et tardetur sepultura ambigui ex mortuis, donec perpēdatur eius dispositio, & nec sit minus 72. horis, &c. Quur insepultus tātō tempore remanere debeat, in hoc consule conciliato-

re: mihi uidetur potissima ratio, quia in hoc potissimum tempore factor apparet, qui mortuum hominem proclamat, &c.

De cura apoplexiæ sanguinæ.

In apoplexia primùm coniectari oportet, an pateriens mortuus sit, an adhuc supersit cū hisdem signis nuper à me recitatis. Deinde si in causa fuerit sanguis, tunc triplex erit curandi scopus: primus reuulsio, secundus euacuatio, tertius malæ complexionis derelictæ remotio. Reuulsio statim fiet per sectionem uenæ saphenæ aut basilicæ, præsertim si corpus fuerit pletoricum, aut solitæ purgationes oppressæ sint: si minus, fiet sectio uenæ cephalicæ, aut uenæ frontis, & sufficiet etiam pro euacuatione. Remotio malæ complexionis derelictæ fiet cum epithemate ex aceto & oleo rosaceo, & hoc in fine, ne in principio morbi ficta magis obstruat.

De cura apoplexiæ pituitosæ.

Cura apoplexiæ pituitosæ requirit quatuor intentiones, scilicet euacuationē, reuul-

sionem & deriuationem, residui resolutionem, & sex rerum non naturalium regimen. Euacuatio fit per sectionem uenæ, si cum pituita signa sanguinis adfuerint. si minus, statim per pharmacum, absque ulla humorum preparatione. Nam tardare in acutis malum est. Aut fiat per enemata, suppositoria, uomitoria, aut per pilulas chochias, foetidas de euphorbio cum syro. de stechade aut aquis capiti dicatis dissolutas. Clysteres parari possunt cum decoctis saluie, maioranæ, rorismarini, origani, calamenti, centaurij, abrotoni, peonia, pulpæ colocynthidos, additis hierelodionis, casia extra. sacchari partibus opportunis, & cum oleo camomillino, rutaceo, laurino, addito sale conficiantur, &c. Suppositoria parentur cum ueratri uel colocynthidos puluere, uel cum speciebus hieræ picræ sale gêmeo, &c. Vomitoria fiant cum penna in oleo liliaceo intincta, ac gutturi immissa, &c. Reuulsio & deriuatio fiet cum cucurbitulis, occipitio cum scarificatione affixis, modò uires permittant. Item cum ligaturis sæpe reiteratis, & cum apophlegmatismis, cum ace-

ro ex origano & thymo decoctis. Item cum sternutatorijs, cum helleboro & pipere, aut cum fricationibus pedum, cum oleo quopiam calido, aut cum suffumigijs ex castorio, popanace, galbano, &c. aut cum synapismo, aut uesticatorio capiti admoto, &c. Resolutio residui perfici poterit, tum per exteriora, tum per interiora. Exteriora fiant cum epithematibus calidis, quæ parantur ex rebus capitalibus, item cum linimentis, inungendo cum oleo de costo, de euphorbio, de castoreo, cum emplastris, in quorum numero laudatur emplastrum de sinapi Mes. aut cum candenti ferro capiti admoto. Interiora perficiuntur per confectiones, electuaria, pulveres, masticatoria, gargarismata: nam ad resolutionem simul ac diuersionem hæc faciunt. Confectiones sunt diacori, confectio anacardina, item quæcunque calida sunt & sicca febrem euocantia, &c. Victus ratio sit calida & abstergoria, in principio tenuis atque exquisita, capiatur tantum hydromel uel aqua hordeacea, modò sanguinea sit apoplexia, procedatur deinde

à tenuissima ad crassiusculam, ita ut solo pane patiens uescatur, quousque morbus iam se remittere incœperit: deinde cibus mollis & succulenter, cōcoctus facilis dādus: similiter uinum aqua dilutum & carnes exhibeantur. Exercitium ante cibum commendatur, uel loco eius fricationes. Somnus modò conceditur, modò damnatur, si fuerit multus, aut si assumpto statim cibo quis dormiat: conceditur uerò ex eo, quod concoctionem adiuuat, & cerebrum roborat, & uaporum resolutionem perficit, &c. Conferunt etiam quandoque animi accidentia, sicuti est irasci, &c.

Locī consentientes de cura apoplexiæ sanguineæ.

Auic. Aliquando accidit, ut homo in epilepsiam incurrat, & non sit differentia inter ipsum & mortuum, idcirco in primis num ager uiuat uel mortuus sit. Mes. cap. de apoplexia, Conaberis à principio materiam subtrahere, in quantum possibilitas exigit: & si sanguineā uideris, utriusque partis illico phlebotoma cephalicā, simul cum emissionē multi

sanguinis, & cōsequēter crura & pedes uen-
 tofari facias, &c. Paul. itidē habet lib. 3. cap.
 18. ibi, Qui curationem admittunt, ijs statim
 sanguis ex uena detrahendus est eadem die.
 Itidē adserit Gal. in introduc. ibi, Sanguis sta-
 tim mittendus, &c. Auic. similiter prima ter-
 tij, tra. 5. ibi, Regimen illius quæ fit ex san-
 guine, est phlebotomia in hora illa, & missio
 sanguinis multi: sanat enim in dispositione,
 id est, citò, & post phlebotomiam clysteriza,
 cum eo quod sciisti de clysteribus, ut depo-
 natur materia à capite, &c. De remouenda
 mala cōplexione loquitur Paul. loc. cit. ibi,
 Caput inungatur oleo camomillino uel ane-
 thino, in quo spondilium decoctum sit uic. Et
 fac ipsum olfacere, quod confortet cerebrum,
 & non calefacit cum eo quod docui te, id
 est, in cap. sodæ, &c. similiter omnes practici
 in hanc concurrunt opinionem.

Loci consentientes de cura
 apopl. pituitosæ.

Auicē prima tertij, tra. 5, Si uerò cum ea
 quæ facta est ex phlegmate inueniuntur signa

sanguinis, phlebotometur, deinde clysterizetur cum clysteribus fortibus, & supponantur collyria fortia, in quibus ponuntur gumæ & fel bouinum, postea bibat quod soluit, &c. Cels. lib. 3. cap. 27, Proderit malo corporis uel sanguis missus uel aluus ducta, &c. Aet. ser. 6. cap. 27, Qui uerò ad uenæ sectionem inepti sunt, primùm ad uomitum cōmoueantur, & sedes ipsorum illinatur ijs quæ flatus educunt, &c. Paul. lib. 3. cap. 18, Oportet & ori per uim aperto digitum uel pennam oleo madefactam inserere, ut ea quæ insunt eijciantur. Auic. loc. cit. Et si possibile est, fac cum uomere cum penna immissa gutturi, illita cum oleo liliaceo, & propriè quum existimatur quod in stomacho, aut in eius ore repletio, &c.

Obiectio.

Celsus uidetur esse huic opinioni contrarius, cum dicat, Non oportet in hoc casu uomere, neque urinam medicamentis mouere.

Responsio.

Intellexit Celsus, si nervorū dolor aut tre-

mor, qui aliquando accidere solet, in præsenti-
 arum adesset, quia tremor nervorum ex vo-
 mitu magis intederetur, alioqui vomitum &
 ipse à cæna utilem non proposuisset, &c. De
 reuulsione & deriuatione loquitur Aet. ser.
 6. cap. 27. ibi, Post purgationem cucurbitæ
 præcordijs aut capiti affigantur cum scarifi-
 catione. Similiter Auic. prima tertij, tra. 5.
 ibi, Et non est malum post euacuationem ipsius
 cum clysteribus & similibus, ut naribus ali-
 quid approximetur, & propriè conditi &
 caput purgia fortia, &c. Itidem Paul. loc.
 cit. ibi, Si vires permittant, cucurbitulæ occi-
 pitio cum scarificatione defigantur, & si fie-
 ri potest, etiam præcordijs. Valetudini etiam
 faciunt quæ sternutamenta excitant, & apo-
 phlegmatismi ex thymi & origani decoctis
 parati, &c. De resolutione residui habes plu-
 ra ex Auic. loc. cit. ibi, Et fiat post super ca-
 put eius uaporationes calefacientes, sicut ex
 anetho, amaraco, folijs citri, calamento, ori-
 gano, &c. Vel fiant inunctiones ex oleis cale-
 faciētibz & confortatiuis, & ignitū ferrum
 apponatur capiti, uel aliquod emplastrū ex

resolutius quæ sciisti, &c. Et hæc de exterioribus, nã de interioribus postea medicamentis loquens dixit, Et cum uideris alienationem, fac gargarismata, sternutationes, & pone uentosas super collum, &c. De regimine uictus, Aet. ser. 6. cap. 27. inquit, Curadũ est ut accipiant cibos quotidie quidẽ, uerũ paucos, leues & calidos, & extersoria ui præditos, plerũque cum melle edulcatos, intellige in pituitosa apoplexia. Auic. prima tertij, tra. 5. Et subtilia regimen ipsius, & sis contentus in eo Iuleb, & aqua hordei subtili & aqua casei. Intellige in prima die, & in sanguinea apoplexia: nam de pituitosa postea loquens dixit, Et potus eorũ sit aqua mellis, & panis cum ficibus siccis est bonus eis. Quidam uerò dicunt ex eis esse bonũ origanũ cum lentibus, & uua passæ, & amygdala & ficus sunt ex fructibus cõuenientibus eis, &c. Paul. lib. 3. ca. 18, Vbi morbus se remisit, cibus mollis, distribui facilis & succulentus assumetur. Et paulò infra, Vinum tenerũ, calente aqua temperatum potui exhibebitur, &c. Auenzoar, Sint carnes syluestres, nõ in domibus pingues

facta, unde passeres & omnia minutarum a-
uium genera in declinatione morbi cōueniūt.
Auic. loquens de uino inquit, Non nouum sit,
ob eius superfluitatem: non antiquum, ob ue-
locem eius penetrationem, sed inter utrunque
eorum magis erit cōueniens: intellige inclina-
to morbo, nam in principio nusquam conue-
nit. Cels. lib. 3. cap. 27, Potus sit sine uino a-
qua calida, id est, in principio. Auēroar, Nec
potent aquam frigidam, nec aquā per se, sed
aquam tepidam cum syrupo corticū citonio-
rum cum melle. si uerò dederis uinū, da solū
unciam unam in fine pro cōfortatione mem-
brorum, &c.

De motu loquitur Auic. ibi, Quum autem
uoluntas adest ut cōueniat, non est malum, si
antē prēmittatur exercitiū leue, & moueant
membra laxata motu aliquo, &c. Paul. Ge-
stentur acri curru aut lectica aut lecto pen-
sili, &c. De somno & uigilia Auic. dixit,
Quum aliquid assumunt, non dormiant super
itsum uelociter, sed expectent aliquantulum,
donec descēdat & digeratur digestionē ali-
qua, nec etiam plurimum uigilent: illud enim

inuuat cerebrum, & resoluit ex cibis uaporem non digestum prohibentem digestionem, &c. B. Hinc pende quorundam errores, qui nullo pacto apoplecticum dormire permittunt. Caveat tamen etiam medicus, ne ex hac Auic. licentia agrum in somno postea perdat: unde apprehenso manibus pulsu, si nimis sentiat calorem profundari, statim infirmum excitet, ne amplius dormiat, &c.

Observationes de sectione venæ.

Aet. ser. 6. cap. 27, Copia sanguinis quæ detrahatur, diuidatur: commouere enim tantum oportet, non vires exoluere, & calorem extinguere, &c. Marcus Catinarius, Ne secures uenas guidez, id est, iugulares, sicuti præcipit Razes, nam difficillimè consolidatur: & recitat historiã de quodã scholari in his uenis uulnerato qui mortuus est. Paul. 4. de uic. in morb. ac. cõment. 27, Primùm ante sectionẽ uult per omnes corporis particulas frictiones fieri, ut sãguis extenuatus facilius exeat, &c.

Observationes de topicis.

Auic. prima tertij, cap. de apople. Et oportet

et ut incipias à debiliore unctione, si cōferre
 & si non, adde, & permuta ad id quod est
 fortius.

Obiectio.

Auic. primo can. fen. quarta, cap. 1, In for-
 ti morbo debemus, inquit, à fortiori medica-
 mēto incipere, quomodo hic adserit cōtrariū?

Responsio.

Tuæ obiectioni respondet Concil. differen-
 tia 154. inquit, esse hanc curam Auicennæ
 sententiam, &c. Vide eum fusius si lubeat.

Observationes de potu.

Auic. loc. cit. Et potus super cibum est ex
 rebus magis nocivus, ac si diceret, à prandio
 uel à cœna nullo modo bibant, &c.

Apoplexiam excitantia.

Excitant apoplexiam fungi, mandragora,
 & pomorum nimius usus & odoramentum.

Apoplexiam curantia.

Cōferūt apoplexiæ absinthiū, anacardus,
 acorus, betonica, colocynthis, gallie odoramē-

V. ij.

tum, euphorbium, piretrum, confectio anacardina, theriaca, dia'esseron, theriaca magna, hieralogodium, & quaecunque dicta sunt in capite epilepsiae, huc referantur. Vide insuper aggregatorem cap. de apop. Item Guilielmum Varignanā, capite proprio. Item consilia Bertholamei Motagnani, praesertim ubi de epilepsia loquitur, &c.

De prognost. apoplexiæ.

Hippoc. aphor. 2. aphor. 42, Soluere morbum, quem apoplexiam uocāt fortem, impossibile, debilem uerò non facile. B. Fortis apoplexia magna ex parte curationem non admittit, ob respirationis lesionem, aut uirium imbecillitatem: debilis uerò non facile, quia terminatur in paralesim. Vnde Auic. Paul. Aet. Razes, Vt plurimum in paralytidem terminatur, &c. Et aphor. 6. aphor. 51, Qui cūque sani à dolore capitis derepēte capiuntur, & incurrunt apoplexiam, ij in septem diebus pereūt, nisi febris apprehēderit. B. Intellige si dolor fiat à spiritu fl. tuoso, & apoplexia à materia pituitosa, quia tunc fe-

bris superueniens dispositionem soluit calefaciendo, extenuando ac resoluendo spiritum flatuosum, & humorem pituitosum. Pereunt in septimo, inquit Galenus, quia pars principalis non diu tolerat fortes simul & diuturnas passiones. Auic. prima terti, tra. 5, Et quum acciderit febris, tunc spes sit, ut cum ea resoluatur superfluitas, &c. Aet. ser. 6. cap. 27, Exhibet spem salutis ipsa calamitas febris. Paul. lib. 3. cap. 18, Apoplexie morbus nequaquam aut raro curatur, ut qui minetur mortem in propinquo. Si uero etiam remedia admittat, plurimum cum partis cuiusdam corporis resolutione discedit, &c. Razes 9. al-ma. Si spuma ab ore exeat, non est medicamen. Adijcit his Arcul. Quod si ad motis ualenter sternutatione mouentibus, & non stertat, neque impressionem sentiat, quod est mortale, &c. Cels. lib. 3. cap. 27, Post sanguinis missionem, si non redit motus & mens, nihil spei superest. Gal. lib. de dinamidijs, Apoplecticus quum ex multis rebus desiderat sibi cibum afferri & potum, & statim haec abominatur, mortem sibi imminere significat.

V. ij.

B. In hoc tamen tu considera robur uirium,
 & æquum iudica, &c. Auic. loc. cit. Et scias
 quòd plurimùm accidit apoplexia habenti-
 bus ætates, & corpora, & regimina humi-
 da, & propriè quum adest cum humiditate
 frigus. Si autem accidit cum caliditate com-
 plexionis & siccitate, tunc est res praua: agri-
 tudo enim contraria complexionì non acci-
 dit, nisi propter magnam causam, &c. Cùm
 seni etiam accidit uertigo comitans iterata,
 tunc illud nunciat apoplexiam, &c. Mesu.
 cap. de apoplex. inquit, Illico administretur
 omnis cura: nam dilatio ducit ad mortem fe-
 stinam, quum morbus per se parum curam re-
 cipiat. Idcirco cum protestatione mortis me-
 dicus se ad curam intromittat.

Authores dissentientes circa apoplexiam.

- 1 Adserere, apoplexiæ species esse tantùm
tres, ut Auicennas.
- 2 Adserere, apoplexiam à frigido tantùm
humore fieri, & non à calido.
- 3 Adserere, in apoplexia musculos pectoris

ob necessitatem respirationis moueri.

4 Adserere, apoplexiam à nudo & simplici frigore posse fieri, cum Auicenna.

5 Adserere, in acutissima apoplexia omnino deficere spirationem.

6 Adserere, apoplexiam fortem nunquam posse curari.

Confutatio dissentientium circa apoplexiam.

Ad primum, Quaecunque sunt quatuor, nō sunt tres tantum, sed species apoplexiæ sunt quatuor per Gal. aphor. 2. comment. 42. igitur non tres tantum. Quod sint quatuor, ibi enarrat Gal: dicens, quod prima est, quā anhelitus prohibetur: secunda est, quum respiratio fit cum magna vi: tertia est, quæ nec intentum nec uiolentum, sed inæquale ac exordiatum, ac præterea intermittentem habet anhelitum: quarta est, in qua anhelitus aliquē seruat ordinē, & est debiliore & citò curatur.

Ad secundū respōdet Auic. 3. can. q. causa apoplexiæ potest esse sanguis & pituita. Quare nō solū à frigido, sed etiā à calido humore

V. iij.

fiet. Item Gal. lib. de sang. miss. cap. 6, Apoplexiæ proueniunt multo nimirum sanguine in principium animantis confertim incumbente. Itidem ait 4. de uic. in mor. ac. comment. 27. et in lib. introd. siue medico appellato, et sic etiam à calido fiet.

Ad tertium : Gal. aphor. 2. comment. 42, Verū in apoplexijs non ob id quod sit adaueta necessitas respirationis, sed quia uis est imbecillis, idcirco muscoli pectoris coguntur operari, etc.

Ad quartum responder Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. ibi, Apoplexiæ quod subito eueniat aut frigidum, aut crassum, aut uiscidū quidpiam, quod principes cerebri uentriculos affatim implet, non autem totius substantiæ intemperiem, causam esse manifestum est. Idē confirmat Aet. ser. 6. cap. 27.

Ad quintum : Galen. 6. de loc. aff. cap. 4, Quippe in confesso est, et spirationem à uitā, et uitā à spiratione seperari non posse, adeo ut uiuentem non spirare, et spirantem non uiuere, sit impossibile. Igitur spiratio omnino non deficit, nisi uellemus apoplexiam

mortē appellare : uerū, ut ipse inquit Gal.
adeo potest esse exigua ista respiratio, ut sen-
sum omnino effugiat. Idem ait 4. de loc.
aff. cap. 7. &c.

Ad sextum: Gal. 2. aphor. comment. 42. ui-
detur innuere, quod interdum possit curari,
per id quod dixit, magna ex parte curationē
non admittit. Præterea regulæ medicorum
non semper, sed ut in pluribus intelliguntur:
igitur interdū curabitur. Præterea Hippoc.
6. aphor. 51. aphor. inquit, apoplexiam for-
tem in septem diebus ægrum perdere, nisi fe-
bris apprehenderit, igitur febre superueniente
curatur. Quod uerò de forti apoplexia intel-
ligat, lege Gal. in comment. ibi, Mutos solet
Hippoc. nominare, &c. Item Auic. prima
tertij, tra. 5. cap. de apople. Accidit, inquit,
ut homo epilepsiam incurrat, & non sit dis-
ferētia inter ipsum & mortuum, & non ap-
paret anhelitus, deinde reuiuiscit & sana-
tur, & tamen intelligit de forti apoplexia,
igitur, &c.

De paralytidis descriptione.

Quum paralytis binas habeat descriptio-

nes, propriam scilicet & cōmunem, ista erit propria, Paralysis est mollificatio totius medietatis corporis cū priuatione sensus & motus : communis est ista, Paralysis est ablatio uel diminutio in sensu & motu uoluntario, aut mixto in aliqua corporis parte, nō in toto. Motus ubi deperditur, & si sensus integer remaneat, semper paralytudem efficit. Quir autem interdum remanente sensu, solus amittatur motus, & econtra, triplices assignantur causæ. Prima, quia ex paucitate spiritus, motus potius quàm sensus deperditur. Secunda, quia aliqua materia est in neruis motus, & non sensus. Tertia, quia temperies pro uno magis quàm pro alio corrūpitur: nā si corrumpatur ab humido, motus deperditur: si uerò à sicco, sensus, &c. In hoc morbo interdum cerebrum, interdum nerui musculi ad motionem deputati afficiuntur. Quod si materia obstruens in ambobus cerebri uentriculis foret, tunc apoplexia diceretur: si uerò in uno tantum latere, hemiplexia : si in parte nuchæ, omnes corporis partes præter faciem resoluuntur : si in parte spinæ sine

dextra siue sinistra fiat obstructio, tunc in ea parte erit resolutio, &c.

Loci consentientes de descriptione paralytidis.

Quòd bina sint paralytis descriptiones, lege Auic. secunda tertij, cap. de paraly. ibi, Paralytis quandoque dicitur sermone absoluto, quandoque sermone proprio, &c. Gal. lib. finit. med. Paralytis est affectio uoluntarium motuum offendens in partibus, uel parte quadam cōtingens. Item Prorrhēt. 3. cōm. 26, Paraplegia talis est affectio unius partis corporis, qualis paraplexia totius, &c. Et quarto de sympt. cau. cap. 5, Si nerui à principio fiant stupidi, deinde omnino sensum & motum amittant, paralytis, id est, neruorum resolutio dicitur. B. Pende ex hoc loco, quòd paralytis à stupore non differt, nisi in magnitudine. Auicē. secunda tertij, cap. cit. Et multotiēs remanet cum ea sensus, quoniam materia est in neruis motus & sensus, & una est causa, quur motus deperditur, &c.

Vide de his latius Auic. loc. cit. & Arcul. De loco affecto loquitur Gal. 3. de loc. aff. cap. ult. Igitur quemadmodum ubi uniuersæ corporis partes quæ sub facie constitutæ sunt, resoluantur, faciei partibus illæsis, affectionem in spinæ initio esse certū est: quod si hæ quoque afficiantur, cerebro noxam iam illatam esse ostenditur. Act. ser. 6. cap. 27. plura habet de his, ibi, Si omnes nerui sensum & motum amittant, &c. Itidem Paul. lib. 3. ca. 18. adserit. Lege etiam Galen. 4. de sympt. cau. cap. 5. fusiis: item 4. de loc. aff. cap. de lingua aff. ibi, Quum utraque cerebri pars, &c. Item Auic. loc. cit. ibi, Si materia aut lesio fuerit, &c.

De causis paralytidis.

Causæ sunt tres, primitiua, antecedentes & coniunctæ. Primitiua sunt regimen frigidum & humidum in sex rebus non naturalibus, incisio neruorum, dislocatio spondilium, ligaturæ comprimentes, percussio in partibus neruosis, & accidentia animi, ut timor, ira. Item ægriiudines præcedentes sicut

apoplexia, epilepsia, cholica, uteri strangulatus, &c. Causæ antecedentes sunt quatuor humores, inter quos plerunque in causa est pituita, interdum sanguis, rarò melancholia, rarissimè omnium bilis, nisi alijs humoribus admisceatur. Causæ coniunctæ sunt repletio uel inanitio, uel apostema in principio nuchæ, uel in una parte actus cõtenta obstruēs: item immoderata temperies frigida & humida cum materia & sine materia, licet etiã immoderata temperies calida & sicca sensum & motum ex sua immoderantia debilitet, &c.

Locī consentientes de causis
paralytidis primitiuis.

Auic. secunda tertij, tra. i. cap. de cau. paraly. de causis primitiuis loquitur, ibi, Forrorum contractio quandoque accidit propter ligaturam, aut quandoque fit ex compressione uehementi sicut accidit apud percussionem aut casum: aut accidit quum declinant spondyli & rumpuntur, &c. Item incisio quæ est in latitudine prohibet sensum

Et motum in membris, et cui accidit percussio et ictus, aut motus subito ex timore, dolore, ira, delicijs, angustia amittitur, etc. Gal. itidem ait 4. de sympt. cau. cap. 5. ibi, Idque uel ob luxatam quandam uertebam, uel alio quouis modo. Si quidem ingens fuerit affectus, partes inferiores subito et sentiendi et mouendi facultate priuantur, etc. De casu et percussione habes ex Gal. 3. de loc. aff. cap. ult. exemplum de Pausania Syro, qui ex casu in initio dorsi lesus duos sinistrae manus digitos amiserat, etc. Similiter habes ex hoc capite Galen. plura de incisione spinæ. Gal. 5. de sympt. cau. cap. 2, Corripiuntur, qui uehementer fuerunt refrigerati, et qui se meraco uino ingurgitarunt, et qui diu in otio uixerunt, et qui intempestiue multam aquam frigidam biberunt, etc. De causis antecedentibus habes Aer. ser. 6. cap. 28. ibi, Conflatur hæc affectio humoribus multis, uiscosis ac crassis, nervos obturantibus, per quos motus uoluntarij perficiuntur. Auic. loc. cit. Et scitum est, quod destructio motus et sensus fit, quoniam spiritus sensibilis aut motuum retinetur à pe-

netratione ad mēbra, &c. Gal. 3. de loc. aff.
 cap. 7, Vbi uerò deperdito sensu quis conci-
 derit, non accidente motu, quo uel cōuelli uel
 salire uideatur, id à uehementi frigore ortum
 trahere sentio, &c. Et aphor. 5. comment. 17,
 Immodicum frigidum hæc facit, cōuulsiones,
 distensiones ob neruorum refrigerationem,
 &c. De causis coniunctis loquitur Auic. se-
 cunda tertij, cap. cit. ibi, Et paralysis faciens
 abscissionem spiritus à membris, aut est reple-
 tio aut apostema, aut solutio singularitatis,
 &c. Gal. aphor. 2. comm. 20. loquens de im-
 modica intemperie inquit, Quoniam omnis
 immodica intemperies, imbecillem reddit aut
 exoluit operationem propriæ uirtutis. Et in
 lib. introd. siue med. Hemiplexia fit ex humo-
 rum crassorum copia, qui capitis uasa, unde
 corpori sentiendi mouēdi que facultas adue-
 nit, obstruunt. Iridē adserit 3. aphor. cōm. 23,
 in fine cōmēti, loquēs de apoplexia. Paul. lib.
 3. ca. 18, Si partes resolutæ cōuellantur uel re-
 laxētur, id ab inanitione uel repletionē pro-
 ueniet, &c. Huc etiā spectant quæcunque de
 causis apoplexiæ nuper recitata sunt, &c.

De signis paralytidis.

Quum quis sensum & motum in una parte, uel in pluribus corporis partibus amiserit, tunc paralytidem pati dicimus. Signa, si fiat à primitiuis causis, habentur partim ex relatione infirmi, partim ex quadam coniectura. Signa ex causis antecedentibus, si sint humores, cognoscuntur, quia si sanguis, adest inflatio uenarum, totius repletio, oculorum rubedo, &c. Si pituita, adest albedo, molli- ties, urina alba, pulsus debilis, tardus, &c. Signa ex causis coniunctis, si adsit apostema, cognoscitur ex febre, dolore, tumore & duritie in loco percepta. Si immodica intemperies cum materia replens, cognoscitur ex tactu, uel ex his quæ iuuât & nocent, in e ex habitudine, uictu precedente & similibus, &c.

Loci consentientes de signis paralytidis.

Razes 9. alman. Quum aliquis se mouere non ualet, aut unum, aut plura membra ex suis, & sensum illius membri siue membrorum amiserit, incurrisse paralytim pronunciamus.

Auic. secunda tertij, tra. i. cap. de sig. paraly.
 Illa quæ est à tortuositate, aut à casu &
 percussione aut sectione, cognoscitur ex præ-
 cedenti causa. Et primo lib. sen. secunda, cap.
 de signis dominij humorum, & loco citato,
 habet omnia signa humorum, præsertim ibi,
 Et si materia est cum sanguine, significat eã
 guidez, & uena, & oculus, & repletio, &c.
 lege fusius in hoc loco, & intelliges cætera à
 me dicta: lege etiam Arcul. & Gord. & Sa-
 uona. & Auic. ibi, Si fieret ab apostemate ca-
 lido, tunc extensio & febris, &c.

De cura paralytidis.

Ad curationem quinque expediunt, uideli-
 cet uictus ratio, humoris preparatio, euacua-
 tio, reuulsio & deriuatio, residui resolutio,
 & membrorum roboratio. Victus ratio sit
 attenuatoria, sicca, non viscosa, non uirosa,
 sed uentri accommoda, urinam ciens, in quã-
 ritate modica: utatur his, quæ roborandi ner-
 uos facultatem habent: toleranda est fames
 & sitis, in potu exhibeatur hydromel potius
 quàm uinum: nam materias ad nervos uinum

X.i.

penetrare facit, & procul sit acetum: nā ualde nocet in morbi recessu: uinū antiquū paucū exhiberi debet, eò quòd calefaciens & exiccans, agritudinibus neruorū cōfert. Similiter & frictio & gestatio in lectica aut uehiculo, & balnea cōmendātur. Humorū præparatio fiet cum calefaciētibz & exiccantibus, ut puta cū hydromelle, syrupo de stecha de, rhodomelle cū aquis saluæ, betonica, rosmarini: huc etiam spectat oxymel simplex, sed ratione aceti cum syrupo mellino rectificandum est. Euacuatio fiet per ea quæ redundātem humorem euacuāt, ut cum hiera simplici & composita, hiera hermetis, hiera logodione: nec ab re existimarem, si à uenæ sectione inciperemus, moderatāmq; detractiōnem moliremur, ut ne agri nimis perfrigerentur, fiatq; detractio per antithesim à sanioribus partibus, nisi quid aliud impediat. Reuulsio & deriuatio, si ea quæ à cerebro ad nucham confluunt, ad alias regiones trahamus cū cucurbitulis affectis, partibus affixis, enematibus, masticatorijs, crinis siue sternuatorijs frictionibus, & hīs similibus. Resolu-

rio residui paratur per exteriora & interiora. Exteriora fiunt linimētis, ceratis, emplastris & balneis. Linimēta parētur cū oleo camomillino de spica, de costo, de terebūtho, uulpino, de castoreo, &c. Cerata similiter fiunt cū pulvere lumbricorū, galanga, piretro, castoreo, additis oleis, cera & pice. Emplastra prosunt, quale est emplastrū de sinapi Mes. uel fiāt cum herbis capitalibus, additis oleis & aliquali farina. Balnea cōferunt tā naturalia, sicut sulphurea, quā etiam arte parata. Interiora sunt electuaria, cōfectiones, pulueres, & similia. Electuaria sunt diamusculus dulcis, theriaca, & omnia deniq; quae calefaciunt, siccant & resoluunt. Confectiones sunt acorus cōditus, pulueres, chamæpitheos, stachados, &c.

Loci consentientes de cura
paralytidis.

Aet. ser. 6. cap. 28. loquēs de diēta inquit,
Sit attenuatoria uentri cōmoda, nihil uiscosi
aut uirosi habēs, &c. Paul. lib. 3. ca. 18, Cibi
cōueniūt ad cōcoctionem expediri, nec recre-
mentitij. Et paulò infra, Victus siccior uilis

X. ij.

324 DE CONSEN. MEDIC.

est, portio modica & frictio, &c. Mesu. cap. de paralyti, Vtantur cibis, qui proprietatem habeant confortandi nervos, qualia sunt grana pini, leporis cerebrum, origanum, hisopus, piper, gingiber, sansucus, salvia, &c. hoc intellige in causa frigida, & in processu morbi. Auic. secunda tertij, Stude ut facias pari famem, & ciba cum cibis siccis, & fac tolerare sitim: & in secunda mensa iuuat uti medulla nucleorum pini, & scias quod aqua melior est eis quam uinum: nam materia in nervis penetrare facit, & ut plurimum acescit: acetum uero est ex rebus quae sunt nervis nocibiliores, &c. Conciliator diff. 144, Non competit uinum, si materia cruda & in fluxu sit: si uero digesta, & factae sint euacuationes, paucum uinum antiquum confert: nam materia resoluunt & exiccat. B. Nota paucum dixisse ex eo quod Mes. dicebat, scito uinum esse nervis inimicum & oculis per se: ipsius enim abusus causa est morbi per se. Itidem Auic. loc. cit. Paul. Vomitus à cena conuenit, ite gestationes curru, lectica aut uehiculo, &c. De preparatione humorum meminit Auic. secunda tertij,

quando dixit, Et in hac hora sis contentus
 rebus subtilibus ex his quæ leuiter digerunt &
 soluant: unde dixerat, quod quædoque exhi-
 betur oxymel cum sua dispositione, & oppo-
 panacum cum syrupo de melle, &c. Aet. ser.
 6. cap. 28, Utendum est etiam portionibus re-
 latis ad morbum comitiale. Quod uero per po-
 tiones intelligat syropos, & ea quæ incidendi-
 uim habent, manifestum est ex his, quæ ab ipso
 supra relata sunt, &c. Mesu. Adæquatio fit
 materici, cum administratione rerum morbi
 materiam carminantium & maturantium,
 &c. Vide de hac præparatione humorum plu-
 ra iuxta neotericos practicantes, &c. De eua-
 cuatione facit mentionem Aet. ser. 6. cap. 28.
 ibi, Manifestum igitur est, quod redundantem
 humorem euacuare oportet, nec aptius prin-
 cipium in his reperire datur, quam à uenæ se-
 ctione, si permiserit ætas, habitus, tempus,
 progressus uictus, &c. oportet autem mode-
 ratam detractioem facere, ne uenæ perfrige-
 rentur. Quapropter minuenda est materia
 paululum, detractio uero fiat à sanioribus
 partibus, &c. Auic. In illa autem, in qua est
 X.ij.

spes, oportet incipere à phlebotomia, &c. Paul. loc. cit. Quoniã partes resolutæ uel cõ-
uelluntur uel relaxantur, idque à repletionem
uel inanitione, attendendũ rursus est partim
sanguinem detrahi debere, partim non, &c. Mesu. cap. proprio, Euacuatio fiet cũ admi-
nistracione priorũ euacuantium, sicut cũ
hiera diacolocynthidos, pilulis fetidis, hiera
hermetis, &c. Similiter Aet. loc. cit. Interpo-
sis diebus aluus subducatur, primũ chyste-
ribus, deinde per aloës & polypodij & colo-
cynthidis cremorem, conuenit etiã hiera Ar-
chigenis, &c. De reuulsione loquitur Auic.
ibi, Oportet ut clysterizetur enematibus for-
tibus, & colyria fortia supponatur, ut incli-
nentur eorũ materiæ ad inferiora: cõfert etiã
positio uentosarum super capita lacertorum
absque incisione, sed post euacuationẽ, &c.
Similiter Aet. ser. 6. cap. cit. Post purgationẽ
cucurbitulæ affectis partibus adhibeantur: si
uerò hæ ineptæ sint, uicinis affigantur, &c. Et
paulò pòst, Detracta materia etiam sternu-
tatorijs, & pituita per os ducentibus, utendũ
est, &c. Itidẽ Paul. lib. 3. ca. 18. asserit. Mesu.

cap. de par. Diuersio cōpleur cū gargaris-
matibus, masticationibus, caputpurgys &
sternutatorijs, &c. Quomodo autē hac fiant,
habes suprà de cephalæa à causa frigida,
&c. De resolutione residui Auic. secūda ter-
tijs, cap. cit. Cūmq; membrū redit ad se, oportet
ut ipsum excites, post id & constringas
ipsum, ut ad integrā redeat sanitatē, &c. Et
paulò infrā, Oportet ut resolutio fiat cū ali-
quibus, quæ sint ut anisum, sigia, id est, storax
liquida & castoreū. Et suprà dixerat, quòd
emplastrū de sinapi est ex eis quæ ipsis cō-
ferunt, & fricatio cū oleo & nitro, & aqua
sulphurea, & administratio acori, & quòd
nihil est ita conferens ut theriaca & mirri-
datū, & assa fetida est uehemētis inuamēti
bibita uel linita, &c. Mesu. Vltimā rem cō-
plet unctiōes, emplastra, fricationes & bal-
neū, &c. Aet. loc. cit. laudat ad resolutionem
residui unctiones quatuor fieri, unā circa ca-
uitatē occipitis, tres in uertice, ex quibus, in-
quit, nō despero perfectā restitutionem, &c.
Paul. li. 3. ca. 18, Cucurbitulae resolutis parti-
bus agglutinētur: si pauca fuerint distinctum,

X.iiij.

post cucurbitulas delinantur medicamenta ex
pice, resina, &c. Vide etiā Auic. ibi, Quādo-
que iuuantur à febre & à balneo sicco, &c.

Observationes de humorum præparatione.

Marcus Catinarius cap. de par. Cauen-
dum est, inquit, ne nimis præparemus cum for-
tibus digestiuis nimium calefacientibus, usque
ad quartam diem, sed gradatim procedendū
à debilioribus ad fortiora, eo quòd magis
materiam dilatant, quàm præparent.

Observationes de euacuatione.

Auic. secunda tertij, Et non properes in
usu medicinarum fortium in principio rei,
imò tarda usque ad quartum & septimum;
quòd si fuerit ægrotudo fortis, usque ad deci-
mum quartum.

Obiectio.

Quar Auic. & Mes. incipiunt à debiliori-
bus, quum Razes dicat, Cuius curam incipie-
mus cum pilulis fœridis, quæ inter uehemen-
tia pharmaca reputantur?

Responsio.

Intellige ad utriusque concordiam, quod hic coactè, illi magis regulariter procedunt. Paul. incipit à semidrachma hieræ, & interpositis diebus exhibet integram drachmam, dehinc unā & semis, postea duas atque tres. B. Notādum est etiam ex Pauli & Aetij textu, quod in hoc morbo interpolatim medicinas exhibeamus, ne natura medicinis assuescat & laxetur. Idcirco diebus interpositis, modò uno, modò altero medicamine uti præcipiūt, & interim vires resumēdas iubēt, &c.

Observationes de resolutione.

Auic. cap. de cur. par. Et ubi necesse est, resolvere oportet, & non sint resoluētia cū lenificatione pura, sed cum aliquantula stypticitate, quia laxantia substantiam membri debilitant, & resoluētia spiritū resoluūt, idcirco cum stypticitate fienda, &c.

Observationes de topicis.

Galenī est placitum 3. de loc. aff. cap. ult. ut consideretur locus originis nervorum, unde

exemplum refert de Pausania Syro. Auic. loc. cit. Positio medicinarum super locum paralyticatum est ex eis, quæ non afferunt iuuamentum, de quo sit curandum, sed oportet cognoscere originem neruorum, &c. & oportet cum resoluentibus procedere à debilibus ad fortiora, & cum medicatur cum calidis, augmentatur agritudo, quoniam materia subtilis dilatatur per ea plurimum: idcirco oportet miscere cum infrigidantibus aut temperatis, ut succo liquiritiæ: & de emplastris loquens dixit, Quumque sensus est debilis, fortasse emplastrum forte nocet, & non sentit id, & ducit ad lesionem & ulcerationem fortem: oportet igitur ut omni custodia ab illo caueatur, & ut consideretur dispositio impressionis emplastri, &c. Paul. lib. 3. cap. 18, In relaxatis quidem mēbris adstringentia ijs quæ laxant miscere, & frictionem intensam moliri conuenit: in conuulsis uerò laxantibus duntaxat utendum est, & frictione molli, &c.

Paralytidem generantia.

Generant paralytidem uapor argenti ui-

ui, carnes porcinae, & tubera.

Paralytidem curantia.

Faciunt ad paralytidem, & à proprietate tam occulta, quàm manifesta ualent, abrotomum chameoris, betonica, salvia, aristologia, artemisia, costus, maiorana, matersylua, colocynthis, laurus, rosmarinum, acorus, calamentum, origanum, hisopus, mellissophyllum, rutha, sauina, mel, cinnamomum, anacardus, assa, helleborus, pyrethrum, peucedanum, diptamus, cyclamen, ceratum alexandrinum, aqua sulphurea, aluminosa, unguentum de bdellio Mes. unguentum basilicon Mes. unguentum marciaron Nic. oleum de piperibus, de cinnamomo, de citro, oleum laterinum, uulpinum, de costo, de terebinthina, de sinapi, de pyrethro Nic. pinguedo gliris, blacha Nic. confectio pyrethri Mes. ca. de epileps. confectio anacardina Mes. ca. de aegritud. neruorum, diambra Auic. in 5. tra. diacalamentum, diacastoreum Ni. sy. de stechade, theriaca, hiera Ruffi, hiera Hermetis, hiera logodion, hiera picra, confectio de musco, diapluris arcot. Nic. pilula facida, de euphorbio, &c. Roborant neruos

nuclei pinearū conditi, castoreū, nux indica,
 peonia, &c. Vide Varigna. in lib. de secretis,
 ca. de paral. Item Barth. Montagnanā conf.
 48. Item Arcul. & Sauon. ca. de cur. paral.
 Vide etiam Gord. & alios practiçantes.

De prognosticis paralytidis.

Paulus loco suprā citato, Quæ à nerui di-
 uisione oritur particularum resolutio, in-
 sanabilis est: quæ uerò à temperie uel ab
 humore, commune ex facultatibus prædictis
 præsidium recipit. Auicennas secunda tertij,
 cap. cita. Urina infantis si sit uiridis, nun-
 ciat paralytim siue spasmus, & paralytis
 eueniens à remotione spondilium mortifera
 est secundum plurimum. B. Ratio est, quia
 spondiles eos nervos, qui à se exeunt, facile
 comprimunt: qui nisi ad suum locum reducun-
 tur, insperata est salus. Celsus lib 3. cap. 27.
 Morbus qui fit in partibus, nunquam acu-
 tus, sæpe longus, & ferè sanabilis est. Razes
 cap. de paral. Quod si paralytis ex percus-
 sione aut casu euenerit, & accidit subito, ita
 quòd nerui aliquialiter comundantur, tali-

ter permanebit, nec unquam sanabitur. B. Intelligere, nisi sit in ætate, in qua membra spermatica restaurari possint. Hippocrat. 3. prorrh. Paraplecticis parotides vitiosæ. B. Parotides sunt abscessus post aures, vitiosique sunt, quia ad inferas partes non devolvuntur, sicuti ceteri abscessus boni. Avicen. loco cit. Et quodcunque membrum mollificatorum & paraleticorum secundum colorem reliqui corporis existens, non minoratur nec extenuatur, est de quo maior habenda est fiducia, quam illud quod est diversum ab hoc: nam quum minoratur aut extenuatur, signum est quod non nutritur, &c. At si nihil horum acciderit, bene sperandum. Item febris superueniens soluit paralysem. B. Intelligere, si ab humiditate & frigidity fiat. Arcul. Tremor & dolor in paralyse superueniens, bonum: si uero paralyse annu pertransit, ut plurimum non recipit curam. B. Intelligere tremorem & dolorem idcirco esse bonum indicium, quia ubi tremor & dolor, ibi est sensus & motus, &c.

334 DE CONSEN. MEDIC.

Authores dissentientes cir-
ca paralytidem.

- 1 Adserere, tunc resolutionem uocari, quum
sensus deperditur, & non motus.
- 2 Adserere, impressionem sensus in membris
à calore impediri.
- 3 Adserere, frequenter usum calidorum mi-
rum in modum prodesse nervis.
- 4 Adserere, uehementia pharmaca in prin-
cipio curæ paralytidis conuenire.
- 5 Adserere, tunc paralytim uocari, quum
uis sentiendi & mouendi omnium neruorum
amittatur.

Confutatio dissentientium cir-
ca paralytidem.

Ad primum respondet Gal. 3. de loc. aff.
cap. penul. dicens, Quòd neruorum tunc uera
erit resolutio, ubi motus deperditur: ubi uerò
aliquarum partium sensus perit, eam partem
sensus expertem uel stupidam potius dicimus
quàm resolutam.

Ad secundum dicit Auic. secūda tertij, tra.
1, Quòd membra sensus non recipiunt impres

sionem propter complexionis corruptionem: complexio uerò corrumpitur à calido, aut frigido, aut humido, aut sicco: sed calidum, inquit, non prohibet impressionem sensus, &c.

Ad tertium, Hippocr. aphor. 5. aphor. 16, Calidum, inquit, ubi eo sæpius utatur, hac mala affert, carniū effæminationem, neruorum incontinentiam, &c. ubi Gal. in comment. intelligit neruorum imbecillitatem fieri, eorum substantia à calore dissoluta, & sic calidi frequens usus neruis nocet, substantiam neruorū dissoluens.

Ad quartum, Communis est opinio, ut regulariter procedendo non euacuemus cum uehementi pharmaco, maximè quum paralysis de materia pituitosa non sit morbus acutus, sed ubi subitanæ mortem minetur, coactè cum uehementi pharmaco purgabimus.

Ad quintum, Galen. 3. de loc. affec. ca. 10, Quum omnes igitur nerui quum sentiendi tum mouendi uim amiserint, apoplexia huiusmodi affectio appellatur, igitur non paralysis, &c.

De conuulsionis descriptione.

Conuulsio, est neruorū ac musculorum affectio, per quam interdum totum corpus, interdum pars, citra uoluntatem ad suam originem contrahuntur. Huius species sunt tres, scilicet τέταρος, id est, tētio equalis: ἐμπροσθενός, id est, tētio ad anteriora: ὑποπρόσθενός, id est, tētio ad posteriora: locus uerò affectus cognoscitur, quia uniuerso corpore conuulso infra faciē, tunc prima spinalis medullae pars affecta est: si uerò cū uniuerso corpore etiam facies conuellatur, tunc cerebrum affectum esse dicimus: si autem quæpiam corporis pars conuellatur, tunc eorum neruorū originem esse affectam iudicamus, etc.

Loci consentientes circa conuulsionis descriptionem.

Gal lib. finit. med. Conuulsio, est affectus qui neruis ac musculis accidit, quum modò corpus totū, modò pars eius citra uoluntatem trahitur. Oribas. aphor. 2. comment. 30, Spasmus est, inquit, motus inuoluntarius, uoluntaria obtinens loca. Auicen. secunda tertij, cap.

de spas. Spasmus, est agritudo nervosa, qua
mouentur lacerti ad principia sua, & inobe-
dientes sunt in dilatatione: nā alij remanent
secundum suam dispositionem, & non dila-
tantur: alij facile redeunt ad dilatationem
suam, sicut in oscitatione & singultu, &c.

Obiectio.

Quomodo est agritudo, si Gal. 5. de Sympt.
cau. referat esse accidens?

Responsio.

Tria considerantur in conuulsione, malus
motus, & sic est accidens: uel mala membri fi-
gura, & sic est morbus officialis: uel causa cu-
ius fiat hoc accidens, & sic est intemperies
sicca, idcirco agritudo dicitur, &c. Galen.
aphor. 6. com. 39, Conuulsio est passio inuo-
luntaria ad simile uenientibus nervosis par-
tibus dispositionem, quam etiam in motibus
factis secundum appetitum assumebant. Iti-
dem ait in lib. de trem. & palpit. in fine. Et
aphor. 4. com. 57, Tres sunt numero conuul-
siones, opisthotonos, emprosthotonos, & teta-
nos. Itidem ait in lib. de trem. & palp. Simi-
Y. i.

liter Auicen. ibi, Sic mollificatio diuersificatur in membris. Et ibi, Quum corpus declinat ad anteriora. De loco affecto loquitur Gal. 3. de loc. affec. cap. 6. ibi, Conuulso enim uniuerso corpore infra faciem, omnium infra faciem neruorum originem affectam esse putandum est, quæ sunt primæ spinalis medullæ partes: si uero cum uniuerso corpore facies etiam cõuulsa sit, non solum eam partem, quæ ex spina procedit, uerum etiam ipsum cerebrum curamus, &c. Itidem. 4. de sympt. cau. cap. ult. adserit.

De causis conuulsionum.

Quum duplex sit spasmus, alter ad materiam proportionatus, alter non proportionatus, causa non proportionati duplex, intrinseca & extrinseca. Intrinseca sunt accidentia animi sicut timor, mœstitia, dolor, uel mala qualitas à materia uermium, uel mala qualitas per cõsensum aliorum membrorum, ad neruos, ut uentriculi, uteri, &c. Extrinseca est mala qualitas frigida, styptica, membrum comprimens, ut frigiditas aëris, uel fri-

gus nervi uulnerati. similiter punctura caeca, casus, percussio, incisio, uel mala qualitas uenenosa, qualis est morsus uenenosorum animalium, uel praecipitatio, & quicquid cerebrum imbecille reddit, mordicat ac dolorem infert, ex quo nervi fugiant ac contrahantur, &c. Proportionalis uero ad materiam duplex, alter de repletionem, alter de inanitione. Causae primitivae de repletionem sunt, crapula, ebrietas, consuetae euacuationes retentae, balneum, & exercitium in corpore plethorico, &c. Causae antecedentes sunt ut plurimum pituita & sanguis, raro melancholia, rarissime omnium bilis. Causae coniunctae sunt ipsi humores in nervis existentes, nervos iuxta longitudinem dilatantes, interdum abscessus, uel flatuosus spiritus, crassus, qui ubi fuerit particularis, uulgo dicitur granfo. Causae convulsiones de inanitione sunt quaecunque strenue exsiccant, quales sunt febres ardentissima, ieiunia, uigiliae, alui profluvium, nimius concubitus, euacuationes persoluentia pharmaca, nimius labor, & quaecunque possunt humiditates in nervis naturaliter existentes dissipare ac extenuare.

Y.ij.

re, & omnino exiccare, &c.

Loci consentientes de causis
conuulsionum.

Auic. secundā tertij, ca. de spas. Et quando-
que fit spasmus qui ad materiam non propor-
tionatur eueniens causa rei impediētis, à qua
nerui fugiunt & congregantur ad expellendū
ipsum: & causa illa aut est dolor, & multo-
tiens ex uapore calido mordicatio, aut à
qualitate uenenoſa perueniēte ad cerebrum,
aut propter qualitatem nō uenenoſam, sicut
quum spasmus accidit ab inſrigidatione uehe-
menti, congregante neruum & lacertum, &
contrahitur ad caput suum, &c. Paul. lib. 3.
cap. 20, Porro facit affectum, quanuis raro
laſitudo, humi dormitio, ponderis eleuatio,
caſus, uulnus, ardor, ictus, & alia quæ eandē
neruis offeſam inferre poſſunt, &c. Vide de
his latius Auicen. loc. cit. Quod uerò spasmus
proportionatus ſit duplex, lege Galen. apho.
4. comment. 57, Omnes cōuulſiones fiunt aut
à repletionē, aut ab euacuationē partium, uī
delicet neruoſarum. Itidem adſerit aphor. 6.

com. 39. & 5. de sympt. cau. cap. 2. ibi, Atque omnes, Hippoc. authore, in duo capita reducuntur, plenitudinē & inanitionē. Et Hipp. aphor. 6. apho. 39, Cōuulsio, inquit, fit uel ex repletionē & inanitionē, &c. De causis huius cōuulsionis proportionata primitius loquitur 3. de loc. aff. ca. 6, Si temulento cuiuspiam ac omnino pleno homini, qui in otio degit, id euenire conspexeris, ex repletionē indicabis. Et aphor. 5. com. 5, Solet etiam uinum nervos replere, quibus repletis fit conuulsio, &c. lege fusius de hac re Arcul. cap. de spas. Gord. Ant. guaine. De causis antecedentibus & coniunctis loquitur Auicennas secunda tertij, cap. de spas. ibi, Causa spasmi aut est cum materia, aut sine materia, sicut caliditas & siccitas: & materia spasmi secundum plurimum est phlegmatica, aut melancholica, aut sanguinea, &c. Et paulò post, Causa essentialis spasmi ex repletionē est, aut humiditas & frigiditas adiuuans secundum cōgelationem & grossitiem, aut caliditas & siccitas, &c. Hippoc. aphor. 5. aphor. 17, Frigidum conuulsiones, distensiones, lino-

Y. iij.

res, rigores febriles facit, &c. B. Quia omne
 nimium siue calidum siue frigidum nervus no-
 cere solet: nam ex immodico calore eorum sub-
 stantia dissolvitur, & ex immodico frigore
 cogitur ac cohibetur. Gal. 2. de sympt. cau.
 cap. 2, Causam huius rei quippe demonstra-
 uimus, dum nervum aut stupore aut resolu-
 tione infestari dicebamus si frigus illum con-
 stringat, aut crassi lentique humores ob-
 struant, aut aliqua causa externa ipsum suo
 pondere comprimant, &c. Itidem ait in lib. de
 tre. & palpitatione cap. ult. ibi, Itaque ner-
 vos, tendinesque in animalium corporibus ex
 humore superfluo repletos, &c. Quod fiat etiam
 a flatuoso spiritu, habes ex Avicen. loc. cit.
 ibi, Et non est longum, quin sit spasmus eue-
 niens a uentositate inflatua, spissa. Ipse enim
 est ex eis quæ plurimum accidunt, & remoue-
 tur in hora, intelligens de eo quod dicitur
 granfo. Itidem ait Paul. lib. 3 cap. 20. ubi
 tribuit originem musculis repletis spiritu &
 aëre crasso nebulosoque, &c. De causis con-
 vulsionum ex inanitione plurima refert Avic.
 secunda tertij, cap. cit. ibi, Spasmus autem sic-

cus, alius quidem qui fit successione febrium
adurentium, & propriè in febribus sirsen, &
successione motuum laboriosorum corpora-
lium, & animalium sicut angustia, uigilia,
timor, & ille est ex eis, à quibus fit euasio.

Obiectio.

Quomodo fit euasio, si ab Hippocrate &
Galeno lib. de tre. & palp. in fine existima-
tur incurabilis?

Responsio.

Duplex est spasmus, alter quidem confir-
matus, in quo omnes substantiales membro-
rum humiditates consumptæ sunt, & hic di-
citur incurabilis, quia humiditates illæ deper-
ditæ haudquaquā restaurari possunt. Alter
non cōfirmatus, in quo primæ tantum humidi-
tates cōsumptæ sunt, sed spei aliquid superest
ut restaurètur, & sic interdū ab his fit eua-
sio. Gal. 3. de loc. aff. cap. 6, Quippe cū con-
uulsio fit uel à labore, uel uigilijs, uel fame,
uel solitudine, uel arida æstuatèque febre,
qualè in phreneticis uidere est, causā eius esse

X. iij.

ariditatem uacuationemque rectè putaueris.
 Et 5. de sympt. causis, Phlegmone plenitudi-
 nem parit, ardentissimæ ac aridissimæ febres
 inanitionem, &c. lege etiam aphorismum, Ex
 superflua purgatione cōuulsio, &c. lege etiam
 Gal. 5. de sympt. cau. cap. 2. & in lib. de tre.
 & palp. & aphoris. 6. cōment. 39. ubi affert
 exemplum modò de chordis, quæ ob nimiam
 humiditatem rumpuntur: aut de loris, quæ ad
 ignem longius calefacta contrahuntur. Iridem
 Auic. Sic dispositiones chordarū, quæ elōgan-
 tur in hyeme propter humiditatem, & abbrevi-
 antur in æstate propter exiccationem.

De signis conuulsionum.

Signa præcedentia sunt angusta ac luctuo-
 sa respiratio, pulsus rarus, durus, exiguus, ri-
 sus sardonicus, tremor manus ægri occultus:
 aluus siccescit, urina aquæ similis uel cruenta
 esse uidetur: tumet oculi, & facies rubescit,
 præcedunt tremores & singultus, dolor capi-
 tis, lumborum ac clauiculorum accidit, den-
 tes strident, oculi peruertuntur. Signa præ-
 sentia sunt membrorum contractio ad suam

originem, diuersitas in pulsu, ita ut in principio sui motus sit humilis, in medio sui motus ascendat, & in fine cadit, arteria alyis membris est calidior, &c. Signa conuulsionis erunt, si in sanis repentina conuulsio adueniat ac permaneat. Signa conuulsionis de inanitione sunt, conuulsiones post multos sudores, uomitus, alui profluvia, sanguinis fluxum, uigilias, fames, aut febres ardentissimas accidentes, &c. Signa conuulsionis non proportionatae ad materiam sunt causae eius antedictae. Signa humorum cognoscuntur ex coloribus & reliquis saepius antedictis. Signa apostematum sunt dolor, febris, pulsatio, &c. Signa conuulsionis per consensum alicuius membri sunt, quia praecedat laesio illius membri, &c.

Loci consentientes de signis conuulsionum.

Paul lib. 3 cap. 20. de signis praecedentibus uerba facit, ibi, Notae horum sunt angusta respiratio, pulsus rarus & exiguus, nonnunquam & risus sardonius oboritur, rubet fa-

cies, oculi intumescunt, & id reliquum quod
à me nuper relatum est. Auic. quasi de uerbo
ad uerbum eadem recitat. Galen. prognost. 3.
comment. 34, Potissimū conuulsiones futurae
cognoscuntur, si partes in uultu peruertantur,
aut dentes strident, aut oculi crebrò mouen-
tur ac peruertuntur: sed in pueris sufficit, si
tantummodo uigilent, si admodum metuant,
si mente lugeant, ac alius non deiciat, &c.
Memento etiam aphor. 54. lib. 6. uidelicet,
In acutis passionibus, quæ cum febre sunt,
luctuosa suspiria malum. uide de pulsu duro
& de alijs huc spectantibus, Gal. in cōment.
De signis presentibus lege Razen, 9. alman.
cap. de spas. ibi, Quum aliquod mēbrum ali-
cuius contrahitur, & ad suam redit origi-
nem, aut plura membra sic disponuntur, spas-
mata esse pronunciamus. Auic. secunda ter-
tij, cap. de sig. spas. Pulsus spasmatorum
est extensus & diuersus in situ, ascendens &
dimittens, sicut sagittæ euadentes de arcu sa-
gittarij, &c. De signis spasmi, de inanitione
& repletionem Gal. prorrh. 3. cōment. 69. in-
quit, Conuulsiones ex euacuatione post su-

dores multos, uel uomitus, uel deiectiones, uel sanguinis eruptiones, uel inedia, uel uigilias, uel moriones tum multas, tum uehemētes fiunt, &c. Itidem Paul. lib. 3. cap. 19. Aer. ser. 6. cap. 38, Si statim ab initio morbi conuulsiones fiant & permanserint, tunc à plenitudine ortum habent: si uerò à multis sudoribus, uomitibus, &c. tunc ex inanitione oriuntur. Itidem Auic. loc. cit. ibi, Si spasmi à repletionē fiat, signa sunt, quòd subito prouenit, & non discedit uelociter: si à siccitate fit paulatim & successione aegritudinum euacuantium, &c. Idem sentit Gal. aphor. 2. comment. 26, Signa humorum tangit Gal. prognost. 3. cōment. 34. ibi, Colores præter naturā habentur indicantes humorum prauitatē, ex quibus cōuelli assolent. Pallidus enim aut liuidus prauū qualitate significat humorem, rubidus uerò sanguinis copiam, &c. De signis spasmi ex apostemate loquitur Auic. secunda tertij, cap. de sig. spas. ibi, Et quandoque cum spasmo sunt pulsatio & saltus, & est signū malum. Pulsatio unam duarum rerum significat, aut apostema in uisce-

ribus, &c. Similiter loquēs de signis per consensum alicuius partis inquit, Cum nocumentum est ex stomacho, comunicat ei cerebrum, deinde nerui, & fit spasmus successione uomitus, qui est sicut succus porri, aut erugoris, &c.

De cura conuulsionum.

Ad curā spectant quatuor intēctiones: prima, est uictus ratio: secūda, euacuatio, sub qua reuulsio comprehenditur: tertia, resolutio ac mēbrorum roboratio: quarta, est symptomatū remotio. Victus in conuulsione de repletionē existente materia pituitosa sit calidus, tenuis & siccus in principio & in uirium robore: si uerō imbecillitas uirium adsit, etiam in statu cogimur ei succurrere, cum carnibus qualitate siccis, uinum non bibatur usque ad morbi remissionem, nam tūc ad resolutionem antiquum facit. In conuulsione de inanitione uictus sit frigidus, humectans, pinguis, tenuis, quū malē transglutiant, & uia sint stricta: magis tamen humectet, quā in frigidet, qualis est aqua carnis cum quatuor semini-

bus frigidis alterata, lac recenter mulctum,
 sorbitiones ex chondro & alica, cremor pti-
 sanae. Potus sit aqua hordei, aqua cucurbitae
 & mellonis indi cū Iuleb, si adfuerit febris: si
 minus, his addatur parū vini tenuis & aquo-
 si, facit enim ad penetrationē, &c. Euacua-
 tio fiet primū per uenae sectionem, si san-
 guis uel humorum copia in causa fuerit: si mi-
 nus, iuxta humorum exigentiam euacuato, de
 quibus in capite de paralyti satis dictum est.
 Sed ubi morbus inducias dederit, tunc primū
 materia erit preparāda cum rhodomelle, sy-
 rupo de stechade, cum aquis ac decoctis ca-
 piti spectantibus. Conueniunt insuper clyste-
 ria cū rebus capiti dicatis, frictiones ad par-
 tes subiectas, item masticatoria, sternutato-
 ria, cucurbitulae affectis partibus cum scarifi-
 catione, multa existēte materia, uel sine sca-
 rificatione, pauca existēte. Resolutio ac mem-
 brorum roboratio perficitur cum emollienti-
 bus ac resoluentibus, cū materia sit crassior
 quā in paralytice, & haec per exteriora
 & interiora. Exteriora sunt linimēta ex oleo
 liliorum alborum, lumbricorum, oleo uulpino,

350 DE CONSEN. MEDIC.

costino, &c. unguenta ex bdellio, balnea
 tam naturalia quam artificialia. Naturalia,
 sulphurea, salsa, aluminosa. Artificialia sicut
 in oleo communi, uel in balneo, in quo deco-
 cta sint uulpes catuli cum herbis capitali-
 bus, scilicet camomilla, anetho, maiorana,
 salvia, rosmarino, stechade, & similibus. In-
 teriora sunt electuaria resoluentia, ut dia-
 muscius, diacorus, mitridatum, confectio ana-
 cardina, & quaecunque febrem prouocare
 possunt. Remotio symptomatum fiet, si dolor
 qui interdum uehementissime molestare so-
 let, auferatur, & hoc perficitur cum anodi-
 nis, cum balneo 53. ex oleo communi, in quo
 decocta sit lumbricorum quaedam quantitas,
 uel cum oleo camomillino de semine lini, uel
 balneo arte parato, & membra contracta
 ad suum locum reducantur, & inordinato
 motui resistatur. Cura conuulsionis de ina-
 nitione tantummodo consistit in humectan-
 do & restaurando, modò cum balneis ex la-
 cte, modò artificialibus, cum folijs salicis,
 hordeo, uiolis & seminibus frigidis, &c. Post
 balneum statim membra ex oleo rosaceo li-

miantur, ne humiditas impressa exhalet, sed
 sua stypticitate cohibeatur. Clysteria fiant
 ex rebus similibus, additis quibusdam im-
 pinguantibus. Somnus insuper accersendus est.
 Euacuatio nulla fiat nisi naturalis, & nu-
 triatur ut dictum est. Cura convulsione non
 proportionata ad materiam sic fiet, Primum
 si fuerit à percussione, cum laxantibus bal-
 neis, ex hordeo, camomilla & malua, fœnu-
 græco, &c. Si fuerit ex uulnere, in primis do-
 lorem remoue, & sanies inducatur, cum em-
 plastro altheæ, uel cum uitello oui, & te-
 rebinthina, & tota spina liniatur cum hu-
 meclantibus temperatis, sicut oleo amygda-
 lino dulci, &c. Si fuerit à uentositate, re-
 soluatur cum frictione & oleis calidis. Si
 fuerit à punctura uenenosa, extrahatur il-
 la humiditas uenenosa, uel cum cucurbitula
 apposita, uel cum emplastro ex scabiosa &
 uitello oui. Si fuerit punctura ex ferro, tunc
 aperiatur locus, ita ut uirus quoquo modo
 trāspiret, cum unguento exiccante & cor-
 rodente, quale est unguentum apostolorum
 ægyptiacum, sed prius sedetur dolor cum

terebinthina & oleo rosaceo, aut cum balneo
ex oleo lumbricorum, aut cum pane in lacte
infuso, aut cum aliquo quod locum stupidum
reddat, qualia sunt opiata, &c. Si fuerit ab
apostemate, curetur eodem tramite, quo so-
leni tales abscessus curari. Si fuerit per con-
sensum uentriculi, curetur uomitu vel eua-
cuatione per secessum, roborando cerebrum
& spinam, ne amplius quidpiam suscipiant,
& sic intelligito de alijs particulis, &c.

Loci consentientes de cura conuulsionum.

Habes de uictu primùm Auic. secunda ter-
tij, ibi, Et si habēs spasmum humidum debilis
sit uirtutis, non abscindantur ab eo carnes
siccae, sicuti carnes minutarum auium, & cu-
begi, & cheruberi, id est, perdici & alaudæ:
& si uirtus non fuerit debilis, sint cibi eius
panis cum melle, & aqua ciceris cum anetho
& sinapi, &c. & sic calidum ac tenuem ui-
ctum imperat. Paul. lib. 3. cap. 20, Porro ui-
ctus erit tenuis, qui expedire distribuat, &
recrementis omnino uacet, &c. Et loquens de

uictu conuulsionis, de inanitione, dixit, Qui ex inanitione conuelluntur, nutriendi sunt ex chondro & alica, uinūque tenui & aquoso, quod facile per omnia corporis membra distribuitur, nisi febris adsuerit, tunc ptisanæ cremor utilis est. Et Auic. loc. cit. Et infirmo detur in potu lac recens et multum, secundum mensuram conuenientem, si non fuerit febris, & aqua hordei, & aqua cucurbitæ & aqua melonis indi cum Iuleb, & si commisceatur cum aliquo horum parum uini albi, ut penetrare faciat, erit conueniens. Et paulò post, Cibus habetium spasmus siccum, sit totum quod humectat & lenit, & omnes sorbitiones pingues, lenes, factæ ex aqua hordei, assumpta ex carnibus agnorum & hœdorum, & quandoque ponitur ex oleribus humectatiuis, frangentibus nocumentum carnis, si illic fuerit caliditas, &c. De euacuatione lege Paul. loc. cit. ibi, Quibus ceruix recta intèditur, ab initio sanguis detrahendus est, & partes lanis oleo scyctionio imbutis & castoreo contegantur, & cucurbitulæ sic admouendæ, ut cutis exasperetur: la-

nes enim noxam inferunt, &c. Auicem secundam tertiam, cap. de cur. spasmi, Si spasmus est humidus, oportet ut curetur cum euacuantibus & purgantibus, &c. & cum uideris sanguinis signa dominantia, tum phlebotomia, &c. Aet. ser. 6. cap. 39, Post uenae sectionem utendum unguentis lancinantibus, & cucurbitulae cum scarificatione locis omnibus affectis affigantur: in potu conueniunt apomelli & radices silphii decoctum, & ipsa trita, & hyssopi decoctum, &c. B. Intellige non tantum ratione potus, quantum preparationis materiae. Itidem Paul. & Auic. loc. cit. asserunt. De resolutione postea loquens Aet. loc. cit. inquit, Deinde cataplasmata locis affectis adhibeantur, quae laxare ac discutere possunt, simulque lenire. horum autem materia sit foenugraecum, semen lini, farina hordeacea ac loliacea, &c. Paul. lib. 3 cap. 20, Quod si tetanus ad uetustatem inciderit, in oleum bis quotidie descendere oportet, nec diutius immorari, quum maxime uires conuellat. B. Nota quod tetanus non differt à conuulsione, nisi ut genus & species, uel si-

cut compositum à simplici. Sunt enim in
 tetano binæ conuulsiones diuersorum mu-
 sculorum & neruorum, ad oppositas partes
 sese trahentium. Auicennas secunda tertij,
 cap. de cur. spasma. Et cessio in pelli uul-
 pium & luporum inuat, & inunctio cum
 adipibus luporum, & oleo de lilio, si non
 fuerit febris: & decoctum catulorum, aut
 sessio in aquis, in quibus decoctæ sint medici-
 næ subriles, sicut abrotanū, aut folia radice
 iunci, & calamus aromaticus, & folia lau-
 ri, &c. lege eū fusius, & plura ad balnea &
 inunctiones spectantia ab ipso intelliges, &c.
 De remotione accidentium habes ferè omnes
 practicanes, sed præcipuè Paulum lib. 3.
 cap. 19. ibi, Primum partes quæ contra-
 huntur, ualenter continendæ sunt, & in-
 ordinatis resistendum motibus: oleo perfri-
 care oportet rutaceo aut sycionio, &c. Iti-
 dem Auic. ibi, Et applanetur quod spasmatū
 est leniter, &c. Et antea dixerat, Et si fuerit
 dolor, seda dolorem, postquam cōsideraueris
 quid sit, & abscinde causā eius. Lege de his
 Arculanū. De cura spasmi ex inanitione lo-

556 DE CONSEN. MEDIC.

quutus est etiam Auic. ibi, dicēs, Conueniētiōr
cura est tina, & inunctio in oleo humido
post ipsam, & eius iteratio multotiens. Si
autem possibile est, tina fiat ex lacte: si non,
ex aqua, in quibus cocta sint folia salicis,
hordeum, uiola nymphaea, cucurbita, & ci-
truli: aut sit totum illud ex aqua rosacea,
in qua decocti sint aliqua horum: & si se-
ceris, clysteria fiant ex istis expressionibus
& oleis aliquibus dissolutis, humectantibus
& impinguantibus, &c. Item Paul. loc.
cit. adserit, ibi, Eos qui ex inanitione con-
uelluntur, oleo uel hydreleo calido fouere
competit, &c. De cura per consensum ha-
bes plura apud neotericos omnes, quos recen-
sere esset præter longitudinem satis graue.
Vide tu Arcul. Marc. Catin. Gord &c. Le-
ge insuper Auic. ibi, In eo qui factus est à
percussione, oportet ut administrentur em-
brocæ quæ laxant, factæ ex hordeo, camo-
milla, &c. Si fuerit à dolore, seda dolorem,
&c. Et si est propter pūcturam, curetur, &c.
Et si fuerit à nocumento, propter alicuius
rei uenenosæ potum, curetur cum eo quod

cognoscitur in cap. de uenenis, &c.

Observationes de sectione
ne venæ.

Aet. ser. 6. cap. 39, Primum si à repletionem
fiat, secunda est uena. Auic. de cur. spas. lo-
quens, de sectione uenæ inquit, Non extra-
has totum, quod necessarium est ex sanguine:
imò retine ex eo aliquid, ut resistat spasmu,
& resoluatur resolutione motuum spasmi: &
hec observatio etiam habetur à Raze 1. con-
tin cap. de spas. &c.

Observationes de balneis.

Auic. loc. cit. Et scias quòd longitudo spa-
tij moræ in tina est ex eis quæ nocent pro-
pter mollificationem uirtutis, tu autem pone
multitudinē numeri in loco longitudinis spa-
cij, & fac sedere ipsum bis in die, &c. hoc
idem annotauit etiam Paul. lib. 3. cap. 20.

Observationes in ponendis
cucurbitulis.

Auic. Et ille qui uritur uentrosis, oportet
Z ij.

uratur sine scarificatione, si res est levis:
 & si non ita est, scarificatio fiat, & loca
 uentosarum custodiantur & conseruentur,
 ne corpus infrigidetur, &c. Vide de hoc la-
 tius Paul. Aeginet.

Observationes de aqua frigida.

Paul. lib. 3. cap. 20, Frigide superfusio-
 nem, quum sit (quemadmodum ait Hippo.)
 periculosissima, eoque posteris credo uitupe-
 rata, & nos dānamus deuitamūsq̃ue. B. Hæc
 dicta sunt in Marcum Catinariam, qui per
 immersionem aquæ frigide curam fieri iu-
 bet. Similiter de febre prouocāda: nam non
 solum Auic. ut supra, sed etiam Paul. in hoc
 loco optimum esse inquit præsidium febrem,
 quæ per initia non fuerit, superuenientem:
 & hoc contra Michaëlem Sauonarolam qui
 nullo modo prouocandā ait esse, quū postea
 nostri non sit arbitrij eam expellere.

Conuulsionem excitantia.

Excitant, ei que nocent coturnix, hellebo-
 rus, albus, tribulus marinus. Prohibent à pro-

prietate spasum iuxta Auicen. & Plin-
nium, Fel adipis, cinis mustelæ, spoliū ser-
pentis, storax bibita, &c.

Conuulsionem curantia.

Curant spasum ex repletionē, acorus, as-
sa, aristologia, bdellium, calamentum, cha-
medrys, castoreum, centum capita, colocyn-
this, epitimum, euphorbium, galbanum, pen-
cedanum, pyrethrum, satirion, scenoanthos,
absinthium, oleum amygdalarū dul. de been,
de piperibus, de costo, de croco, de alchechē-
figi, de semine lini, syrupus de stechade, de be-
tonica, rhodomel, pilulæ foetidae, de serapi-
no, de sex rebus Alex. chochie, unguentum
aragon, balsamum, confectio anacardina,
diamusculus, diābra. lege etiam remedia, inun-
ctiones, &c. iuxta Varig. cap. 10. de dispos.
capitis. Item Barho. Montagnanam conf.
244. in fine: uide etiam Aggregatorem, Ar-
cul. Sauona. Gord. Act. &c.

De prognosticis conuulsionum.

Hippocr. aphor. 2. aphor. 26, Febrem con-
uulsionem superuenire, melius est quā febris
Z. iij.

conuulsionem. B. Nam si febris superueniat
 humorem calefaciens, extenuat & dissoluit:
 si uerò post febrem conuulsio accidat, statim
 ob sui acutiem uires dissoluens, exitium af-
 fert, nisi ab initio quis huic opportunis reme-
 dijs resistat. Et aphor. 4. aphor. 5, Ex purga-
 tione superflua, conuulsio aut singulus su-
 perueniens, malum. Et aphor. 4. aphor. 49,
 In febre non intermittere si labrum, uel ocu-
 lus, uel nasus, uel supercilium perueratur, uel
 non uideat, aut iam debili existente corpo-
 re, quodcumque horum fiat, iam propè est
 mors. Et aphor. 4. aphor. 57, Qui à conuul-
 sione uel distentione nervorum tenetur, fe-
 bre superueniente liberatur. Et aphor. 4.
 aphor. 66, In acutis febribus conuulsiones &
 circa uiscera dolores fortes, malum. Et aphor.
 4. aphor. 67, In febribus ex somnis timores
 uel conuulsiones, malum. Et aphor. 4. aphor.
 68, In febribus spiritus offendens, malum,
 conuulsionem enim significat. Et aphor. 5.
 aphor. 1, Conuulsio ex helleboro lethalis.
 B. Non eam intelligit Hippoc. quæ per con-
 sensum oris, stomachi, neque eam quæ per ni-

miam euacuationem accidit, sed fortè eam,
 quæ ab impulsâ hellebori uirtute, uolentius
 neruorum substantiam exiccat, alioqui fru-
 strâ legeretur alter aphor. Ex superflua pur-
 gatione, &c. Et aphor. 5. aphor. 2, Conuul-
 sio ex uulnere lethalis. B. Quia ad uulnera
 sequi solet inflammatio, quæ ubi neruos atti-
 gerit, conuulsiones accidunt quandoque uni-
 uersales, ex quibus mors. Etiam aphor. 5. a-
 phor. 3, Vbi sanguis plurimus fluxerit, sin-
 gultus aut conuulsio superueniēs, malum. Et
 aphor. 5. aphor. 1, Si ebrius quispiam repente
 obmutuerit conuulsus moritur, nisi febre cor-
 ripiatur, aut ad horam peruenerit, qua sol-
 uuntur crapula, uocem recuperet. Et aphor.
 5. aphor. 6, Quicūque à distensione corripitū-
 tur, in quatuor diebus pereunt: si uerò hos ef-
 fugerint, sani fiunt. B. Morbus hic in primo
 dierū indicatoriorū circuitu finitur, non to-
 lerante diu natura laborem. Et aphor. 5. a-
 phor. 18, Frigidum inimicum ossibus, dēribus,
 neruis, cerebro, spinali medullæ, calidum ue-
 rò utile. Et aphor. 5. aphor. 57, In fluxu mu-
 liebri, si cōuulsio & animi defectus adueni-

rit, malum. Et aphor. 5 aph. 70, A quartanis capti, non admodum à cōuulsione capiuntur: si uerò prius capiantur, & quartana superuenerit, liberantur. Et aphor. 7. aphor. 9, A profluuiio sanguinis desipientia & conuulsio, malum. B. Dictum est conuulsionem ex euacuatione esse malam, sed quanto magis, si ambarū fuerit conuentus? Et aphor. 7. aphor. 10, Ab illo uomitus, singulus, desipientia uel conuulsio, malum. Et aphor. 7. aphor. 13, Ab aestibus fortibus conuulsio aut distentio, malum. B. Intellige pro aestibus siue febrem, siue aerem ambientem, uel feruorē, uel cauteria, uel escaram: nam ob neruorum siccitatem hæc proueniunt conuulsiones, quæ difficillimè curantur. Et aphor. 7. aphor. 18, In uigilia conuulsio uel desipientia, malum, &c. Et aphor. 7. aphor. 25, Ex medicamento potione conuulsio. Et aphor. 7. aphor. 27, Mulieri uterum gerenti si tentio superuenerit, facit abortum. Razes 9. aliman. Spasmus qui non repente, sed suauiter accidit post febrem, aut post multam uentris solutionem, aut multum uomitum, aut

sanguinis fluxū, malus est, & uix curabilis. Iridem habet Paul. loc. cit. Et Aet. & Auic. Mes. Cur sit hic deterior, quā distentio est, quia iuxta omnes dimēiones cōtrahit. Gal. lib. de tre. & palp. in fine, Conuulsiones, quarum siccitas causa est, minimè medicaberis: nam sic affecti citissimè intereunt, nec medicamēta sibi ipsis uilia excogitare permittunt: at quæ ex humorum copia, aut ab inflammatione eueniunt, humorum euacuando repletionem & inflammationem proprijs remedijs medendo ipsas curare poteris, &c. Similiter aphor. 5. comment. 7, Conuulsio, quæ sit ab euacuatione, acutissima est & perniciosissima: quæ uerò à repletionem nervorum partium, neque acutissima, neque similiter periculosa.

Authores dissentientes circa conuulsionem.

- 1 Adserere cum Aristotele, nervos oriri à corde.
- 2 Adserere, conuulsionū species esse plures

quàm tres, quum corpus etiam ad dextram
et sinistram curuari possit.

3 Adserere, conuulsiones de inanitione non
esse semper mortales. Nā pueri, inquit Auic.
liberantur à spasmō sicco uelociter.

4 Adserere, omnem conuulsionem de reple-
tione posse semper à febre curari.

5 Adserere, conuulsionis motum à naturali
motu non differre.

Confutatio dissentientium circa conuulsionem.

Confutat primum Gal. 3. de loc. aff. cap.
6. probans duobus medijs non oriri à corde.
Primū per exercitatissimos medicos, qui non
cordi in hoc morbo, sed cerebro, uel circa spi-
nam, remedia adaptant. Alterū ex arte ana-
tomica, in qua euidentissimè cernitur, nervos
oriri à cerebro, et non à corde.

Ad secundum respondet Gal. lib. de tre. et
palp. cap. ult. enumerans tantū tres species,
inquit, Huiusce passionis modos hūc quidem
emprosthotonum, illum uerò opisthotonum,
tertium autem tetanum (ut omnes fatentur)

IN CVR. MORB. LIB. II. 365

appellari cognosces, reliquos modos laterales
tanquam impossibiles propter situm neruo-
rum & corporis imbecillitatem, tacens, quos
si cognouisset utiles, non utique sicco pede
pertransiisset.

Ad tertium inquit Gal aphor. 2. comment.
26, Si uerò ex ardentibus febribus totum cor-
pus exiccetur & nervus: deinde ex siccitate
conuulsio accidat, hoc maximum est malum,
& penè insanabile, cuius ratio ab ipso red-
ditur, &c. Quod uerò dicit Auic. ita intelli-
gèdū est, quòd pueri liberantur à spasmō sic-
co uelociter: id est, pueri immunes sunt, ne de
facili in conuulsionem de inanitione incidant
ob eorum edacitatem, &c.

Obiectio.

Gal. 3. prognost. inquit, Quòd cōuulsio ac-
cidens pueris cum acuta febre, facillè curatur,
& tamen sequitur febris: igitur non omnes
moriuntur.

Responsio.

Duplex est febris. Altera totum corpus &
neruosam compaginem desiccans, & hæc est
incurabilis & lethalis. Altera est dissoluens

humores pituitosos, frigidus, qua facile curatur pueri, & sic intelligit Gal. ibi.

Ad quartum respondet Gal. in lib. de tre. & palp. non curari conuulsiones ex repletionem, tantum ex febre, sed quæcunque tantummodo ex frigidorum humorum copia proueniunt, repletionem tamen euacuando: sed quæ ab inflammatione eueniunt, minimè per febres curantur, sed inflammationem proprijs auxilijs: igitur conuulsio de repletionem non semper à febre curabitur.

Ad quintum inquit Gal. 3. de loc. aff. cap. 6, Conuulsionem in conuulsis partibus factam hac sola ratione à motu naturali differre, quod præter uoluntatem fit. Naturalis uero motus uoluntarius est. Et sic differt à motu materiali qui inuoluntariè semper fit.

De Melancholiæ descriptione.

Melancholia est quædam sine febre mentis alienatio ex humore melancholico dependens. Hæc duplici specie insigni constat: altera quam Græci μελαγχολίαν, id est, atram bilem: altera μανίαν, id est, insaniam uocant. Melancholia ratione locorum affectorum duplex est:

prima, quā cerebrū primario affectu affici-
tur: altera, quā per consensum uel totius, uel
partiū præcordijs scilicet affectus molestat,ur,
unde præcordialis siue hypochondriaca melā-
cholia uocatur. Cōplures uerò & harū exi-
stūt differētiæ, quas enarrare lōgū foret. Nā
quidā semper ridēt, nonnulli plorāt, alij mor-
tē expetunt: alij mori timēt, alij futura uati-
cinātur, quos οὐδεστικοί Græci uocāt, &c.

Loci consentientes de Melan-
choliæ descriptione.

Gal. lib. finit. med. Melācholia, est quidā
sine febre affectus mentē lādēs, nō sine graui
molestia animi, atq; auersione à rebus cha-
rissimis. Ibi etiā describitur Insania, dū in-
quit, est alienatio mētis, mutatiōq; à cōmunī
hominū ritu ac sanorum moribus, sine febre.

Auic. Melācholia, est mutatio existimatio-
nū & cogitationū à cursu naturali ad cor-
ruptionē, & ad timorē, & ad malitiā, pro-
pter complexionē melancholicam, facientem
spiritum cerebri sylvestrem interius, & fa-
ciētē ipsum timidum propter tenebras, &c.

Oribasius aphor. 7. comment. 10, Atra bilis est affectio cerebri, & ex melancholica fit materia, &c. Gal. 3. de loc. aff. cap. 7, Vbi atra bilis in corpore abundat, eam insaniam facit, quā Græci μελαγχολίαν uocant, efficit. Quemadmodū aliter atræ bilis succus, qui præassata flaua bile nascitur, ferina deliramenta inducit, modò cū febre, modò sine febre. Alexand. Tra. cap. 22, Sed ex loco etiam affecto aliā atque aliā sortitur speciei nomenclaturā: afficitur enim interdum cerebrū primario affectu, nōnunquā per consensum singularū corporis partiū, interdū uētre & præcordijs adfluctis, quā speciem hypochondriacā nominant. Gal. 5. de sympt. cau. in fine, Melancholica demētia uariæ sunt species, prout in ipsis particulatim dolosæ suspectæ que apparent. In omnibus commune unum habetur, quòd omnes præter rationem mœsti sunt, nec quamobrem tristentur, rationem possunt reddere, ac non pauci eorum mortem, & alia non timenda timere uidentur, &c. Vide fusius infra de signis melancholiciæ, &c.

De causis Melancholiæ.

Causæ uel sunt in cerebro, uel extra cerebrũ. Si per se in cerebro sunt, & non ab alijs dependeant partibus corporis, tunc uel sunt initiatrices siue primitiua, uel antecedentes, uel coniunctæ. Causæ primitiua sunt aër frigidus & siccus, turbulentus, aut calidus siccus adurens, sicut aër æstatis & autumnus, cibi potiusque atrabilarij, qualis est caro bubula, caprina, lentes, uinũ crassum, exercitiũ exiccans, ac balneũ, immoderata uigilia, timores, tristitiæque, uehemens studiũ, longi carceres, menstrua ac hamorrhoides oppressæ, &c. Causæ antecedentes sunt mala intemperies, frigida & sicca sine materia, quæ tũ cerebri, tum spiritus animalis complexionem ac substantiam tenebrosam efficit. Itidem facit mala intemperies calida & sicca, nam adurendo eorum substantiã obtenebrat. Itẽ mala temperatura frigida & sicca cum materia melancholica naturali uel non naturali, ut ex adustione sanguinis. Mania similiter ex bile præassata generatur. Causæ coniunctæ sunt, uel ipsa intemperies cerebri frigida &

Aa.i.

sicca, naturalis & non naturalis, melācholiā ad actū producēs, uel ipsa melācholia in cerebro contenta. Causa uerò per consensum à toto corpore sunt, uel febres quartanæ præcedentes, uel aliæ aegritudines in melancholiam desinentes. Causæ per consensum à partibus erunt plures: nam si proueniat malum à splene, tunc causa erit uel eius imbecillitas, segregare ac expurgare atram bilem non ualens, aut obstructio, aut apostema, aut mala intemperies. Et similiter intelligito de hepate, stomacho, præcordiis, ex quibus humor aut uapor tenebrosus tandem ad cerebrum eleuatur.

Loci consentientes de causis Melancholiæ.

Auic. loc. cit. Et melancholiæ causa aut est in ipso cerebro, aut extra cerebrum. Aet. ser. 6. & Paul. lib. 3. cap. 14. & Gal. 3 de loc. aff. ca. 5, Interdum sine febre uitiū est, ut in mania & melancholia, id quod modò per cōsensum, modò primaria affectione, cerebro laborante accidit. Itidē ait cap. 7. B. Ex hoc

Galenī loco cognoscitur, quotienscunque ali-
 quid per se & per consensum afficiatur, &
 hoc exactè discernitur per propria acciden-
 tia perpe. De causis primitiuis melancholiæ
 loquitur Gal. aphor. 3. comment. 20. ibi, Fu-
 rores enim & atra bilis, & morbi comitia-
 les, & anginae sunt morbi autumnales. Simi-
 liter & comment. 22. eiusdem est sententiæ,
 &c. Auic. prima tertij, tra. 5, Et quandoque
 causa generationis eius est aër exterior, &
 quandoque sunt in generatione eius cibi ge-
 nerati cholerae nigrae, & ex causis fortibus
 in generatione melancholiæ est superfluitas
 tristitiæ & timoris. Gal. 3. de loc. aff. cap. 7,
 Facile in temperiẽ melancholicam incidūt,
 qui & uigilijs & multis laboribus, & solici-
 tudine, & tenui uictu fuerint educati. Ad hæc
 accedunt, si hamorrhoids aliqua restricta sit,
 aut alia quædã consueta sanguinis euacua-
 tio, aut mulierũ menstrua: insuper si quis usus
 sit cibis qui suapte natura sanguinem melā-
 cholicum efficiunt, ut caprina bubuláque ca-
 ro, magisque hircinae & taurinae, asinorum
 ac camelorum carnes. Item uulpinae, caninae,
 Aa. ij.

atque magnam vim in huiusmodi generatione ex lepore cibus est, sed multò magis, ac frequenter limaces comestæ, omnesque terrenorum animalium carnes sale cõditæ. Ex aqualibus thunni, balenæ, vituli marini, delphini, canis atque cetaceorum omnium. Ex oleribus brassica sola ferè: inter legumina lentes, mox panis furfuraceus, & qui ex uitiatis seminibus conficitur. Præterea uina crassa nigræque aptissima sunt, ut ex ipsis melancholicus humor efficiatur: uetus denique caseus, &c. Vide de his etiã Gal. de atra bile cap. 4. & 6. &c. De causis antecedentibus loquitur Gal. 1. quòd fiat sine materia, aphor. 6. comment. 53. Et Auic. prima terty, tra. 5, Causa est malitia complexionis frigida & sicca, sine materia permutate substantiã cerebri, & complexionem spiritus luminosi ad tenebras: aut est cum materia, & illa aut est in uenis, ueniens ad eas ex loco alio, & conuertitur ad cholera nigram per adustionem, aut est materia imbibita in corpore cerebri, &c. Et paulò infra inquit, Et oportet ut scias, quòd cholera nigra facies melancholiã, quãdoque est

cholera nigra naturalis, aut phlegma, quādo
 conuertitur in cholera nigram ob spissitudi-
 nem, aut ob aliquā adustionē, quanuis hoc sit
 rarum & parum, &c. B. Nota ex Manardo
 in secunda epistola noni libri, pituitam adeo
 assari non posse in corpore humano, ut ni-
 gra in totum euadat. Et Gal. 3. de loc. aff.
 cap. 7, Igitur ea quam atra bilis constituit,
 in melancholiam transit: quæ uerò à pituita
 parata est, in aliam affectionem permutatur,
 melancholiam haudquaquam efficiens, &c.
 Gal. 5. de sympt. cau. in fine, Sola autem me-
 lancholica demētia à frigidiori succo, ut cau-
 sa, euenire solet, &c. Et 3. de loc. aff. cap. 7,
 Prouenit huiusmodi humor in quibusdam
 plurimus, uel à tēperie ab initio comparata,
 uel à cibis in hunc humore cōuersis. Et paulò
 antè, Melancholici sunt, in quibus siccitas
 & frigiditas dominatur, &c. Vide etiam
 caput sextum de atra bile. Aet. ser. 6. cap. 9,
 Generatur autem caliditate multa indige-
 na, aut flauam bilem, aut crassio rem sangui-
 nem adassante, &c. Vide etiam Galenum
 3. de locis affect. & 2. artis curatiue, &c.

Aa. ij.

Cause coniunctæ recitantur ab Auicen. loc. cit. ibi, Et unaquæque specierum cholera nigra, quum in cerebro est, modo prædicto facit melancholiam. Gal. 5. de sympt. cau. in fine libri, Porro omne delirium deprauatus est principis facultatis motus, à prauis succis, aut cerebri intemperie ortum habens. Et in fine cap. Quod nobis extrinsecus accidit, quum ambiens nos aër uastissimis tenebris fuerit obscuratus, id melancholicis ab intimo corpore erumpere uidetur, occupante cerebrum, uel ipsamet attrabile, uel uapore quopiam melancholico, &c. De causis etiam per consensum loquitur Galen. 3. de loc. affec. cap. 7. ibi, Interdum cerebro accidit, ut nonnunquam uniuerso in uenis sanguine melancholico effecto, ob commune uitium ipsum quoque lædatur: nonnunquam uerò reliqui corporis sanguine prorsus innocuo, solus qui in cerebro continetur, uel aliunde in ipsum deriuans, aut in ipso met humor melancholicus genitus est, &c. Et paulò post, Sunt etiam nonnulli, qui per febriles morbos melancholicum humorem contraxerunt, &c. Auicen. prima tertij, tract. 5.

cap. de melancho. Cui causa est extra cerebrum, communicat res aliqua ex qua humor aut uapor tenebrosus eleuatur ad cerebrum, & res illa aut est in toto corpore, quā ei dominatur complexio melancholica: aut præcesserunt ægrotudines, quibus succedit melancholia, ut febres temporales & permixtæ: aut quum sit permutatio ex epilepsia: aut est in splene, quum in ipso retinetur melancholia, & non potest ipsam purgare, uel trahere nigram ex sanguine: aut quia in ipso peruenit apostema uel oppilatio, &c. Lege fusius eum, & inuenies etiam caliditatē hepatis esse causam, &c. Aet ser. 6. cap. 9, Perducit etiam ad cōsensum cor ipsum ob uicinitatem. Et ibi, Plerunque partes circa præcordia primario affecta caput ad cōsensum perducunt, & delirium efficiunt, &c. Galen. 3. de loc. affec. cap. 7, Videtur quidem in ipso uentriculo inflammatio esse: sanguis enim in parte inflammata contentus crassior & atræ bili magis conformis: & sicut ex uentriculo halitus fumosus ad oculos eleuatus suffusorum accidentia efficit, pari ratione subla-

Aa. iiij.

ta ad cerebrum ab atra bile euaporatio, melancholica accidentia excitat, &c.

De signis Melancholiæ.

Signa principij melancholiæ, sunt timor & mœstitia sine causa, solitudinis dilectio, iudicium corruptum, iræ velocitas. Signa cōfirmatæ melancholiæ sunt, si quæ cogitare cœpit, ore promat, & permisceat actus & uerba, ut si dicat timere casum cœli, uel putet se esse regem, & sic adest timor & existimatio mala, & sermonis alienatio, sollicitudo & angustia, & non timenda timet, &c. Signa melancholiæ in cerebro sunt superflua cogitatio, & assidua sollicitudo melancholica, firmusque aspectus ad terram, uel ad aliâ rem. Item capitis, faciei, & oculorum color niger, capilli crassi & nigri, præceduntq; malæ cogitationes ac insomnia, uel aliqua cerebri ægriitudines, ut epilepsia: nec adsum indicia per consensum afficientia. Signa, quum à rosso per cōsensum fiat, sunt gracilis corporis habitus, qualis est niger, hirsutus, & ex toto melancholicus per naturam uel per acquisitio-

nem, sicuti per solitudines, vigilias, malorum ciborum esus, uel per menstruorum uel hamorrhoidarum oppressionē: adest insuper multitudo pilorum uehementer nigrorum atque crassorum, &c. Signa hypochondriaca melancholia, quam Auicennas Myrachiam uocat, sunt inflationes, rugitus, ructus acidi, ardor, & hypochondriorum grauitas, aluus restringitur, uomitus, dolor uentriculi, & propriè à cibo, quousque digestum sit. Accidunt etiam ex acceptance cibi multa accidentia, quæ facta digestionem minuuntur, iuuanturque à uomitu, ructu, flatibus, & excretionem alui, ac à concoctione. Signa humorum, si fuerit atra bilis sanguinea, primum insaniunt cum risu uero uel ficto, nec ulla adest mœstissia: si melancholia fuerit pura, tunc mœrent, plorant, mortem expetunt: si bilis perassata, tunc uehementer insaniunt, effrænes ad modum ferarum euadunt, & uiolenter homines uerberant, &c.

Loci consentientes de signis
Melancholiæ.

Hippoc. aphor. 6. aphoris 23, Si timor atque

mæstitia longo tempore perseuerent, ex eo a-
 tra bilis significatur. Auic. prima tertij, tra-
 5. ca. de sig. melāch. Signa principij melācho-
 liae sunt, existimatio mala & timor sine cau-
 sa, & uelocitas iræ, & dilectio solitudinis,
 & tremor, & uertigo, & sonitus, & tinnitus
 & propriè in myrach, &c. Razes 9. alman.
 Quum alicui malæ cogitationes sine causa
 acciderint, & timor, & mæstitia in eo præ-
 ualuerint, est principium melancholiae. Ga-
 len. 3. de loc. affect. cap. 7, Differunt inter se
 melancholici: nam omnes timent, mærent, ui-
 tam damnant, odio habent homines, sed non
 omnes mori cupiunt. De signis cōfirmata me-
 lācholiae loquitur Auic. loc. cit. ibi, Quum au-
 tem confirmata est, tunc adest timor & ma-
 litia existimationis, & angustia, & sollicitu-
 do, & alienatio sermonis, & fastidium pro-
 pter multitudinem uentositatis, & species ti-
 moris ex eis quæ non sunt aut sunt, penè infi-
 nitæ. Nam quidam timent casum cæli supra
 se, alij quòd terra eos absorbeat, alij timet la-
 trones, & quandoque imaginantur se factos
 reges, &c. Razes loc. cit. At si quæ cogitare

cœperit, ore promat, uerba sua actûsque per-
 misceat, iam perfecta est melancholia. Faciunt
 quoque ad hunc locum quacunque ex Gal. in
 5. de sympt. cau. & 3. de loc. affe. ca. 7. suprà
 recitata sunt. Idem habet Paul. lib. 3. ca. 14.
 & Aet. ser. 6. ca. 9. ibi, In summa melâcholia
 multiformia deliria sunt ob particulares cor-
 ruptas imaginationes, non pauci mortem ti-
 ment, &c. De signis melâcholiae in cerebro le-
 ge Gal. 3. de loc. aff. cap. 7. ibi, Quum autem
 propria melâcholia accidentia auctiora ui-
 dentur, circa uentriculum uerò nulla, aut pau-
 ca admodum sunt, haud ab re existimaueris
 primitiuam in cerebro affectionem consiste-
 re, ob atram bilem in ipso congestam, &c.
 Aet. ser. 6. cap. 9, Cognitio an totum corpus
 melancholicum sanguinem habeat, an iuxta
 solum cerebrum talis sit, nigriores & hirsuti,
 & qui uenas amplas habent, aptissimi sunt ad
 atra bilis generationem: interdum homines ru-
 bicundi in melancholicam temperiem trans-
 eunt, similiter & flauī, praesertim ubi uigi-
 lijs, laboribus pluribus & curis, & tenui ui-
 tu, aut melancholicis edulys usi fuerint, &c.

Vide etiam quacunque supra ex Galeno de
causis primitiuis uerba fecimus. Iridem adse-
rit Auicen. loc. cit. ibi, Signa eius quæ in cere-
bro est, sunt propriè superfluitates cogitatio-
nis, & assiduatio sollicitudinis melancholica,
&c. De signis per consensum totius corporis
loquitur Paul. lib. 3. cap. 14. ibi, Peculiares
melancholia notæ sunt, gracilis corporis habi-
tus, niger, hirsutus, & ex toto melancholicus
uel natura, uel acquisitione per sollicitudi-
nes, uigilias, &c. Auicen. loc. cit. Eius quæ fa-
cta est communitate totius corporis est nigre-
do corporis, & arefactio, & retentio eius
quod euacuatur ex splene & stomacho, &
quod euacuatur cū periodis, ex ano, & men-
struis, &c. lege Gale. 3 de loc. aff. cap. 7. Fa-
cit etiam mentionem de signis melancholia
hypochondriacæ, 3. de loc. affect. cap. 7. ibi,
Quumque circa uentriculum prima incæpe-
rint accidentia, ipsiisque auctis melancholi-
ca sequatur affectio, deinde alui deiectione,
& uomitu, & proba cōcoctione, ructibusque
leuetur is qui laborat, hypochondriacum fla-
uorūque morbum ipsum nominabimus, &c.

Auicē. loc. cit. Signa myrachia sum, grani-
 tas in myrach, & attractio ad superiora, &
 nausea inseparabilis, & malitia animæ, &
 corruptio digestionis, & eructuatio acetosa,
 & sputum humidū, & rugitus, & exitus uen-
 tositatis, &c. Lege eum fusius. lege etiā Pau-
 lum lib. 3. cap. 14. ibi, Qui hypochondriaca la-
 borant, habent cruditates, acidos ructus, ar-
 dorem, & ipsorum gravitatem, præcordia sur-
 sum conuelluntur, &c. Razes 9. alman. Quod
 si cum melancholia fuerit dolor uentris, &
 inflatio, & malus color, & digestionis cor-
 ruptio, & uomitus acetosus, &c. De signis hu-
 morum loquitur fusius Auicē. loc. cit. ibi, Et
 cholera nigra faciens melancholiam, quan-
 do est cum sanguine, est cum gaudio & risu,
 & non comitatur ipsam tristitiam uehementē,
 & si est cum cholera, tunc est cum agitatio-
 ne & lesione & demonio, & est similis ma-
 nis: & si fuerit cholera nigra, pura, tūc ad-
 erit cogitatio plurima, & audaciæ minus,
 nisi moueatur & rixetur, & habeat odium
 cuius nō obliuiscitur, &c. Lege etiam Paul.
 lib. 3. cap. 14. ibi, Si quando flaua bilis supra

modum exusta in nigram fiat mutatio, &c.

De cura Melancholiæ sine materia.

Quum dictum sit supra, cerebrum uel primario affectu uel per consensum laborare, & quod primarius affectus uel ab intemperie nuda, sine humorum cōplexu, uel cū humoribus complexa perficiatur, idcirco primū de cura eius qui sine materia fit, agamus. Hæc igitur mala temperies triplici scopo remouenda erit: primū alteratione, cum ijs præsertim, quæ cerebrum & cor roborant: secundò, cum euacuatione & diuersione: nam si quispiam humor fuerit in fluxu, euacuari debet ac diuerti: tertio cum sympt. remotione. Alteratio fiet cum humectantibus calidis uel frigidis, prout in discrasia expediet, roborantibus tamen spiritus, cor & cerebrum. Spiritus simplici-ter roborant oua, uinum, aqua carnis: spiritus & sanguinem purificant margaritæ, capillus ueneris, fumus terræ, &c. lapsus temperamenti cordis emendant, si sit frigidus muschus, ambra, melissophyllon, borago: si calidus, camphora, rosæ, sandali, acetosa, uiolæ

nimphae, coriadrum, coralli. Euacuatio fiet per simplicia uel per composita: simplicia sunt helleborus niger, aloes, agaricus, colocynthis, epithymum, sena, myrobalani, chebuli, lapis lazuli, lapis armenius, serum lactis, &c. Composita sunt, diasene, confectio hamech, hiera Hermetis, hiera Iusti, pilulae de lapide lazuli, pilulae indae, decoctum senae epithimi, &c. Remotio sympt. uersatur circa uigiliarum remotionem, cum somniferis tam intrinsecus quam extrinsecus adhibitis. Caveat sibi ab imminentibus periculis, ne alta petentes, interdum se praecipitent, uel ne arrepro ferro, alios percutiant, uel semetipsos interimant, &c.

De cura Melancholiae cum materia.

Cura mala complexionis cum materia in cerebro per scopos quinque absoluitur: primo, per sex rerum non naturalium institutionem: secundo, per materiae preparationem: tertio, per euacuationem: quarto, per reuulsionem ac derivationem, tum a cerebro, tum a corde, ad alia membra minus principalia: quinto, per resolutionem.

nem residui cerebri, ac cordis roborationem. Vicius ratio in melancholia sit calida & humida, magis tamē humectans quā calefaciens, siq̃ue probi succi, concoctu facilis: uitentur quacūque atrem bilem generant, de quibus supra in causis primitiuis satis copiose à Galeno dictum est. Commendantur uolucres montanae nō pingues, oua gallinarum mollia, pisces petrosi, carnes hœdinae, & lactentium animalium: uiuētur animalia in stagnis degentia. Potus sit uinum tenue, album, non uetus: abstineant à copia potus, ne cibi ex uentre fluitent, acetum à cibo commendatur: somnus non prohibeatur, imò cum remedijs sæpe arcessendus est, uicem motus leues frictiones suppleant, coitus uiteatur, & sudor copiosus: in accidentibus animo caueant mœrorem & tristitiam, sed sonoris cantinellis ac modulationibus letificentur, uiuentque cogitationes, &c. Preparatio materiae fiet per syrupos & per decocta. Syrupi sint de pomis, de epithimo, de fumo terræ, de lupulis, de uio-
lis, de succo boraginis, de cortice citri, &c. Decocta sunt ex epithimo, sena, polypodio la-

pulorum, thymo, fumo terra, boraginis, mentha, calamo aromatico, mellissophyllo, macis, rosmarino, xyloaloe, &c. Evacuatio, si materia in capite contineatur, non fiat per uenæ sectionem, nisi uel copia sanguinis adsit, uel præseruationis gratia id fiat, sed potius per atram bilem subducentia eam moliemur, prout supra dictum est. Reuulsio & deriuatio fient per enemata, frictiones, cucurbitulas, de quibus alijs satis copiosè uerba fecimus. Resolutio residui per intrinseca & extrinseca perficietur. Extrinseca erunt balnea, sacculi & epithemata, balnea uel naturalia, sponte scaturientia, uel artificialia, cum herbis prædictis parata. Sacculi quoque parantur ex floribus buglossæ, boraginis, mellissophylli, rosarum, & cum been albo & rubro, sandalis, garyophyllis, &c. Similiter epithemata cū debitis aquis & pulueribus cordi dicatis componantur. Intrinsicæ sunt saccharum buglossatum, boraginaceum, rosaceum, uiolaceum, addendo ijs aliquid diamusci dulcis & electuarij de gemmis, &c.

Bb. 1.

De cura Melancholiæ per
consensum.

Cura melācholiæ per consensum binis in-
tensionibus præseruatiuis potius, quàm cu-
ratiuis perficitur, quarum altera cauet, ne
hic humor abundet: altera cerebrum robo-
rādo, efficit ne quid in se recipiat: & si quid
receperit, id expurgando à se expellat. Hu-
mor non abundabit, si per sectionem uenæ,
(præsertim atra bile uniuersum corpus occu-
pante) uel per purgantia pharmaca superius
habita patiens euacuetur, præparando ta-
men interim ac alterando, prout in dyscra-
sia expedit: rursusque repurgando, deinde
reuellendo ac diuertendo cum cucurbitulis,
lotionibus, aut menstruorum uel hæmorrhoi-
darū euocatione, & in fine resolūdo si quid
superfit, &c. Roboratur cerebrum cum hume-
stantibus calidis uel frigidis, prout morbus
requirit, tam intrinsecus, quàm extrinsecus
applicitis, sicuti fieret epithema cum rosis,
nenuphare, folijs salicis, uiolarum, boraginis,
mellissophylli, stechadis, & hœdino capi-
te, &c.

Loci consentientes de cura Melancholiæ sine materia.

Auic. prima tertij, tra. 4. ca. de cur. mel. Si melancholia fuerit ex malitia complexionis singularis, frigida aut sicca, sufficiet ut administres calefactionem cordis cum latificantibus, è medicinis de musco & theriaca, & metridato, & similibus, & cura caput cum eis quæ dicta sunt in cap. de stoliditate, &c. Gal. etiam 3. de loc. aff. ca. 7. de cura melancholiæ sine materia loquitur, ibi, Interim monendi sunt amici, qui me curantem uiderunt, frequentibus balneis, uictuque humido, bonique succi, nulloque adhibito presidio huiusmodi morbum me curasse, ubi nondum ob longum temporis tractum nocuus humor euacuationi resisteret, &c. Arcul. in 9. alman. nouem modos roborandi ac alterandi spiritus & cor docet, quem tu fusius uidere poteris. De cura in cerebro cum materia loquitur ibi Auicē. prima tertij, tra. 4. Si est ex materia melancholica in cerebro confirmata, tunc thesaurus curæ est tres res: prima euacuatio materie: secunda, ut administres Bb. ij.

cum euacuatione humectationem assiduam cum embrocis & oleis calidis: tertia, ut admixtiones confortationem cordis in complexione frigida cum calidis laticificantibus, &c. De victus ratione lege Aet. ser. 6. ca. 10. ibi, Post balnea cibos damus concoctu faciles, flatu exortes: plerunque conueniunt panes in clibano cocti probe parati, uolucres non pingues, non uirosæ, montanæ, oua gallinarum mollia, pisces petrosi, & molles carne, uitentur in stagnis degentia & in paludibus. Ex carnibus conueniunt hœdina & lactentiũ animalium, & magis extremæ partes probe concoctæ. Vinum sit tenue & album, & non ualde uetus. Nec acruatim detur inter cibum, nec magna copia exhibeatur, ne cibi in uentre fluitent, &c. Paul. lib. 3. cap. 14. etiam de uictu facit mentionem, ibi, Victus omnibus melancholicis confert probi succi & mediocriter humidus: uitanda sunt, caro bubula, & quacũque atram bilem generant, &c. Itidem Auicenna. ibi, Sumat cibos laudabilis chymi, humectatiuos ualde, & fiat augmentum in hoc, ut corpus eius tenerescat cum cibis cõuenien-

ribus, &c. Lege cum fusius. Razes in Diuis.
 Poter uinū album, subtile, clarum cum aqua
 plurima. Aqua sit boraginea, inquit Guai.
 De preparatione materiae habes Aet. ser. 6.
 cap. 10. ibi, Optimum est pulegij decoctum sa-
 pe bibere, & ante purgatoria, & post. Mesu.
 cap. de Melanch. Fac ut cadat digestio æ-
 qualiter in materiam, quoniam est cura ue-
 ra, &c. Hippoc. in lib. de atra bile, Primū
 quidē bona digestio curæ sit, deinde purga-
 rio. Et Auic. loc. cit. Incipe à digestionē. Et
 paulò infra laudat Syrupū, in quo semina fla-
 rus discutiencia decoquantur. De euacuatio-
 ne melancholice loquitur Gal. 3. de loc. aff.
 cap. 7. ibi, Nam ubi uniuersum corpus sangui-
 nem melancholicum continet, curationem à
 sectione uenæ incipere oportet: ubi uerò so-
 lum cerebrū sanguinis detractione ager non
 indiget, quanuis ob aliam forrē causam mit-
 ti possit, &c. Itidem adserit Aet. adiungens,
 Ni praeservationis gratia detractionem fa-
 ciamus. Auic. prima tertij, cap. de cur. mel.
 Amplius euacua in principio rei, cum medi-
 cinis lenibus, in quibus recipiuntur epithi-
 Bb. ij.

mū, pulpa colocynthidos, & scamonea parū.
 deinde cum decoctione, in qua sit epithimum
 & agaricū: & postea si non cōfert, admini-
 stra hieras magnas, deinde helleborū, sed cū
 timore & cautela: quæ si non cōferunt, rursus
 reitera, & in omni hebdomada euacua uice
 una, &c. B. Nota melācholicos ob gravitatē
 humoris per inferiora purgari debere, unde
 Hipp. apho. 4. aph. 9, Melācholicos plenius
 inferiores eadē ratione contraria apponen-
 tes, unde dixit ἀδύολεπῶς pro σφοδρῶς, id
 est plenius, pro fortius, quū humor de sui na-
 tura ad exitū sit ineptus. Paul. lib. 3. ca. 14,
 Purgentur per initia epithimo uel aloe. Aet.
 ser. 6. ca. 10, In quibus uitiati humores ma-
 gis redūdāt, agrum purgabis per hierā Ruffi
 aut Archigenis aut Iusti. Cōducit etiā sero la-
 ctis aluū subducere, quod à lacte per cocturā
 separatur. B. Modus segregādi lac à sero ha-
 betur non solūm hīc ab Aet. sed etiā à Dio-
 sco. ca. de lacte, ubi etiam modū bibendi de-
 monstrat. De reuulsione & resolutione loqui-
 tur Auic. ibi, Quūmq; purgaueris, attēde ad
 cor, cum his quæ multotiens diximus, & ad-

ministra masticationes, gargarismata, & odoramenta bona, muscum, & ambram, & alfeniati, & xyloaloen, &c. B. Alfeniati sunt species aromaticæ, ut gariophyllū, & similia. Mesu. Secundum regimen est faciens resolutionem cum mediocritate. uide Arcul. & cæteros practiçantes de resolutione, &c. De cura per consensum lege primū illud Paul. Morbum qui ex totius corporis consortio trahit originem uiribus ualentibus, à sanguinis missione curare incipies, & interposito tempore uiribus recollectis inferius purgare conuenit, & si hæmorrhoidibus aut mensibus suppressus morbus proueniat, horū purgationem moliemur. Itidem ait Aet. ser. 6. cap. 9. ibi, Quum igitur totum corpus melancholicum sanguinem habuerit, &c. Itidem Auicen. loc. citat. ibi, Nam si uides uenas plenas, qualitercunque sit cholera, nigra est sanguinea: phlebotometur igitur ex nigra, &c. Lege etiam Gal. 3. de loc. aff. ca. 7. De alijs intetionibus habes plura iuxta modernos authores, pro resolutione utitur triphera. 3. iij. epithimi. 3. i. hieræ. 3. 5. Aet. theriaca præsertim hye Bb. iij.

me & uere. De roboratione cerebri lege Auic-
cen. ibi, Succurres illi cum eis qua caput in-
frigidant, & humectant ipsum ac confor-
tant, ut non recipiat quod peruenit ad ipsum
ab alijs, &c.

Obseruationes in cura.

Auicen. prima tertij, tract. cit. Oportet ut
cura eius fieri incipiat, antequam confirme-
tur, quoniam facilis est in principio, & pra-
ua & difficilis cum est confirmata: sitque stu-
dium tuum in humectando, magisque in cale-
faciendo. Itidem ait Aet. ser. 6. cap. 10. ibi,
Incipientem affectione curare oportet, &c.

Obseruationes de cibo.

Auicen. loc. cit. Et prohibe ne comedant
post cibum illum alium, & ab intermissione
cibi super cibum iam corruptum, & alienent
e se fabas, carnes salitas, lentes & caules, &
uinum crassum & nouum, & omne sal, & o-
mne falsum, & acre, & acutum, & quod est
uehementis acetositatis: sed sumat pingue, &
dulce, & cibos generatiuos sanguinis lauda-
bilis, &c.

Observationes de euacuatione.

Mesu. cap. de melancho. Tria in euacuatione annotanda proponit. Primum, ut non semel laboriosam & subitanam euacuationem faciamus, sed pro temporis interstitio: nā subitanea ac uiolenta euacuatio uix à natura regulatur. Secundū, quòd solutiū sit cōmensuratū, non excedens mediocritatē. Tertium, non spoliatur à rebus lenientibus & hūmectantibus. Hoc idem sentit Auic. ibi, Euacuato in rei principio cum medicinis lenibus, &c. B. Adde tu quòd pharmacū in se habeat aliquid ex medicinis membra principalia & spiritus roborantibus, &c.

Observationes de sectione venæ.

Gal. 3 de loc. aff. ca. 7, Quū speraueris in uniuersi corporis uenis, melancholicum sanguinem contineri, quo certiore habear notitiam, mediam cubiti uenam seca, quæ cōmunis est: quòd si fluens sanguis nō uideatur melancholicus, statim supprimatur: si uerò talis appareat, euacua, quantum pro laborantis corporis habitu satis esse conieceris, &c. Ita-

dem Aer.ca.9.adserit. Auic.loc.cit. Amplius si phlebotomas, & inuenis sanguinē subrilē, non retineas sanguinē propter hoc, quoniam multotiens in ipsa præcedit subtilis. Et similiter oportet ut amplifices phlebotomiam, ut nō effluat quod subtile est, & retineatur crassum. Mesu. Si sanguis exuberat in toto, & uenæ plenæ sunt, euacua ex uena nigra, & post ipsam ex basilica, & hoc in melancholia: in mania uerò fac econtra: incipe à basilica, deinde ex uena nigra, & post has phlebotomia ex saphenis, &c.

Obseruationes de alteratione.

Arcul. & Marc. Carin. Fac quòd alteratio non uirtute solùm, sed etiam numero euacuationi correspondeat, ita ut nō fiat statim, sed successiue, ut dictum est.

Obseruationes de resolutione.

Auic. loc. cit. Non administrentur pura resolutiua, ut non incrassetur humor propter resolutionē purā, &c. Et paulò post, Quumque administras embrocas, nō est uia ad ministrandum infrigidantia pura super caput,

Ec. Intelligi in mania, *Ec.* Michael Sauo.
Diuretica in hoc casu sunt suspecta, ex eo
quod tenue educunt, & crassum aptum in
melancholiam conueru relinquant, *Ec.*

Melancholiam incitantia.

Inducunt melancholiam & maniam car-
nes uaccinae, nimius anacardi usus, allium,
hyosciamus, lentes, solatrum fluuiiale, uitis al-
ba, & quaecunque sanguine crassum efficiunt.

Melancholiam curantia.

Curant melancholiam, absinthium, epi-
thimum, fumus terrae, borago, buglossa, lupu-
li, anacardi, aurum, margarita, calamus aro-
maticus, sena, helleborus niger, eupatorium,
mellissophyllō, matricaria, scylla, stechas, thy-
mus, myrobalani chebuli & nigri, oximum
flauiatile, diasene, confectio hamec, confectio
esdra Nic. ius galli decrepiti, serum lactis, pli-
us, arcoticon Nic. rosata magna Nic. diana-
cardinum, serapio. 8. antido. miridatum, la-
pis armenius, lapis lazulus, pilulae indae, pi-
lulae de lap. lazuli, sal indū, saccharū buglo-

396 DE CONSEN. MEDIC.

saceum, boraginaceum, rosaceum, muscus, larificans almans. electuarium de gēmis, & mille alia quæ arte parari possunt. Vide de hac re Varignanam cap. 8. tra. 2. plura composita afferentem uide etiam Montag. cons. 47. de agritudinibus cap. Vide insuper Arcul. Michaël. Sauo. & Gord.

De prognosticis melancholiæ.

Hippocr. lib. de atra bile, Morbus hic quā nondum ferè incæpit, curari debet: nam inueteratus, difficulter curatur ac tractatur. Cognosces esse confirmatum ex signis suprà positis. Et aphor. 6. aphor. 53, Desipientiæ quæ cum risu fiunt, securiores: quæ uerò cum studio, periculosiores.

Obiectio.

Quomodo esse potest risus in melancholia, quum dictum sit, mærorem & tristitiam esse eius accidentiæ?

Responsio.

Duplex est risus, fictus & uerus, sed de hoc lege Gentilem & Arcul. qui de hac re fusius sermocinantur, intelligēque securiores pro

IN CVR. MORB. LIB. II. 397

minus periculosas. Et aphor. 6. aphor. 21,
In insanientibus si uarices uel hæmorrhoi-
des superuenerint, insania solutio. B. Fit so-
lutio, natura ad ignobiliores partes humo-
rem melancholicum transmittente. Auic. cap.
de Malan. Si accidat casus appetitus, tunc
egritudo est mala: & si accidant in corpo-
ribus eorum ulcera, tunc mors est propinqua.
Si uerò cholera nigra appareat in egestio-
ne, uomitu, urina, in coloris cutis lentiginibus
& panno & ulceribus, scabie, uaricibus, ele-
phantia & cursu, quod ex ano profluit, est
signum bonitatis: quia hæc signa omnimo-
dam à sanguine discretionem ostendunt, &c.
Et aphor. 6. aphor. 56, In morbis melacholi-
cis ad hæc periculosi decubitus stuporẽ cor-
poris uel conuulsionem uel furorem uel cæ-
citatem significat. Et aphor. 6. aphor. 2, Atra-
bile uexatis & renum passionibus hæmor-
rhoides superuenientes bonum. Auic. prima
terty, tra. 5, Preparati ad hoc sunt trauli,
& syllabam multotiens repetentes, antequam
dictionem proferant, &c. & hæc egritudo
plus accidit uiris, sed in mulieribus est dete-

rior, & multiplicatur in iuuenibus & senibus. Et plurimum melancholiam habens est spleneticus, & aegritudines, quibus succedit melancholia, sunt sicut febres temporales & mixtae, & melancholia accidens successione alterius aegritudinis calidae, facilis est cura, ita ut embrocationibus remoueatur, &c.

B. Trauli dicuntur qui proferre non possunt r & s, ob humiditatem linguam mollificantem. Dixit accidere plus uiris quam mulieribus, quia calidiores sunt uiri foeminis. De successione huius morbi per alias aegritudines lege 3. prognost. tex. 29. in comment. Gal. &c. Hippocr. de morb. uulg. Melancholici magna ex parte morbo comitiali laborant, & econtra. B. Quia habent communem causam, idcirco facile alter in alterum mutatur, &c.

Authores dissentientes circa Melancholiam.

- 1 Adserere, in hoc morbo idem esse affectum & causam.
- 2 Adserere, in omni specie melacholiae sectionem uenae congruere.

3 Adserere, pituitam adeò assari posse, ut melancholia efficiatur.

4 Adserere, Melancholiam cōfirmatam sine controuersia posse sanari.

5 Adserere, humorem melancholicū, qui est fax sanguinis, non differre à melancholia.

Ad primum: Gal. lib. 2. artis cur. Melancholiæ nomen à causa ipsum faciente prouenit, et humor, qui ipsius est causa, melancholia ab omnibus dicitur. Igitur sicuti differt causa ab effectū, ita hic affectus à sua causa, et sic idem non erunt.

Ad secundū: Gal. 3. de loc. aff. ca. de melan. Vbi uniuersum corpus sanguinē melancholicū continet, curationē à uenæ sectione incipere oportet: ubi uerò solum cerebrū, infirmus sanguinis detractio non indiget, in omni igitur specie sectio uenæ non congruit.

Ad tertium: Gal. 3. de loc. aff. cap. 7, Igitur ea quā atra bilis constituit, in melācholiā transit: quæ uerò à pituita parca est, in aliā affectionem permutatur, melancholiā haudquaquam efficiens.

Ad quartū: Alex. cap. de melanch. Si con-

firmatur hic morbus, cerebrum ad sui naturam mutat, & aeger ad assumptionem medicinarum fit inobediens, &c. Hippocr. lib. de atrabile, Non curatur confirmatus, quia in insaniam sæpe conuerti solet. Idem etiā Aet. & Auic. adserunt.

Ad quintum: Gal. lib. de atra bile & de plenit. circa finem, Porro dum ea ueluti faex sanguinis permanet, neque adhuc acida facta est, satius forsitan sit, humorem melancholicum illam appellare, nondum melancholiam: sed melācholicum potius humorem solemus appellare, quando propè accessit, ut in melancholiam uertatur. Melancholia uerò dicitur, quæ iam atra bilis est, & sic per hæc uerba inter se differunt.

De Ophthalmia.

Lippitudo, Græcè ὀφθαλμία dicta, est annata tunica inflammatio rubore caloreque plurimo, ac punctiōibus eueniēs. In hoc genere continetur etiam perturbatio siue uacillatio, à Græcis πᾶσις dicta, quæ nihil aliud est, quàm oculi humiditas cum calore & rubore naturæ alieno, ob extrinsecā cau-

nam forinsecus adueniēre. Sequitur etiā tertia species ophthalmie, à Græcis dicta *μωσις*, Arabicè alguardenegi, & fit quotiescūque ab inflammatione uehementi utraque palpebra ita inuertitur, ut uix oculi ab ipsis contegantur.

Loci consentientes de ophthalmia.

Gal. 1. de diff. mor. cap. 13, Lippitudo est membrana, quæ ceratoidi tunica adheret, phlegmone. Itidem de part. art. med. cap. 3. ait, & in lib. finit. med. Est, inquit, phlegmone circa oculos cum rubore & plurimo calore, & motu difficili, ac punctiōibus nata. Auic. tertia tertij tra. 1, Ophthalmia alia est uera, & alia ei similis, quæ nominatur cōturbatio & uacillatio. Ophthalmia uera est apostema in cōiunctiua: & alia quidem est, quæ est apostema simplex, non pertransiens terminū: & alia est quæ magis est pertransiens termini in magnitudine, in qua superabūdat albugo super pupillā, & tegit eam, & prohibet clausiōem, & nominatur chimosis, & apud nos alguardenegi, &c. B. Ex his intel-
Cc. i.

lige tres esse ophthalmiae species: prima est
πᾶρα ἔξω, quæ levis est: nā remota eius causa,
 remouetur: secūda ophthalmia, quæ est apo-
 stema simplex, non pertrāsiciens terminū, &
 in ea est uenarū exuberatio, fluxus & dolor:
 tertia *ἡ μωσις*, quæ est ophthalmia magna,
 pertransiens terminū in magnitudine, in qua
 superabūdat albugo super pupillā, &c. Am-
 plius scito omnes oculorū morbos esse in tri-
 plici differētia, scilicet ex phlegmone, fluxu,
 & ulcerationibus. Quid sit phlegmone iam
 declaratū est. Fluxus uerò est tenuium dela-
 rio humorum citra uolūtatem quæ cohiberi
 non potest. Ulceratio uerò est ceratoidis ru-
 ptio ab ictu uel à ualida inflāmatione oriēs.
 de his uide Galen. lib. fin. med. Habet etiam
 unaquæque oculi tunica morbos à quibus af-
 ficitur, quæ separatim à Paulo & in uno
 capite ab Aetio declarantur. De his uide
 etiam Manardū epist. 2. lib. 7. Loquitur in-
 super Gal. de his primo de diff. mor. cap. 13.
 & 4 de sympt. cau. circa principiam. Paul.
 lib. 3. cap. 22. *πᾶρα ἔξω* est oculi humiditas cū
 calore & rubore naturæ alieno, nō ex corpo

re, sed à foris adueniente causa. Gal. lib. fin. med. Chemosis est ambientis oculum mēbra-
na, quod album quoque appellatur, extube-
ratio, albæ carnis persimilis, &c. Vide etiam
Paul. loc. cit. ibi, Chemosim uocant, &c.

De causis ophthalmiæ.

Causæ initiatrices sunt puluis, fumus, sol,
aër, uel quæcūque ex sex rebus non natura-
libus, & sibi annexis oriūtur. Causæ antece-
dētes sunt sex, sanguis, bilis, pituita, atra bilis,
materia aquosa & flatuosa. Causæ coniun-
ctæ sunt, hi humores ophthalmiam ad actum
producētes, aut inflāmatio, aut alius quispia
tumor. Causæ generationis ophthalmiæ binæ
sunt, prima fit cum materia ex superfluitate
alimēti annata tunica paulatim cōgeritur,
aut ipsum alimentum non probè concoctum
in ea permanet, & apostema efficit. Secun-
da est, cū materia per modum fluxus à
capite per uenas & arterias, musculos ac
nervos opticos siue intrinsecè siue extrinsecè
ad annatā oculi tunicam se cōfert, aut quum
ab alijs corporis partibus materia trāsmitti-
tur ad oculū iam debile ob eius tēperaturam,

Cc. ij.

vel à generatione existentem. Causa doloris oculorum in inflammatione sunt aut ex acrim humorum influxu, aut à distentione tunicarum repletarum, aut à crassu humoribus & à flatuosis spiritibus, &c.

Loci consentientes de causis ophthalmiæ.

Galen. in lib. de ocu. cap. 8, Ophthalmia quæ uisum turbat triplex est, cuius causa vel est exterior, ut sol, fumus, puluis: uel interior, sicut humores ad coniunctiuam fluêres. Paul. lib. 3. cap. 22, Perturbatio oculi fit à foris adueniêre causa, ut à sole, fumo, puluere, oleo, &c. Auic. tertia terti, tra. 1, itidem ait, ibi, Fit à causis extrinsecis facientibus in ipso botor, & rubificantibus oculum, sicut à soda adustiuâ, à sole, puluere & fumo & frigore, & propter constrictionem ipsius, &c. De causis antecedentibus loquitur etiam Auic. loc. cit. ibi, Quum ophthalmia sit apostema, & omne apostema fiat à sanguine, uel à phlegmate, uel à melancholia, aut à cholera, aut à uetositate, tunc similiter ophthalmia

mia causa non euacuatur ab una istarum
 causarum, &c. Alex. lib. 1. cap. 23. idem
 ait, ibi, Considerandum cuiuscemodi sit
 πείρωμα, id est superfluum, utrum ex hu-
 more atrabiliari, sanguineo, bilioso, pituitoso-
 ue ortū sit, &c. Lege etiā omnes ferē practi-
 cātes, de hac re loquētes. Quod autē humores
 ophthalmiam ad actum producētes sint cau-
 sa coniuncta, patet ex Auicē. dum dicat,
 Sed aduentus eius plurimū est propter cur-
 sum materierū, & multitudinē uaporū, &c.
 De causis generationis ophthalmiae lege etiā
 Auicē. ibi, Et quandoque humor apostemās
 generatur in ipso, & quandoque est adue-
 niens ei à cerebro, secundum semitam ca-
 tarrhi, per uiam uelaminis intrinseci, &c.
 lege hunc locum uberius, & plura ad rem
 facientia inuenies. Lege etiam Alexan. lib. 1.
 cap. 23 ibi, Diligenter prospiciendū est, unde
 nam quod redūdat in oculos, ex solōne capi-
 te, an ex uniuerso corpore manet: mox per
 arteriāsne an per uenas, siue per utrasque
 in eū sese locū recipiat, &c. De causis dolo-
 ris ophthalmiae loquitur Auic. ibi, Violentia
 Cc. iiij.

doloris ophthalmiæ aut est propter humorē mordicātem & corrodentē tunicas, aut propter humorem plurimum extensiuū, aut propter uaporem grossum, &c. Gal. 12. meth. doloris causas in genere longo sermone inuestigat, quæ breuiter ita se habent: Omnis dolor aut ob uehementem & aceruatim irruentem alterationem fit, aut ob cōtinuitatis solutionem. Continuitas soluitur ruptione, contusione ac corrosione. Hæc uerò uel ob distentionem, aut grauitatem, aut mordacem qualitatem producuntur. Si igitur nil extrinsecus sit, quod distendat, grauet & corrodat, tunc distētio ab interno humore multo, aut à flatu concluso, aut à plurima siccitate oritur: grauitas à dura aliqua magna aut graui mole corpori extra illapsa contingit, aut ab interno aliquo magno ac graui tumore, mordax qualitas ex humoribus acerbis ac mordacibus prouenit: alteratio autem per uehementem fit caliditatem aut frigiditatem, siue spirituum siue humorum siue partium solidarum: quæ omnia in omni dolore consideranda sunt, uide illum in uberius.

De signis ophthalmiae.

Signa communia ophthalmiae sunt, tumor, grauitas, dolor & rubor. Signa uerae ophthalmiae sunt, quam album oculorum in ruborem mutatur cum fluxu lachrymarum, & lippitudine in angulis oculorum lachrymalibus collecta. Signa temporum ophthalmiae sunt, si materia ab humore oculi proueniens, aquea & tenuis fuerit, tunc est morbi principium: si uerò crassescat, & ad album tendat, erit morbi incrementum: si palpebras, quas Graeci βλεφαράς dicunt, adglutinat, erit morbi consistētia, praesertim si lachrymarum copia praecesserit: si uerò haec omnia minuuntur, erit morbi finis. Signa humorum sunt, & primò sanguinis, oculi rubor & tumor, & uenarum plenitudo, temporum pulsatio, dolor potius extendens quàm pungens, grama & glutinationes apud somnum fiunt. In biliosa adest punctura uehemens dolorque adurens & uehemens, rubor oculi paucus, lachrymae tennes & acutae, quandoque exulcerantes & per somnum non agglutinantur, tumorque paruus uisitur. In pituitosa adsunt tumor,

Cc.iiij.

parua caliditas, rubor ad albedinem decli-
 nis, cum paucio dolore & multa grauitate,
 glutinationes iuxta somnum fiunt, & color
 faciei est albus. In melancholica, dolor debi-
 lis, grauitas cum offuscatione, exiccatio cum
 perseuerantia, paucitas glutinationis, & mi-
 nutæ sunt gramæ & pauca lachryma. Signa
 flatuosa ophthalmiæ sunt, extensio sine gra-
 uitate, ruboris paucitas sine lachrymarum
 fluxu. Signa perturbationis sunt, leuitas cura,
 & causæ præcedentes, & quantitas aposte-
 matis primitiui. Signa, quando fit non per cō-
 sensum, sed per essentiam, in capite sunt, do-
 lor capitis præcedens & grauitas, &c. Si à
 consensu uentriculi præcessit uomitus, nau-
 sea, &c. Signa fluxus humoris per partes ex-
 teriores sunt, frons extenta, uenæ exteriores
 plenæ, &c. Si per intrinsecas, tunc præcedit
 frequens sternutatio, dolorq; ab intima parte
 oculi, antequam ophthalmia appareat, &c.

Loci consentientes de si-
 gnis ophthalmiæ.

Signa communia terigit Gal. 2. de loc. aff.

cap. 7. ibi, Inflammatis partibus accidit ut
 rubescant, tendantur, renitentur, intumescant,
 & doleant. uide de his Arcul. in 9. alm. De
 signis uerae ophthalmiae meminit Razes 9.
 alm. ibi, Cum ea, quae in oculis alba sunt, &
 in rubedinem mutata fuerint, fluxerintque
 lachrymae, & in angulis oculorum lachrymalibus
 lippitudo collecta fuerit, dicimus tunc
 agrum pati ophthalmiam: & quanto plus
 symptomatum uehementia aut ipsorum ad-
 fuerit minoratio, tanto magis erit ophthalmiae
 fortitudo uel debilitas. Signa temporum
 ophthalmiae habentur ex Auic. tertia tertij,
 cap. de sig. ophr. ibi, Cumque palpebrae con-
 glucinari incipiunt, tunc iam maturationis
 adest propinquitas: dum uero perseuerat flu-
 xus aquosus, est initium adhuc, &c. Vide in
 hoc latius Arcul. & Sano. De signis humorum
 loquitur Alex. lib. 1. cap. 23. ibi, Sanguis co-
 grescit, quum sanguineo colore omnia tin-
 cta sint, uultusque cum rubore suffunditur,
 receptacula sanguinis plena uisuntur, graui-
 tas sentitur, functiones solitae segnius perfi-
 ciuntur, lachrymae nec mordaces nec acres

erunt, &c. Nota bilis sunt biliosa complexio, lachrymæ mordaces, non solum hirquos qui à Græcis καυτοὶ dicuntur, exurentes sedant genas, & quasunque partes attingunt, &c. Auic. loc. cit. Sanguineam ophthalmiam significant color oculi, exuberatio uenarum, & pulsatio temporum, &c. Vide fusius etiam de alijs humoribus: & nota quòd Arabes per lippitudines superfluitatem quartæ concoctionis in oculo intelligunt, & quandoque accipitur pro illa humoris parte, quæ oculum infestat ut Razes, & quas uocat Aet. glutinationes & granas. Arabes dicunt lippam, &c. De signis perturbationis meminit Auic. ibi, Pòst dicamus, quòd conturbatio cognoscitur leuitate sui, & causa sui, & quãtitate apostematis, &c. Similiter de signis per consensum & per essentiam, ibi, Ophthalmiam in capite significat sola grauitas capitis, & si est cum communitate stomachi, associatur ei nausea & conturbatio, &c. Signa fluxionum per partes exteriores habet Paul. ibi, Fluxiones extra caluariam notant uasa in fronte & temporibus distenta, & caput ue-

luti reuinctū, tum quòd ex agglutinentis
 sicca prasidio sunt. Si hæc desint, & floris
 impetus prorogetur, & sternutamenta non-
 nunquam molestè elidantur, humorem sub
 calua contineri censendum est. Itidem ait
 Auic. Si uia fluxus à cerebro ad oculum non
 est nisi per uelamen extrinsecū, tunc frōs est
 extensa, & uenæ exteriores sunt plenæ, &c.

De cura perturbationis.

Perturbatio per eius causæ ablationem cu-
 ratur, & si quid doloris remanet, per altera-
 tionem in cōtrarium reuocatur. Nam impres-
 sio calidi per frigida, frigida per calida fa-
 cilè remouetur, &c.

De cura veræ ophthalmiæ.

Quinque in cura occurrunt scopi, uideli-
 cet uictus ratio, reuulsio & deriuatio, humo-
 rum preparatio, euacuatio, & symptomatū
 ablatio. Victus sit in principio parcus, boni
 succi, facile cōcoctilis, uitentur acetosa, salsa,
 coit⁹, mor⁹, per⁹ uini, præsertim in principio:
 laudatur somnus, aer obscurus, alui excretio

assidua. Reuulsio & deriuatio fient per sectionem uenae saphenae communis & cephalicae ab eodem latere, praesertim si plethorica fuerit dispositio. Fiet etiam per frictiones à supernis partibus ad infimas descendentes, uel per cucurbitulas uel per clysteria & pilulas soluentes, ut Razes. Preparatio humorum fiet in calido humore cum frigidis tenuem humorē incrassantibus, ut cum syrup. de papauere rosaceo, iuiubino, de granatis, &c. In frigido, cum calidis ut rhodomelle, oxymelle simplici, &c. Euacuatio perficitur rursus uel per sectionem cephalicae eiusdem lateris, uel per soluentia pharmaca: solunt humorem calidum pilula aurea aggregatiua, electuariū de succo ros. Decoctum myrobalanorum, citrinorum casia, mana, rheub. Soluunt frigidū pilula chochia, diaturbis, diaphinicon, electuarium indum, confectio hamech, &c. Ablatio symptomatum completur doloris causam auferendo, & cum anodinis mitigando, & ad leuia stupefacientia usque perueniendo, &c.

De cura locali ophthalmiæ.

Cura localis triplex est: prima repellit materias ad oculum fluentes cum frigidis stypticis, ut oculus non recipiat in principio morbi. Secunda est repulsio admixta resolutioni conueniens augmento & status. Tertia est pura resolutio conueniens postrema status parti & declinationi. Exempli gratia, primò ophthalmia calida apponatur albumen oui cum aqua rosacea: in secunda parte principij sies, album sine sarcacolla: in augmento sies, album cum sarcacolla: & tandè addatur aliquid aque fœniculi uel decoctionis fœnugraci, melliloti ꝯ citoniorum, &c. Commendantur etiam in resolutione balneum & merum, &c.

Loci consentientes de perturbatione & vera ophthalmia.

Aet. ser. 7. cap. 3, Perturbationes oculorū facillimè curantur, si ager à causa lædente discedat, ut à sole, fumo, & alio simili, &c.
Anic. in cura conturbationis & ophthalmiæ

leuis quæ cursu eius procedit. Sufficit quandoque causæ abscissio, ut si fuerit à repletionē sanguinis, aut alterius humoris cū euacuatione, &c. Lege hūc locū fusiū. Paul. loc. cit. Facilmè discutitur, si obseruentur omnia quæ foris accidētia lumē perturbare possunt, item parciorē cibo & aluo de facili respondere, &c. De uictus ratione in uera ophthalmia loquitur Aet. ser. 7. cap. 8. ibi, Alimenta danda sunt leuia, concoctu facilia, & ad digerendum uentri cōmoda, urinā cientia, nihil acre & salsum habentia, aut crassi humoris, &c. Itidem ait Auic. tertia tertij, Causa est communis in regimine ophthalmiæ, materialis est minoratio cibi, & ipsius exiccatio, & electio eius quod generat humorem laudabilem, & alienatio rei quæ est malæ digestionis, & alienatio coitus, & motus, & potus uini, & cōmestionis acetosi & salsi. &c. Similiter & Paul. lib. 3. cap. 22. adserit. ibi, Per initia cōuenit nihil assumere, &c. De reuulsione & deriuatione locū habes in Auic. ibi, tertia tertij, cap. 10, Quod si materia fuerit sanguinea, adhibebis uentosas post phleboro-

miā, & assiduabis frictionē extremitatum,
 &c. Et cap. 9, Interdum administrentur ca-
 putpurgia, & quæ per nares materiei partē
 extrahunt, &c. Paul. lib. 3. ubi πρὸς ὁπιθο-
 ρὴν ράματα agit, Post generales, inquit,
 corporis euacuationes, medicamentorū us⁹ est,
 quæ per nares atque os pituitā eliciūt: caput
 etiā anōderur, & incisa cute exasperabitur.
 huc etiam spectāt quas in capite χροῦρας
 administramus ἀφαιολογίαν φημί καὶ ἀρτη-
 ριοποισίαν ὑπερπατισμόν τ' καὶ ἀεροκυφι-
 σμόν, καὶ καὶ σιν κατὰ τῆς κορυφῆς ἕως ὀστέων,
 καὶ σιν κατὰ τῆς τῶ ἐνὶ τῷ μῦ ἐκχαρᾶξέως.
 reuellere scilicet possunt impetū fluoris, &c.
 De humorū preparatione loquitur Mes. ca.
 de ophth. ibi, Quinta res est alteratio & di-
 gestio eius quod est trāsmissum, & intelligen-
 tur tā de extrinseca, q̄ de intrinseca altera-
 tione. uide in hoc casu Arcul. Catin. Gord.
 &c. De euacuatione, quā eradicatiuā uocāt,
 meminit Aet. ser. 7. ca. 8. ibi, Vbi oculorū di-
 stērio fuerit, & multus rubor, & ad cōtactū
 resilius, & ardor, & lachryma multa & ca-
 lida, tūc sectio uenæ adhibēda erit, humera-

lis appellata, ita ut animi deliquiū succedat, quo dolor eximatur, & feruor inflammationis extinguatur, &c. Aet. cap. 9, Si uerò uniuersum corpus humoribus uitiatus fuerit resectum, tunc iuxta redundantem & affligentem humorem euacuandum. Nam si pituita magis aquosa redundauerit, exhibe pharmacum ex euphorbio, & sic de reliquis. Auic. tertia terij, cap. 9, Et oportet, si fuerit ophthalmia uehemens, ut fiat phlebotomia, usquequò timeatur lipothymia. Et paulò post, Si agritudo sit chronica, tunc facienda est phlebotomia ex lachrymalibus, & phlebotomandæ sunt ambæ arteriæ quæ sunt post aures, &c. Et si materia fuerit cholericæ, euacuabis post phlebotomiam cum eo quod educit cholera, &c. Et cap. 2, In ophthalmia frigida oportet ut euacuetur humor frigidus, & quandoque necessarium est reiterare, &c. De ablatione symptomatum habes Paul. cap. 22, Interdum semen papaueris ad leniendum dolorem miscetur, si magna necessitas doloris est, etiam opij pauxillum adhibetur. Auic. loc. cit. Et quandoque doloris uehementia facit neces-

sariam stupefacientium adhibitionem, sicuti succi pomorū, mandragoræ, lactuæ, papaue-
ri, & aquæ sumach, &c. Similiter & Mes-
cap. de ophthalmia inquit, ibi, Sextam rē cō-
plent administrationes medicinarū dolores
sedariuarū, &c. Hip. aphor. 6. aphor. 31, Do-
lores oculorum meri potio aut balneū, aut ue-
næ sectio, aut medicamētum epotū soluit. B.
Intellige quòd ad remouendū dolorē oculo-
rū alij pharmaco soluēte indigent, alij sectio-
ne uenæ, alij fomēto, alij potu uini, prout co-
rum exigit dispositio: nō enim omnia hæc au-
xilia eidē homini adhiberi iubet. Cōpetit ui-
ni potus, quū ut crassos humores attenuet, &
interdū transmutet & euacuet, tū quia facit
ut somnus cōcilietur, & sic per accidens do-
lores sedat. Balneū competit, etiā si dolor tu-
more molli & laxo, uel à fluxu calido minus
fieret: balneū enim partim dolorē remouet,
partim signū est rei demonstratiuum. Quòd
uerò sectio uenæ dolorē sedet & purgatoriū
pharmacum, iā manifestum: nam remouendo
causam, dolor ipse etiā remouetur, idcirco in
ophthalmia unicus tātū erit medēdi scopus,

Dd. i.

ut scilicet inflammatio remoueat, quæ nec
 amoueri poterit, nisi causa à qua dependet,
 & ipsa auferatur: hoc autem fiet per uentris
 solutionem ac uenæ sectionem, &c. De cura
 locali loquitur nō solū Mesu. sed & Gal. &
 Paul. Mes. cap. de ophth. In principio morbi
 percussius utendū, in quibus sit facilitas:
 deinde resolutius, ita ut perueniatur grada-
 tim, & cum successione paulatim ab eo quod
 est percussiuum usque ad resolutiuum. Gal.
 4. de compos. med. per loc. cap. 2, Adhibenda
 sunt pharmaca repulsoria non exasperantia,
 id est, non uehementem sortita adstrictionē,
 sed quæ cū propria sua substantia sunt mode-
 ratiora, tū lenitiui liquoris, &c. Auic. tertia
 tertij, ca. 10, Quūque repuleris materiā per
 euacuationem & attractionem & apocru-
 stica, tunc gradatim tendas ad maturatiua,
 & sint in primis mixta apocrusticis. Est er-
 go conueniens in primis eorum commistio cū
 aqua rosacea, & aqua fornigraci est bona
 maturationi, sedatiua doloris, & est matu-
 ratiuo dignior, & non est in ipsa attractio.
 Postea transi ab his ad decoctionem melli-

loti, in qua sit dissoluta sarcacolla alba, nutrita in lacte mulieris & asinae: quumque descendere incæperis, adde in administratione resoluētium, quod sit fortius, sicuti sarcacolla in aqua fœniculi uel fœnigræci, & administra balneum, si sciueris cerebrum esse mundum, & da in potu post cibum per aliquas horas aliquid uini antiqui puri in parua quantitate &c.

Obseruationes in ophthalmia.

Gal. 4. de compos. med. per loc. cap. 2, Manifestum est omnia pharmaca huiuscemodi affectionem curantia sub communem omnium inflammatorum curationem cadere, assumereque necessariò quidpiam pro partis ipsius natura, quæ excellētem mollitiem, & ad hoc ut lædatur aptitudinem, super omnem totius corporis cutem nacta est, propter sensus subtilitatem & substantiæ raritatem, &c. Aui-cen. loc. cit. cap. 9, Et penitus oportet, ut nō sit in medicina administrata in oculo & propriè in ophthalmia asperitas, nec qualitas saporis acetosi aut acuti. Et paul. infra,

Dd. ij.

410 DE CONSEN. MEDIC.

Et oportet ut patiens ophthalmiā uel rheu-
matismos ad oculos, deuiter inūctionē capi-
sis & destillationē alicuius olei in aurē, &c.

Observationes de percussio- ne in ophthalmia.

Aet. ser. 7. cap. 4, Quicumque oculi secun-
dum naturam uenas amplas habent & san-
guine plenas, itē qui glauci sunt, omnino non
ferunt collyriorum adstrictionem, quoniam re-
pellentia oportet ut sint frigida & styptica.
Vnde fac percussiva, ne nimia infrigida-
tione infrigidet, quia oculū congelascunt, &
uisum auferunt. Secundò fac ut oculum robo-
rent. Auic. loc. cit. Et oportet in quantum pos-
sibile est, ut retardetur collyriorum admini-
stratio usque ad tres dies, & sufficiat regimē
prædictum ex euacuationibus & attractio-
nibus materierum ad extrema, &c. Et paulò
infra, Oportet ut in principio non admini-
strentur inspissatiua fortia, & quæ sunt uehe-
menter styptica, quoniam inspissant tunicas,
& prohibent resolutionem, & magnificant
dolorem, & propriè cū dolor fuerit fortis,

Et c. Hoc idem confirmat Aet. ser. 7. cap. 9.
 ibi, Repulsoria collyria quā sint ferè viribus
 frigidiora, obstructionem & corporum con-
 densationem faciunt: & dum humorum ma-
 terias concludunt, maximas inflammationes
 & graues dolores inducunt, Et c. B. Intellige
 obstructionem fieri, si materia in oculo con-
 tenta fuerit frigida: nam in calida & tenui
 corrodente maior audacia erit in admini-
 stratione stypticorum, inquit Auic. Imò non
 est malum apud me, inquit, uti opio: ipsum
 enim sanat celeriter. uel intellige repulsoria
 esse mala, quotienscunque materia ex uela-
 minibus intrinsecis ad oculum fluxerit, unde
 Auic. Quum initium est ex uelaminibus in-
 trinsecis, cura est difficilis. lege Paul. & Mes.
 de hac re plura loquentes, Et c.

Obseruationes de lacte adhi-
 bendo in dolore
 ophthalmico.

Aet. ser. 7. cap. 10, Qui lac pro ouo infun-
 dunt uolentes dolorem obtundere, decipiun-
 tur. Nam lac à caliditate in oculo præter
 Dd. ij.

naturam facile alteratur, & acrius euadit,
unde per paruo solatio diurnam affectio-
nem propinant, &c. Auic. loc. cit. Non est cō-
ueniens, ut dimittatur destillatio lactis in o-
culo tempore lōgo, imò oportet ut remouea-
tur & renouetur omni hora, &c.

Observatio de resolutiuis.

Auic. Resolutiua in principio ophthal-
miæ uehementer deuicta, & oportet ut inten-
dus ante omnia ad mundificationem lippi-
tudinis cum facilitate, & non noceas oculo,
&c.

Ophthalmiæ nocentia & vifum debilitantia.

Nocent oculis acetum, amyllum, fumus ar-
genti uiui, semen canabis, folia castanearum,
caules, coriandrum, crocus, lac, lactuca, oli-
uæ, opium, ozimum, pisces, portulaca, &
quæcunque his uersibus ioci gratia anno-
tauimus:

Hæc oculis multū, sol, puluis, fumus & æstus,
Ventus cum fletu, uina, uenūque nocent.
Acrida ne mades, nec quæ sint plena uaporū,

Nec cepas, lentes, allia, porra, fabas.

Roar primo, thesir tra. 8. cap. 21. inquit capita gallinarum à proprietate causare cæcitatē. Item damnat carnes siccas, salsas, pinguedinē crassam & uiscosam, & propriē porcina, superfluūque animi & corporis laborem, &c.

Ophthalmiæ curantia &
visum roborantia.

Valent ad ophthalmiam, absinthium, aloes, flomos, uerbena, camphora, album oui, psyllium, opium, rosa, sarcacolla, mellilotum, fœnugræcum, semperuina sumach, portulaca, sief album Mes. puluis albus Haly. 21. anti. emplastrum ex pomis coctis, zucharo, & aqua rosacea, addendo aliquid camphoræ. uide Montagn. cōf. 63. Vide etiam Varig. tra. 3. cap. 8. Item Gord. Sauon. & Arcul. &c.

De prognosticis ophthalmiæ.

Hip. aphor. 6. aphor. 17, Lippientem alui profluuiο corripī bonum. B. Quia humorum abundātia euacuatur simul, & ad inferiora
Dd. iij.

retrahitur, dans nobis exemplum, ut in lippitudinibus alium nos quoque subducamus. Auic. Et ophthalmia est uelocioris status, in qua lachrymae magis currunt, & quae acutiorrem habet mordicationem, & tardioris, quae est magis sicca. B. Cognoscitur an longo uel breui tempore sit lippitudo duratura, aut à multitudine materiae ad oculum fluente, aut ab oculi imbecillitate, aut à uiarum latitudine, quasi longo durauerit tempore, ulcerationem uel oculi interitum pronunciat. Hip. aphor. 3. aphor. 12, Si hyems australis & pluuiosa fuerit, &c. Et in fine, Lippitudines siccae fiunt, &c. Lege insuper aphor. 13. & 16. & 21. eiusdem lib. 3. Auic. loc. cit. Si initium ophthalmiae erit ex uelaminibus intrinsecis, cura est difficilis, & omnis aegritudo, quae fit per communitatem uelaminum exteriorum est magis salua, &c.

Authores dissentientes circa morbos oculorum.

I Adserere, uisionem fieri extra mittendo, & non intus suspiciendo cum Platone.

2 Adserere, sectionem uenæ non conuenire
in omnibus ophthalmiæ speciebus.

3 Adserere, in doloribus oculorum stupefa-
cientia esse ualde utilia.

4 Adserere, balneum in ophthalmia mini-
mè prodesse.

5 Adserere, oculos esse complexionis igneæ,
quum maximè luceant.

Confutatio dissentientium circa
morbos oculorum.

Ad primum respōdet Arist. in lib de sens.
& sensa. quòd impossibile sit, fieri extra mie-
tendo probat. Præterea Auer. 3. collig. Si ui-
sio, inquit, fieret extra mittendo, sequeretur
quòd in obscuro uideretur, sicut in luce, neq;
lux ut medium, neque retine, nec tunica opus
essent in uidendo, neque destructo aliquo isto-
rum uisus destrueretur. De his uide Arist. loc.
cit. interrogantem Empedoclem, quomodo
uisus exirederetur usque ad astra, si quid cor-
poreum foret, quod ab oculis emittitur. lege de
his fusius Conciliatorem different. 64. &c.

Ad secundum: Auic. tertia terti, cap. 9, Et

phlebotomia ex cephalica est conueniens omnibus speciebus eius. Item Razes 9. alman. cap. de oph. In principio curationis minuenda est semper cephalica: & quanto fortior fuerit ophthalmia, tanto plus est minuendum de sanguine. Itidem ait Mes. Et sic in omni specie conueniet, si non ratione euacuationis, saltem ratione diuersionis, &c.

Ad tertium: Gal. aphor. 6. commen. 31, Si talia sint debilia, tunc fluxiones non reprimunt uehementes: si uerò sint ualde stupefacientia, ut ex eis maximam oculi inflammationem non sentiant, tunc necessarium est, simul uim uisoriae offendi, adeò quòd cessante inflammatione uel debiliter uel nihil omnino uideant: simul autem & quandam præduram dispositionem, quæ difficulter sanari possit, in oculorum tunicis derelinqui, & sic per Galenum nullo modo sunt utilia.

Ad quartum: Gale. eodem commen. Securiusimum est fomentum, & omnino aliquam afferens utilitatem, uel tanquam signum ad cognitionem, uel tanquam causa sanitatis. Nam si nihil influit omnino in oculos fomen

tum, contentam in ipsis superfluitatem dissolvens, sanitatem restituit: si uerò adhuc influit, suo calore affert aliquod leuamen, & paulò post dolorem auget, & tunc fit signum dignoscituum, & sic utroque modo summo-
pere confert, ut Gal.

Ad quintum respondet Arist. de sen. & senſa. & quinto de generatione animalium, dicens, Quòd oculus est complexionis aqueæ, quia aqua est impressionum susceptibilis, nec potest esse ignea, quum ignis nimium agitur, & de facili resoluatur, nihil penè retinens. Igitur non complexionis igneæ: uerum oculus, quoad eius spiritus naturam ignis obtinet, sed in ipso simpliciter dominatur aqua. Nam constat, quòd tactus & gustus terræ attribuitur, oculus aquæ, auditus aeri, olfactus igni: ex fumali enim uaporatione perficitur, quæ ignea esse perhibetur, &c. Lege tamen de hac re Concil.

De oculorum suffusione.

Affectus, qui à Latinis Suffusio, à Græcis ὑπόχρωμα, ab Auic. aqua, à uulgo cataracta dicitur, est inter crystalloidem & corneam

428 DE CONSEN. MEDIC.

circa pupillam humoris aquei concretio, quæ
ubi perfecta fuerit, uisum impedit. Hanc ali-
qui cum glaucomate idem putarunt sese de-
cipiētes: nam hypochyma sicuti est aquosi hu-
moris cōcretio, ita glaucoma est naturalium
humorum in casium colorem mutatio. Præ-
terea in glaucomate nil prorsus, in suffusio-
ne aliquantulum cernitur.

Loci de suffusionis descriptione.

Gal. lib. finit. med. Suffusio est humoris a-
quosi inter crystalloiden & corneam concre-
tio. Aet. ser. 7. cap. 51, Suffusio est præterfusio
humorum circa pupillam congelatorum, ut
ubi perfecta fuerit, uisum impediat, &c. Paul.
lib. 3, Hypochymata humorum dicimus effu-
sionem, qui inter tunicam ceratoidem & cry-
stalloidem concrementes impediunt. Auicē.
tertia tertia, ca. 18, Descensus aquæ est agritudo
oppilatiua, & est humiditas extranea,
stans in foramine uuæ inter humorem albu-
gineum, & syphac, & corneam. Quare prohi-
bet penetrare formas ad uisum. B. Aduerte
quod una & eadem infirmitas est catara-

Etia, suffusio, aqua, gutta, & imaginatio apud Arabes. In hoc tamen differunt, quia imaginatio est tanquam suffusionis principium, in quo id uideri imaginamur, quod uerè nō est: Aqua uerò & gutta est, quum in modum aquæ uel guttæ suffusio uideatur. Nam dum curris, & in compressione digiti dispergitur, aqua dicitur: dum uerò firmari incipit, gutta: at quum iam dudum firmata est, uocatur cataraëta. Aet. loc. cit. Glaucedo est crystallini humoris in casium colorem mutatio. Itidem ait Paul. loco nuper cit.

De causis suffusionis & eius speciebus.

Causæ uel sūt primario affectu in oculo, ex nutrimento huius partis non bene conuerso, aut superfluitate nutrimenti non resoluta: uel fiunt per consensum capitis humiditatem hanc ad oculum transmittentis, uel ex uaporibus oris uentriculi ad oculos eleuatis: deinde à frigidityte oculorum in humiditatem conuersis. Species suffusionū variantur in quantitate & qualitate & loco. In quantitate, quia interdum tantæ molis est, ut integram in

oculo obstructionē pariat: interdum tam parua, ut non totum lumen occupet, sed per partem res uideantur: interdum etiam ita crassa est, ut nihil in lumine cōprehendatur, interdum adeo subtilis ac tenuis, ut res quidē, sed ueluti sub nube cernantur. Ambae hae curam non admittunt cum acu, sed tantūm quae inter has species media quodāmodo fuerit. Species in qualitate sunt multiformes ratione coloris. Nam quaedam aëri, quaedam uitro sunt similes: aliae sunt albae, aliae uirides, aliae flauae siue citrinae, &c. Differunt loco, quia aliae fiūt in tunicis, aliae in humoribus. In tunicis, quū aliquod uestigium siue occultum siue manifestū ab ophthalmia uel ab alio morbo relinquitur, uel quum adeo crassescunt, ut uisio impediatur. In humoribus, quum uel eorum substantia fiat humiditas aquosa, uel eorum complexio colorem inalteret, & nutrimentum transmutet, &c.

Loci consentientes de causis &
speciebus suffusionis.

Gal. 4 de loc. aff. ca. 2, sunt & alij oculo-

rum affectus, quibus ei per consensum adueniunt, unde subdit: Igitur accidētia suffusorū uisis similia uidentur, oculis nulla propria affectione molestatis, sed aut oris uētriculi, aut cerebri cognatione id accidere solet, &c. Et 1. de loc. affe. ca. 2, Accidit nonnunquam, ut efficiens causa pertransiens non firmum in particulā faciat effectum, ueluti quum suffusioni similia quādā oculi imaginantur, collecto in ore uentriculi tenui excremento, unde uapores quidam subleuati, deinde circunuenti à uisifica facultate similes imagines mouent, quales per suffusiones apparere consueuerunt: idq; maximè solet euenire ijs, quibus oculorum humor exquisitè purus est, aut uisifica facultas quam facillimè sentit. Et 3. de loc. aff. ca. 1, Itaque affecto stomacho oculi similibus infestantur casibus, quales in suffusionibus apparere solēt: dicendum est, illos pati, elato ad cerebrū ab humoribus in uētriculo contentis, fumoso quoque uapore, &c. De his lege etiam in fine cap. 7. eiusdem lib. & quomodo consensus fiat, intelliges. Gal. 4. de sympt. cau. cap. 2, Facultas uisifica offen-

43: DE CONSEN. MEDIC.

dicur uel neruo ad oculum descendente affe-
cto uel cerebro, &c. lege fusius totum hoc ca-
put. De speciebus suffusionum loquitur Gal.
4. de sympt. cau. cap. 2. ibi, Haud aliter acci-
pienda sunt ea, quæ de aquosi humoris quan-
titate, substantia & colore diximus, &c. A-
uicenn. tertia tertiū, cap. 18, Et ipsa quidem di-
uersificatur in quantitate & in qualitate. In
quantitate quandoque est plurima, & oppi-
lat totū foramen, & nō uidet oculus aliquid:
& quandoque est pauca, quia oppilat partem
eius, & dimittit partem detectam, &c. Gal.
in lib. de ocul. cap. 12, Huius color aquæ est
diuersus: quadam enim acri aëri, quæ uitro
assimilatur, alia est quasi alba, &c. Itidem
ait Aet. ser. 7. cap. 51. Auicenn. loc. cit. Diuer-
sitas in qualitate quandoque est in essentia,
quoniam alia est subtilis & clara, & alia est
crassa ualde: & quandoq; est in colore, quo-
niam alia est aërei coloris: alia alba, & est
margaritalis, &c. Gal. 4. de sympt. cau. ca. 2.
quid alia per locum affectū fiat diuisio, de-
monstrat, dicēs: Vnus affectus ad tunicā ipsam
trigoiden spectat, alter ad humorem tenuem

effusum, qui inter crystalloiden & rhagoiden medius existit. Quod etiā intelligendum est de ceratoide: unde paulò infrā adserit, quòd si ceratoidis tunica crassior densiorque fuerit, hebetem efficit aciem: si uerò humidior ac densior, non hebetem solum obtusumque reddit uisum, uerum etiam efficit, ut qui sic affectus est, putet se per tenebras, aut nebulā, aut per fumum res ipsas intueri, &c. Itidem ait Auic. ibi, cap. 9, Nam aut existit in tunicis, aut in humoribus. Quæ existit in tunicis, est, ut sit super tunicam corneam uestigium occultum ualde, quod remāsit à uariolis aut ophthalmia, &c.

De signis suffusionis.

Signa præcedentia sunt, ut qui sic affectus est, ueluti quadam caliginosa, uel paruos culices, uel fumosa, & nebulosa uidere uideatur, aut circa lucernas circulos uel duplex lumen se intueri arbitretur: quæ imaginationes uariantur in quantitate, quia parua uel magna: in essentia, ut crassæ, tenues, occultæ: in situ, ut raræ, densæ, nebulosæ: in figuris, ut

Ee. i.

sunt granosa, muscosa & capillares, &c. Signa absoluta suffusionis cognoscuntur ab ar-
 ris perito, & per longitudinem tēporis: rarò
 enim pertransit sex menses, similiter signa co-
 lorum per se manifesta inspicienti apparent.
 Signa ipsius obstructionis cognoscuntur in
 compressione oculi: nam si statim aperto ocu-
 lo uideatur diuidi, ac in partes separari,
 tunc est suffusio subtilis ualde: si uerò nullo
 modo moueatur, sed in se remaneat, erit cras-
 sa ac densa, nec per acum ambæ admitti po-
 terunt: si uerò dilatari, sed non in partes di-
 uidi uideatur, ea est quæ per acum curam re-
 cipit. Signa loci obstructionis cognoscuntur,
 si clauso altero oculo pupilla alterius aperti
 dilatetur uel constringatur, indicat non esse
 obstructionem in uis spiritualibus, per quas
 ab uno in alterum fit transitus, & hoc præ-
 fertim, quum maxima ac crassissima non fue-
 rit suffusio. Cognoscitur etiam esse inter pu-
 pillam & ceratoiden, si pupillæ uisio impe-
 diatur. Signa quando fit per consensum sunt,
 quia si à toto, adsunt febres, ad quarum aug-
 mentum suffusiones augētur, & ad earū re-

cessum declinant: si à stomacho, aucta stomachi mala dispositione crescunt, & remota remouentur: uel si in utroque equaliter oculo apparitio fuerit, tunc cataracta erit ex consensu stomachi: si uerò fuerit in uno tantum oculo, uel in utroque, sed diuersimodè, erit ex cerebro, &c.

Loci consentientes de signis suffusionis.

Aet. ser. 7. cap. 51, Præcedentia signa sunt ueluti culices parui, caliginosa quædam oculis sæpe obuersari uidentur, quidam piliformia uident, alij ut lanarum flamenta, aut aranearum texturas, aut circa lucernas circulos: dum uerò augetur affectio, augentur & ipsa accidētia, &c. Auicē. tertia tertij, cap. 19, Signa portendentia aquam sunt imaginationes prædictæ, & quòd accidit cum eis conturbatio sensibilis, & quòd imaginantur res luminosæ, sicut cādela duplices. Et capite 9, Imaginationes diuersificantur in quæritate, & sunt parua uel magna: uel in sua essentia, & sunt grossæ, subtiles, &c. De signis ob-
Ee. ij.

structionis an sit curabilis, loquitur Alex. ca. de aqua, ibi, Quando passio fuerit confirmata, & fuerit curabilis. signū erit, quod dum aspiciuntur oculus, uel pupilla uidetur clara, & cedit dilatationi, cū premitur digito aut instrumento, deinde redit ad ipsum & non frangitur, &c. Auic. tertia terti, cap. 18, Et illa quæ magis susceptibilis curæ ex parte est etia est, subtilis: quæ cū eam conspexeris, & super ipsam digitis tuis compressionem feceris, separabitur uelociter, deinde redibit & aggregabitur. Paul. lib. de ocu. ca. 12, Quando cataracta sit curabilis, sic dignoscitur: Si uno oculo clauso pupilla alteri⁹ dilatetur, possibile est sanari: sin autem, minimè. Causa, quia neruus concauus, quo uisibilis spiritus ad pupillā ducitur, oppilatus est: & sic signa habes loci obstructionis. Hoc idē habes ex Auic. loc. cit. ibi, Inter aquā & oppilationē intrinsecam distat, &c. De signis per consensum loquitur Gal. 4. de loc. aff. cap. 2. ibi, Distinguendum utrū à cerebro, an à uentriculo hæc affectio proueniat: primū ex eo, quod alter oculus, uel uterque similiter uisis occupetur:

nam si utrique oculo hoc accidat, affectus erit ex uentriculo. Distinguendum etiam est ex tempore: nam si per plures dies uel menses suffusionis accidentia apparuerint, & nihil tenebrosum in pupilla uideatur, tunc ab ore uentriculi affectus procedit: sed si perpetuò hæc apparitio perseuerauerit, nec aliqua suspicio sit ex uentriculo, tunc per essentiã morbum intelliges, maximè si una pupilla altera sit turbidior, idq; magis, ubi sumpto ex aloë medicamento nihil uariauerint, &c.

De cura suffusionum.

In cura suffusionis diuersæ sunt intentiones, quarum prima est, quòd si à uentriculi imbecillitate proueniat, roboratione indigemus, si multitudine pituitæ in eo contenta, præparatione & euacuatione, deinde oculi roboratione, ut ne quid suscipiat, & susceptum resoluatur ac exiccetur. At si suffusio à cerebro uel uitio oculi prouenerit, confirmata nõ nisi per manualementem operationem curã admittit, non confirmata adhuc pullulans quinque medys auferetur, scilicet regimine Ec. iij.

sex rerum non naturalium, humoris præparatione, euacuatione, reuulsione ac deriuatione, exiccatione & resolutione. Victus ratio erit, donec morbus transierit, attenuatoria: nam pisces & cibi crassi nutrimenti, & quæcunque flatuosos vapores pariunt, & humectant ac replent, fugienda sunt, uinum pariter, & coitus, & balneum, & aer humidus uitetur. Pro potu hydromel conuenit. Humoris præparatio quoniam plerunque ortum habet à pituita, idcirco cum oxymellite simplici & composito, cum syrupo de stechade, rhodomelle, & cum decoctis fœniculi, rutæ, euphrasiæ, betonicæ, stechados, rosmarini, & similium perficietur. Euacuatio primum per sectionem uenæ, si corpus fuerit plethoricum, si minus, cum phlegmagogis, ut pilulis chochys, sine quibus lucis Asiatareth, ꝛ. de agarico, cum electuarijs & simplicibus, ut pluries repetitum est. Reuulsio & deriuatio fient cum clysteribus nascalibus, masticatorijs, narifusorijs, cum cauterijs, cucurbitulis, extremarum partium frictionibus, aut balneis extremis partibus adhibitis, &c. Resolutio suffusionis & uac-

porum tam per intrinseca, quàm per extrinseca paratur. Intrinseca erunt electuaria, inter quæ laudatur confectio humani à Mes. Item triphera, myrobalani conditi, & alia multa, quæ à cœna comeduntur. Extrinseca multa sunt abstersoria, quæ suffusioni quadrant, qualis est aqua mellis stillata more chymico, aqua fœniculi, rutæ, euphragiæ, serapinum in uino granatorû dissolutum, puluis hirundinû, urina infantis, & collyrium de fellibus Raxis, & alia multa quæ infra annotabuntur.

Loci consentientes de cura suffusionum.

De cura per consensum uentriculi lege Arcul. Marc. Catin. Gord. & ceteros practi-
cantes. Habes insuper Galeni auctoritatem de dolore capitis per cōsensum, quæ ad hunc locum reduci potest. De operatione manuali, quoniã quid agendû foret nō expressimus, nunc auctoritas Auic. tertia terrij, cap. 20. satisfaciet, quæ talis est, Quum uolūtas adest ut fiat cura cum instrumēto, permittitur habenti aquam, ut nutriatur piscibus recenti-

Ee. iiij.

440 DE CONSEN. MEDIC.

bus & cibis humectatiuis, & administretur
 ex eis aliquid, quod resistat nocumēto aquæ,
 & præcipiatur infirmo aspicere ad lachry-
 male domesticū, & ad nasum, & conseruetur
 iuxta illam figuram: nec sit iuxta fenestram
 uel in loco uehementis luminis, & perforet
 artifex cū acu, & uadat inter duas tunicas,
 usquequo sit corā foramine, & deponat ca-
 taractam, nec deponere cesset, usquequo ocn-
 lus clarificetur. Cūque curam cum instru-
 mento operatus fuerit, pone super oculū ui-
 tellū oui conuassatum cum oleo uiolaceo, &
 dormiat super collum tribus diebus in tene-
 bris, &c. Vide eum in fusius. Et nota quòd
 triplex est cura iuxta chirurgos: prima fit
 cum acu ferrea uel plumbea incuruata: se-
 cunda cum acu acuminata incuruata: qua
 dum suffusioni superponitur, eam in uacuum
 extrahit: tertia cum cauterijs circa frontem
 super oculū laesum, ita quòd abscindatur flu-
 xus & exiccetur suffusio. De his uberius le-
 gere poteris Placentinū Arnaldum & Gui-
 donem. lege etiam Paul. lib. 6. cap. 21. ubi de
 hac manuali operatione pertractat uberri-

mē. uide etiam alios practi-
 cantes, &c. De
 nictus ratione loquitur Auicē. tertia tertiū,
 cap. II, Et oportet ut uitet pisces & cibos
 ingrossantes & uaporatiuos & potum plu-
 rimum aquæ & uini, & frequentiam phle-
 botomia & uentrosarum, &c. Et cap. 19, Et
 caueat habens eam repletionē uinum & coi-
 tum, & sit contentus comedere semel in me-
 ridie, & fugiat pisces, & fructus, & carnes
 grossas, &c. Aet. ser. 7. cap. 51, Dieta omnis
 sit attenuatoria, à uino abstinendum est per
 totam curationem, & ab omnibus replenti-
 bus caput, &c. Razes 9. alman. itidem ha-
 bet, ibi, Non comedat pisces, nec omnia qua
 humectare possunt, sed ager ex calefactius
 & exiccatiuis nutriendus est, hydromel pro-
 pterea in potu exhibendum est, &c. De hu-
 morū preparatione loca non adducā, quum
 iuxta Arcul. Gord. Sauona. & Marcum Ca-
 rin. ualde pateant. De euacuatione, Aet. ser.
 7. cap. 51. inquit, Curādi sunt qui suffusione
 tentantur in principio sanguinis detractio-
 ne ex cubito, &c. Paul. lib. 3. cap. de glan.
 Suffusione tentatus succurremus sanguinis ex

cubito detractiōe & purgatione, euacuationibus acrioribus. Auicēn. loc. cit. Oportet ut incipias & mundifices corpus, & propriè stomachum: deinde deuenias ad mundificandum caput, & scias quòd hiera picra est mirabilis iuuamēti in eis, & similiter pilulæ aureæ, & medicamenta, in quibus ponuntur centaurea, & cucumer amarus, &c. Razes similiter ait 9. alman. tribuens pilulas chochias, &c. Mesu. cap. de aqua, Quando est in principio, & non est confirmata, succurritur ei cū medicinis, & cū mundificatione sæpius reiterata, & propriè cum chochys, hiera picra, & hiera colocynthidos, &c. De reuulsione & deriuatione plura habes ex Aet. ser. 7. cap. 51. ibi, Et si nihil impedit, etiam clysteribus acrioribus & purgatione utemur: deinde cucurbitula occipitio affigenda est cum scarificatione, & pituitam per os trahentibus narifusorijs, &c. Auicēn. tertia tertij, cap. 2, Deinde mundificandum est caput cum gargarismis, & caput purgijs, & masticationibus, & dicitur quòd appositio sanguisugarum super tēpora confert in

initio sui, & phlebotomia arteriarum post
 aurem, &c. De resolutione loquitur Mesu.
 cap. cit. ibi, Et succurritur cum administra-
 tione medicinarum resolventium, sicuti est
 aqua rutæ cum serapino, aut aliquo ex felli-
 bus animalium, cum melle & succo fœniculi,
 &c. Auic. itidē adserit, ibi, Quæ sunt ex sic-
 citate, cōferunt quandoque humectatiua no-
 ta, sed si sunt ab humiditate, conferunt eis
 omnia aleophol, id est, collyria quæ abster-
 gunt. Vide Arcul. Gordo, & Marcum Cati-
 narium & ceteros practicantes, &c.

Observationes in manua- li cura.

Auic. tertia tertiij, cap. 20, In regimine cu-
 ræ, quæ fit cum instrumento, oportet ut ante
 ipsam precedat mūdificatio corporis & ca-
 pitis propriè, & fiat phlebotomia, si necessa-
 ria fuerit, & obseruetur, ne ille qui cum in-
 strumēto curādus est, habeat in oculo ruptu-
 ram, & timeatur ut accidat in tunicis apo-
 stema, aut sit assuetus pati tussim, aut sit ue-
 hemētis rixæ, uelocis iræ: nam hæc mouent ad
 profundum uel reditum. Arcul. Ne primum

re ad curandum intromittas, ni prius magistrum pluries operari uideris.

Obseruationes de euacuatione.

Paul. lib. 3. cap. de glau. Si ueluti culices oculis obuersari uideantur ex quadam humorum prauitate, uel biliosioribus uaporibus sursum distributis, medicamentum dia-loes amarum exhibeatur. B. id est, quū sciuerit esse morbum ex bile, utere picra: si minus, alys compositis: nam picra stomachū & caput una simul uice expurgat ac euacuat, &c. Auicen. loc. cit. Vomitus quantumuis conferrat ex parte mundificationis, tamen est nocitius in proprietate aquæ.

Obseruationes de resolutione.

Aet. ser. 7. cap. 51, Medicamentis utendum est primū simplicibus, uelut melle, succo fœniculi, deinde cōpositis, liquidis, siccis collyrijs, quæ paulò pōst describentur. Auic. tertia tertij, cap. 2, Et oportet ut incipias primo à medicinis lenitiuis, sicut fœniculū cum melle: deinde gradatim perueniatur ad medicinas

compositas ex serapino, &c. Et hæc non nisi post mundificationem corporis, &c.

Suffusiones curantia ac
perseuerantia.

Curant suffusiones adeps piscis & uiperæ recens, oleum antiquum cum melle, fel aquilæ cum melle, asa, asphaltum, berbena, ciclaminis succus cum melle, euphorbium, sarcacolla, segapinum, myrrha, lac ficus, gunni oliuæ, oleum benedictum Nic. mirabile, sief de fellibus Haly, sief rubeum Serapionis, fel canis, capræ, auium rapacium, scorpionis marini, gallinæ, tauri, testudinis, hyenæ, uulturis, aquilæ, succus fœniculi, semen raphani, oximum, rosmarinus, & sal. Prohibent suffusiones fieri pilulæ, sine quibus pilulæ optomeræ Auic. hiera Archigenis, hiera magna, hiera andromæchi Mes. in cur. sod. frig. caput purgiū Alex. eodem in loco. lege insuper Varignana cap. 12. tra. 3. ubi tractat de descēsu aquæ ad oculum. Vide etiam Razem cap. de cataraçta. Item Placentinum, qui puluerem describit, multum ab ipso commendatum, &c. Vide su-

sius Montagnanam cons. 66. cap. 4. de remedijs conuenientibus diminutioni & corruptioni uisus, &c.

De prognosticis suffusionum.

Paul. loc. cit. Verum omnia glaucomata curationem non recipiunt, hypochymata uero curantur, sed non omnia. B. Intellige glaucomata non curari, quae ex praegressa suffusione sunt, humore iuxta pupillam uehementissime congelato ac resiccato. Vnde Auic. de obstructione uisus, inquit, Ex siccitate fit, ut oculus in seipsum colligatur & corrugetur, & nominatur haec aegritudo glaucoma: fit enim oculus propter eam uariis multorum generum, & non est ei medicamen. & Aet. Quae glaucescunt, incurabiles sunt, &c. Auic. tertia tertij, cap. 18, Et illa quae est magis susceptibilis cura, ex parte coloris est aerea & alba margaritalis, & quae ad uiriditatem parumper declinat. Genus autem gypseum, & uiride, & nigrum, & plumbeum uehementis nigredinis, & citrinum non recipiunt curam, quae fit cum acu, &c. Galen. 14. meth. cap.

ult. Hypochyma iam incipiens digeritur, ubi diu constitit, non potest.

Arcul. 9. almans. Cataractæ quæ totum oculum occupât, sunt incurabiles. Item nimis crassæ, quæ non per cõpressionem mouentur, neque acu, neque medicamētis curantur. Item cataractæ ex integra obstructione nerui optici factæ curationem non admittūt, & quæcunque siue à percussione, aut post ægritudinem cerebri fiant, difficulter sanantur.

Authores dissentientes circa suffusiones.

- 1 Adserere, locum affectum in suffusione esse ambiguum.
- 2 Adserere, suffusiones ferè omnes per chirurgiam posse curari.
- 3 Adserere, parorasim, id est, hallucinationem esse suffusionis speciem.

Confutatio dissentientium circa suffusiones.

Ad primum: Haly Abb. 9. theoricæ cap. 13. tenet, quòd locus suffusionis sit inter crystalloidem & corneam: pro quo habes etiam

448 DE CONSEN. MEDIC.

rationes in descriptione superius ex diuersis authoribus recitatas.

Ad secundum: Paul. lib. 3. cap. de glau. & Auic. ut supra dictum est in prognosticis, multa suffusionum genera, quibus non est dare remedium, proculdubio recitauerunt. Ex quibus concludi potest, non omnia ferè, sed ualde pauca posse curari, sicuti etiam nobis experientia demonstrat, &c.

Ad tertium responderetur, quod si parorasis esset species suffusionis, sequeretur quod hyposphagmatici & icterici suffusiones pati dicerentur, quod à ratione alienum est: nam isti parorasi laborant, ut testatur Galen. 4. de sympt. cau. ibi. Si uerò humores non multitudine, sed colore peccauerint secundum eiusdem coloris naturam parorasis, id est, hallucinatio suborietur: nam qui ictero laborant, omnia quæ uident, pallere arbitrantur. Qui uerò hyposphagmate, omnia quæ aspiciunt, rubra putant, &c. sed hoc falsum, igitur, &c.

De aurium doloris descriptione.

Dolor aurium, Græcè ὠταλγία dictus, est

eristis ac molesta auris sensatio à contraria
re derepente ac uiolenter simul & uehemen-
ter imprimente facta. Cuius species enume-
rantur quinque, ut dolor punctorius, stimu-
lans, tensiuus, grauis, & pulsatilis, &c.

Loci consentientes de dolo- ris aurium descriptione.

Plato in Timæo, Pathos præter naturam
uiolenter ac affarim incidens dolorem exci-
tat. Gal. 4. de sympt. cau. cap. 6, Hoc Plato
uolebat, quum diceret molesta sensationem in
corporibus sensu præditis fieri, si compositum
ipsi pathema ex uiolento simul & conferto
acciderit, &c. De speciebus dolorum lege Gal.
2. de loc. aff. & 3. cap. 7. ubi mentionem fa-
cit de torpido, ulceroso, stringente, lacerante,
&c. de quibus, cum de doloribus agemus, in
genere loquemur: lege etiam Auicem. & Ar-
cul. 9. almans.

De causis doloris aurium.

Omnis dolor aut per consensum, aut pri-
mario affectu fieri solet, cuius causa est, aut

Ff. i.

mala intēperies, aut soluta continuitas. Mala intēperies aut fit à frigiditate, aut à caliditate, aut ab utraque, & hæc cum materia uel sine materia esse potest. Soluta uerò continuitas fit aut à flatu extēdente, aut ab humore corrodenre, siue putrefaciente, aut ab aliquo tumore, abscessu uel inflammatione. Quæ uerò per cōsensum fiunt, aut à toto, aut à parte oriuntur. A' toto, sicuti per crism, per febres. A' parte, ut à stomacho, à matrice. Qui uerò per se ueniunt, id est, à parte læsa, uel erunt in auris cartilagine, aut in meatu, aut in auditorio nervo, &c.

Loci consentientes de causis dolorum auris.

Gal. 12. meth. cap. 7, Doloris causa aut est diuisio uel alteratio, &c. de omnium dolorum causa in genere loquens, &c. ut supra dictum est. Gal. lib. 3. de compo. med. per loc. cap. 1, Dolores auriū aliqui ex frigiditate à uentis inducta fiunt, aliqui ex balneis frigidis medicariisue, aliqui ex inflammatione: interdum circa meatum cutis: interdū in profundū progressi, ubi auditorius nervus ad

inflāmatam affectionem peruenit: aliqui ex flatu uentoso transitum non habente, aliqui ex humoribus saniosis & mordacibus dolorem excitātibz oriūtur. Auicē. quarta tertiij, cap. 6, Dolor auris aut fit à malitia complexionis, aut fit causa apostematis aut bo- rhor, aut causa solutionis continuitatis, &c. uberiorius hunc locum legito, & plura ad rem faciētia inuenies: lege insuper Alexan. lib. I. cap. 24. ubi diffusius rem pertractat: uide & Arcul. Sauo. & Gord.

De signis dolorum auris.

Indicia omnino communia ab ætate, tem- perie, anni tempore, arte & uictu præceden- te sumuntur, item ex laborantis relatione. Si- gnz si fiant à mala intemperie, siue calida, siue frigida, cognoscūtur per ea, quæ in con- trarium adhībentur. Signa particularia sunt: nam si à flatu fiant, tunc dolor erit tensius, non grauius, & sonus clarus auditur, non confusus: si à caliditate, præcesserunt calefa- ciētia, & à frigidis iuuātur: si à frigiditate, grauitas & tumor una sentientur, & audi-
Ff. ij.

tus impediatur, si à soluta cōtinuitate, ex eo cognoscitur, quòd aliquid sanguinis uel puris effluit: si ab inflammatione, tunc dolor erit cōtinuus, grauitas cum tumore & febre continua aderit: quòd si intensiora hæc symptomatica fuerint, quàm quòd liceat, cum alienatione & frigidityte extremorum, tunc erit inflammatio in intrinseca auris parte. Cognoscitur apostema esse sanguineū uel biliosum, quum intensius se habeat dolor in bile & sanguine, mitius in pituita & melancholia, &c.

Loci consentientes de signis
dolorum auris.

Paul. lib. 3. cap. 23, Auriū dolor qui à frigidityte fit, ex anni tēpore, ex uictu præcedēte, & ex laborātis tēperie cognoscitur: at qui ex calida intemperie prouenit, ob id cognoscitur, quòd feruoris cuiusdam sine grauitate seu tensione sensus aderit: qui uerò ex glutinosi crassiſque succis fit, ex capitis auditūsque grauitate & uictus præcedētis ratione deprehēditur, &c. Auic. quarta tertij, cap. de taraxen. Si fuerit apostema calidū in

ipso nervo, significat febres cū quibus est horripilatio, & tremor, & cōcomitatur ipsum permixtio, intellectus alienatio, &c. Si uerò non sit in nervo, tunc aderūt extēsiō, dolor, grauitas, & pulsus: si causa erit ventositas, significāt ipsam sonitus & tinnitus, nec aderit grauitas: si ulcus & bothor, significat pruritus cum dolore & sanie: si ab humore frigido læditur, à frigidis, & sit fortior in frigidioribus partibus diei: si est à calido, est à cōtrario, &c. Vide de his Arcul. longè alijs melius rem pertractantem: uide etiam Auic. quarta terty, tract. 1. cap. 25. de signis apostematum in radice auris.

De cura doloris aurium.

Omnis curatio per eius causæ ablationē perficitur, & si quid malæ cōplexionis impressum fuerit ac derelictū, cum suis cōtrarijs tam intrinsecis quàm extrinsecis remouebitur: uerū si humorum fluxus ad aurem timeatur, cum reuellentibus & euacuantibus auferendus erit, accidentia remouenda, & auctus ratio instituenda erit, &c.

Dolor uerò ex inflāmatione uel erit creti-

Ff. ij.

cus, uel non creticus. Creticus duabus intentionibus curabitur: prima crīsim adiuuando, secunda symptomata remouendo, & uictum ordinando. Crīsis quadrifariam adinuatur: Primo, multitudinem humorū euacuando, ut uirtus in reliquum potētius exonerata agere conetur. Secūdo, uirtutē roborādo cum his quæ sanguinem & spiritū cumulant, & hoc fiat ante crīsim, ne in crīsi natura impediatur. Tertio, meatus preparādo, & superfluitates auris abstergendo ante crīsim. Quarto, uirtutē stimulādo, si natura ad crīsim tarda uerit, uel si morā natura in crīsi cōtraxerit in expellēdo. Remotio symptomatū fir, quotiens dolor, modū excedēs non frigidis & repellētibus, sed rebus molliētibus & anodinis demulceatur: nā frigidus & repellētibus interdum crīsis impeditur. Dolor ex inflāmatione non creticus septem exigit intentiones quæ sunt euacuatio, reuulsio, repercussio per se, & resolutioni mixta, resolutio pura, ablatio symptomatū, & sex rerum non naturalū institutio. Euacuatio fiet per sectionē uenæ, si sanguis peccauerit, uel per cholagoga, si

bilis, ut cum rheubarbaro cassia, manna, electuario de succo rosarum, diapruni solu. cū pilulis aureis, &c. Vel per phlegmagoga, si pituita, uel cū pilulis chochys, turbit, agarico, &c. uel cum pilulis indis, de lapide lazuli, confectione Hamech, si fuerit atra bilis. Reuulsio fiet cucurbitulis, frictionibus, &c. Repercussio in materia calida perficitur cum oleo ros. & quarta parte aceti per decoctionem resoluti, uel in materia frigida cum oleo amygdalarum amararum uel camomillino, &c. Repercussio resolutioni mixta fiet, si subscriptis addatur mucilago, semen citoniorū, semen lini, scenugraci, &c. Resolutio fiet per resoluentia & mollientia, quale est diachilon minus, uel emplastrum ex farina hordei cocta cum oleo camomillino. Resoluit etiā ac maturat apostemata auris emplastrū ex farina fabarum, cum oleo liliorum alborū, & est expertū. Victus ratio sit tenuis in frigidās in causa calida, uel ecōrrario in frigida. Vinū carnes & oua uitētur, quāquam uinum in causa frigida absente apostemate cōueniat. Aēr sit calidus potius q̄ frigidus, Ff. iiij.

nam frigidū inimicū nervosis partibus est. Symptomata remouētur, si fuerint uigiliae, per ea quæ somnum cōciliant, si syncopis uel surditas, per ea quæ de syncopi ac surditate dicentur, dolor interim cum anodinis uel narcoticis, de quibus plura ex Auicē. & Aet. & iuxta neotericos practīcantes habentur.

Loci consentientes de cura doloris aurium.

Quòd omnis cura per eius causæ ablationem fiat, habetur non solum ex Paulo, sed ex Gal. 3. de cōpo. med. per loc. cap. 1. ibi, Dolores à frigiditate oborti, calefaciētibus quàm celerrimè curantur, & dolor ab aqua medicata circa meatum auditorium contēta, oleo assiduè infuso curatur, &c. Paul. lib. 3. cap. 23, Dolor aurium à frigiditate calefaciētib; curabitur præsidijs, ut oleo rutaceo, laurino: at ex calida conceptum in: ēperie contraria discutunt, ut oui albumen in aurem demissum, lac muliebre, oleum rosaceū, oleum lumbricorum & asellorum, quos Græci ὀνούς καὶ ἄσδίους uocāt. Quòd si à crassis ac glu-

tinosi succis fiat, uel à flatu exitum non ha-
 bente, cum medicamentis curabitur, quæ ape-
 riant, incidunt, ut aphronitrum cum aceto &
 melle, uel fel ouillum cum oleo amygdalino,
 &c. Aet. ser. 6. à cap. 73, usque ad caput
 76. inclusiue de his uberrimè pertractat, ubi
 habes, quòd omnia amara citra mordacita-
 tem ac molestiam meatui auris purgant &
 extergunt, ac crassos humores impactos secant,
 &c. Auic. quarta tertij, cap. 8, Si autem est
 causa, caliditas superflua, oportet ut infrigi-
 des cerebrum cum extinguentibus cognitis, &
 destilles in aurem oleum rosaceum, tepidum,
 aut albumen oui: & si est dolor uehemens,
 permisce cum eo camphoram, &c. lege cum
 fusius, lege insuper Mesu. ibi, summa sexta
 cap. de cur. aurium, Si dolor fiat à com-
 plexione siue materia, solùm alteratio-
 ne indiget, ut si calida, iuuatur ex infusione
 albuminis oui recentis, aut mucillagine psy-
 ly: si fiat à complexione frigida, conferunt
 infusiones calida, &c. De dolore ex inflam-
 matione cretico & non cretico loquitur Ni-
 colaus, ibi, Accidunt hæc apostemata ut Sym-

ptomatis stimulata natura, & quandoque accidunt vincente natura, & fit saepe secundum semitam crisis, & maximè in febribus & apostematibus cerebri. Vide Razen 3. cōment. auctoritate Gal. de hac re loquētem. Vide etiam in hoc Arcul. 9 almans, qui & si quinque modos in adiuuanda crisi declararet, nihilominus ad quatuor reducūtur, ut dictum est. Lege etiam aphor. 20. primi lib. ibi, Quæ iudicantur & indicata sunt integrè, neque mouere, &c. amplius Galen. in cōment. dicētem, Vbi deficit natura, adiuuandū, ne recidiuus materia relicta faciat, &c.

De dolore ex inflammatione non cretico uerba faciunt omnes moderni, ex quibus primum elicere poteris omnes à me dictas curandi intentiones, quas etiam breuiter habet Auicen. quarta tertij, cap. 8. ibi, Et si causa fuerit apostema calidum, profundum, quod est timorofum propter propinquitatem sui ad cerebrum, usquequo ad collectionem perueniat & suppurationē, tunc post phlebotomiam & euacuationem oportet ut administres lenitina in primis & infrigidantia,

Et propriè lac mulieris uice post uicem, us-
 que ad diem tertium, Et similiter oleum ro-
 faceum, decoctum cum aceto, deinde mucila-
 ginem scænuigræci semine lini in aqua lactis,
 Et c. Paulus loco citato, Si ex inflamma-
 tione auris laborauerit, statim sanguis mit-
 tendus est, deinde fofus ex oleo dulci Et
 calente per specillum in lana inuolutum ad-
 hibeatur, extrinsecus etiam quæ dolorem le-
 niunt, materiâque impactam cōcoquant su-
 peraccommodare, Et c. Lege Galenum 3. de
 compositione medicamentorū per loca, cap.
 1. ibi, Dolor uerò ab inflammatione ortus,
 Et c. Pro resolutione abscessus, Galenus 12.
 meth. cap. 8. ad dolorem aurium ex humo-
 re frigido uel flatu, medicamento utitur,
 quod ex castoreo Et papaueris succo con-
 fitur, Et c. Mesu. Expertum est diachylon
 in oleo anethino dissolutum, Et ex eis quæ
 sunt ultimi iuuamenti est ærypi cerotum.
 Docet etiam cataplasma confici ad hoc
 idoneum ex farina fabarum, camomilla,
 uiolis, Et c. De uictus ratione Et de sex
 rebus non naturalibus legantur Arcul. Et

Matthæus de Grado fufius. Auic. loc. cit. Et habes dolorem frigidū, poterit uinum purum, forte & dormiat: & cū excitatur, non habet lesionem aliquam, &c. Quod aer frigidus fit neruis inimicus, habes aph. 18. terty lib. ibi, Frigidū inimicum ofsibus, dēribus, neruis.

De symptomatum ablatione legatur Auic. ibi, Et quandoque necessarium est in curationibus dolorum uehementium in aure administrare narcotica, sicut aliquid ex philonio cū lacte, uel opium & castoreum, & crocum cum lacte mulieris, &c. Aet. ser. 6 ca. 80, Vbi uerò magnus est dolor, necesse est stupefacientibus sensum uti, ita ut ad lac muliebre & oui cādidum modicum opij admisceamus. Admiscendum est & castoreum ad uehementiores dolores pari mensura, ad leuiores dupla proportionē, &c.

Obferuatio de diuersione.

Hic ad memoriam reuocandum quod in quarta primi dixerat Auic. Quod si ad diuersum trahere uolueris materiam, primūm dolorē mitigabis ac demulcebis, quo sedato, ad curam te conseras, &c.

Observationes de percussione.

Arcul. 9 almans. Antequam fiat percussio, obseruentur hæc: non sit materia cretice expulsa, non sit uenenosa, non sit furiosa, nō plurima, non immediate à cerebro expulsa, non ualde tenax & crassa, non paulatim cōgesta, nō fluxam ad partem extrinsecā auris.

Observationes de topicis.

Tusignanus septem conditiones obseruandas esse inquit in his quæ in aurem proiciuntur: prima, quod inijcitur, nō sit calidum nec frigidum, sed tepidum, & hoc etiā innuit Auenicē. cap. 8. Secūda, quod sit in parua quantitate, & hoc habetur ex Auenzoar primo lib. Theisr. tra. 41. ca. 1. Tertia, quod stet in aure pauco tempore. Quarta, quod antequā aliud proijciatur, primū sit expulsū. Quinta, quod cū aliquid inijcitur in aurem, pariens iaceat super latere sano. Sexta, quod locus sit cum auriscalpio mundificatus propter tortuositatem auris. Septima, quod non administrētur percussiones in apostematibus auris, &c. Gal. 5. meth. cap. 10 cōtra Thesali sectatores dixit, aurem esse particulam

siccissimā, idcirco quæ ualentissimè exiccet
opus esse, ut castoreum. Verum hîc in dolore
anodinus, illic in ulcere siccantibus fortius
uti persuader: uide tu illum fusius.

Observationes in narcoticis.

Auic. quarta tertij, ca. 8, Oportet ut post-
ponantur narcotica, usque quo timeatur syn-
copis, & propriè cùm fuerim humores frigi-
di: nocent enim eis ualde, & post eorum usum
administra castoreum.

Auditui nocentia.

Fumus argenti uiui, semen arundinis, la-
nugo & flos Typhæ, folia castaneæ, puluis
platani, & puluis inuentus super eius folijs.

Dolorem ac pulsationem au- rium curantia.

Dolorem ac pulsationem aurium iuuat ua-
por decoctionis absinthij, aqua decoctionis
acerosæ, succus acori cum rosa, oleum in ra-
dice aphodilli coctum, allium cum adipe an-
seris, succus cucumeris asinini, succus cucur-
bitæ cū oleo rosaceo, in calido dolore, crocus
cum oleo rosaceo, succus dracunculi, hederæ,

cānabis, gallia cū oleo de been uel de cheiri,
galbanum cum oleo liliorū, grana granatorū
cum melle, succus hyosciami, lactuca asini,
laudanū cum oleo ros succus maiorana, mel
liloti, menta, paritoria, peucedani, polygoni,
foliorum populi, porri, plantaginis, prassij, ro
sarum, rubi, ruta, salicis, serpentaria, solatri,
adeps anseris, leonis, uulpis, fel arietis, apri, bu
bali, tauri, suis, oleum liliorum, amygdalarū
amararum, scorpionum, de uitellis ouorum, de
semine cannabis, oleum benedictum Nic. de
cherua, sisaminum, de nucleis persicorum, lau
rinū, de semine raphani, de anetho, de chry
somyli, de been, yrinū, nardinum, urina apri,
bubali, tauri, capra, oleum de cinnamomo, pe
troleum in frigido & antiquo, pilula sine
quibus, hieralogodion, esdra, cōfectio Nicol.
opium cum myrrha, croco, & oleo ros.

De prognosticis dolorum aurium.

Hippocr. prognost. 3. text. 15, Aurium do
lor acutus cum febre continua ac uehementi
difficilis est, periculum enim delirij abolitio
nisque imminet. Quia igitur fallax hic locus

est, citò etiam aduertere omnia alia indicia à primo die necesse est, &c. Auic. quarta tertij, cap. 6, Et peruersior dolor auris est ille, qui est ex apostemate calido, profundo, & propriè cum perducit ad commixtionem intellectus: ubi uerò dolor est in cartilaginibus extrinsecis, non est illic uehemens dolor, nec uehemens timor, sed primus interdum subito interficit, ueluti apoplexia: interficit tamen magis adolescentes quàm senes, sed ratio est, quia in senibus ignauior sensus, nec humores sunt ad alienationem prompti, sicuti in iuuenibus.

Authores dissentientes circa
dolores aurium.

- 1 Adserere, in omni dolore auris esse in primis reperiendum.
- 2 Adserere, dolorem auris non esse periculosum.
- 3 Adserere, in dolore auris non esse secandam uenam.

Confutatio dissentientium
circa dolores aurium.

Ad primum: Auicem. quarta tertij, cap. 25,

Si apostema fiat per uiam crisis, oportet ut non intendas ad curam quatenus exigitur, ad curam apostematum, adhibendo styptica & apocrustica, id est, repercussiva in principio. Item repercussio fit ad membrum principale, igitur in omni dolore non est perpetranda.

Ad secundum: Gal. 3. prognost. comm. 15, Quod si dolor fuerit in cartilaginibus, aut in summa auris parte, non est periculum mortis. At si in profundo ex auditorio meatu doloris sensus affligat, ut etiam nervus auditorius afficiatur, periculum imminet, ne in consensum perducto cerebro, mors repente sequatur.

Ad tertium respondent Auicen. & Mes. quod in omni dolore à sanguine fieri debeat sectio uenæ. In alijs doloribus reuulsivam imperant neoterici.

Descriptio vlceris aurium.

Vlcus, Græcis ἔλκος dictum, nihil aliud est quàm continuitatis solutio cum sanie,
Gg. i.

46 DE CONSEN. MEDIC.

quod interdū extrinsece, interdum intrinsece accidit. Si intrinsece, uel erit in meatu, uel in neruo auditorio, aut circa os, petrosū uocatum. Præterea uel erit ulcus mundum, sordidum, uirulentum uel corrodens cum dolore, cum mala intemperie & cum inflammatione uel alio tumore, &c.

Loci consentientes de descriptione vlceris aurium.

Gal. 2. meth. cap. 1, Vnitatis nanque solutio in osse fractura dicitur, in carnosā parte ulcus. Auic. quarta tertij, cap. 12, Amplius nō possunt esse ulcera, quin sint apparentia sensui, aut sint profunda, & non profunda propinqui temporis uel chronica, &c. Lege Articul. & plures ulcerum differentias intelliges. Gal. 3. meth. cap. 4. memorat ulcus cauum & aquabile, recens & inueteratum, sordidū, purum, liberum phlegmone, & phlegmone impeditum. Similiter de intemperie intelligendum. Lege de hac re Placentinum. De ueris ulcerum differentiis lege Gal. 2. meth. cap. 1.

De causis vlcerum auris.

Cause ulcerum sunt uel humores corrodē-

res, uel aliquis abscessus, uel casus, percussio,
 & res quæ putrefacere uel corrodere possunt.

Loci consentientes de causis
 vlcerum auris.

Arcul. 9. almans. Causa vlcerum sunt apo-
 stemata uel bothor cùm rumpuntur, nec non
 humores acuti, item cerumen aurium & uer-
 mes, aut res ibidem natæ corroderentes ac pu-
 trefaciētes, similiter casus & percussio. Gal.
 4. met. cap. 1, Est enim horum duplex ortus,
 aliis ab excisione, sæpe ab erosione. Quo pa-
 cto fiat excisio, patet: erosio uerò si intrinse-
 cus ab ipso animali prouenit, uitiosi succi so-
 boles est: si extrinsecus, aut à ualētibus me-
 dicamentis, aut ab igne.

De signis vlcerum auris.

Signa vlcerum auris manifesta sunt, si pus
 ex aure defluat, nulla in cerebro præterita la-
 sione. Si fiat ab apostemate, statim ex uomi-
 ca multa puris copia exiet, deinde paulatim
 & in pauca quantitate. E contra uerò, si ab
 humoribus corroderentibus paulatim in primis
 egredietur, deinde magis abundabit. Si-
 gna vlcerum mundorum ab optima & con-

Gg. ij.

cocta sanie cognoscuntur. Sordidorum ex crassitie ac multitudine exeuntis saniei. Virulenta ulcera ex f. rore et putrida sanie subtili exeunte nobis innotescant. Corrodentia si post sanie sanguis effluerit. Fistulosa, si longo tempore contracta, si virulenta sanie, si ex callosa ac indurata carne consistant, etc.

Loci consentientes de signis ulcerum auris.

Razes 9. almans. hoc tantum signum posuit, scilicet quum pus ab aure egreditur. De his signis fusius pertractat Arcul. et Auic. Similiter ceteri practificantes.

De cura ulcerum aurium.

In omni ulcerum cura quinque opus sunt medicamina, abstergentia scilicet, corrodentia, carnem generantia, consolidantia, ac ad cicatricem inducentia. Abstergentia idcirco opus sunt, ut sanies crassa glutinosaque membro adherens amoveatur, qualia sunt tenuia ac calida circa secundum gradum, sicut mel, etc. Corrodentia, ut supercrescentia carnis

minuantur, & sunt calida & sicca in quarto, ut flos aris, alumen, &c. Carnem generantia, ut sanguis ulceri superueniens in carnem transmutetur: quod fieri nequit, nisi complexio temperetur, & sanguis coaguletur, & sunt sicca in primo, & temperata in actiuus, stypticis & abstersionis pauca, ut thus. Nec opus esset medicamentis in gignenda carne, quum ad naturam tantum pertineat, ni in generatione carnis excrementum tenuius ac crassius interdum efficeretur, ad quod id tandem opus est, quod redundantiā absumat, & sanguinem coagulet, quale est medicamen siccans & abstergens. Consolidantia, ut humilitas inter utrasque ulceris superficies propinquas contenta ita conglutinetur, ut altera superficierum ulceris alteri adhæreat, & sunt sicca in secundo, cum proportionē actiuorum ad membrum ut aloes, sanguis draconis, &c. Cicatricem inducentia sunt, quæ absque mordacitate tantum superficiem exiccant, ut cortex pini, &c. Sed de his uberius dicemus in Libro de chirurgia. Cura simplicis ulceris in corpore

Gg. ij.

purgato indiget tantum abstersione & consolidatione. Si uero ulcus fuerit compositum, puta cum inflammatione, uel mala temperie, aut dolore uehementi, tunc primum erit inflammationi ac reliquis uacandum, non neglecto interim ipso ulcere, &c. Cura ulcerum auris malignorum praesertim corrodentium quinque medijs perficitur, praecedat tamen euacuatio ac reuulsio ad haec quae dicenda sunt. Primò, si quid est putridum, uel corrosum, uel induratum, auferatur. Secundò, quod remanet, optimè mundificetur. Tertiò, substantia iam deperdita regeneretur. Quartò, regenerata substantia ad cicatricem inducatur. Quintò, accidentia corrigantur, & ratio uictus instituat, &c. Primò putridum auferemus cum unguento Aegyptiaco, cum modico aceti uel uini dissoluto, uel si pars ueluti sensus expers sit, accipiantur uiridis aeris, saluminis, & mellis partes aequales, & cum modico aceti fiat collyrium. Secundò, mundificatio fiet cum hydromelle uel rhodomelle, aut anomelle, aut oxymelle simplici uel scillitico, si materia

egrediens fuerit ualde tenax. Tertiò, substantia regeneratur cum his quæ mediocrem cum pauca mordacitate exiccationem, qualis est aloes, myrrha, sarcocolla, sandaraca cum melle & uino dissoluta. Quartò, ad cicatricem perducunt, olibanum, si esmemite, sarcocolla, &c. Quintò, accidentia corriguntur, ut si sit dolor, cum prædictis in capite præcedenti, si surditas, cum his quæ de surditate dicentur. Ciborum quantitas sit modica in principio, donec ad substantiam regenerandam deuenierimus, tunc sit locupletior, sed boni succi & facilis concoctionis, &c.

Loci consentientes de cura ulcerum aurium.

Galen. 3. meth. cap. 8, Fieri non potest, ut in ulcere, uel carnis productio, uel sinus impletio, uel agglutinatio, uel cicatricis inductio rectè unquā cedat, nisi subiecta caro pro naturali modo se habeat: uerùm purgari sordida, minuique supercrescentia etiā carne statura non seruante possunt, &c. Ex quibus uer
Gg. iiij.

bis quinque dicta à me medicamenta ad ul-
 cus sanandum opus esse cognosces. De abster-
 gentibus quæ Græcis *πυλινκὰ* appellantur,
 loquitur Galen. 5. de fac. simpl. cap. 2. ubi in-
 quit, Omnia nitrosa & amara ad expurgan-
 dos meatus intro ualere, at cutis & ulcerū sor-
 des nō hæc tantum, sed & uiribus minora au-
 ferre possunt, qualia sunt dulcia, quæ tenuium
 sunt partium, ut mel, & ex cerealibus eruum,
 faba, lupini, hordeum, &c. Et cap. 14. de cau-
 sticis seu urentibus loquens, uehementer esse
 calida & carnis colliquantia, ut arsenicum,
 auri pigmentum, sandaraca, & crysocolia,
 &c. Et cap. 15. eiusdē lib. loquens de his quæ
 uim ἐπουλωτικήν habent, id est, cicatricē in-
 ducendi, esse desiccantia absque mordacita-
 te dixit, &c. De generantibus carnem lege
 Galen. 3. meth. cap. 3. ubi ad unguem, quæ à
 me dicta sunt recitatur, & plura ad hoc mu-
 nus idonea etiam enumeratur. De glutinato-
 rijs etiam uerba facit cap. 5. eiusdem, & quo
 pacto ab ijs, quæ cicatricem inducunt, diffe-
 rant, aperte declarat: uide illum fusius. De cu-
 ra simplicis ulceris lege Galen. 3. meth. cap.

4. De ulcere composito lege etiam similiter Gal. 4. meth. cap. 5. ibi, Verum ulcerus quod cum alio affectu coniunctum est, &c. lege tu hunc locum uberius, & inuenies quod sanari non possit ulcus, nisi locus in quo consistit, prius sit sanatus, &c.

Breuis Galeni vlcenum curatio quæ 5. meth. cap. 1. continetur.

Omne ulcus siccantia medicamina requirit, ulcus sinum habens, nō solum modicè siccantia, sed abstersoria expostulat: quod uerò coniungi labra perit, ueluti cruentum, magis siccantia, tum quæ sine abstersione leuiter adstringunt, desiderat: quod uerò ad cicatricem perducī debet, non solum magis adhuc siccantibus, sed strenuè adstringentibus remedijs indiget. At si caro præter naturam modum intumuerit, acria & demollicia quæ calida & sicca sunt, adhibeantur: si uerò ulceri aliquod symptoma adiunctum sit, primò id remoueatur, deinde ulcus sanetur: si sordes innascentur, tollendæ sunt ijs, quæ maiorem adstringendi vim habeant, quàm quæ carne

474 DE CONSEN. MEDIC.

implent: si copiosa humiditas adsit, siccantibus medicamentis, quæ propriam speciem non egrediantur, curandum. Agglutinatoria, sine igitur medicamenta siccantia & adstringentia, carnem generantia, siccantia & abstergentia, & sic de reliquis. Si uerò subiecta caro intemperata sit, primum eius intemperantia succurrendum, utique quæ siccior iusto est, humectantibus: quæ humidior, siccantibus: quæ calidior, refrigerantibus: quæ frigidior, calefacientibus: quæ geminata qualitate intemperata per geminam qualitatem contrariam curetur. Considera insuper intemperantia causus, num à toto uel à parte per consensum membrum ulceratum infestent. Primum enim causæ, quæ adhuc intemperantiam fouet medendum, post hanc ipsi quæ facta est intemperantia. Sumitur etiam indicatio à particula læsa, quæ si siccior fuerit, ea magis siccari expostulat: quæ minus talis est, ea minus siccanda. Simile etiam erit de calefaciendo refrigerandoque præceptum. Sumitur etiam à præcellentia membri aut à contrariis statu. Itemque ex sensu acris

hebetéue , quum hac diuersum medendi modum petant, & reliqua.

De mundificantibus ac abstergentibus vlcera aurium.

Mundificant ac abstergunt vlcera aurium succus absinthij cum melle aphodilli , etiam cum melle & thure, succus omphacij cum melle, arugo ferri cum aceto decocta, fel tauri cum lacte caprae, licium antiquis ulceribus, mel cum sale gemeo repidum, myrthi decoctum, myrrha cum memite, castoreo & opio, succus foliorum nucum, & succus oliuae agrestis, uirga pastoris, urina pueri cum cortice granatorum, oleum amygdalarum amararum, rhodomel cum matrisylua & betonica, oleum myrthinum, terebinthina, &c.

De sonitu aurium.

Sonitus aurium nil aliud est, si describatur, quam auditus corruptio, in qua uidetur homini audire id quod certè non audit, hos Graeci uocant ἤχος & οὐερσμοῖς.

476 DE CONSEN. MEDIC.

Loci consentientes de sonitu aurium.

Avicen. quarta terij, tract. I, Hac dispositio est uox, quam homo incessanter audit exterius. Et eius comparatio ad auditum, est imaginationum & tenebrarum, quas uidet homo, comparatio, &c. B. Id est, uocem quandā homo audit, ac si exterius audiret: & talem habet comparationem sonitus ad aures, qualē imaginatio ad oculos, &c. Vide etiam hanc eandem sententiam in Auic. cap. de nocumentis auditus.

De causis sonitus ac tinnitus aurium.

Omnis causa sonitus & tinnitus uel est occulta uel manifesta. Occulta aut fiet à sensu audiendi imbecillitate, aut ab eius subtilitate: imbecillitas fiet à mala quapiam complexione. Manifesta nouem modis fiet. Primò ex aëre extrinseco intrinsecum mouente. Secundò, ex sanie sonitum in aure efficiente. Tertiò, ex motu ebullitione humorum excitato, ut in febris. Quartò, repletionē superfina. Quintò, humorum agitatione & uapo-

re. Sextò, casu uel percussione. Seprimò, ex humoram magna inundatione. Octauò, ex fame humores commouente & aerem. Nonò, ex medicinis soluentibus quæ mouent & non educunt, &c.

Loci consentientes de causis sonitus ac tinnitus aurium.

Galen. 3. de compos. medic. per loc. cap. 1, Sonitus quidam ex flatuoso spiritu generantur, quidam ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem, quorum neutrius affectionis certa cognitio in principio haberi potest.

Auicenn. quarta tertij, cap. 9, Et inundatio aeris quæ est causa uocis, aut est occulta, aut est maior illa. Occulta, quum interdum sonitus auditur, interdum uerò minimè, & tunc, id est, aut propter acuitatem sensus, aut propter debilitatem, &c. lege usque ad illum locum inclusiue. Et quandoque accidit sonitus post medicinas, quarum proprietas est ut retineant humores & uentositates in partibus cerebri, &c.

De signis sonitus ac tinnitus
aurium.

Dabis operam ut in primis cognoscas qui fiant per se & qui per consensum. Per se enim fiunt quicunque sunt continui & assidui: per consensum uerò, qui sunt intermittentes, qui dispositione crescente augentur & desinente minuuntur. Signa ab acuitate sensus sunt, quia à mediocribus sonis læditur, nec excellentes tolerare potest, nullusque adest flatuosus spiritus, nec uapor crassus, nec repletio. Signa ab humore cum flatu, grauitas in aure percipitur, imbecillisque adest auditus: si uerò ex flatu tantum, sonitus est clarior, nec ulla adest in aure grauitas: si ab humoribus crassus fiant, paulatim crescunt: si à siccitate, fiunt post euacuationes & febres. Signa apostematis suppurati sunt, quia dolor præcessit, sonitusque confusus & sanies apparet. Signa debilitatis sunt superfluitates, si à complexione calida fit statim cum inflatione: si à frigida, econuerso. Cognoscuntur etiam ex prægressa diæta, à uomitu & à progressu pharmaco, &c.

Loci cōsentientes de signis sonitus
& tinnitus aurium.

Auicen. quarta tertij, cap. 10, In illo qui est continuus & assiduus, causa est aliquid stans in ipso cerebro: si autem quiescit, deinde excitatur post euacuationem aut uacuitatem, aut quum calor sit uel frigus, sit fortis, tunc est per communitatem. Illum qui est per acuitatem sensus significat defectus causarum uentositatis & repletionis, & mundificationis auditus, & excitatio eius apud ieiunium & uacuitatem. Paul. lib. 3. cap. 23, Sonitus qui fiunt à crassis glutinosisque humoribus cognoscuntur, quòd non uniuersim, sed paulatim increscunt ac nascuntur. Gale. 3. de comp. med. per loc. ca. 1, In cognitionem peruenimus non tantum ex procataceticis causis, sed ex temperie, ex diata prægressa, ut à longo uini potu, à uiolento & multo uomitu, aut à prægressa plaga, aut ex auricularium pharmacorum usu, & similibus. Quinetiam si sonitus aut per interualla redit, aut perpetuò permanet, aut ex eo quod paulatim,

aut aceruatim fit sonitus . uerum exacta & certa cognitio habetur , ut si quis ex flatuoso spiritu exitum non habere, sonitum fieri putet, & siccantia uel attenuantia adhibuerit, ad motisque apophlegmatis mis nihil profecerit, tunc certo cognosces ex auditus subtilitate sonitum fieri, praesertim si acuto audiendi sensu egre praeditus appareat. Auicen. loc. cit. Factus à siccitate est post euacuationes & febres, & factum à debilitate scies per superfluitates : & quandoque est à complexione calida, fit subito & cum inflatione, & frigida est econtrario, &c. Vide de his latius Arcul. & reliquos practiçantes, & inuenies quaecunque à me dicta sunt.

De cura sonitus & tinnitus aurium.

Quum curatio fiat per causae efficientis morbum ablationem, tunc si à percussione, uento, ebrietate, & à ceteris procatarticiis causis fiat . Causae primitivae per sua contraria remoueamur, & roboretur auris & cerebrum. Si morbus hic generetur ex quadam crisi uel

febre, primū discutienda erit febris, & cri-
 sis non prohibeatur, præsertim si ex se natu-
 ra præualeat: si minus, iuuetur: si uerò ab a-
 liquo particulari membro per consensum ori-
 retur, primū id quod transmittit membrum
 euacuabitur, & ad aliam regionem materia
 diuertetur, & eius membri lapsa tēperies per
 contraria permutabitur: deinde mēbrum reci-
 piens roborabitur, ut puta cerebrum cum oleo
 myrtheo, & auris cū oleo amygdalino ama-
 ro, &c. In cura uerò per se ex repletione ca-
 pitis ab humoribus crassis quatuor curandi
 erunt intētionēs, scilicet euacuatio, reuulsio ac
 deriuatio, humorū preparatio, ac eorū extir-
 patio, cerebri & auris roboratio, & regiminis
 institutio. Euacuatio fiet per ea quæ humorē
 superfluum euacuant, qualis est hiera colo-
 cynthidos, pilulæ fœtidæ chochiæ, &c. Re-
 uulsio similiter fiet cum clysterijs, frictioni-
 bus, & hæmorrhoidarum ac menstruum e-
 uocatione. Deriuatio post omnimodam e-
 uacuationem cum caputpurgijs, masticato-
 rijs, gargarismatibus, &c. Preparatio hu-
 morū præsertim pituitosorum fiet cum Syru-
 Hb.i.

po de stechade, de calamento, oxymelle simp.
 & cōposito, & cum reliquis quæ suprà me-
 morata sunt, & cum decoctis saluie rosmari-
 ni, uiolarum, betonica, maiorana, ruta, origa-
 ni, &c. Humorū extirpatio perficitur cum
 pharmacis in euacuatione nuper relatis, &c.

Roboratio cerebri & auris fiet remouen-
 do eorum discrasiam, cum sacculis ex milio,
 sale, & furfure, asperso potenti uino, torre-
 factis, aut cum fomentis ex camomilla, me-
 liloro, calamento, origano, stechade, absin-
 thio, aut cum pulueribus capiti adhibitis, ut
 puta cum speciebus pleris arcoticon Nic. &
 diamusci dul. aut cum his quæ in aurē infun-
 duntur, quale est oleum amygdalarum ama-
 rarum cum musco & nuce moscata, aut oleū
 de uitellis ouorū, aut castoreum in oleo rosa-
 ceo dissolutū. Victus ratio sit calida & sic-
 ca, pluuia, uenti, ebrietates & satietas nau-
 seatiua & uomitus uitanda sunt. Item mora
 sub radijs lunæ & solis, &c.

Loci consentientes de cura soni-
 tus & tinnitus aurium.

Auicē. quarta tertij, cap. 2, Sonitus creti-

cus non oportet ut moueatur, quoniam remo-
uetur cum remotione febris. In eo uerò qui fit
ob cōmunitatem, oportet ut intentio sit mem-
bri facientis ipsum, & propriè stomachi,
quare mundificetur & intendatur cerebro,
& confortentur auris & cerebrum cum oleo
myrrhino, auris uerò cum oleo amygdalino,
&c. Idem ait Mesu. cap. de sonitu. Paul.
lib. 3. cap. $\omega\epsilon\iota\ \eta\ \chi\omega\nu$, Si in febris aut ha-
rum crisis sonitus aurium euenerint, nul-
lum eis negotium facessere oportet, quippe ma-
gna ex parte statim finiuntur: si autem post
morbum perseverauerint, absinthij decocto fo-
ueri aures debent, & acetum rosaceum infun-
di, &c. De cura per se ex repletionem, quod
tot sint intentiones, quot diximus, lege Arcul.
& alios hac de re loquentes. Auen. loco
cita. Et similiter factum à repletionem, oportet
ut mūdificetur corpus & caput cum eo quod
scis, & subtilietur regimen, &c. Mesu. cap.
de sonitu, Quando fit per abundantiam &
repletionem in capite, cura eius est solutio &
euacuatio cum hiera diacoloquinthidos, &
chochys, & similibus, cū reiteratione & rei-
Hh. ij.

484 DE CONSEN. MEDIC.

teratione, &c. B. Intelligitur de materia minoratione ac eradicatione per hoc uerbum reiteratione duplicatum. De preparatione humorum & aliis intentionibus loquitur ibi Aet. ser. 6, Si adhuc remanet ampliori tempore, omnibus amaris & acribus & attenuantioris ac discussoriis utere, quæ paulò antea descripta sunt, &c. lege eum fusius. lege insuper Arcul. Sauo. & Gord. & Mesibi, Quando fit à uentositate grossa, conferunt caput-purgia, sternutationes post mūdificationem, &c. intelligens de deriuatione & de aliis, prout in ipso reperies, &c.

Obseruationes in cura.

Auic. quarta terti, ca. 11, Oportet ut omnes isti nitent balneum, solem, & uomitum & clamorem & repletionem, & ut leniant naturas, id est, uentres.

Curantia sonitum & tinnitum aurium.

Curant sonitum & tinnitum aurium, uapor aceti, absinthium cum felle bouino, fel capræ cū succo porri repido, colocynthidis de-

coctum in aceto, succus foliorum ebuli, fel
tauri cum succo porri, acetum decoctionis
hellebori, decoctio caricarum cum sinapi,
succus ruta in cortice granati tepesactus, va-
por decoctionis hyssopi cum ficibus, oleum de
been, cum adipe anatis, oleum liliorum albo-
rum, oleum violaceum, amygdalarum amara-
rum, decoctum lauri cum uino antiquo & o-
leo rosaceo, &c.

De prognosticis sonitus.

Galen. 3. de compos. med. per loc. cap. 1, Si
in febribus sonitus fiant, minimè curandi
sunt, ut plurimum enim statim sedatur. Hipp.
aphoris. 4. aphoris. 60, Quibus in febribus
aures obsurduerunt, sanguis ex naribus flu-
ens, aut alius turbata soluit morbum. B. In-
tellige de fluxu cretico, qui facilè adueniens
sonitum soluit. Hercul. Antiqui sonitus diffi-
culter sanantur: qui uerò ex natiuitate con-
trahuntur, nequaquam sanari possunt, &c.

De graui auditu & surditate.

Differunt inter se grauis auditus & sur-

Hb. iij.

ditas, quum hic t̃iũm diminutum, auditum, illa uerò omnimodã auditus ablationẽ significet. Hunc Græci κωφωσις, illam uerò δυνήκοις appellant.

Loci consentientes de graui auditu & surditate.

Auicen. quarta tertij, cap. 2, Omne auditus nocumentum, uel est ut destruaturs eius operatio, aut auditus minuatur, ita ut quis audiat quod non audit, &c. Lege Arcul. 9. almans.

De causis surditatis.

Omnis causa uel essentialis est, uel per compatiendi rationem. Si essentialis, aut auris pars aliqua lesa est, aut cerebrum. Si pars uel similis est, uel instrumentalis. Si similis, tunc uel ab intemperie, uel à soluta continuitate afficietur. Si instrumentalis, tunc ab obstructione aliqua, aut à tumore aliquo præter naturam innato, aut ab aliquo aduentitio, ut puta callo, carne, tuberculo, aut à sorde in auribus genita, aut ab humoribus crassis, uel à flatuoso spiritu occupate ob-

oriatur. Si causa sit per cōpatiendi rationē,
tūc uel à toto, sicuti in febribus, ex quibus ua-
pores ad aures deferuntur: uel à crisi iam fa-
cta, uel à membro particulari propinquo &
remoto, sicut à cerebro & à stomacho. Item
fiunt surditates ex paucitate & crassitie spi-
rituum, uel à consumptione corporis, &c.

Loci de causis surditatis & gra- uis auditus.

Galen. 4. de sympt. caus. cap. 3, Grauis au-
ditus & surditas animanti euenire solent,
aut ob auris partem aliquam, aut ob neruum
à cerebro descendentem, aut ob cerebrum
ipsum, si eadem in parte, unde neruus oritur,
lesum fuerit. Proinde harum partium morbi
ab illis huc transferendi sunt, ut ij, qui ad si-
milares pertinent, ex intemperie & conti-
nui solutione aestimentur: qui uerò ad instru-
menta ex obstructionibus, siue ipsarum par-
tium tumor aliquis præter naturam meatum
obstruxerit, utputa abscessus, phlegmone,
œdema & scirrhus, siue aduentitius, isque o-
mnino præter naturam tumor in meatu
Hb. iiij.

ipso oriatur, ut quum callosum uel carnosum innascitur tuberculum. Atque huc pertinet sordes, quæ creberrimè in auribus gigni consueuerunt. Auicenn. quarta tertij, cap. 2, Nocumenta auditus aut sunt complexionalia, aut instrumentalia, aut resolutiua. Singularitatis nocumentum in neruo auditus interdum accidit per omnes causas ægritudinum similium partium & instrumentalium & solutionis continuitatis. A Egritudines consimilium partium in ipso sunt, unaquæque specierum malæ complexionis singularis & compositæ. Et quandoque fit unaquæque earum absque materia, & quandoque cum materia melancholica, cholericæ, phlegmaticæ, ex phlegmate crudo & uentoso. Instrumentales sunt sicut oppilatio, quam facit humor, aut sanies, aut apostema, &c. Lege eum fusius. Hericulus. 9. almans. Defectus etiam spirituum seminis quum sunt crassi, est causa grauedinis auditus, & similiter paucitas spirituum, & corporis exiccatio & consumptio. Vide de his Mesu. cap. de surditate. Item Gord. & Sauona.

De signis surditatis & grauis
auditus.

Et si per se surditas manifesta sit, nec alijs indigeat indicijs, nihilominus an per essentiam uel per consensum fiat, nisi indicia cognoueris, non facile rem percipies. Cognoscuntur igitur quæ fiunt per essentiam absente totius uel partis mala dispositione: e contra uerò si per consensum, ex totius & partis prægressa ægritudine, qua aucta surditas augebatur, & remota remouebatur. Cognoscitur etiam obstructio tantum ex intuitu sub radijs solaribus. Cognoscitur fieri ex materia frigida, crassa, ex grauitate & loci frigiditate, ex commotione cum sonitu: & quia læsio cū frigidis augetur, cognosces causam esse in neruo auditorio ex dolore. Cognoscitur ex crisi, fieri per præcedentem morbum ad aures terminantem, & eo quòd crisi finita remouetur auditio grauis, &c. Reliqua signa ex relatione infirmi manifesta erunt. Cognoscitur à flatu fieri ex sonitu & tinnitu.

Loci consentientes de signis
surditatis.

Auicē. quarta textij, ca. 4, Factum à com-
munitate cerebri significat dispositio in re-
liquis sensibus, sicuti in uirtute matrice: præ-
terea præcesserunt nocumenta cerebri, sicut
sirsē & intellectus cōmixtio, & reliqua quæ
dicta sunt in cap. de ægritudinibus cerebri,
similiter de reliquis plura habet Auicē. quem
fusiùs legere poteris. Lege insuper Arcul. nam
si omnes ad unguē recitare uoluerimus, præ-
terquàm deceat, in mora essemus.

De cura surditatis & grauis
auditus.

Si à nuda intemperie surditas prouenerit,
per alterationem in contrarium sanabitur,
aurisque roboratione ac regimine contrario
discrasie indigebit, facta tamen aliquali re-
uulsione, si humorum fluxus timeatur. At si
fuerit frigida intemperies, calidis remedijs cu-
rabitur, utpote cum oleo laurino, costino, a-
mygdalino amaro in aurem infuso. Robora-
bitur auris, si his aliquialiter styptica adhi-
beantur. Similiter calida intēperies cum oleo

rosaceo, cum aliquantulo aceti bullito curabitur. Si uerò ab intēperie cum materia morbus fiat, cogitandum est in primis de qualitate humoris, deinde an principaliter in aure contineatur, an aliunde transmittatur. Et tunc in curatione scopi erunt quinque, euacuare scilicet, reuellere, membrum mandans corrigere, deinde causam coniunctam educere & resoluerē, denique discrasiam alterare, & regimen in contrarium instituere. Calida igitur intemperies cum materia euacuabitur per *χολάγωγα* pharmaca, sicut cum decoctione fructuum, rheubarbaro, pilulis aureis, &c. Frigida materia per sectionem uena uel cum chochys & agarico. Reuellitur etiam materia, ac deriuatur per masticatoria, per errhina, caputpurgia, & per ea quæ pluries à me dicta sunt, imò etiam per cauteria cōmissuræ coronali applicita. Corrigitur membrum mandans euacuando, corroborando, & eius intemperiem alterando. Causa coniuncta resoluitur in causa frigida per exercitiū, clamores, & uociferationes in aure, uel per ea quæ in aures inijciuntur,

492 DE CONSEN. MEDIC.

uel extrinsecè applicantur, ueluti sunt suffumigia, emplastra, &c. uel lotiones cum aqua thermarum. Regimen in contrarium ordinetur, &c.

Loci consentientes de cura surditatis.

De cura surditatis sine materia loquitur Auicenna. quarta tertij, tra. 1. cap. 5. ibi, Quòd si illic est caliditas tantum, tunc cum infrigidantibus curetur ex oleis & alijs, aut succo granati, ita ut bulliat in cortice suo cum aliquantulo aceti, thuris, & olei rosacei, & destilletur in ipsam aqua lactucæ aut salatri. Illi uerò quod factum est à frigore conferunt omnia olea calida, in quibus sit dissolutum castoreum, &c. De cura intemperiei cum materia, Alexander libro primo, cap. 32. inquit, Quando biliosi humores ad caput delati surditatem inducunt, non difficulter succurritur, modò uenter per *χολαγγογὰ* sedulò euacuetur. At si malum ex crassis & crudis humoribus oriatur, principio statim medicamento purgante euacuandum, ut puta cum oxymelle Iuliano, uel hiera, uel eo quod cō-

stat ex euphorbio. B. De hac cōpositione que paratur ex euphorbio, meminit Mesues cap. de surditate, & modum parandi docet: sed in pondere ipse decipitur, quum loco scrupulorum quatuor usque ad sex, ipse à quatuor dragmis usque ad septem in duo sorbili exhiberi iubet, quam quantitatem uix oui cortex absque uitello & albumine caperet. Auic. loc. cit. In eo quod est cholericum oportet ut euacuetur cholera cum solutio uentris: nam ut plurimum cum solutione uētris surditas remouetur, si uera materia frigida, &c.

Paul. lib. 3. cap. αὐτὸ δὲ συνηκόας καὶ κωφώσεως, At ex crudis crassisque humoribus prognatas surditates, uel grauem auditum uenæ incisione curato, aut omnino purgatione ex hiera.

De reuulsione habes Alex. locum in primo lib. cap. 32. ibi, Purgatione uerò egregiè facta, utendum est apophlegmatismis, quibus per os capitis pituita purgatur & ἐπὶ πρῶτο καὶ μετὰ πρῶτο, &c. Vide de his latius Mesuen. & Arcul. De resolutione loquitur Auicenn. loco supracitato ibi, Et ex-

exercitium est uehementis iuuaminis, & similiter uociferatio uehemens in aure, & clamores buccinarū: & quādoque ponitur in aure caput embubæ, ut ad ipsam peruenire faciat uaporem decoctionū resoluētium, & confert succus rutæ cum melle & castoreo, &c. Obseruentur quæcunque dicta sunt in capite de dolore auris.

Conferentia & acuentia auditum.

Confert & acuit auditum uapor, siue fumus aceti, succus aristologiae cum melle, succus foliorum capparorum, uel oleum decoctionis eius radice, castoreum, cucumeris asinini succus, acetum decoctionis hellebori nigri, flos acris qui ex eo albus est, tritus & insufflatus, delet antiquam surditatem. Auic. oleum decoctionis seminis laureolæ, mercurialis cum uino instillata serpentaria, suffumigium sulphuris, radix brioniae & uitis albae, oleum laterinum, albuchaßis, oleum cucumeris saluestris, amygdalarum amararum de been, oleum laurinum, sotira Nicolai injecta auditum reddit, theriaca magna, pi-

lula aggregatiua, hieralogodion, & fel, & urina caprae cum galbano.

De prognosticis surditatis.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 28, Quibus biliosa deiectiones superueniēte surditate cessant, & quibus surditas superueniētibz deiectionibus cessat. B. Intellige cessare surditatem ex deiectionibus, praesertim si a febribus uel bile ad cerebrū mota ipsa fieret: nam in ceteris casibus locū nō haberet Aphorif.

Paul. lib. 3. cap. cit. Quae ab origine, uel à prima natali die, sed longissima & absolutae surditates constituuntur, nullo remedio eliduntur. Quae uerò non absolutae, sed diuturnae sunt, ipsae etiam nullam curam recipiunt, aut certè difficillimam, &c. id est, quae ab origine fiunt surditates, arte curari non possunt: siquidem neruus auditorius meatum fortè non habet, unde species soni hauriat. uel si habet, locum fortè non occupat, quem iure possidere deberet: aut uehemens adeò inest obstructio ex carne oborta, ut minimè curationem admittat. Vide de his Mesuen.

496 DE CONSEN. MEDIC.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 60, Quibus in febris aures obsurduerunt, sanguis ex naribus fluens aut alius turbata soluit.

De Parotidibus.

Parotides sunt abscessus post aures de genere inflammationum, quæ accidunt in carnibus glandulosis, sicuti in emunctorijs.

Loci consentientes de parotidibus.

Paul. lib. 3, Parotis est glandularum sub ipsis auribus passio. Gal. 3. de comp. med. per loc. cap. 2, Parotides ex genere inflammationum sunt, fiuntque glâdulis circa aures affectis. Iridem ait Aet. ser. 6. cap. 89. Auicenn. quarta terti, cap. 24, Hæc apostemata sunt ex genere apostematum accidentium in carnibus mollibus & propriè glâdulosis, & nominantur nascentia auris, &c.

De causis parotidum.

Parotides uel à parte uel à toto fieri possunt. A parte, obstructis in capite humoribus: à toto corpore, si qua fuerit crisis in se-

bribus. Hoc autem contingit ob eam quæ est in febribus caliditatem, relata multitudine ad caput. Fiunt interdum à materia sanguinea aut biliosa, interdum à pituitosa, aut melancholica, aut uenenosa iuxta semitam epidimiae, &c.

Loci de causis parotidum.

Paul. lib. 3. cap. 23, Parotis fit à materia morbi illic emanante, modò à capite humoribus in eo obstructis, modò à reliquo corpore in febribus crism expertis oritur, &c. Quòd in febribus ob earum caliditatē fiunt abscessus, lege 4. aphor. Gal. cōment. 31. ibi, Lassitudinē habetibus in febribus, &c. Aulic. loc. cit. cap. 23, Et hæc apostemata omnino fiunt à materia sanguinea aut cholericæ, & quandoque melancholica aut phlegmatica, & quandoque ex his mixta. Vide latius in hoc Arcul. & reliquos practitantes, &c.

Alexan. lib. 1. cap. 34, Parotidum igitur aliæ originem ad copiosum sanguinem referunt, aliæ ad tenuem calidum & biliosum humorem, aliæ ad gelidum crassumque succum, &c.

De indiciis parotidum.

Si fierent à sanguine, rubor loci, dolor, febris sequens, caliditas, grauitas, manifestè indicant. Si à bile, erysipelas, dolor punctorius, uel mordicans, febris succedens, color pallidus, pauca grauitas aderit. Si à pituita in compressione aderit inundatio, color albus, uel rubedo ad albedinem decliuus, dolor non intesus, nec sequitur febris, nisi dum pus conficitur, adest etiam grauitas. Si à melancholia, durities, nullus ferè dolor & color liuidus ostendunt.

Loci de indiciis parotidum.

Auic. loc. cit. Significant quod est sanguineum rubedo & grauitas, & expulsio eius apud compressionem, & constrictio in meatibus, & significant cholericum ex sanguine subtili, dolor mordicatus, fistulosus, id est corrosiuus sine grauitate multa, &c. Alex. loc. cit. loquitur etiā ipse de his indicijs, ibi, Quæ feruentis humoris plenitati adscribuntur, dolores intentissimos pariunt: quæ uerò tenui subtilique humori erysipelaceas inflā-

mationes referunt, nulláque gravitate, neque dolore locum excruciant, &c. de alijs indicijs lege latius hunc locum.

De cura parotidum.

Cura eisdemet præsidys, quibus alios abscessus curare solemus, perficitur, præter quod nec styptica, neque repellentia in morbi principio conveniunt: verùm sanguine exuberante prius sectionem uenæ moliemur, quæ peracta considerandum num parotides in tumorem attollatur, an adhuc altius delitescant: si in tumorem erumpant, tunc lenientibus mollientibusque, ac digerentibus medicamentis utemur, qualia sunt quæ ex farina hordeacea, ex semine lini, fœnigræci, althea, camomilla, lapathio, & infusa axungia parantur. Si uerò altius delitescant, tunc natura cum attractorijs præsidys, ueluti cum cucurbitula & foriũ crebro usu, adiuuanda erit. Si uerò abscessus ad suppurationem se conferat, pus mouëtibus utemur: deinde scissa cute pus excerni cogemus: quòd si dolores interim agrum molestant,

Ii.ij.

his dolores mitigabimus quæ moderatè humectant ac calefaciunt, &c.

Loci de cura parotidum.

Auic. quarta tertiij, cap. 25, Oportet ergo ne intendas ad curam eius in quantum exiguur ad curam apostematum, adhibendo styptica & apocrustica in principio, deinde compositionem regiminis, deinde resolutionem puram. Imò oportet ut incipias, & propriè quando accidit in febris cum dolore capitis, & adiuues ad extrahendum materiam ad apostema cum omni ingenio & cum uentosis, &c. Galen. 3. de compos. med. per loc. cap. 2, Non utimur in parotidibus, ut in alijs partibus inflammatis, in principio repellentibus, sed uice uersa attractorijs, ut affligentem humorem ex profundo ad cutem attrahentes, naturæ opem feramus, &c. Vide latius Aet. ser. 6. cap. 89. Paul. lib. 3. cap. cit. Si igitur altè adhuc delitescens parotis in tumorem non attollitur, natura debet adiuuari præsijs, quæ coactas sordes extrahant, uel etiam cucurbitula adglutinata, uel crebro focuum usu. Sin in-

flammatione tentata in tumorem erumpat,
 ys quæ leniunt, & concoquunt, utemur ca-
 taplasmatibus: at si sanguis exuperare uidea-
 tur, prius sectione uenæ ipsum euacuabis: de-
 inde medicamentis utere, quæ puri mouendo
 sunt: & ubi abscessus ad suppurationem spe-
 ctarit, cute descissa pus excernetur, uel acris
 medicamento erumpetur, &c. Vide Alexan.
 Tral. longè fusius de singulis his tumori-
 bus differentem.

De mitigando dolore lege Auicem. ibi, Si
 fuerit initium eius cum dolore uehementi, sis
 contentus uaporatione, &c.

De prognosticis parotidum.

Auic. loc. cit. Et fortasse cōsequitur quan-
 doque ex uehementia doloris eius ut interfi-
 ciat, & apostematum, quæ fiunt sub origine
 auris, illud est magis incolume, quod est secū-
 dum semitā bonæ crisis. Illud uerò quod est à
 crisi, cū qua non est signū maturationis, aut
 præcedit bonā crisis, est malū, &c. B. Ratio
 est, quia quæcūque ante materiæ cōcoctionē
 à natura fiūt crises, malæ sunt: quæ uerò coctæ

materia, bonæ: nam satius est naturam uincere, quàm uinci. Paul. loc. cit. Si in altum recurrat colluuiæ, periculum haud mediocre subsequuturum est, &c. Lege etiam de his fusiùs Arcul. & Sauonarolam.

**De narium affectionibus, & primò
de polypode & ozena.**

Tres inueniuntur narium propemodum similes affectus, Sarcoma, quod in descriptione polypi ponitur, Ozena & Polypus. Sarcoma, est præternaturale incrementum carnis in naribus. Ozena uerò, est ulceratio profunda in naribus retri odoris atque halitum emittens. Polypus uerò, est quoddam sarcoma simile polypis piscibus: nam sicuti illi multas habent propagines, mollèsque sunt atque augentur, ita hic quoque affectus. Differt tamen sarcoma à polypo magnitudine tantum & opificio, &c.

Loci consentientes de polypode & ozena.

Gal. 3. de compos. med. per loc. cap. 3, Et

Paul. lib. 3. cap. 24, Polypus tumor est præter naturam in naribus ortus, polypodis carni similis iuxta substantiæ proprietatem. Ozena uerò, ulcus est putridū ex humorum acriū illuue creatum. Gal. lib. finit. med. differentiā inter polypum & sarcoma enarrat. Auic. nullum agit de polypo caput, nisi illud sit in quo de hæmorrhoidib⁹ & alharnaberh agit, ubi carnes esse in naso additas asserit, nec de ozena sermonem facit, nisi fortè in capite ulcerum nasi cõtineatur. Vide latius Gal. 3. de compos. med. per loc. cap. 3. ibi, Ex genere tumorum præter naturā polypodes in naribus generantur, &c.

De causis polypodum & ozenæ.

Ozenæ cæterorūque ulcerum ac tumorū causæ esse possunt multiplices, sicuti à uulnere, ab abscessu, ab humorum acrium influxu, à uaporibus acutis paulatim rodentibus, donec ulcera pullulent. Causæ etiam esse possunt quæcunque hæc omnia irritare possunt. Similiter polypodes fiunt ex humoribus crassīs à cerebro ad nares influentibus.

Li. iiij.

vel ex ipsarum narium nutrimento, à facultate nutritoria & auctrice, in carnem mutato, &c.

Loci de causis polypodum & ozenæ.

Gal 3 de cōpos. med per loc. cap. 3, Manifestum est affectionem hanc polypodis ex crassis & viscosis humoribus generari, & ozenæ ex humorum acrim & putrescibiliū influxu generantur, ita ut si acres solū sint, agrè curabilia ulcera producere consueverunt, non tamen graueolentia. Auic. quarta tertij, de ulcer. in naso cap. 3, Quandoque generantur ulcera in naso ex uaporibus acutis aut malis aut catarrhis acutis, &c. De his legito accuratius Alexand. lib. 1. cap. 35, Et Paul. ibi, Ozena est ulcus ex humorū acrim illuue creatum, &c.

De polypodis & ozenæ cura.

His ambobus curandi scopus idem est, ut primum corpus euacuetur, materiâque per reuulsionem ac derinationem adhuc fluens

intercipiatur, caputque firmetur ac corroboretur: quo corroborato ad narium curationem progrediendum, ita ut in ozenis affecta pars tum per repellentia, tum discutientia pharmaca resiccetur, sed in polypo partim adstringant, partim siccant ac extenuent, partim discutiant ac condensent. Si igitur totius corporis humorum copia indicia adsint, euacuatio prius aut per sanguinis missionem, aut purgatione per hieram perficitur: deinde loco indantur remedia. Cura ozenæ erit prout de ulceribus aurium dictum est. Polypodis uero cura fiet, si cum filo tenui ligetur, & in radice sua incidatur: & ubi æger manulem abominatur operationem, procurandum est ut acris medicamentis polypus extirpetur, sicut cum puluere corticum granatorum, arsenico, ære ustis, nitro, cathartidis, &c.

Loci de cura polypodis
& ozenæ.

Gal. 3. de compos. med. per loc. cap. 3. Cæterum curatio utriusque his communis ozenæ

Et polypodi, ut primum caput siccetur, fir-
 metur, et corroboretur, quum palam sit, ob-
 uitiatorum humorum redundantiam deflu-
 xum ex eo provenire: quo roborato, ad naris
 curationem progredieris, scopo in oxenis pro-
 posito, ut affecta pars per mixta facultatis
 pharmaca, tum repellentia, tum discutiencia,
 resiccetur. Repellunt austera et acerba, quae
 adstringentia dicuntur: discutiunt uero cali-
 da et sicca facultate praedita. Similiter in
 polypode mixta materia medicamentaria
 opus est, ut partim astringat, partim siccet
 et attenuet, partim discutiat et condenset,
 etc. Paul. lib. 3. cap. 24. itidem ait, ibi, Quum
 totius corporis humorum copiae suspicio fue-
 rit, haec prius aut sanguinis dimissione aut
 purgatione ex hiera euacuetur, etc. Auic. et
 Mes. curationem polypodis manualet docet,
 per incisionem et cauterium cum ferro igni-
 to, aut acri medicamine, quos, si lubeat, leges.
 Hercul. recitat ung. de quo, inquit, modernos
 se profiteri omnem polypum et carcinoma
 curare, et est medicina fortis, cuius operatio
 durat tribus diebus, sed circumstantes partes

cum defensiuis & siccis frigidis defendan-
tur, cuius descriptio hæc est. R^x cātharidarū
p.i. arsenici sublimati p.5. uel plus & minus,
prout fortius aut imbecillius operari desi-
deras, & cum oxymelle simplici aut sapone
nigro fiat unguentum: caue tamen membra
principalia: nam tota uis in arsenico repo-
nitur, &c.

Polypum & ozenas curantia.

Faciunt ad remotionem polypi, puluis an-
timony, arsenici, aristologia, calcanti, cicla-
minis, dragontea, æris usti, floris æris cū melle
uel succo serpentariae, succus mali granati,
uidelicet granorum eius acetosorum cum os-
sibus suis cum melle coctus ad spissitudinem,
hermodactilus cum ære usto. Faciunt etiam
ad ulcera narium, aloes, aristologia, auri pi-
gmentum, ciperus, ciclamen, licium, planta-
go, sicla, sumach, bleta, &c.

De polypi & ozenæ prognosticis.

Auic. quinta tertij, ca. 2, Carnes additæ sū
sunt, molles, albæ, & nō sit in eis dolor, sūt fa-

cilis curationis. Quæ uerò sunt rubæ aut fus-
 scæ, uehementis doloris: cum sanie fætida,
 sunt difficilis curæ. B. Molles, quia pituitosæ
 facillè curationem admittunt, sed liuidæ diffi-
 culter, quum canceri propemodum naturam
 sapiant. Mesu. cap. de polyp. nar. Polypus qui
 fit in naribus durus, niger, et non tractabi-
 lis, et mollis et putridus et fætidus, fortasse
 nõ sanatur: sed qui elögatur et pëdet, habēs
 radicem gracilem, non nimis profundatam,
 curatur per incisionem, etc.

De dolore dentium.

Manifestum est quid dolor sit dentium,
 sed locus doloris adeò latet, ut uix à medico
 diuinari possit. Quæ de re triplex erit dolo-
 ris locus, aut in substantia ipsius dentis, aut
 in neruo ad radicem dentis prostrato, aut in
 gingiuarum substantia inflammationem pa-
 tiente, etc.

Loci consentientes de do- lore dentium.

Gal. 5. de compos. med. per loc. cap. 8, Ex

dentium affectionibus aliqua euidenter apparent, ueluti quum perforati, denigrati aut dekriti sunt, aut frigida nec calida ferunt, sed ab utrisque aut ab altero solo dolor eis contingit: aliqua non manifestè apparent, ueluti quum circa corpus dentis in profundo obortus sentitur, &c. lege de his Paul. lib. 3. cap. 26. & Auic. septima tertij, cap. 4.

De causis doloris dentium.

Causa doloris dentium aut est mala intemperies, aut soluta continuitas. Si mala intemperies, uel nuda erit, uel cum materia: quæ si fuerit multa, partes extendens, dolorem excitabit: si uerò pauca, tenuis & acris, tunc ulcus inde orietur, & per consequens dolor: at si erit intemperies nuda absque materia, tunc erit uel flatuosa, uel nimis calida & frigida, &c.

Loci consentientes de causis doloris dentium.

Auic. septima tertij, cap. 4, Causa doloris dentium sunt aut malitia complexionis pura

§10 DE CONSEN. MEDIC.

cum frigore & calore, aut est cum materia aut uentositate: si cum materia, uel hæc est multa uel pauca, crassa uel acuta, aut materia apostemans dentem, uel erodens, uel uermem nasci faciens, & tunc uel à capite, uel à stomacho, uel à toto, ut in febris materia descendit, &c.

Galen. 5. de compos. med. per loc. cap. 8, Perforantur dentes ex acrium ac rodentium humorum influxu, uelut ulcera in cute citra externam causam: similiter dentes liuidi siue denigrati ex humorum uitiatorum influxu fiunt, &c.

De signis doloris dentium.

Dentes esse affectos cognoscimus ex sua nigredine uel corrosione: sed si in suo permanserint colore, inquirendum est, num malus color in gingiua uideatur, aut si tumida, aut quid erosionis uel putrefactionis in se habeat: nam tunc ex se dens non dolet, sed ex mala affectione in gingiua: uerum si nihil horum adfuerit, coniecturandum est affectionem esse in ueruo, præsertim si dolor in

IN CVR. MORB. LIB. II. 511

profundo sentiatur. Cognosces etiam hæc, si gingiuam gingiue, uel dentem denti comparaueris: ita etiam mala intemperies siue calida siue frigida, per colorem cognoscitur, ut si pallida, rubea, alba, item ex applicitis, iuuantibus ac nocentibus, &c.

Loci consentientes de signis doloris dentium.

Gal. 5. de comp. med. per loc. cap. 8, si dentes liuidi per omnem suam substantiam facti appareant, nihil mirum est ipsos quid inflammationi simile pari, &c.

Auic. septima tertij, cap. 5. omnia ferè recitat quæ à me nuper relata sunt. Vide insuper Arcul. 9. almans. & Mesu. cap. proprio.

De cura doloris dentium.

Cura duplex est, uniuersalis & particularis. Vniuersalis in se continet euacuationem, reuulsionem, & fluxus cohibitionem. Euacuatio fit uel per sectionem uenæ, aut uentris solutionem, præsertim ubi abscessus aliquis, aut sanguinis copia in causa fuerit. Secetur

512 DE CONSEN. MEDIC.

igitur primū uena cephalica, deinde quæ
sub lingua latet. Reuulsio fiat cum cucurbi-
tulis & extremarum partium frictionibus,
&c. Fluxus cohibetur per pilulas alchaiber
nominatas. Cura particularis duplex, regu-
laris & coacta. Regularis erit in materia ca-
lida, ut primū destillationes repellantur
cū frigidis, sicut rosa, myrtho, cāphora, &c.
deinde repellentibus discutientia cōmiscean-
tur, & in fine resoluentia & maturantia,
prout ad inflammationem pluries dictum est,
adhibeantur. Cura coacta consistit in aufe-
rendo sensum, quo ablato dolor sedatur. Si
uerò inflammatio fuerit in neruo dentis, tunc
dens eradicandus erit. Si uerò præ mollitie
dens erosus sit, reddere oportet eum duriorē
per austera & acerbā medicamina. Si liquidi
& nigri, per resiccantia pharmaca.

Loci consentientes de cura
doloris dentium.

Galen. 5. de compos. med. per loc. cap. 8,
Erosiones dentium, siue cauernæ, per exicca-
tionem influentis humoris uitiosi sanantur:
qui si paucus fuerit, ex localibus auxilijs

IN CVR. MORB. LIB. II. 513

exiccātibz medela sufficit: si multus influēs humor, uniuersi capitis rationem habere conuenit: sed si caput à reliquo corpore afficiatur, totius corporis cura gerenda est. Porro erosos dentes, qui prae molliē perpeſsi sunt, reddere oportet duriores per austerā & acerbā medicamentā. Simili etiam cura indigent liuidi & denigrati cum perforatis per resiccantia pharmaca, &c. Auic. septima tēry, cap. 6, Inquirendum an per se uel per cōsensum fiat dolor: si per cōsensum, incipe ab euacuatione membri consentientis cum phlebotomia, & uentris solutione, cum hiera aut scamonio: si uerò per se, cum scarificatione, & similibz: deinde si materia calida, cum frigidis: si frigida, cum calidis: si sicca, cū humectantibus & dolorem lenientibus: si fuerit in causa siccitas, confert ut fricetur dens cum butyro & adipe anatis, &c. Mesu. Intentio in cura duplex est, uniuersalis & particularis: uniuersalis habet tres res, prima est euacuatio, &c. Vide eum fusius: uide etiam Arcul. 9. almans. cap. proprio, & alios practi- cantes, &c.

Kl. i.

Obseruatio in cura doloris
dentium.

Gal. 5. de compos. med. per loc. cap. 9, In dolore dentium citra gingiuarum inflammationem, siue in proprio dentium corpore, siue in neruo dolor fiat, uehementissimus opus est medicamentis, siue quis uelit repellere, siue discutere doloris causam, siue humor sit, siue uentus, & propterea omnia acerrimo aceto preparentur, &c.

Nocentia dentibus.

Nocent dentibus, brassica, dactyli, gumæ, granata dulcia, lac, nix, porrum, raphanus.

Curantia dolores dentium.

Ad dolorem dentium ualent acetum, uini decoctionis acetosæ, acorus, aphodillus, allij decoctum cum pini ligno & olibano, alumen, amygdalarum folia in aceto cocta, asfa been, betonica, borax. Pulsationem dentis mirabiliter tollit chameleontis nigri decoctio, cappares, lac capræ, radix chelidonia, cypressus, colocynthis, cornu cerni decoctum,

IN CVR. MORB. LIB. II. SIS

radix cucumæ masticata, hedera, galla, gith,
gramē, lacca, malua, melissa, mezeron, morus,
nasturcium, peucedanū, pinus, pyrethrū, por-
tulaca, rosmarinus, sandaraca rosa, ruta, su-
mach, saxifragia, hyssopus, sparagus, oleum
uermium terrestrium, myrthinum, de citro, de
uitellis ouorum, oleū benedictum Nic. & dē-
tifriciū Democriti. Auic. tra. 4. sum. 2. 5. me-
dicamen Andronici. Auic. eodem in loco. mi-
tridatū Nic. Sotira Auic. prima quinti, &c.
Reseruant ad dolorem dentium, succus cepa-
rum, sanguis testudinis marinæ fricatus, &c.

De doloris dentium pro-
gnosticis.

Auic tertia tertij, cap. 5, Si affectio fuerit
in gingiua, nunquam remouebitur dolor cum
dentis extirpatione: si uerò in neruo fuerit,
nec per remotionem dentis interdum remo-
uegur, & interdum iuuat. B. Quòd dentis
eradicatio minimè utilis sit, omnibus no-
tum est: at si in neruo fuerit, exempto dente
facile curatur, quum materia quæ prius cum
dente erat retenta, exitum habeat: non iuuat

Kl. ij.

interdum, quum materia sit crassa & nervo
nimis adhæreat, &c. Hipp. 4. aphor. aphor.

53, Quibus circa dentes in febribus quidam
lentoires nascuntur, ijs fortes fiunt febres. Le-
ge etiam prognost. 1. rex. 24. ibi, Si quis stu-
deat dentibus non consuetus à pueritia ita
facere malum.

Authores erronei dissentientes circa dolores dentium.

- 1 Adserere, dentes per se dolorem posse pati
cum roat primo thesifir.
- 2 Adserere, dolores dentium magis affici à
calido, quàm à frigido.
- 3 Adserere, dentes ab alijs ossibus non dif-
ferre.
- 4 Adserere, in dentibus non posse aposte-
ma spurium fieri.

Confutatio dissentientium circa dolores dentium.

Ad primum, Arist. 1. & 3. de anima, Pilis,
ossibus, unguibus nullus est sensus, quum sint
naturæ terreae, propter quod etiam plantæ

nullum habent sensum: sed dētes sunt ossa per
 Auic. prima primi, cap. de anoth. ossium, &
 secundo de generatione animalium cap. 6.
 igitur dolorem non patiuntur: nec obstat di-
 ctum Gal. 3. de sympt. cau. nec Arist. pro-
 blem. 2. & 3. cap. 6. problem. 22. ubi habe-
 tur, quòd dentes celeriter & dolent, & sen-
 tiunt frigus & sic patiuntur: nam hoc non
 per se, sed potius per accidens euenit.

Ad secundum, Hip. aph. 5. aph. 18, Frigi-
 dum inimicum ossibus, dentibus, nervis, cere-
 bro, spinali medullæ, calidum uerò utile, ubi
 Gal. Quæcunque partes sunt natura frigi-
 diores & penitus exangues, citius ac magis
 à frigido offenduntur, quàm à calido, &c.

Ad tertium, Arist. 2. de generatione ani-
 malium cap. 6. & 2. de anima, inquit, quòd
 ossa non crescunt, ibi, Omnium natura con-
 stantium impositus est finis magnitudinis &
 augmenti, sed dentes crescunt, ut patet expe-
 rientia, igitur ab alijs ossibus differunt: alio-
 qui in contritione & contactu, nisi cresce-
 rent, omnino contriti perderentur.

Ad quartum respondet Serapio, 2. de den-

Klx. ij.

tibus, ibi, Si dentes in suo toto corpore uiriditatem accipiunt, tunc non mirandū si consequatur eos, quod simile sit apostemati. Vel dic posse apostemari per uiam congestionis, id est, ex superfluitate nutrimenti, non per uiam rheumatis, sicut alia apostemata. Lege Concil. dra. 96.

De gingiuarum affectionibus.

Accidunt gingiuis inflammationes, ulcera serpentia, parulus & epulis. Inflammatio est calidi sanguinis influxus. Parulus, est alicuius partis inflammatio, quæ nisi discussa fuerit, in suppurationem uertitur. Epulis, est carnis excresecientia, quæ ab inflammatione contracta ad intimos molares dentes pertinet, nõnunquam cum febre & dolore, &c.

Loci consentientes de gingiuarum affectionibus.

Gal. 6. de comp. med. per loc. cap. 1, Inflammatio est calidi sanguinis influxus, &c. Aer. ser. 8. cap. 24, Parulus est inflāmatio alicuius partis gingiuarum cum tumore, quæ ubi non dissoluitur, suppuratur. Epulis uerò, est ex-

crescentia carnis ab inflammatione consequuta, iuxta interiorem dentem molarem, aliquando cum febre & uehementi dolore internarum mandibularum, ut neque os agro aperire liceat, contingens, &c. Lege de his etiam Paulum.

De causis gingiuarum affectuum.

Causa uel est extrinseca uel intrinseca: si extrinseca, tunc erit uel pluuiosa constitutio calida & humida, uel ceteræ dispositiones ad humorum putredinem paratæ. Si intrinseca, uel à parte ortū habet, uel à toto: à parte, sicuti à capite uel à stomacho: à toto, sicuti in febribus, uaporibus scilicet ad gingiuis peruenientibus, ex quibus ulcera & inflammationes oriuntur, eo quòd in hac oris partes tam tenues & debiles facillimè imprimantur, &c.

Loci consentientes de causis affectuum gingiuarum.

Auic. octaua tertij, cap. i, Gingiue accidunt apostemata causa materiei descendētis ad ipsam secundū plurimum ex capite, & quā-
Klx. iij.

doque ex communitate stomachi, & quandoque accidunt in principio hydropisis ex malitia formæ ob id quod ex uaporibus corruptis ad eam eleuatur, &c.

De signis affectionum gingiuarum.

Cognoscitur humor putridus per colorem & tactum: nam cognitio nostra quæ per uisum quandoque decipitur, ex tactu interdum certior fit: ex tactu enim omnes qualitates percipimus, ut durum, molle, calidum, frigidum: interdum inflammationes & ulcera per se manifesta sunt, & plerunque cū febre fiūt.

Loci consentientes de signis affectionum gingiuarum.

Auic. loc. cit. Et significatur genus materiei per colorem & tactum, & quandoque sunt ex eis manifesta, recentia, uelocia ad suscipiendam curam, &c.

De cura affectionum gingiuarum.

Vbi totum corpus apparuerit aut multitudinem humorum refertum, aut eorum malitia uitiatum, primum antequam ad topica per-

uenias, per sectionem uenæ, per purgationem ac inediam curabis: quū uerò ad topica accesseris, duo scopi erunt considerandi: alter ab ipsius affectionis indicatione, alter à particula quæ curatur natura. In ipsa affectione conuenit ut in principio id quod influit, repellatur. Repellentia sunt quæ adstringendi uim habent, post principium usque ad morbi finem pharmaco opus est repellente & discutiente, sed primo tempore adstringens præcellat, in fine uerò discutiens, intermedio tempore æquales utriusque partes sint. Si uerò quid induratum de inflammatione relinquatur, non sunt adstringentia cum discussorijs miscenda, sed ita curandum, ut concoctoria præcedāt ad discussoria. In particula natura, consideretur superficiem oris esse cuterorum corpus ambiente molliorem ac rariorem. qua de re non fortibus auxilijs indiget, &c. Cura parulidis fiet per discussoria, antequam suppuretur, sicuti per collutiones ex decocto seminis lini, sed epulidis inflammatio cum discussorijs ac siccis deprimentibus auferetur, &c.

Loci consentientes de cura affectionum gingiuarum.

Gal. 6. de compos. med. per loc. cap. 1. eandemet methodum enarrat, quam nuper retulimus, sed longè satis fusiozem. Aet. ser. 8. ca. 24. & 25, Parulis dissoluenda est antequam suppuretur per collutiones, quales sunt, succus ptisanæ, decoctum seminis lini, deinde siccis deprimenda est carnis eminentia. Similiter epulis inflammatio cum dissoluētibus & siccis deprimentibus curanda est: quòd si suppurentur, incidantur, & ulcus per collutiones curetur. habes remedia epulidis ex Gal. 5. de compos. med. per loc. cap. 9. & à Paul. lib. 3. cap. 26.

Auic. octaua tertij, cap. 2. loquens de inflammatione, inquit, Si materia est superfluitas calida, tunc administra euacuationē & phlebotomiam, & cura in principio cum collutionibus oris infrigidantibus, & sic in eis stypticitas, sicut aqua myrehi, & foliorū frigidorum stypticorum, & decoctio balaustrarum glandium, & succus portulacæ, ar-

noglossæ, &c. Lege de his Galenū fusiꝯ in loco nuper citato, &c.

Obseruationes de repellentibus & discutientibus.

Gal. 5. de compos. med. per loc. cap. 9, Inflammationes repellentibus citra asperitatē & discutiētibus sine asperitate indigēt. Hoc idem refert etiam Aet. ser. 8. cap. 20. Gal. 6. de compos. med. per loc. cap. 1, Quum gingiuarum caro sit mollis & rara, idcirco fortibus auxilijs non indiget. Vitentur insuauia ob eius sensum, itē uenenoſa, ne ob duos meatus subiacentes aliquid in uentrem uel pulmonem influat, &c.

De linguæ batracho.

Ranunculus, Græcè βάρταχος dictus, est tumor uenarum quæ potissimum sub lingua continentur. Sunt inter Auicennianos qui morbum appellant glandulam. Crescit ac si noua lingua oriretur: unde sunt qui uelint carnem additam esse linguæ batrachum, alij apostema piuitosum.

524 DE CONSEN. MEDIC.

Loci de linguæ batracho.

Paul. lib.3. cap.26, Batrachus, tumor est ad inflammationis similitudinem, sub lingua erumpens, maximè in pueris. Itidem adserit Aet. ser.8. cap.37.

De batrachi causa.

Si tumor fuerit pituitosus, omnino ab humiditate uiscosa à capite descendente fiet: si uerò caro addita, tunc fiet sicuti & alia caro, &c.

Loci cōsentientes de batrachi causis.

Auic. sexta tertij, cap.17, Et causa eius est humiditas uiscosa, &c. uide ipsum fusiis.

De batrachi indiciis.

Cognoscitur, quia similis est ranæ in colore, quum superficiei & uenarum linguæ tumor sit, &c.

Loci consentientes de batrachi indiciis.

Auic. loc. cit. Est similis glādula dura existens sub lingua, cuius color est similis colori

cōposito ex colore superficiei lingua & uenarū quæ sunt in ea, & est similis rana, &c.

De batrachi curatione.

Considerandum in primis est, num in puerulis, an in perfectæ ætatis hominibus cura fieri debeat: nam si in puerulis, tūc collutiones tantū cōueniunt: si uerò in maturis hominibus, tunc primū sectio uenæ sub lingua: & si ranunculus magnus fuerit, oportet ut scindatur & extrahatur. Verū in primis experiundæ sunt medicinæ corrosivæ, incisivæ ac resolutivæ: deinde si nihil profeceris, nil erit quod ab operatione manus te excuset. Medicinæ igitur in principio parantur ex sale, ammoniaco, & gallis, & diu fricetur locus, deinde flore aris, dragacanto, & similibus uti poteris, &c.

Loci consentientes de batrachi curatione.

Aet. ser. 8. ca. 37, In cura hoc discriminis est, ut aliter in pueris ac imperfectæ ætatis hominibus medendum sit, si quidem ijs sectio uenæ sub lingua, illis uerò collutiones tantū

conueniunt. lege de his Paul. lib. 3. ca. cit.

Auicen. sexta tertij, cap. 18, Experiantur in ipsa medicina corrosiua, incisua, resolutiua, in quibus est superflua exiccatio, ut sal, ammoniacus, & fricatio cum flore aeris, & dragacato, & administrentur phlebotomia sub lingua & medicina fortis alcola: si autem non ualuerint, non erit excusatio ab operatione manus, &c.

De aphthis, id est, oris vlceribus.

Quas Græci αφθες dicunt, Auicēniani alcola, nos pustulas in superficie oris appellamus, &c.

Loci consentientes de aphthis.

Gal. 6. de comp. med. per loc. cap. 4, Aphthæ sunt ulcerationes in superficie oris obortæ, habentes quidpiam caliditatis igneæ, &c.

Aet. ser. 8. cap. 39. idem refert. Auicen. sexta tertij, cap. 23, agit de his sub nomine alcola & ulceribus malignis, &c. Vide Hippo. 3. aphor. aphor. 24. ibi, In ætatibus talia contingunt paruis & nuper natis puerulis, oris ulcera quæ aphthæ uocantur, &c.

De causis aphtharum, id est,
oris vlcerum.

Fiunt aut à lacte nutricis vitiato, aut ex humorũ vitiosorũ ad os influxu, aut ab acre dine eorũ quæ bibuntur ac comeduntur, &c.

Loci consentientes de causis
aphtharum.

Gal. 6. de cõpos. med. per loc. cap. 4, Fiunt ut plurimum pueris lactentibus, quum vitiosum fuerit nutricis lac, aut non probè ipsum cõcoxerit infans, &c. Auic. sexta tertij, ca. 23, Non accidunt eis nisi propter malitiam lactis, aut malitiam digestionis eius in stomachis ipsorum, & quandoque accidit ex humore omni. Aet. loc. cit. Fiunt etiam in his qui ad perfectam ætatem peruenerunt, tum propter vitiosorum humorum ad os defluxum, tum propter acredinem eorum quæ bibuntur ac comeduntur, &c. lege aphor. 3. Galen. cõmẽt. 24. ibi, Causa harum nil aliud est quàm mollities instrumentorum, quæ neque tactum, neque lactis sustinent qualitatem. Et com. 32. eiusdẽ, Vbi, inquit, à substantiam te-

528 DE CONSEN. MEDIC.

nuem habentibus, & à mordacibus humoribus fieri, &c.

De aphtharum indiciis.

Cognoscuntur ex tactu & visu aphthæ: ex tactu, dum calor & tumor excitantur: visu cognoscuntur ob colorem: nam albus piritā, flauus bilem, rubeus sanguinem, & niger atram bilem significat, &c.

Loci consentientes de aphtharum indiciis.

Aet. ser. 8. cap. 39, Cognitio omnium facilis est, utpote uisui & tactui subiecta: ad tactū quia calidiores quàm expediat loci sunt, tumoresque excitantur: visu uerò cognoscuntur ob colorem, nam rubicundiores à sanguine, &c.

Auicen. sexta tertij, cap. 23, Cognoscitur ex colore suo: album enim est phlegmaticum ex phlegmate salso in pluribus, & citrinum est cholericum uehementioris inflammationis quàm alia, & nigrum est melancholicum & rubeum, clarum est sanguineum, &c.

De cura aphtharum.

In primis curandum est, ut humor ex quo

ulcerationes fiunt, statim euacuetur, deinde fiat uenæ sectio: nam in his ulceribus maxime conducit: quibus peractis, tunc si subrubra fuerint ulcerationes, uti oportet refrigerantibus & moderatè adstringentibus, à principio præsertim & in puerulis, deinde his quæ citra mordacitatem discutiunt. Si uerò subflaua fuerint, tunc similibus utendum, sed frigidioribus: si nigra, discutientibus, &c. In adultis uerò efficacioribus remedijs utendum, &c.

Locī consentientes de cura aphtharum.

Auicē. loc. cit. cap. 24, Oportet ut intendatur primò humori dominanti & facienti alcola, & euacuetur ex corpore toto, si est dominus, deinde phlebotometur ex uenis quæ sunt sub mento. Phlebotomia enim confert omnibus aegritudinibus oris calidis, &c. Galen. 6. de compo. med. per loc. cap. 4, Quæ in superficie tantùm sunt, faciliè ex moderatè adstringentibus curantur: quæ uerò diuturnæ & depascētia sunt, fortioribus remedijs utendum. Aet. ser. & loc. cit. Si subrubra infan-
Il.i.

rium ulcerationes fuerint à principio cum his
 quæ mediocriter adstringunt & refrigerant:
 deinde his quæ citra mordacitatem discu-
 riunt: si subflauæ, iisdem similiter utendum,
 verum magis frigidis, &c. Vide fusius.

Obseruatio in cura aphtharum.

Auicē. sexta tertij, cap. 24, Et oportet ut
 alienet omnia olea, usque ad oleum de oli-
 uis, &c.

Aphthis nocentia.

Nocent ori & palato quadā species bras-
 sicæ & capparorum, lacticia, melongia, nu-
 ces, raphanus.

Aphthas curantia.

Ad ulcera oris prosunt absinthium, ompha-
 cium, alumen, butyrum, camomilla, campho-
 ra, acatia, aloes, uerbena, lutū armenum, plan-
 tago, rosa, rubus, spodium, dragacantum cum
 amylo, & aqua rosacea dissolutum, granata
 mala, galla, oliua, malua, litium, lac, apho-
 dillus, &c.

De aphtharum prognosticis.

Auicē. loc. cit. Cholericum est uehementis inflammationis, sed omnibus malignius est melancholicum siue cum apostemate siue singulare sit. Et omne ulcus eueniens in superficie oris est uelox ad dilatandum. B. Scito ulcera in temporibus pluuiosis & in febribus pestiferis multiplicari. Quod uerò ulcus facile dilateretur, ut ait Auicē. ex eo fortè contingit, quòd locus in quo ulcera fiunt, caliditate non deficit, & cutis mollis & humida facilius ulceratur. Paul. lib. I. cap. 10, Quod modo crusta nigrescit, omnium perniciosissimum & lethale est, &c.

Il. ij.



IOANNIS

BACCHANELLI
Regiensis, De cōsensu
Medicorum in curan-
dis morbis, Lib. 3.

De tonsillarum columellæque
inflammationibus.



TONSILLAE, aliàs
glandula, ob quandam
glandis similitudinē, à to-
le, qui authore Festo est
fauciū tumor, dicta sunt,
fiuntque circa columellā
ex utraque parte infra fauces, et Gracè *παρα-
εισδυα*, et Arabicè *amygdala* uocatur. no-
tis uero siue gurgulio, uel columella (quāquā

gurgulio propriè pars sit gutturis à naribus
ad pulmonē, constās ex cartilagine et carne
per quam spiritus meat ac remeat) accipitur
tamen pro columella caruncula, quæ dū sum-
ma existit, gurgulio dicitur: dum uerò colūna
instar propēdet, columna uel colamella: hæc
dum superius angusta est, et inferius rotūda,
ob uuis similitudinem uua et uuula dicitur:
dum uerò gracilescit, uel ab influxu humido
laxior euadit, tanquam loro similis pendēs,
lorum dicitur.

Loci consentientes de tonsillis & gurgulione.

Galen. aphor. 3. com. 26, Tonsillæ sunt lo-
corum ad isthmum attinētium inflammatio-
nes. B. Intellige per isthmum, partem illam
quæ os et gulam interiacer dictā per meta-
phoram. Aer. ser. 8. cap. 40, Gurgulionem
quidam columellam appellant, uua uerò no-
mine accipienda est quedam in eo affectio,
quum uua acino simile summum gurgulio-
nis apparet. Lorum uerò aliam affectionem
uocant, quum ex suffitū, nimium ignis
Ll. ij.

gracilescit, & loro similis propendet, &c.

Gal. 6. de compos. med. per loc. cap. 3, Columella carnosæ quædam est particula in summo ore depēdens, quæ duobus nominibus appellatur à ueteribus Græcis gargareon & cion, id est gurgulio & colūna: quāquam non cion, sed cionidem posteriores medici, id est columellā uocarint: nec dicēda uua est, quum sit hæc gurgulionis affectio, &c. Gal. aphor. 3. cōment. 26, Tonsillæ sunt nonnunquam solius tunicæ uentri ac gulæ & faucibus totique ori cōmunes inflāmationes, nōnunquam uerò & subiectorum ipsi musculorum, &c.

De causis tonsillarum & gurgulionis.

Omnis inflāmationis causa procatarctica est, uel nimia meri potio, multaque ciborum maximè acriū deuoratio. Causa uerò antecedens est humorū influxus, uel humores liquidi, quibus lingua larinxque & aspera arteria humescere solent, ad malignū redacti, uel uapores ipsi a febrili calore concitati ac elati. Causæ coniunctæ sunt humores ad actum inflammationem reducentes, &c.

Loci consentientes de cau-
sis tonsillarum.

Gal. 6. de cōpos. med. per loc. cap. 3, Fiunt
hæc, quemadmodum dictum est de alijs in-
flammationibus, ex humorum influxu, &c.
Aet. ser. 8. cap. 45, Tonsillarum inflamma-
tiones plerūque fiunt à nimia meri porione,
& à multa ac auidiore ciborum deuoratio-
ne maximè acrium & asperorum, fiuntque
ijs maximè, qui plurimo abundant sanguine,
uel pueris qui texturam habent teneram.

Auicē. nona tertij, cap. 12, Illis quandoque
accidit catarrhus apostemans eas (nam de
columella loquitur) ita ut prohibeat anhel-
um, & quandoque mollificatur uua præter
apostema, & indiget eo quod adstringit,
&c. B. Scias quòd Arabes quatuor uulæ
morbos enumerant, & sunt apostema, ulcus,
corrosio, & casus. Apostema fieri potest à
quacunque materia, ulcus tantum à materia
ulcerante, corrosio à multa & acri materia,
casus à sanguine uel à pituita gurgulionem
remolliente.

L.iiij.

De columellæ indiciis.

Cognoscitur facillè per uisum, si lingua deprimatur, uel si æger in radice linguæ aliquid insistere sentiat, difficultas præter hæc deglutiendi adest, item dolor, & interdum febris, cognoscuntur humores ex eorum coloribus, apostema uerò, ulcera & corrosiones per se ex uisu manifestant, &c.

Loci consentientes de columellæ indiciis.

Galen. 6. de compos. med. per loc. cap. 3. Cognoscitur hoc si quis aperto plurimū ore toto linguam deprimat, &c.

Aet. ser. 8. cap. 45, In tonsillarum inflammatione accidit difficultas transglutiendi, dolor & aliquando etiam febris, &c. Vide in hoc Auicennam, qui tantam deglutiendī difficultatem interdum esse inquit, ut æger digitis suis eam comprimere cogatur, donec transglutiat, & hoc præsertim fit, quum tonsillæ & columella plus iusto humiditatis recipiunt, uel laxantur, uel inflammationem experiantur.

De cura tonsillarum &
gurgulionis.

Si ex inflammatione periculum immineat, primò euacuandum per sectionem uena cubiti, deinde reuellendum ac deriuandum cum cucurbitulis collo ac mento affixis, & cum gargarismis, primò leuiter adstringentibus, postea ex decocto fursure, passularū paratis. Quòd si ad suppurationem uertantur tonsillae, tunc fiant gargarismi ex decocto caricarum & aqua mulsa: si uerò augeat morbus, uenae sub lingua secentur, aliūque subducatur, postque pharmacis acribus multum discussorijs utendum est. Si uerò quispiam sectionem gurgulionis moliatur, reuera praestantius est cauterio gurgulionem resicare, quàm ferro: siquidem nullo potiore remedio tota humiditas ad illam extremitatem defluxa exiccabitur quàm cauterio. Vstionem siue incisionem fiendam denotant uuluae attenuatio, & si ab extremitate eius resudet ueluti pus, & limiditas eius partis appareat, &c.

Logi consentientes de cura tonsillarum & gurgulionis.

Gal. 6. de compos. med. per loc. cap. 3. Communiter tum tonsillis, tum columella inflammatis aut exulceratis in principio conuenit quies, inedia & consequens diæta, gargarismi simplices leuiter adstringentes. In uigore morbi aluus subducatur, gargarismi ex decocto ficuum aut prisanae succo, in quo passulae sint incoctae. Si uero tonsillae ad suppurationem ueniunt, gargarismi fient ex decocto ficuum, aut aqua mulsa calida: si amplius augeat malum, & principium suffocationis suspectum sit, aluus forti clysteri uel glande subducatur, uena cubiti secetur, cucurbitula cum scarificatione collo ac mento affigenda, fomentis ac cataplasmatibus frequenter & gargarismis utendum. Quod si morbus ad nullum horum praesidiarum cedat, sed augeatur, uena sub lingua secetur, aut iuxta angulos oculorum uel ea quae in fronte est, &c. De sectione gurgulionis loquitur Hippoc. prognost. 3. cap. 9. tex. 13. ibi, Gurgulio cum periculo se-

catur, aut uritur, & scarificatur, quādiu rubidus fuerit & magnus: nam inflāmatio ad hāc consequitur, & sanguinis eruptio, sed hunc oportet alijs medicamentis extenuare. Vbi uerò separatū fuerit, quod sanè uuā uocāt, extremūque gurgulionis maius & liuidū fuerit, superior uerò pars tenuior, in hoc sanè tēpore tutum est manus admoliri: praestat autem alio prius euacuata manū adhibere, si tempus permittat, & homo non suffocetur, &c. Auicē. nona tertij, cap. 15, Consideretur uuā subtiliatio & detumitio, & propriè in inferiore parte eius, & si ingrosatur extremitas eius, & refundat ex ea sicut pus, tunc est melior hora incidendi cum ferro aut medicinis cauterizantibus, &c.

B. Quoniam uocis plectrum est columella, ut Gal. de usu partium, & in eius incisione sequatur quandoque sanguinis profluum, fiatque ex eius abscissione frigidior inspiratio, unde fit ut thorace & pulmone refrigeratis quādoque multi intereant. Idcirco cautiū procedēdū arbitror, ne dum partē sanare cupimus, maius nocumētū inde sequatur.

540 DE CONSEN. MEDIC.

Habes etiam remedia per omnia morbi tempora ex Aet. ser. 8. cap. 45. & à Paulo lib. 3 cap. 26. Vide & alios practi-
cantes, &c.

De angina & strangulatione.

Angina quæ à Græcis ουράγγη dicitur, est musculorum, faucium interiorum inflammatio, quæ fauces anguntur & strangulantur, anhelitum uel deglutionem impediens, sicuti παρ ουράγγη exteriorum. Hic morbus ab imperito medicorum uulgo deflexa uoce à synanchi, squinantia dicitur. Dicitur tonsilla etiam, quāquam Plinius tonsillas ab angina seiungat. Strangulatio uerò est subitus ob inspirationis defectum interitus. Angina quatuor habet differentias, ut infra in Aet. uidebitur.

Loci consentientes de angina & strangulatione.

Galen. aphor. 4. cōment. 34. Quum musculi gutturis anteriores unā cum ambiente tunica inflammationem patientes uiam spiritus ualent intercludere, medici talem dispositio-

IN CVR. MORB. LIB. III. 541

nem vocāt synanchen, &c. Pau. lib. 3. cap. 27, Angina quæ ουνάγχη à Græcis dicitur, musculorum faucium interiorum est inflammatio, sicuti parasynache exteriorum. Avicen. nona tertij, cap. 8, loquens de suffocationibus describit esse apostema in gutture anhelitum uel deglutionem uel utrunque impediens, &c. Gal. aphor. 4. comment. 34, Strangulatio nil aliud est quam subitus interitus ob inspirationis defectū, qui fit ex angustia alicuius instrumenti ex ijs qui seruiunt respirationi, &c. De angina differentijs loquitur Aetius ser. 8. cap. 47, Angina quatuor differentiæ existunt: prima, quum fauces inflammantur. Altera, quum nec circa oris regionē, nec iuxta fauces, nec forinsecus quicquam apparet, sed iuxta asperæ arteriæ extremū suffocatio egrum angit. Tertia, quum externa regio unā cum interna fuerit iuxta mentum inflammata. Quarta, quum ceruicis uertebra à suo loco excidunt, unde lingua à luxata uertebra ad suam radicem impulsæ quandoque ex suis proprijs locis excidit, & difficultas respirandi magis infestat, unde

aperto ore semper hiare, atque aërem attrahere aeger cogitur, &c. B. Præter has quatuor differentias à loco sumptas, sunt alia quatuor species ab humoribus sumptæ, scilicet à sanguine, bile, pituita, atra bile, quâvis raro hæc ultima ob sui crassitiem eueniat. Speciem uerò, quæ ex luxatione ceruicis uerticuli contingit, caninam suffocationem uocat Auicenn. ad similitudinē canis, qui aperto ore uehemēter ex lassitudine anhelat. Vide Gal. 2. prorrh. cōment. 54. & aphor. 4. cōment. 35. De alijs anginae speciebus mentionē facit Hippoc. & Gal. 3. prognost. tex. 16. & ibi quid sint fauces euidenter exponit. Similiter aphor. 4. cōment. 34. inter gulam & guttur spaciū fauces nominat, &c. Lege de speciebus anginae Galen. 4. de loc. aff. cap. 3. circa finem, &c.

De anginae causis.

Causæ procatarticae sunt ciborum facultas, qualis est potus frigida, ebrietas, nimia satiētas, frigiditas aëris, & quaecunque ex respiratione attrahuntur mala. Causæ antecedentes sunt totius uel partis repletio, aut

partium quæ circa fauces gutturque existunt,
uel humores fluentes, ut sanguis, bilis, pituita,
etc. Cause cōiunctæ sunt humores anginam
actus facientes, qui partim fluxi sunt, partim
fluunt, ex quibus binæ species pullulant: alte-
ra scilicet à glutinosa frigidaque fluxione,
altera uerò à calida & acri, etc.

Loci consentientes de cau-
sis anginæ.

Aet. ser. 8. cap. 47, Anginæ cause multæ
sunt, frigiditas magis quàm ardor, & plaga,
& ex piscibus ossa ad tonsillas impacta, &
potus frigida, & ebrietas, nimia satietas, &
quæ ex respiratione attrahuntur mala. Auic.
nona tertij, cap. 8, Et quandoque causa est
propter quosdam cibos, etc. Et subdens cau-
sam antecedentem inquit, Quòd non est sem-
per repletio totius corporis, nec superabūdat
superfluitas, nisi in membris uicinis gutturi,
& facit euenire apostema, etc. Et subdit,
Quādoque accidunt ex sanguine, uel ex cho-
lera rubra, aut ex phlegmate, rarò uerò ex
melācholia. De causis cōiunctis loquitur Gal.
4. de uic. rat. in mor. ac. com. 30. Et Hippoc.

eodem in loco, ibi, *Synache*, id est *angina*, fit quum hyeme uerèque fluxio multa & uiscosa ad uenas iugulares defluerit, &c. unde *Galen.* Fluxionum quæ à capite deferuntur, quædam sunt substantia tenues, aliæ ex crassis uiscosisque humoribus fiunt. Tenues penetratis latis uenis in angustioribus detinentur. Crassæ uerò contrarium obtinent, ut in latis contineantur, strictas penetrare non ualentes. Quum igitur in faucium uenis tales impacti fuerint humores, pars in tumorem attollitur, &c. Scias quòd quum nerui & ligamenta ad partes inflammatas extenduntur, tunc uertere uel intra, uel ad latus, ob eorum copulam, qua simul coniunguntur, citò uertuntur. Et de his lege *Gal. aphor. 4. comment. 35.* & *Aet. in præallegato loco, &c.* Vide etiam *Galenum aphor. 3. comment. 22.* ubi *anginam* fieri inquit ex biliosis humoribus qui ad fauces autumno decumbunt, & à pituitosioribus, qui uerè cum *orthopnoea* accidunt, &c.

De angina indicis.

Indicia anginae sunt, difficultas spirandi,

febris, genarū rubor, deglutio impedita, dolor circa guttur, tumorque non extrinsecus appares, interrupta uox. Fluxionū humoris indicia sumuntur à colore, à dolore, & à sapore. Cognoscuntur à colore, si rubidus, flauus, albus, liues humor fuerit. A dolore, si grauis, tēsius, pulsabilis ut in sanguine, si punctorius ac mordicans ut in bile, si faruus & obusus ut in pituita, &c. A sapore, si dulcis ut à sanguine, si amarus à bile, si salsus uel insipidus à pituita, si ponticus ab atra bile, &c.

Loci consentientes de anginae indiciis.

Paul. lib. 3. cap. 27, Anginae notae sunt, spiritus recta ceruice uix trahitur, nonnullis febricula oboritur, faciei rubor, aeger ore conuiuet, cibum potumque deglutire non potest. Gal. 3. praedict. coment. 16, Quia inflammatione uexatur muscoli in gutture, merito dolore afficiuntur, &c. Hippocr. 4. de uict. in mor. ac. tex. 30, Praeterita quae intuenti apparent haudquaquam tumētia uidetur, tēdinesque ceruicis posteriores tenduntur, uoxque ἀπὲρ φωνῆς,

Mm. i.

546 DE CONSEN. MEDIC.

id est abrupta est, &c. Auic. ipse inquit, quòd uidetur loqui cū narib⁹, additque exitus am borū oculorū & egressio linguae. Lege fusius de signis quādo extrinseci laborant muscoli, quādoque intrinseci, &c. De indicatijs fluxionum humoris lege Auicen. nona tertij, cap. 9. ibi, Et signa eius quæ est sanguinea, &c. Similiter ibi, Et signa cholerica. Et ibi, Signa phlegmatica sunt salsedo & sapor baurach, &c. lege etiam Arcul.

De cura ipsius anginae.

Curatio in remouenda antecedente causa triplicem scopum exigit, primo ut euacuetur, secundo ut fluxio prohibeatur, tertio ut reuelatur. Euacuatio fiet per sectionē uenæ usque ad defectum animi, exclusiue, ni morbus inducias dederit, ualida maximè existente uirtute cum repletionē copiosa. At ubi morbus moram fecerit, partienda erit sectio uenæ, ita tamen ut non desinēte morbo, primū à comuni, deinde à cephalica extraxeris, post hanc ad secandas sub lingua uenas te conferes: uerū si pauca fuerit repletio, à cepha-

lica eiusdē lateris ad uenas sub lingua incipies: deinceps si abundauerit bilis, aluus soluenda erit cum bilem educantibus. Fluxio prohibeatur cum his quæ materiam incrasant, quale est diacodion & opiata, &c. Si uersio fiet, per cucurbitulas, frictiones, enemata. Confert etiam diuersio per deriuationem. Curatio in remouenda causa coniuncta, siue phlegmone discutiatur, siue impus conuertatur, tres etiam medendi scopos expostulat. Primus erit reperiens, quæ reperiens nisi facta euacuatione suspecta sunt. Secundus partim repellens, partim discutiens esse debet, maximè dum uiget morbus. Tertius discutiatur tantum, & hoc à medio statu usque ad morbi inclinationem. Quod si ad suppurationem inflammatio uertatur, tunc aperientibus, abstergentibus ac mundificantibus opus erit. At si sapiens à dolore prematur, tunc anodinis ut gargarismus ex lacte caprino dolori ipso uacandum erit. Interim diæta sit tenuissima: sufficit enim ut sumatur ptisana, uel panis in aqua decoctus, & bibatur aqua, &c.

M. ij.

Loci consentientes de cura anginae.

Hippoc. 4. de uic. in mor. ac. tex. 30, Sanguinem igitur ex brachijs detrahens mox uenas quae sub lingua sunt secabis, &c. Iridem adserit Paul. lib. 3. cap. 27. Auic. nona tertijs, cap. 10, Oportet ut euacuetur in principio uniuscuiusque materia faciens illud cum phlebotomia & solutione uentris, & ut retrahatur materia ad partem diuersam, saltem cum uentosis positus super loca longinqua opposita ei, & ligatione extremitatum dolorosa, &c. Lege in hoc Mes. & Paul. fusius. De cura causa coniuncta loquitur Mesu. cap. de synanch. ibi, Distinguiamus in administratione particularium operationum per tempora morbi: nam in augmento sit magis uincens medicamen, stypticum & prohibitium agitationis, & discursionis rheumatis, &c. Lege fusius: nam praeter has intentiones etiam remedia docet in omni tempore morbi opportuna. Auicen. similiter loc. cit. ait, ibi, Incipiat cum medicinis stypticis mixtis cum ijs, quae parum abstersionis habet, & gargari-

ratio cum aceto est ex eis quæ repellunt & prohibent attractionē humiditatis plurimæ, deinde fiat gradatio ad maturatina, &c. Et cap. 2, Et quādoque dolor sit fortior in principio rei: quare oportet ut stypticis admisceatur aliquid quod sedet dolorem, sicut Syrupus viol. &c.

Paul. lib. 3. cap. 27. loquitur de uictu quū dicit, Cibus sit triduo aqua mulsa, inde prisane cremor cum dulci quadam portione, deinde & ouorum lutea, &c.

Obferuationes de phlebotomia.

Mesu. cap. de synan. Sit principium nostrū à phlebotomia si morbus accidit ex plenitudine sanguinis: si uerò cū sanguine abundet cholera, præponimus euacuationē cholerae ad sanguinis detractionē, deinde facimus sequi phlebotomiā. Paul. lib. 3. cap. 27, Non uniuersim, sed pluribus interpositis uicibus euacuetur, ne cumulata, uniuersimque facta euacuatione, anima ipsis deficiente suffocationis periculum superueniat, &c. Auic. nona tertij, ca. 2. idē adserit, & Aet. ser. 8. ca. 47.

Mm. ij.

Observatio de gargarismatis.

Auic. loc. cit. Gargarismata postponantur, si illic est repletio, & si fuerint gargarismata dolorosa, sed administrentur post modificationem, &c. Mirum in modum laudantur etiam uentose super collum ad secundam uertebam, si deglutio fiat difficilis, &c.

Observatio de percussiuis.

Mesu. loc. cit. Percussiva nisi facta euacuatione suspecta sunt, unde Gal. 3. art. parua, Corpus plenum existens percussione non recipit, &c.

Observatio de victu.

Auic. loc. cit. Et prohibeatur nutrimentum, ut sit corpus eius utens sanguinis eius nutrimento, & conuertens ipsum a parte apostematis, quare minorem cibum necessario aut uoluntarie, &c.

Nocentia gutturi.

Nocent gutturi amyllum, mustum, platanus, urtica, nux, piretrum, andachoca, &c.

Anginae conferentia.

Anginae conferentia sunt acerum per se

gargarizatum, omphacium, oximel, agrimonium cum uino, uinum granatorum, diamorron, robnucum, succus rubi, ebuli, anisum cum melle, hyssopo & aceto, gargarisma, stercus canis ossa comedentis, uiola purpurea, hyssopus, Antirum confectio Haly. 27. antid. diabolibanum Nic. diayrundinis. Auicen. prima quinti, philonium romanũ, theodoricon magnum Hali. 7. antid. hiera Archigenis, &c.

De prognosticis anginae.

Hippoc. aphor. 6. aph. 37, Ab angina habito si tumor fiat in collo bonum, foras enim morbus deducitur. Et similis sententia est 7. aphor. aph. 50, Et ratio aphor. est quia satius est ex intimioribus & principalioribus membris morbos extrudi, quàm è diuerso. Hippoc. prædict 3. text. 16, Angina grauissima est, ac celerrimè interimit, quacũque nec in ceruice, nec in faucibus cõspicuum aliquid efficit, sed plurimum doloris infert, ac spirationis difficultatem, orthopnoeam dictam. Hac enim eodem die, & secundo & tertio & quarto strangulat. Quacunque uerò dolorem alteri

Mm. iij.

subsimilem infert: attollitur uerò, ac rubore in faucibus efficit, admodum exitiosa, sed paulò longior quàm superior est. Paul lib. 3. cap. 27, Pueris raro talis affectus accidit, nisi cū ceruicis uertebrae affectu loco excidunt, uerum illis ceu curā non recipientibus ac deploratis manū admoliri non oportet. B. Habes aphor. 43. secundae sectionis, Si strangulati ac dissoluti nondum mortui non referuntur, quibus spuma circa os fuerit: nam in ijs exitiale signum est spuma circa os. Verum Gal. inquit, Nonnulli etiam strangulorum, quibus circa os spuma uisa est, relati sunt: unde etiā Auic. Quū tamen quādoq; accidat ut praefocatus spumet, deinde sanetur. Hippoc. aphor. 4. aphor. 34, Si à febre habito, tumore non existente in faucibus strangulatio repēte superuenerit, lethale. B. Habes hanc eandem sententiā 2. prorrhēt. tex. 53 ubi inquit, Fauces dolētes, &c. Ibi quòd libri huius author à Gal. damnatur. Et aphor. 4. aphor. 35, Si à febre habito collū peruertitur, & uix potest deuorare sine ullo tumore, lethale est. B. Vbi non uisitur tumoris uestigiū, dictum inflāma-

tionē in gutture, uel in eius musculis esse, quare exitiale signum est maximè, quū febris ad-
sit, tanquam una ex causis mortem porten-
dentibus: unde Auic. Si cum præfocationibus
uehemens febris fuerit, tunc mors festinat,
quoniam febris facit ægrum magno anhelitu
indigere, &c. Et aphor. 5. aphor. 10, Qui-
cunque ab angina liberantur, ijs ad pulmo-
nem uertitur, & in septem diebus pereunt: si
uero has effugerint, suppurantur. B. Dictum
est ab Hippoc. 2. aphor. aphor. 19. quod acu-
torum morborum non sunt certæ prænun-
tiationes aut salutis aut mortis, quia non-
nūquam humor noxius ex uno loco ad alte-
rum transfertur, unde si angina ad pulmo-
nem uertatur, uel interficit, uel in pus con-
uersa suppuratur: si ad cor, omnino ægrū
perdit. Auic. 9. tertij, cap. 9, Quum autem fa-
cies sit uiridis & denigratur situs oculorum,
tunc ipse moritur. Similiter quando minora-
tur pulsus, & in frigidatur extrema, & gros-
situs lingue & ipsius denigratio sunt ex
signis malis, &c.

Hippoc. prædict. 3. tex. 20, Securißima est

angina, si rubor quàm maximè foras uertatur. Et prædict. primo, Fauces dolètes renues cum quadam difficultate strangulantes uelociter exitium afferunt, &c.

Authores erronei dissentientes circa anginam.

- 1 Adserere, ab inflammatione aspera arteriæ strangulationem posse effici.
- 2 Adserere, in gutture nullum posse fieri tumorem absque dolore.
- 3 Adserere, in angina non conducere re-percussiuâ, ne materia introcludatur.
- 4 Adserere, anginam pluries fieri à pituita, quàm ab alijs humoribus.
- 5 Adserere, sectionem uenæ in omni angina non conferre.

Confutatio dissentientium circa anginam.

Ad primum, Gal. aphor. 4. comment. 34, Aspera quidem arteriæ inflāmatio difficultatem spirādi aliquam efficere potest, strangulationem uerò non potest.

Ad secundum, Gal. eodemet cōmen. Quum

tumorum triplicem differētiā enumerasset, postea in fine commenti inquit, possibile esse multitudinē humiditatis, pituitosæ præcipuè, madefaciēte tunicam gutturis interiorē, aliquem fieri tumorem absque dolore.

Ad tertium respondet Auic. 9. tertij, cap. 10, Et gargarizatio cum aceto est ex eis quæ repellunt & prohibent attractionem humiditatis plurimæ: hæc tamen non conducere, si materia esset crassa ac tenax. Vide tamen de his supra in observationibus, &c.

Ad quartū Gordonius & Gilbertus Anglius & Geraldus de solo super 9. almans. cap. de squinantia dicunt, quòd apostema hoc fit secundū plurimū à sanguine, & rarò à pituita. Præterea quum hæc inflammatio sit morbus peracutus, à frigido fieri nequit, igitur non pluries fit à pituita.

Ad quintum, Auic. 9. tertij, cap. 10, Oporteret ut euacuetur in principio uniuscuiusque materia faciens illum cum phlebotomia: præterea si non euacuatua, saltem reuulsiva in omni angina specie conueniet: habes etiam de hoc supra plures auctoritates, &c.

De destillatione, grauedine,
& raucitate.

Destillatio à Græcis κατὰ ῥῆος dicta, nil aliud est quàm superabundantis humoris ex capite in partes subiectas fluxio. Differt à broncho qui raucedo, & à coryza que grauedo à Latinis dicitur, eo quòd catarrhus fauces & palatum obtineat, bronchus guttur ac arteriam, coryza uerò nares tantum molestat. Has species destillationum Gerardus quidam his duobus uersibus explicuit,
Dū fluit ad pect⁹, dicetur Rheuma catarrh⁹,
Ad fauces bronchos, ad nares dico coryzā.

Loci consentientes de destillatione, grauedine, & raucitate.

Paulus lib. 9. ca. 28, Communis est omnibus uitijis excrementitiæ humiditatis ex capite in subiectas partes descensus, si in nares defluat κόρυζα, si per palatum ad nares κατὰ ῥῆος, si in guttur & asperam arteriam, ita ut membranam interiorem exasperet, Βρόγχος & ῥῥτηναὶὸν à Græcis dicitur, si fluxio in pectus pulmonésque decumbat, tussis

sive, ut ipse inquit, βήχης ἀπὸ τοῖς ζῴοντι κα-
 κὼν δαίς, &c. Gal. 6. de sympt. cau. ca. 4, De-
 stillatio est per palati foramina multorū hu-
 morum delatio, &c. Vide etiam Aet. Ser. 8.
 ca. 53. & Gal. 2. prognost. comment. 49 ibi,
 Humorem de naribus secretum tenuē & in-
 coctum omnes medici grauedinem nominare
 solent, &c.

De causis destillationis, graue-
 dinis, & raucedinis.

Causæ procatacticae sunt aër frigidus,
 mora sub radijs lunæ, septentrionales uenti
 dum humiditates exprimunt, similiter aër ca-
 lidus, uenti meridionales caput replentes &
 humiditates liquefacientes. Item somnus, coi-
 tus, & omnia ad caput euaporantia & ipsum
 replentia, sicut ebrietates & crapulae, exer-
 citium & ira. Causæ antecedentes sunt uel
 per se uel per consensum. Per se sunt humores
 superflui in capite existētes, intemperies ca-
 lida, frigida, & humida. Per consensum sunt
 aut à toto corpore, ut in febribus humorē eli-
 quantibus: aut membro particulari, ut à sto-

macho in digerendo debili, & à reliquis mēbris. Causa coniuncta sunt humor actu fluēs, qui saepe est calidus, subtilis, interdum crassus & frigidus, &c.

Loci consentientes de causis destillationis.

De causis procatarteticis lege comm. apho. 5. lib. 3. ibi, Austri caput aggrauantes caliginosi, &c. Item aphor. 12 & 13. eiusdem lib. ibi, in cōmento, In quibusdam uerò coacto in unum & compresso quodammodo capite, expressa materia inutilis ad loca capite inferiora descendit, &c. Aet. ser. 8. cap. 53, Destillationis & muci causa est cerebrum, quod à frigore ad frigidam intemperiem perducitur, &c. nam in hoc loco enumerat omnes alias procatarteticas causas à me superius descriptas. Gal. 6. de Sympt. cau. cap. 4, Destillationis & grauedinis cerebrum statim causa est, ut pars quidem similis, uel à frigore, uel à solis ardore ad intemperiem reductum, ut instrumentum uerò, quatenus à plenitudine infestatur. Lege latius Mes. de

cura catarrhi, ibi, Austerarum facit ac replet, &c. Lege similiter Arcul. comment. almans. cap. de catarrho. Item Gor. Sauon. &c. De fluxionum causis lege Gal. 2. de diff. feb. cap. 2, Nam ibi ex parte laborante binas causas intelliges, alteram ex accensa caliditate, alteram à dolore excitato, unde minus plùsue attrahitur quod influit. Nam si uehementior fuerit calor, multum attrahit: si minus, tunc debilius. Similiter & in dolore. Ex parte uerò mittente, nam si pars mittens minus superfluitatibus abundet, parum aliquid attrahenti parti immittit: si uerò plus materie inutilis habeat, tantum ingerit amplius, quanto plus à natura modo recesserit, &c.

De destillationis indiciiis.

Id scias uelim, quòd destillationum indicia ex capitis intemperie siue calida siue frigida sumi possunt, item à sapore, odore, calore, & ab ipsius symptomatibus, ut gratia exempli: Si caput calidæ fuerit tēperaturæ, facies rubescit uel flaua est: si uerò frigida, erit alba & pallida. À sapore, ut si quod influit acris aut salsi, aut amari uel fœtenti

quidpiam habuerit, calidam censeto: si insipidi uel dulcis, frigidum. A colore, ut quod rubescit, uel flauet, calidum: quod albescit, uel liuet, frigidum. A symptomatibus, ut si adsit ardor, pūctio siue mordacitas, calidū: si nullius sensus particeps cū grauitate & narium obstructione, frigidū. Relinquo ea etiā indicia, quæ sumi possunt ab his quæ iuuāt & nocent: sed ad differentiā quæ est inter tenuem & crassam destillationē nunc trāseo. Tenuis igitur cognoscetur ex eo dum expuitur, quod labilis sit & fluēs: at è cōuerso crassa in globum uertitur, & in se permanēs non fluit. Si quid uerò in medio crassum & in circumiacentibus partibus tenue fuerit, tūc iudica destillationē omnino esse tenuē, quum hæ partes ad crassitiē nōdū deuenerint. Signa quòd destillatio sit à toto sunt, quia in febrium augmento augetur, & in earū remissione remittitur. Similiter de particulariū partiū consensu intelligendum est. Signa per essentiam in capite sunt, si diu perseuerauerit destillatio, nec adsit aliarū partium morbus de quo suspicari possit, &c.

Loci consentientes de indiciis
destillationum.

Paul. lib. 3 cap. 28, Qui ex aestu grauedinē
uel destillationem concipiunt, ijs particulae
incalescunt, acris tenuisque humor tum per
nares tum per os descendit, facies rubescit &
nasus. Qui ex frigore, ijs frons & caput un-
dique distenditur, meatūsque athmoides di-
cti clauduntur, &c. Lege de his Auic. & Ar-
cul. Mes. & Razem fusius, & inuenies plura
quae tuo arbitrio huc traduces, &c.

De cura destillationum.

Sex in catarrho requiruntur medendi intē-
tiones, prima regiminis regula, secunda erit
catarrhi alteratio siue digestio, tertia eua-
cuatio, quarta diuersio, quinta catarrhi in-
terdū fluentis retētio, sexta accidētū corre-
ctio accipitis roboratio. Regimē erit in ca-
tarrho calido, si calida omnia uitētur, & ea
quae etiā cerebrum debilitare possunt. In fri-
gido, somnus longus & meridianus, & supi-
nē dormire in frigido, malū est. Digestio si-
ue humoris preparatio in calido cū frigidis

Nn.i.

incrassantibus, sicut cū syrupo uiol. de Iui-
 bis, de papauere myrthino cū aquis farfare
 endiuie, aqua ordeī, & similibus parabitur
 in catarrho frigido, si crassa fuerit materia
 cum calidis attenuantibus, sicut cum syrupo
 de glycyrrhiza, de hyssopo de passio, oxymelle
 simp. & composito, cum aquis cap. uen. sal-
 uie, decocto pectorali calido. Vacuatio in
 calido fiet cum fructuum decocto, cassia, mā-
 na, rheubarbaro, & cum pilulis aureis aggre-
 gatiuis de hiera simplici. In frigido, cum pi-
 lulis de hiera, cum agarico, polypodio, turbit,
 pilulis chochyis, &c. Vitetur sectio uenae, si
 possibile fuerit: si minus, fiat à uena commu-
 ni. Diuersio siue renulsio fiet per caputpur-
 gia, masticatoria & cauterizantia, uel per
 fricationes, lotiones, iuncturarum ligationes,
 cucurbitulas & hirudinū applicationes. Ca-
 putpurgia fiūt per liquores, per nares attra-
 ctos, ut puta in calido cum aqua uiolacea uel
 hordei, &c. In frigido cum aqua maiorana,
 cum succo blitis, decocto nigella, ireos uel cy-
 claminis. Cauteria fiant in commissura co-
 ronali uel in humeris. Retentio catarrhi quæ

fieri non debet nisi maxima urgente necessitate, pluribus medijs perficietur : primo cum stypticis, ut cum bolo armenio, spica, olibano. Secundo cum his quæ à proprietate incrasant, ut cum iuleb violaceo, Zuccharo violaceo, penidijs, diadragacanto, loch de papauere, diacodione liquido, pilulis bechichys. Tertio cū gargarismis ex aqua rosacea, aceto, sandaraca, etc. uel cum pilulis de cynaglo. Remotio symptomatum erit, per ea quæ malā capitis intemperiem siue calidam siue frigidam remouere possunt. Roborabitur deinceps caput in causa frigida cum confectione pliris arcoticon Nic. cum diamusco, in causa calida, cum electuarijs frigidis, etc.

Loci consentientes de cura
destillationum.

Mesu. cap. de cat. Commune est sex res, prima ponit studiū in uita patientis, secunda adequat materiam, tertia abscindit eam, quarta diuertit, quinta abscindit fluxum eius, sexta corrigit accidentia, & de his singulatim agit, ut latius uideri potest. Hercul. & Marcus Catinarius de

Nn. ij.

his etiam fusius pertractant. Videant in sua praxi qui optat rem medullius introspicere. De reuulsione, euacuatione & deriuatione loquitur Gal. 4. meth. ca. 6. ibi, Destillationem fluere incipientem ad contraria trahendam esse dicimus, fixam uero in laborante particula euacuandam. Similiter meth. 5. ca. 2, Quae uero in oculis, aure, palato, fluxiones accidunt, eorum ad uicina deriuatio est per nares, &c. Hinc etiam elice quot modis fiat reuulsio. Lege etiam Aet. Ser. 8. cap. 53. ibi, Expedit fontem malorum excindere sanato uidelicet capite, &c.

Obseruationes in cura.

Gal. 3 de loc. aff. cap. 5. dicit, exemplificans de grauedine & destillatione, quod qualitas & quantitas excrementorum atque causarum, quae praecesserunt, contemplatio & capitis dispositio siue calida, ut in uestione, siue frigida, ut in refrigeratione, primum à re considerentur: quae nisi discretè cognoueris, idoneam dispositione curationem haudquam inuenies.

Observationes in phlebotomia.

Mesu. in cur. cat. phlebotomiam non nisi in tribus casibus fieri posse adserit: primus, si destillatio calida fuerit cum multa sanguinis copia in corpore calido. secundus, si calida descendens in aliqua principali parte figatur, ut in oculis, pulmone, diaphragmate: tertius, si cum febre & maximè continua fuerit destillatio, ita ut in uenis putrescere humores existimentur, in cæteris uerò nequaquam.

Observationes de gargarismatis.

Mesu. Suspecta sunt gargarismata in quatuor casibus: primus est suspicio catarrhi ad pectus & pulmonem fluentis, id est, in paratis ad phthisim & asthma. Secundus, si sit de genere subtilium, acutorum & mordicantium, eò quòd facile cum gargarismis concitatur. Tertius, in præfocationibus quæ fiunt citò, id est, in paratis ad suffocationes. Quartus, si sit uehementis multitudinis.

Nn. iij.

Observationes in diuersionibus.

Marcus Catin. in cur. cat. inquit, Nota quòd caputpurgia & sternutatoria non debent à principio fieri, sed factis euacuationibus, quia per ista fit motus & agitatio, &c.

Mesu. Securins est regimen diuersiũ quàm abscissium, & licet regimen diuersium dilatat materiã & multiplicet, tamen multiplicatam conuertit ad partem cõmunem non timorofam, &c.

Observationes in abscissione catarrhi.

Mesu. Et sunt ex stolidis qui ante digestionem & mundificationem communem administrant abscindentia catarrhi, & sunt causa cumulationis & multiplicationis ipsius. Fiãt igitur post mundificationem & sedationem agitationis uehementis: in aliquibus tamen casibus in principio fieri potest, primò si ad partes nobiles reperet, aut catarrhus esset præfocatiuus, &c.

Catarrho conferentia.

Conferunt catarrho assatæ cum pipere

sumptæ, betonica, bolus armenius, cinnamomum, gramen, lac caprinum, grana lauri, manna, myrrha, vitella ouorum sorbilia, fumus sandaracæ, laudani & asphalti uapor, suffumigium utriusque storacis retinet catarrhum, item suffumigium uernicis, sebesten & hyssopus, acharistum Nic. confectio de iacur Mesu. Phylonium Romanum Auic. loch de papauere, pilulæ pro catarrho Mes. 10. antid. Pilulæ de papauere Mes. Rob de nucibus Mes 5. antid. Rob de papauere Haly. 19. antid. Syrup. de papauere, &c.

De prognosticis destillationum.

Hippocr. aphor. 2. aphor. 40, Raucedines & grauedines in ualde senibus cōcoctionem non admittunt. B. Quia frigiditas illa ex senili ætate acquisita, reprimi non potest, imò & in quibusdā iuuenibus difficulter concoquuntur. Hippoc. prædict. 2. tex. 49, Grauedines & sternutamenta per omnes morbos qui in pulmone fatigent præire & subsequi malū est, &c. B. Ratio est, quia si grauedines sint signa, indicant pulmonem malis humori-

Nº. iiij.

bus repleri: si uerò sint causæ, sunt etiam male, ex eo quòd ab alijs affectionibus prauis cõmittantur. Lege etiam pro his aphorif. 12, & 14, & 31. libri tertij aphor. & plura intelleges de prognosticis, &c.

Authores dissentientes circa destillationes.

- 1 Adserere, sternutamenta in destillatione esse salubria.
- 2 Adserere, cum Artemide medico, plumbeā laminā pro uoce tremula pectori esse applicandā.
- 3 Adserere, destillationes tantum uocari, quæ ex capite per asperam arteriam ad pulmonem feruntur.

Confutatio dissentientium circa destillationes.

Ad primum, Gal. prædict. 2. comment. 49, Sternutamentum sequitur grauedines magna ex parte, sed sanè concutit thoracem & uiuat pulmonem: igitur in destillatione non est salubre, quia ex suo motu efficit, ut materia à capite ad subiectum pulmonem descendat,

uel signum est insalubre ostendens per consensum etiam affici cerebrum, ut ibi Gal.

Ad secundum, Hippoc. 5. aphor. 24. aphor. Frigida qualis est nix & glacies pectori inimica tusses mouent & destillationes, &c. Sed plumbeæ laminæ sunt huiusmodi, igitur pectori non applicandæ.

Ad tertium, Galen. aphor. 3. commen. 12, Non quas communi uocabulo destillationes consueuimus nominare, quæ scilicet fiant ex capite ad pulmonem per asperam arteriam, sed omnes fluxiones quæ feruntur per uenas à capite ad partes inferiores, &c. scilicet uocamus destillationes, &c.

De tussis definitione.

Tussis, βὺξ Græcè dicta est, quoddam aggregatum ex duobus motibus, scilicet dilatione & cōstrictione imperuosa pulmonis & pectoris, ad expellendum nociua à uirtute expulsoria naturali pulmonis facta cum adiutorio diaphragmatis. Nam tussis ita pectori inest, sicuti cerebro sternutamentum, ut per eam nocumentum à pulmone expellatur, &

à membris , quæ ad pulmonis consensum patiuntur, &c.

Loci de tussis definitione.

Gal. 5. de sympt. cau. cap. 4, Tussis nil aliud est quam uehementissima efflatio, qua plurimus spiritus celerrimè foras erūpens impetu suo extrahit, exploditque excrementa meatuum ipsius obstruentia, &c. Auic. fen. 10. tra. 3. cap. 1, Tussis est ex motibus quibus expellit natura nocuum ex membro aliquo, & hoc membrum est pulmo & membra quæ ei continuantur. Vide de his latius Gal. loc. cit. cap. 3. & 4. de sympt. cau. Similiter de loco lesionis uide cap. 6. eiusdem quinti libri, &c. Vide etiam Arcul.

De causis tussis.

Causæ procatareæ sunt, sicut dictum est in destillationum causis, causæ antecedentes uel per se sunt, uel per consensum. Per se, ut mala intemperies cum materia, uel sine materia calida, frigida, sicca, humida: aut solutio continui, uelut in ulcere pulmonis, in phthisi. Per consensum, uel à toto, ut in fe-

bribus: aut à partibus, ut à cerebro destillante, uel à pectore ut pleuritide & orthopnoea, aut diaphragmate ulcerato, uel in abscessum conuerso, aut à stomacho, splene, hepate, quum abscessum patiuntur: nam facta diaphragmatis compressione, siue à tumore, siue ab alio quopiam fit tussis. Materia in pulmone quandoque imbibuntur, interdum inhaerent, obstruunt, & resolutis partibus subtilibus in petram condensantur. Causae tussis siccae sunt uel mala complexio, uel materia in pulmone contenta, quia uel nimis crassa expulsionem inepta, uel apostemata pulmonis, uel materia in uenis pulmonis contenta, sua acuitate uel multitudine stimulans, uel imbecillitas facultatis expulsoe, &c.

Loci consentientes de causis tussis.

Aet. ser. 8. cap. 54, Causae tussis sunt uariae, nam humor à capite ad asperam arteriam destillans tussim efficit. Asperitas insuper intrinsecae pelliculae arteriae asperae, cibi & potus praeterlabentes tussim promouent. Lumbrici stomachum infestantes, etiam tussiculas

paruas excitant, similiter & acris humor stomachum perturbans, & intemperies frigida instrumentorum respirationis tussim irritat: Vide de his fusius Auicen. 10. 3. tra. cap. 1. ibi, Cause primitiue tussis sunt, &c. Nam fusissime has pertractat. Vide insuper Galen. de sympt. causis, cap. 4, & ibi intelliges, quomodo intemperies tussim excitet, & à mala intemperie dolor fiat contra plures, qui de mente Gal. hoc non posse fieri certò affirmat.

De signis tussis.

• Signum malæ complexionis calidæ, cognoscitur ex præcedentibus causis calidis, & laudatur ex similibus, & iuuatur à contrarijs, caliditas etiam sentitur ab agro, uehementia sitis, magnitudo anhelitus & pulsus, rubor faciei cum tussi sicca. Signa complexionis frigidæ sumuntur ex causis frigidis præcedentibus, iuuatur à contrarijs, &c. Signa tussis ex sanguine sunt, rubedo faciei, uenarum tensio, sapor in ore dulcis, & interdum sanguis excreatur. Signa bilis sunt, flauities uulius, sapor in ore amarus, sitis, & quod expuitur, ci-

trinum est, & ut plurimum tussis sicca est. Signa pituitæ sunt, pallor faciei, & albedo, sapor insipidus aut salsus cum humiditate superflua, pauca sitis, circa fauces viscosa pituita, commotio uomitus, &c. Signa atræ bilis sunt, fuscus color, sapor ponticus, tardus euentus, longa duratio. Signa subtilitatis & crassitie ex tenuitate fluxuque materia, & quia subito accidit, & è cōuerso, materia viscosa, tarda in fluxu, &c. Signa siccitatis sunt, quia sedatur ex sorbitione amyli, multiplicaturque, quū fames & sitis adest, & apud somnum alleviatur, similiter dum comeditur & bibitur. Signa per consensum, est antecessio læsionis uētriculi uel hepatis, tussis adest sicca, est insuper minus continua & minus laboriosa, quàm quæ est per essentiam. Signa apostematis, ulceris, & similiū cognoscuntur ex regularis in pleuritide, peripneumonia, & phthisi.

Loci consentientes de signis tussis.

Aetius serm. 8. cap. 54, Tussis quæ cum titillatione partium ab utraque palati parte contingit, palam ostēdit destillationem à ca

pire ad asperam arteriam & ad pulmonem
deferri: quòd si nihil expuatur, tenuem flu-
xum indicat, &c. Auic. 10. tra. 3. ca. 1. de his
pertractat signis, ibi, In tussis frigida, est ad-
ditio ex frigore, &c. Lege hunc locum fusius,
& habebis omnia quæ à me nuper relata
sunt. Lege etiam Arcul.

De cura tussis.

Dictum est in capite destillationis, fluxum
humoris esse diuertendum, & quod iam flu-
xum est, euacuandum. Nunc etiam dicimus
in tussis cura duplicem scopum requiri, al-
terum in præparanda materia, alterum in ab-
stergendo & præparatam educendo. Tenuis
igitur & acris destillatio per infrigidantia
& incrassantia, & fluxum intercipientia
curatur, sicut cum syrupo de papauere vio-
laceo, iuiubino, cum decocto hordei, iuiuba-
rum, sebesten, uel cum diacodione tēpore som-
ni, uel pilulis bechichijs. Si uerò fuerit frigi-
da, crassa ac tenax, tunc cum calidis exte-
nuantibus ac disseccantibus digeratur, ut cum
syrupo de glycyrrhiza, de hyssopo oxymel-

lite. Syrup. de prassio, oxymellite scillitico cum decocto caricarū passularum. cap. uen. hordei, &c. cum loch de pino, de scilla, cum iure galli decrepiti, &c. Evacuatur deinceps subtilis materia cum cassia, electuario de sebesten, addita pectorali decoctione, uel cum pilulis aureis aggregatiuis, &c. Frigida cum pilulis cochys elephanginis. T. de ag. &c. Quod uerò superest in pulmone, exiccerur tum bibendo, cum lambendo ac euaporando, de quibus satis pertractauit Mesu.

Loci consentientes de cura tussis.

Aet. serm. 8. cap. 54, Medemur tussi à tenui fluxu facta per antidotum ex papaueris cap. inspissantes, aut per alterius pharmaci dolorem leuantis. Quæ autem à crasso aut uisoso fit humore per extenuantia & discindentia, instrumentorum respirationis frigiditati per calefacientia medemur. Quæ ab asperitate, per lenientia & mordacitatem arcetia sanantur, qualia sunt ex arteriacis compositionibus simpliciora, &c. Gal. 6. de compositionibus simplicioribus, cap. 2. & 3. non diuerso à no-

bis sermone hæc dilucidius pertractat, ubi habet insuper multas ad tussim cōfectiones, &c. Lege etiam Auicē. 10. 3. tract. 9. cap. de cura tussis, & Arcul. & Mesu. Vide etiam quæcunque dicta sunt de destillatione, nam huc referenda sunt.

Observationes in cura per exiccantia.

Hercul. 9. almans. cap. de cur. tussis, multas conditiones observari in his iubet: Primò, quòd non nisi reiteratis euacuationibus exhibeatur. Secundò, quòd non adsit febris notatu digna. Tertiò, ut uirtus constet. Quartò, ut incipiatur à minima quantitate, &c. Vide cum fusius.

Nocentia & conferentia tussi.

Nocent tussi, acetum, succus ebuli, præsertim tussi recēter factæ, nam antiquæ prodest mel non spumatum, nuces, &c. Conferunt tussi. amyllum cum zucharo & oleo amygdalino, semen bimbicis, bdellium, radix chamæleonæ, cinnamomum, cochleæ, adiantũ, hyssopus, dragacantum, enula, faba, scænuigræcum,

cum melle, phistici, fursur triticeum cum aqua
 hordei decoctum & colatum in frig. & sic.
 tussi, galbanū, gentiana, granata dulcia, iuiu
 bæ, lac asinae uel caprae, decoctū glycyrrhizæ
 in uino, malua, māna, mastix, mulsa, oua cum
 melle, papauer, passulæ, peucedanū, grana pi
 ni, pulmo asini, prassium, rosmarinus, sebestē,
 semen lini, serpentaria, sulphur, sea, storax,
 prisana, terebentina cum melle, uiolæ, zedoa-
 ria, urtica, radix ireos. Composita sunt, dia
 codion Mesu. diapapauer Mesu. in tussi ca-
 tarrhali, diasulphur Serap. diacodion cōpo-
 sitū Serap. diaolibanū, diapenidion, diadra-
 gantum, diairis, diacalamentū, diatrion pi-
 pereon, diahyssopum, diazingiberis, emplastrū
 adip. Auic. sexto tra. emplastrū gabadi Ha-
 ly. loch de pino, de papauere Mes. de allys
 Auic. & Mes. in quita antid. in cur. tussis hu-
 midæ, loch de semine lini. Auic. quinta quin-
 ti, oleum amygdalarum dul. uiolaceum sifa-
 mi, cucurbitæ. Pilulæ pro catarrho Mes. 10.
 antid. bichichia Mes. ad tussim. Auic. syrup.
 uiolaceus, myrithinus, acetosus Mes. Iuiubinus
 de prasio, de hyssopo, de cannis, de papauere

re, alteraniabim, &c. Athanasia magna, syrup. de liquiritia, de calamento, de theriaca maior. trochisci de stella, Auicē. 8. 5. de berberis, de papauere, de arsenico, &c. Aliū coctum, & bacca lauri, &c.

De prognosticis ipsius tussis.

Auicē. decima terij, loc. cit. Et tussis frequens plerunque perducit ad sputum sanguinis. Arcul. 9. almans, de cur. tuss. Si diuturna sit & frequens, in pregnantibus abortum facit: expuitur sanguis fractis in pectore uenis. Hippoc. aphor. 6. aphor. 46, Qui gibbi ex anhelitu aut tussi efficiuntur, ante pubertatem intereunt. Lege etiam aphor. 54. lib. 4, Quibus ut plurimum tusses sicca leuiter irritantes in febribus ardentibus fiunt, &c. Vide etiam Hippoc. in cap. de destillatione aphor. supra recitato.

Authores dissentientes circa tussim.

- 1 Adserere, tusses à nuda intemperie fieri non posse.
- 2 Adserere, tussim siccam à nulla alia causa fieri posse, quàm à mala intemperie sine

materia.

3 Adserere, tussim plerūque fieri causa tantū calida & sicca, ut Gerardus.

4 Adserere, pilulas bechichias conferre in omni sicca tussi.

Confutatio dissentientium
circa tussim.

Ad primum, Galen. 5. de sympt. cau. cap. 4, Tussim, inquit, fieri refrigeratis tantūm respirationis instrumentis, ita ut affecti nihil inter tussiedum expuant. Itidem ait Aet. ut supr. de causis dictum est.

Ad secundum, Gal. 2. prædict. cōment. 42. inquit, Quod si humor crassus & viscosus, uel adeo tenuis sit, ut expelli nequeat, siccam tussim efficit: unde modicè crassus facilè screatur. Et aphoris. 4. comment. 54, Sicca tusses sunt, in quibus nihil expuitur: sunt etiam aliquando ob intemperiem instrumentorū que seruiunt respirationi, aliquando in faucium asperitate, uel à paucō & tenui humore destillante. Igitur sicca tussis etiam à materiali causa effici potest.

Oo. ij.

Ad tertium, Galen. aphoris. 3. comment. 23, Ob hanc igitur ipsam frigiditatem tusses hyeme maximè fiunt, &c. Similiter 9. 12. eiusdem libri, Caput prius repletum in calida & humida constitutione, frigus autem superueniens ueluti manus quadam extrinseca capiens ac premens, quandā uti spongiam, cerebri illam, quæ in ipso continetur, humiditatem, unde fiunt tusses & grauedines, &c. Igitur à causa frigida & humida plerunque, & magis quàm à calida & sicca fieri potest.

Ad quartum dicimus pilulas bichichias conferre tantum in causa calida & sicca, ut restatur Mesu. Sed tussis sicca ab alia causa fieri potest, ut monstratum est, qua de re in omni sicca tussi conferre non potuerunt, &c.

De asthmate dispnoea & orthopnoea.

Asthma est affectus qui respirandi difficultatem cum magno conamine præ se fert. Hæc spirationis difficultas dum modica est, δύσπνοια Græcè dicitur: at quum uehemen-

tior fit, & spirare æger sine anhelitu & sono non potest, tunc ἀσπμα uocatur: si uerò accadat in spirando ut non nisi recta ceruice spiritus trahatur, tunc ὀρθοπνοία nominatur: quos igitur Græci uocant ἀσπματικοί, Latini anhelosos siue suspiriosos dicunt.

Locī cōsentientes de asthma,
dispnoea, & orthopnoea.

Auic. decima tertij, ca. 4, Asthma est ægri tudo pulmonis cum qua patiens non inuenit excusationem ab anhelitu frequenti, sicuti est anhelitus quo laborat præfocatus & festinatus. Gal. aph. 6. com. 46, Multæ sunt spirandi difficultates, sed solam illam Hippoc. consueuit asthma nominare, in qua contingit satis crebrum anhelitum fieri. Vocant τὸ ἀσπμαῖν verū, id est, anhelare, id quod fit in cursib⁹ & uehementioribus exercitijs, &c. Vide de his Gal. 7. de cōp. med. per loc. ca. 6, ibi, Qui citra febrem dense respirant, &c. B. Nota quòd asthma interdū sumitur pro difficultate spiritus sine febre & apostemate, interdum pro constrictione nō facta à causis materialibus,
Oo. iij.

interdum pro malitia spirandi à materia crassa inherente facta: & sic in hoc loco à Gal. accipitur, &c. Gal. 4. de uict. in mor. ac. comment. 21, Sicca orthopnoea ea est spirandi difficultas, quæ sine sputis uel rusti usque adeo uehemens est, ut inclinari citra suffocationem qui ita afficitur non possit.

De causis harum affectionum.

Causæ procatartice sunt caliditas uel frigiditas, aëris casus, percussio, nimius corporis motus, fumus argenti uiui, odor rectum pectus constringentium, &c. Causæ antecedentes per se, ut à mala intemperie frigida coarctante uel obstruente, uel à materia ut plurimum pituitosa in pulmone, uel eius bronchijs infarcta. Per consensum fit uel à toto, ut in febribus & hydrope, aut ab aliqua parte, sicut ab occipite, neruis, uertebis colli, à pectore, diaphragmate, hepate, stomacho, splene, ab occipite inquam spiritibus ad pectoris musculos transire non ualentibus, à neruis motum diaphragmatis impediētibus, à colli uertebis & pectoris, quum extra sedem diuer-

tuntur, à pectore, sicut ab eius angustia, abscessu, paruitate, ulcere, & colluie, à diaphragmate, hepate, splene, ob eorum abscessus & ulcera: interdum fit etiam ab exiccatione pulmonis, &c. Cause coniunctæ sunt ipsi humores infarcti in arterijs & uenis pulmonis morbum facientes, & similia.

Loci consentientes de causis.

Auicē. decima tertij, cap. 14, Et quandoque accidit propter multitudinem uaporis, quando coarctatur in pulmone, & propter uentositatem coarctatam in membris anhelitus, & quandoque causa generationis in ipso est frigiditas eius. Vide de his latius apud Mesu. cap. proprio. Galen. 7. de compos. medic. per loca, cap. 6. loquens de causis antecedentibus, inquit: Manifestum est coarctationem locorum præter naturam intrinsecus adesse, cuius etiam sensum ægri manifestè perceptant. Coarctatio uerò fit, quam aut crassorum & tenuium humorum multitudo pulmonis bronchijs fuerit infarcta, aut tumor abscessui similis in ipso constitit.

Oo. iiij.

rit, &c. Auic. loc. cit. Et quandoque fit propter nocumētū in ipso pulmone, & in eis quæ ipsi cōtinuantur, propter inuiscationē humorum crassorū in arterijs & ramis eorum, & quandoque in cana pulmonis, & eius raritate, & in locis uacuis. Et istæ materia effusæ sunt ad ipsum ex capite. Et quandoque isti humores nocēt sua qualitate, quātitate, & multitudine, & quandoque fit & rarō ab exiccatione pulmonis, & quandoque fit propter communitatem membrorū uicinarum cōprimētiū membra anhelitus, &c. Vide de his Gal 4. de uic. in morb. ac. com. 21, & 3. aphor. com. 26, & 4. aphor. com. 50. ibi enim à quibus causis spirandi difficultas fiat, apertè intelliges: lege etiam 4. de loc. aff. cap. 7.

De indiciis asthmatis, orthopnoæque.

Frequēs adest anhelatio, nec spirare possunt, nisi recta ceruice, pallefcit eorum facies. Si ab intēperie absque materia fiat, adest pectoris lenitas absq; sensibili grauitate, rursus sine sputo: calida ex caloris sensu & ex anhelitu & pulsu magno frequēti cognoscitur: fri

gida ex frigore in partibus spiritualib⁹ percepto & ex anhelitu, pulsu paruo ac tardo: sicca ex asperitate, ex siti, & à causis exiccantib⁹: humida ex causis contrarijs. Vel intemperies omnes cognoscuntur ab his quæ iuuat & nocet, nã calidis frigida prosunt, frigidis calida: humores cognoscuntur ex sapore, odore, crassitie ac tenuitate. Locus læsus cognoscitur, quoniã si in pulmone est læsio, tunc adest grauitas, screatus, tussis laboriosa, & difficilis anhelitus: si in aspera arteria, sonus adest in respirando, screatus facilis: si in bröchijs, screatus fieri nõ potest, nisi cū multa tussi: si fiat à peripneumonia, signa suo capiti ascribentur: si fiat asthma à toto per cõsensum sicuti in febribus, ex eo inde cognoscer, quòd ad earũ augmentum augetur, & in recessu minuitur: si per cõsensum ex partibus, facile etiam cognosces ex earum morbis superuenientibus, &c.

Loci consentientes de indiciis asthmatis.

Auic. decima tertij, ca. de sig. asthmatis, si humores uel humiditates fuerint causa asthmatis, tunc aderit cõstrictio, in principio an-

helitus, cum excreatione, oscitatione, & retentione humoris permanentis, & grauitas cum spuro, &c. Vide hunc locum fusius. nam de singulis signis hîc pertractatur. Vide insuper Arcul. Sauro. Gordo, &c.

De cura asthmatis & orthopnoæ.

Primus in curando scopus, (dummodo totius corporis repletio appareat.) sit sectio uenæ. Secundus sit humoris præparatio, ita ut tenuis incrassetur, tenax & uiscosus attenuetur cū syrupis in capite catarrhi memoratis. Tertius sit euacuatio, prout opportuna fuerit in humore peccate. Quartus sit humoris cum cucurbitulis & frictionibus ad partem oppositam reuulsio. Quintus residuum exiccat. Sextus sit regimen ex his quæ dilatant anhelitum. Vitentur acris, acerosa, styptica, tolentur fames & potus, uitetur insuper somnus meridianus ac diurnus, &c.

Loci consentientes de cura asthmatis & orthopnoæ.

Paul. lib. 3. ca. 29, Hac cura sit, ut per abs-
tergentia extenuantia que medicamina gluti-

nosus humor & crassus abscindatur: quòd si
 necessitas urgeat, etiã uena ante omnia inci-
 datur, & quantum uires patiuntur, sanguis
 detrahatur, &c. Gal. 7. de cõpos. med. per lo-
 ca. ca. 6. Cæterum curatio ambarũ affectio-
 num aliquid cõmune habet, & aliquid cuique
 proprium: cõmune utrisque est, ut redundãtia
 humoris affectiones generantis cõsumatur &
 expendatur: proprium uerò, ut si à crassis ui-
 scosisque humoribus fiant, per attenuãtia &
 extergentia consumantur, &c. Consule in his
 & alijs non solum Auic. sed Mesu. ipse enim
 singula declarat. Vide & Arcul. & alios præ-
 cticantes.

Observationes in præpara- tione humorum.

Paul. loc. cit. duo notat, alterum ut quum
 crassitiem & tenacitatem humorum secamus
 & attenuamus, humiditatẽ cum pharmacis
 adhibeamus, quo facilius efferatur, unde lar-
 giorẽ potũ anhelosis cõmendat: alterum, ne
 uehementer calidis uel frigidis in hac affe-
 ctione utamur, quia tenaces & crassi humo-
 res à uehemẽti calore uiscosiores redduntur,

Et sic difficulter auelli possunt, frigidis ne crassescant ac cogantur, &c. Vide similiter Aet. ser. 8. cap. 57.

Auic. loc. cit. Vitandæ sunt medicinae multum incisivæ, ibi & non sis contētus, &c. Secundò, miscendæ sunt medicinae hepaticæ, sicut eupatorium, cum pectoralibus, præsertim si crassities hepatis asthmatis adiungatur. Tertio, quum morbus sit natura longus, medicinae sæpius permutentur, non ex eodem genere in aliud, sed in eadem cōsimili facultate mutata permaneāt, ut uoluit quarta primi, cap. 1. ibi, Immò in una medicatione medicinā permuta, &c. Quartò in aegritudinibus chronicis interpolationes fiāt. Quintò, si causa coniuncta & antecedens aduersentur, attendatur illi quæ magis infestat. De observationibus aliarum intentionū lege Mesuen.

Conferentia asthmatis & orthopnoæ.

Conferunt asthmatis & orthopnoæ acetum scilliticū, amygdala amara, ammoniacū cum melle, assa fœtida in ouo sorbili, bolus armenius, calamentum, cappares saliti, de-

coctum centaurij Mes. dauci, diptami, enula,
 caricarum, adianti, gentiana, iuniperi, gra-
 norū lauri, marrubij, origani, pastinaca, oxy-
 mel scilliticum, peucedanū in ouo sorbili, pix
 humida cum melle, sulphur in ouo sorbili uel
 fumus eius in ore per embotum, scilla, thymus,
 hyssopus cum ruta, ficubus & melle, alliū co-
 ctum, beronica, gentiana, ius galli antiqui,
 galbanū, scœnugracum cum melle, urtica cum
 melle, bacca lauri, myrrha, uiola, zucharum.
 Composita sunt, T. de agarico, alipta musca-
 ta Nic. presertim in pueris, diapapauer,
 diaprasium, loch de pino Mes. loch de scil-
 la Serap. loch de papauere Haly. quadru-
 meron conf. Nic. rosata magna Nic. Syrupus
 de hyssopo, de prasio, de calamento, de iuin-
 bis, de liquiritia, theodoricon magnum Ha-
 ly, 6. antidota. theriaca magna Nic. hiera,
 logodium, hiera Archigenis, Phylonium ro-
 manum, &c.

De prognosticis asthmatis.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 50, Difficultates
 spirandi in febre intermittente, lethale: uide
 etiam aphor. 46. lib. 6.

Auicen. loc. cit. Hæc ægritudo cū accidit decrepitis, non forsitan sanatur, neque maturatur, quū ipsa in iuuenibus ut plurimū sit difficilis, & est ægritudo lōga, habēs cū hoc paroxysmos acutos iuxta similitudinē paroxysmorum epilepsie & spasmi, & multotiēs mutatur ad peripneumoniam, &c.

Authores dissentientes circa difficultates spirandi.

- 1 Adserere, asthma uerum non esse morbum pulmonis.
- 2 Adserere, orthopnoeam non posse fieri absque febre.
- 3 Adserere, apnoeam non dari posse in animali uiuente.
- 4 Adserere, pulmonem esse propriam anhelitus instrumentum.
- 5 Adserere, anhelitum esse motum tantū naturalem & non uoluntarium.
- 6 Adserere, spirandi difficultatem indicare tantummodo lasionem membrorum spiritalium.
- 7 Adserere, uinum in spirandi difficultate non esse exhibendum.

8 Adserere, pharmaca non ualde solu-
entia in asthma conuenire.

Confutatio dissentientium circa
difficultates spirationis.

Ad primum, Razes quarto cōment. cap. 1,
Asthma est ueraciter, quod in canalibus pul-
monis habet humiditates multas uiscosas,
prohibētes ex ipsarum uiscositate, ne aēr tra-
hatur quātitate opportuna. Et Auic. Asthma
est agritudo pulmonis, igitur erit uerus mor-
bus pulmonis.

Ad secūdū, Gal. aphor. 6. cōment. 46, Nō-
nulli simpliciter asthma nomināt, nōnulli or-
thopnœam, quādo absque febre agroti ingi-
ter anhelitū habēt difficilē: ex quibus uerbis
cognoscitur orthopnœam absque febre fieri.

Ad terciū, Gal. de loc. affe. cap. 7. in fine,
Nā impossibile uidetur, ut animal omni spi-
ratione exactè priuatū in uita seruari possit,
quāuis animalia quæ in cauernis latēt, tho-
racem mouere minimè uideantur, quare aut
exiguā fieri spirationem, ut sensum effugiat,
aut huiusmodi animalia tunc spiratione
omnino non indigere, sed eam spirationem

quæ per uniuersū corpus fit, sufficere, quippe hæc cor ipsū p arterias efficit, ex quib⁹ apparet ut apnoea dari possit uiuere etiā animali.

Ad quartum, Conciliator differentia 99, Sciendum quòd instrumentum proprium anhelitus est diaphragma, pulmo uerò coadiuuatiuū se habens ut ad secantem serra, &c. Probat etiā alia potiori ratione, ex eo quod insensibilis sit pulmo, tum quia tot musculos in pectore frustra natura procreasset.

Ad quintum, Auic. IO. 3. tenet, quòd anhelitus completur duobus motibus, inter quos sunt duæ moræ, &c. ita ut componatur ex motu uoluntario & naturali. Itidem confirmat Gal. de usu partium, &c.

Ad sextum, Hippoc. prædictionū 1. tex. 27. & Galen. in eodē. com. At uerò, inquit, rara spiratio, hoc est, multo tēpore interposito, si magna est, indicat delirium: si parua, extinctionem natiui caloris: igitur aliam à thora-ce etiam lesionem indicat, &c.

Ad septimū, Razes 4. cōment. Vinū tenue & subtile facit, ad asthmatis passionē, si in potu accipiat, multa quātitas. Hoc tamen

intellige in resolutione materia, uel ubi uinum sit cibus & potus.

Ad octauū, Paul. lib. 3. cap. 29, Ex antidotis hiera & purgatio cōtinens, ex ualidissimis medicamentis petita. Idē Auic. utitur helleboro & colocyntide. Præterea probatur etiam ratione, nā materia quæ sunt à uis duclū remota, educi nō possunt nisi per pharmaca uehementia: sed in asthmate ita sunt, igitur non nisi per ualidissima pharmaca educi poterunt, & per consequens uehementi indigent pharmaco, etc.

De peripneumonia.

Peripneumonia nil aliud est, q̄ pulmonis inflāmatio cū febre acuta & spirādi difficultate: & est duplex, uera & spuria: uera cum à sanguine: spuria, quum ab alyis humoribus oriatur: unde non immerito Mesues alioquin oculatus à Cōciliatore reprehēditur differentia 100 dum inquit, ueram fieri ex pituita, & esse minus mortalem, etc.

Loci consentientes de peripneumonia.

Paulus libro 3. cap. 30. ἡ περὶ πνευμονίας,

Pp. i.

φλεγμονὴ τῆς πνέμονος ἐστίν. similiter
 Act. ser. 8. cap. 66, Peripneumonia est pulmo-
 nis inflammatio cū febre acuta. Itidem Auic.
 decima tertij, tra. 4. cap. 10, Peripneumonia
 est apostema calidū in pulmone. Lege Gal.
 2. meth. & in lib. de finit. med. Item in lib.
 de part. art. med. cap. 4. ibi, Peripneumonia
 tantūm dicitur, quum à sola inflammatione
 pulmo afficitur, &c.

Mesu. cap. de peripneu. Ex ea quadam est
 uera, quadā non uera, &c. Vide eū tūlatius,
 uide etiā Cōciliatorē loc. cit. lege etiā de his
 Hippoc. & Gal. prædict. 1. tex. 29. Item Ar-
 cul. & Gord. & ceteros practiçantes, &c.

De causis peripneumonix.

Causæ antecedentes sunt angina, pleuri-
 tis, catarrhus, uel alia materia ab aliqua
 corporis parte ad pulmonē transmissa. Cau-
 sæ coniunctæ sunt humores ibi coarctati &
 putrefacti, sicuti est sanguis, bilis, pituita: fie-
 ri enim potest ferē ab omni humore.

Loci consentientes de causis peripneumonix.

Haly abbas in sua praxi, Et hoc apostema

aliquando fit ex materia sanguinea, aut ex cholera quæ ad pulmonem incurrit, nonnunquam à catarrho à capite descēdente, interdū à pleuritide, iugulatione, &c. nam pulmo imbecillis ea faciliè suscipit, quæ ab alijs membris repurgantur. Paul. lib. 3. cap. 30. idem sentit, ibi, Inflammatio fit ut plurimum à ualentibus in eam partem destillationibus, aut angina, aut suspirio, aut pleuritide, &c. De causis uerò coniunctis loquitur Auicē. decima tertij, cap. 10. ibi, Et peripneumonia fit ab omni humore, sed ut plurimum fit à phlegmate, quoniam in membro rarò non continetur humor subtilis, &c.

B. Intellige Auicē. uelle peripneumoniā à sanguine, & à pituita frequenter fieri, rarò ex bile, rarissimè ex atra bile, unde Auic. plura capita facit de hac re, quem legere poteris. Gal. aphor. 7. coment. 12. causas peripneumonix etiam tetigit, quem fusius uidebis.

De indiciis peripneumonix.

Indicia cōmunia omni inflāmationi sunt rubor, tēsio, dolor. Propria sunt febris acuta,

Pp. ij.

grauitas absque dolore, nisi pellicula ipsius thoracis sint inflāmatæ, quoniam tunc dolor percipitur, spirādi adest difficultas, rubescunt male & facies, nasus fissus, uenæ reporum eleuantur, appetitus deiectus est, linguæ adest siccitas, tuſſis sicca præcipue in morbi principio, respiratio calida est, sputum biliosum, spumosum, & quandoque cruentum, uigiliæ adsunt quæ deliriū & stuporem inducunt, extremitates frigidæ, ungues liuidi incuruantur, & hi plerunque in 4. uel 7. per-eunt: si uerò ad salutem tendat morbus, sanguinis ex naribus profluium sequitur, excrementitia per sedem excernuntur, &c.

De locis cōsentiētibus de indi-
ciis peripneumonix.

Gal. 4. de loc. aff. cap. 8, Quando cū spirandi difficultate, cui & angustia & grauitas cōiuncta est, acuta quoque febris inciderit, is affectus inflāmatio pulmonis est: quod si fuerit intolerabile incēdiū, angustia uerò & grauitatis sensus minor, erysipelas ipsum uexare censendū est. Et 2. de loc. aff. cap. 7,

Signa inflammationum cōmunia sunt, ut partes inflāmatæ rubescāt, tēdātur, remittantur, intumescant & doleant. Et 2. de loc. aff. cap. 9, Cognoscitur pulmonis inflammatio, quia tanta inducitur spirādi difficultas, tantāque angustia, ut suffocari laborātes uideantur, ac recti sedere cogantur, calida adest respiratio. Quocirca ubi plurimūm perflant, iuuari uidetur: in tussiedo modo hoc, modo alio colore infectū expuitur, ut rubrum, flauum, rufum, spumosum, nigrum & liuidum. grauitatis sensus adest, dolorque ab imo ad pectus & ad spinam, & febris acuta adest, &c. Lege de his fusius Aet. ser. 8. cap. 66. Vide similiter Auicē. decima tertij, cap. 2. ipse enim addit, quod dolor ascēdit ad iugulū, & pulsatio est usque ad spatulam, & furculam, & mamillas saltē apud tussim, & quādo dormit super latus præfocatur, & lingua primò rubescit, deinde nigrescit, & q̄ adest inflatio oculorū, grauitas palpebrarum, pulsus undosus, lenis & diuersus, & ibi reddit rationem horū omniū. Vide insuper Hipp. 2. prognost. tex. 60. Vide etiā Arcul. & Razē 9. almās.

Pp. ij.

ibi, Cum alicui superuenerit febris, & in aë-
ris attractione tantam patitur constrictionē,
ut se præfocari putet, &c.

De cura peripneumoniæ.

Primus in medendo scopus erit reuulsio,
ut inflammationis augmentum prohibeatur,
quæ fieri potest cum sectione uenæ, cum cu-
curbitulis, cum impositione enematum, &c.
Secundus est humoris digestio, unde si fuerit
à sanguine uel à bile, conueniunt syrupus uio-
laceus, iuiubinus cum aqua hordeacea uel
zucharacea, uel syrupus myrthinus de papa-
uere cum decocto pec. Si uerò fuerit à pitui-
ta, conueniunt syrupi de glycyrrhiza, de his-
sopo, oxymel simp. miscendo secū syrup. uiol.
cum decoctis pectori conducentibus, &c. Ter-
tius est euacuatio, quæ fieri potest cum man-
na cassia, rheubarbaro 7. de uiol. de agarico
cum electuario de sebesten, &c. Quartus est
sputi prouocatio, & completur cum his quæ
in ore lambuntur, ut patet in cura pleuriti-
dis, &c. uide ibi plura.

Loci consentientes de cura
peripneumoniæ.

Gal. meth. 13. cap. 4, Quum aliqua particula phlegmone urgeri cœperit, uidendum est an propter calorem aliquem, qui in illa præter naturam ortus sit, an propter dolorē uel ipsius uel propinquæ alicuius partis hæc contraxerit, quò scilicet adempta causa phlegmone non amplius increscar. Post hæc considera num uicina particula sanguinem largius ad partem phlegmone obsessam transmittat, deinde si corpus succorum æqualiter auctorum redundantia laboret. Si igitur corpus fuerit plethoricum, uel malo succo redūdet, cogimur sanguinem mittere, & membrū, ne quid transmittat, corrigere, &c. Aet. ser. 8. cap. 66, Si nil obstiterit, uena in cubito secanda: & si uires ualidæ fuerint, ex utroque brachio sanguis extrahatur, &c. Vide latius Auic. loc. cit. & Arcul. & Marcum Catin. & Sauonarolam & Gordon.

Obseruatio in sectione venæ.

Herc. 9. alman. Reiteratio sanguinis fieri
Pp. iij.

non debet, nisi plethoricum sit corpus, uel membrum influens sit hepar, uel aliqua euacuatio solita, puta menstruorum, hæmorrhoidarum repressa sit, aut si quam putaremus ad membra principalia materiam defluere, in alijs enim periculosa & suspecta est, &c. Auic. decima tertijs, cap. 1. commendat plus sectionē uenæ, quā uētris solutionē, quia in ipsa, inquit, non est timor sicut in solutione, quā interdū nō soluat, interdū superflua sit, prohibet etiam narcotica, quoniam spurum & maturationem prohibent, &c.

Observationes in topicis.

Platearius, Nunquam utendum est reperiussius, sed diaphoreticis & resolutiuis. Præterea caueant aquæ calidæ infusionem super caput, quia liquefacit humiditates, & superfluitates ad pectus descendere cogit, &c. Auic. loc. cit. unum aduertit, quod in topicis exterius applicitis maior esse debet in penetrando uis, quā in pleuritide: nam in peniori loco affectio collocata est, unde ad cataplasmata, fomenta & linimenta addatur aliquid quod sit tenuium partium. Et notæ

quod debent applicari tam retro supra spō-
dilos, quàm antè ex directo partis inflam-
mate, &c.

Conferentia peripneumonix.

Conferunt peripneumonia, althea, amyli,
aqua mellis, butyrum cum melle, bolus arme-
nius, capillus Veneris, semina cucurbitæ, ci-
truli melonum, crocus, decoctio hyssopi, faba
fressa in cubis, farina hordei, carica cum fœ-
nugrieco decoctæ, succus gētianæ, iuleb uiol.
iuiubinum, iuleb Alzemes Mes. in cur. pleu-
rit. Glycyrrhiza, organū cum melle penidij,
pix cum amygdalis & zucharo, porrum cum
melle, mucilago psylli, ruta cum anetho sicco
coctæ, viola, hypericon, iris, hyssopus cum ruta
ficubus & melle. Composita sunt oleum de
amygdalis, oleum narcissi, de cucurbita, uio-
laceum, syrupus de cucurbita, violaceus, de vi-
no granatorum dulcium, iuiubinus, unguen-
tum violaceum, zucharum violaceum, confe-
ctio catasici Haly, 6. antid. Dialthea, æsypū,
diapapauer, diadragacantum, diaolibanum
Nic. Phylonium Nic. cum melle, loch de pa-

pauere Mesrosata magna Nic. sotyra Nic.

De prognosticis peripneumoniae.

Hippoc. aphor. 5. aphor. 10, Quicunque ab angina liberantur, ijs ad pulmonem uertitur, & in 7. diebus pereunt: si uero has effugerint, suppurantur. Et aphor. 6. apho. 16, A morbo laterali, uel pulmonia habito, alui profluuium adueniens, malum. Et aphoris. 7. aphor. 2, A morbo laterali inflammatio pulmonis, malum. B. Nota peripneumoniam fieri à pleuritide, sed non econuerso, quia si mitis fuerit inflammatio, omnis humor noxius per sputum expurgatur: si sit perniciofa, antequàm costæ patiantur, strangulat. Et aphor. 7. aphor. 12, A pulmonis inflammatione phrenitis malum. Et secundo prognost. ca. 69, Qui purulenti ex pulmonia sunt, &c. Vide tu Galeni commentum: item secundo prognost. tex. 64. ibi, Quibus abscessus, &c. Et tex. 67. eiusdè libri, Auic. Peripneumonia quæ à cholera rubea fit, secundum plurimum sua acuitate interficit, cùm sit uicina cordi, & appositio cū infrigidatibus non peruenit ad locū, &c.

Mes. Et dixit Gal. quòd peripneumonia est
difficilioris curæ quàm pleuresis, & prom-
ptior ad interficiendum, eò quòd solutio cò-
tinui in pulmone rarò est susceptibilis curæ:
uel quia uirtus cordis non tantùm patitur,
immo deficit ab inflàmatione eius, &c. Her-
cul. Peripneumonia longa & diuturna per-
ducit tandem ad nocumentum hepatis, ita ut
erret eius digestiua, & tumescant pedes &
crura, interdum etiam uenter. Auic. decima
tertiy, cap. 2. Et Hippoc. dixit, quòd quando
accidunt exituræ apud mamillas, uel ea quæ
sequitur ad eas, & aperiuntur pustulæ, eua-
dunt, & similiter quando accidunt exituræ
in crure, sunt signa laudabilia, &c.

Authores dissentientes circa
peripneumoniam.

- 1 Adserere, peripneumoniam fieri non pos-
se à pituita per uiam influxus.
- 2 Adserere, peripneumoniam pituitosam
esse biliosa deteriore.
- 3 Adserere, in peripneumonia ex alijs mor-
bis facta conferre sectionem uenæ.

Confutatio dissentientium circa
peripneumoniam.

Gal. 2. de loc. aff. cap. 9, respōdet primo,
Quippe iam ostendimus omnem inflamma-
tionem ex affluente fieri sanguine, quapro-
pter si biliosus fuerit sanguis, flauum aut pal-
lidum erit sputum: si pituitosus & spumans,
candidum, &c. Ex quibus inferri potest hāc
e iam inflammationem pulmonis à pituitoso
sanguine gigni posse, &c.

Ad secundum respōdet Mes. & omnes an-
tiores, quòd deterior est biliosa, quum mor-
bus sit acutior, seu inducens accidētia, &c.

Ad tertium, Paul. lib. 3. cap. 30, Vitabimus
sanguinis detractionem, dum ex alijs morbis
peripneumonia dependeat, & si in statum
morbus fuerit, &c.

De sputo sanguinis.

Sputum sanguinis nil aliud est, quàm quæ-
dam sanguinis reiectatio per os undecunque
proueniens. Hic considera potius locum à
quo sanguis emanat, quàm ipsam definitio-
nem, ut monet Gal.

De causis sputi sanguinis.

Causa eius primitiua sunt percussio, casus, uociferatio, acuitas uocis, uomitus laboriosus, cibi acuti, calidi, timor & angustia sanguinem acuens, sanguisuga gutturi inhaerens, frigus constringens, caliditas dissoluens, &c.

Causa antecedentes sunt multitudo materiei & ciborum, aut retentio menstruorum, aut sanguis ex hemorrhoidibus, aut abscissio membri, aut acuitas humorum, aut uehementia motus, aut flatuosus spiritus, &c. Cause coniunctae sunt, quia si proueniat à uenis, erit aut incisio, aut perforatio, aut apertio, aut erosio, aut ualida abstersio: si uerò non prouenerit à uenis, tunc erit uel uulnus, uel ulcus, quod à corrosione, uel putrefactione, uel ab abscessu sanguineo fiet, &c.

Loci consentientes de causis sputi sanguinis.

Avic. decima tertij, cap. 4, Causa primitiua fit ex percussione aut casu super pectus aut super hepar, aut à re incisua, aut à tussi frequenti, aut à uociferatione, aut ab acui-

606 DE CONSEN. MEDIC.

tate uocis sine gradatione, aut à rixa, aut à uomitu laborioso, & propriè in preparatis, aut assumptione solutiuiorum acutorum, aut ciborum calidorum, aut à timore & angustia sanguinem acuate, &c. Galenus 4. de locis affectis capite octauo, Voco precedentes causas, aut cum aliquis ex alto, uel in ludo, uel in certamine ceciderit, aut ubi lapis uel lignum thoracem offenderit, aut ira cum exclamatione acuta uehementi que uoce, ut cytharædis tragædisq; accidit, uasa diruperint: uide locum hunc fusius. De causis antecedentibus & coniunctis loquitur etiam Gal. 4. de loc. aff. cap. 5, Sanguis reijcitur uel rupto uel eroso uase aliquo, uel ore alicuius uena patefacto rumpitur uas, uel ob sanguinis abundantia, aut ob frigus à uicinis partibus contractum, aut ob innatam intemperiem. Quandoque ruptionis causa est aut uehemens motus, aut humorum abundantia qui una cum crudo & frigido & flatuoso spiritu uenas extendant, &c. Lege hancmet sententiam cap. 8. eiusdem: similiter 6. de symptom. cau. cap. 2. ad medium. Vide etiam

Auic. decima tertij, tract. 3. cap. 4. Similiter
lege omnes practicanes.

De signis sputi sanguinis.

Quoniam locum cognoscere ex quo sanguis emanat necessarium est, ne inter stolidos quos redarguit Gal. computemur, diligenter aduertendum, quod si à capite sanguis fluat, quod capitis uel dolor uel aliud nocumentum præcessit, si proueniat ab arterijs, magno cum impetu exiet, eritque tenuior, rubeus cum claritate, uixque cohibetur. Si à pectore, præcessit dolor: tussis & grauitas, si à pulmone. Habes Hippoc. aphor. 13. lib. 5. ibi, Quicumque spumofum sanguinem expuunt, is à pulmone eductio fit cum tussi multa, extenuatio corporis, alteratio in genis, &c. Nota etiam quod spumofus sanguis de mēte Auic. prouenire potest etiā à cana pulmonis. Si sanguis prouenerit à rupto uase, in primis erit multus, deinde paucus cum aliquali dolore. Si ab eroso uase, accidunt affatim sanguinis uacuationes, præceduntq; exigua sputa, atq; acres ex capite in pulmone destillationes, eritq; tenuis.

Sanguis ex aperitione orificiorum in principio est paucus, deinde augetur, & est sine dolore, sanguis ab apostematibus, corrosionibus & ulceribus cognoscitur ex præessione eorū, & interdum expuitur sanies, &c. Sanguis proueniens ex naribus faciliè cognoscitur, in ex rubore faciei, tum quia dum exprimitur, nasus adhuc fluit. Vel rem breuius sic habet: Sanguis ab ore proueniens per quatuor modos cognoscitur, aut expuitur tantum, & est ex partibus oris: aut exit cum sreatu, & est ex colatorio, uel uuula palati & partibus eorum: aut exit cum uomitu, & prouenit uel à meri, uel à stomacho, aut ab hepate & finibus eorum: aut exit cum tussi, & tunc uel est ex pectore uel pulmone, aut cana, aut lacto uocali, aut epiglotti, &c.

Loci consentientes de signis sputi sanguinis.

Gal. 4. de loc. aff. cap. 5. Cognoscitur sanguis qui à gula & uentriculo reycitur ex ipso uomitu: si ex spiritualibus partibus, ex ipsa tussi: si ex faucibus & gurgulione, ex sreatu:

si ex ore, ex simplici expuitione. Cognosces ex erosa uel exesa uena, si nulla præcedente causa existēte, sanguis plurim⁹ inter tuſsiēdū reijciatur. Cognosces à pulmone educi, ubi fuerit sanguis spumofus. Cognosces à partibus pectoris emanare, si illic dolor adfuerit: nam in thorace multi adsunt nerui, quibus dolores percipi possunt. Cognoscitur à primaria thoracis affectione fieri, si neque multū, neque rubrum, sed nigricantem grumosū, que sanguinem conieceris, &c. Vide etiam cap. 8. huius lib. Item Paul. Aeginetam cap. 31. lib. 3. Itē Aet. ser. 8. cap. 59. Et Auic. 10. 3. tra. 3. ca. 4. Tibi ad unguē omnia intelliges. Vide etiam Mesu. cap. de exitu sanguinis ab ore: similiter Arcul. & alios practicanes.

De cura sputi sanguinis.

Primus scopus in medendo erit, sex res nō naturales ad frigidum & siccum ordinare, ut sanguis cohibeatur & frigeſiat. Cibi igitur sint uiscosi glutinosique, stiptici & frigidi, quales sunt prisana hordeacea, uel ex amylo cōfecta, aut pisces uiscosi, carnes cras-

Q q i.

GIO DE CONSEN. MEDIC.

sa, pingues, & animalium extremitates. Cō-
 nexiunt etiam caseus recens, portulaca, lentes,
 miliū, alica ac coriza. Bibatur aqua chaly-
 beata, uitetur exercitium, loquutio, &c. Se-
 cundus erit reuulsio, quæ fieri potest per
 phlebotomiam multoties repetitam, quæ pro
 singula uice sit modica. Hinc ualet ligare
 extrema, menstrua & hæmorrhoides euo-
 care, cucurbitulas natibus affigere, &c. Ter-
 tius est malam sanguinis qualitatem tempe-
 rare, reprimendo eius aquositatem, uel (ut ita
 dicam) biliositatem. Si enim fuerit aquositas
 illa pituitosa, præparetur cum rhodomelle &
 syrupo rosaceo, deinde euacuetur cum myro-
 balanis, chebulis & rheub. At si sanguis
 fuerit biliosus, digeratur cum syrupo rosaceo
 de semine acerosæ, de granatis, de omphacio,
 de citonijs, myrrhino, de portulaca, cū aquis
 plantaginis, portulacæ, &c. deinceps eua-
 cuetur cum myrobalanis citrinis & rheub.
 cum cassia. Quartus est sanguinis cohibi-
 tio, quæ primū & statim fienda erit, ne
 fortè adeò uires egrotantis prosternat, ut
 difficultas sit in reuocando. Primū conue-

IN CVR. MORB. LIB. III. 611

nit portulaca, lapis hematites, corallus, cornu ceruinum ustum, terra sigillata, bolus armenius, semen myrthi, flores & cort. granatorū, gumi arab. &c. Sextus est, ut si sanguis in pectore uel uentriculo coaguletur, statim dissoluatur cum oxymelle simplici & composito, cum aquis hyssopi, scabiosæ: aliqui exhibent theriacam & coagula leporis, &c.

Loci consentientes de cura
sputi sanguinis.

Auic. 10. 3. tra. 3. cap. 6. loquitur de sex rebus supranaturalibus dicens, Et cibi conuenientes eis, sunt omne conglutinatium & oppilatiuum, & omne consolidatiuum, & omne infrigidatiuum sanguinis, prohibens feruorem eius, & custodiantur ab omnibus causis mouentibus sanguinem, ut sunt cibi calefacientes, saltus, clamor, rixa, coitus, loquutio plurima, &c. Vide de his latius Mesuem.

De Renuisione loquitur Paul. lib. 3. cap. 31, Quibus destillatio cruentum sputum cōcitat, uena protinus debet incidi, & pro uiriū modo sanguis detrahi. Auic. loc. cit. Cura est

Q. 9. 4.

ut succurratur cum phlebotomia basilica, in qua existimatur esse resolutio singularis, &c. Et fricentur eius extremitates & ligentur, incipiendo à superioribus ad inferiora, &c. Vide de his latius Marcum Cat. Arcul. Gord. & reliquos practicantes, &c.

Item Mesuem ibi, Secundam rem complent administrationes phlebotomiæ cum iterationibus, &c. De Rectificatione sanguinis loquitur Auic. loc. cit. ibi, Et sumant in potu medicinas frigidas conglutinativas, &c. Vide de his uberius Mes. & Arcul. De constrictione sanguinis loquitur Galen. 7. de comp. med. per loc. cap. 4, Curamus apertionem osculi alicuius uasis per obturationem, & rupturam per eius conglutinationem, & uasorum erosionem per renutritionem erosorū. Obturatur osculum dilatatum per adstringentia, conglutinatur ruptum per eadem & quacunque ipsis in compositione cirra mordacitatem resiccantia, & glutinosi quid habentia miscant, ut lemnia terra. Renutrientur corrosa per cibos boni succi, & pharmaca carnem gignentia, &c. Vide fusius Gal. 5.

merh. cap. 5. 6. & 7. Item Aet. ser. 8. cap. 63.
Et Auic. ibi, Et confert tribuere ei in potu
trochiscos de charabe, &c. Vide de his iuxta
Arcul. Mar. Cat. Saunon. Guilielmum Plac.
Gordonium, & reliquos practi- cantes, &c.

Obferuationes de euacuatione.

Mesu. cap. de flu. sang. ab ore, Si fuerit
acutis & inflammatio & ebullitio in san-
guine propter mixtionem cholerae acutae in
ipso, oportet ut euacuetur cholera prius, de-
inde phlebotometur: hoc enim est secundum
canonem artis, demum sequatur infrigida-
tio, &c.

Obferuationes in adstringentibus.

Gal. 2. de comp. med. per loc. cap. 4, Con-
ueniunt adstringentia ijs qui non tussunt sim-
plicia: sed illis qui ex pulmone, aut thorace,
aut arteria sanguinem reieciunt, miscenda
sunt adstringentibus calida, & tenuium par-
tium existentia, ut per totum corpus distri-
bantur.

¶ q. iij.

614 DE CONSEN. MEDIC.

butio fiat: ubi uerò circa stomachum aut
aluum affectio hæc contingat, huiusmodi
pharmacorum mixtura opus non est, &c.
Razes 15 comment. In ruptura uenæ pectoris
& phthisicis noli prohibere sreatum perse-
uerante adhuc catarrhi descensu ad pectus
uel pulmonem, &c.

Cohibentia sputum san-
guinis.

Cohibent sreatum sanguinis, aloes, amy-
lum, balaustia, barba hircina, betonica, bolus
armeniæ, cinis cancri, cortices castaneorum,
cauda equina, cætaurium maius, nux cupres-
si, cydonia, & eorum flores, coagulum leporis
& hædi, colla piscium, corallus, corrigiola, co-
riandrum, cornu cerui ustum cum dragacan-
to, radix dracontæ, hæmatites, gummi ar-
abicum & amygdalarum, cortex glandium,
flores granatorum, hyosciamus, charabe, la-
chryma lentisci, litium, lutum sigillatum, ma-
stix, fructus myrthi, mumia cum mastice, ænā-
the, omphacium, cortex rad. oliuæ, cortex oli-
bani, albumen oui, pix, portulaca, plantago,

psylium, rheubarbarum, rosa, succus rubi, salix, sandaraca, sanguis draconis, symphytum, synopida in ovo, cortex suberis, sumach, spina alba, spodium cum succo plantaginis, stercus apri, terra samia, triticum, uernix, uirga pastoris, hypocystis. Composita sunt, Trochisci hemathicorum Mes. in cur. sputi sang. T. de charabe, de terra sigillata, de papauere, de stella Auic. triphera saracenica Nic. theriaca maior Auic. sotira confectio, confectio mirabilis Mes. in cu. tuſſis hum. medicamen Andromachi Auic. phylonium persicum, diaolibanum Nic. loch de papauere Haly, diapaouer Mes. diasulphur Serap. aqua aluminosa, chalybeata, athanasia magna Auicen. I. 5. etc.

De prognosticis sputi sanguinis.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 25, Sanguis quidem supra qualiscunque fuerit, malus, infra autem bonus. B. Si immoderantia sanguinis adsit, siue infernè uel supernè exeat, semper malum est: immoderata enim nullo modo naturæ quadrat, etc. Et aph. 4. aph. 47, Excretiones

Q. q. iiij.

in febris non intermittētibz liuidā, cruetā, foetida, omnes mala. Et aphor. 4. aphor. 27, Quibus in febris sanguinis fluxerit multitudo quacunque ex parte, &c. Et aphor. 5. aphor. 3, Vbi sanguis plurimus fluxerit, singultus aut conuulsio superueniens, malum. B. Intellige nisi à plenitudine proficiatur, alioqui ad ualeitudinem confert. Verū si ex euacuatione alius morbus sequatur, necessario prognosticum erit malum. Nam Hippoc. aphor. 7. aphor. 9, A profluvio sanguinis desipientia & conuulsio, malum. Et aphor. 6. aphor. 10, Caput dolenti & circundolenti pus uel aqua uel sanguis effluens per nares, aut os, aut aures, morbum soluit. Et aphor. 7. aphor. 15, A sanguinis sputo puris sputum, malum. B. Hoc intellige de sputo maligno quod ex pulmone educitur, alioqui sensus aphor. non esset semper uerus. Et aphor. 7. aphor. 37, Quicunque euomunt sanguinem, si sine febre quidem, salutare: si uerò cum febre, malum: curare uerò acerbis & refrigerantibus, &c. Gal. 7. de compos. med. per loc. cap. 4, In reiectione

sanguinis, primum periculum est, ne immoderata euacuatio fiat, &c. Auic. 10. 3. tract. 3. cap. 4, Et ille cui accidit sputum sanguinis est preparatus ut adueniat ei ulcus pulmonis: & ille qui est à pectore, non est tantum timoris, quàm in eo quod est ex pulmone. Et multoties quidem est sputum sanguinis causa sanitatis apostematis in hepate aut splene, &c. Lege & aphor. 3. aphor. 29 ibi, Iuuenibus autem sanguinis spuitiones, tabes, febres acutæ, &c.

Authores dissentientes circa
sputum sanguinis.

- 1 Adserere, sputum sanguinis cum tussi semper à spiritualibus membris prouenire.
- 2 Adserere, spumosum sanguinem semper esse indicium affecti pulmonis.
- 3 Adserere, aperitiua in sputo sanguinis à retentione menstruorum facto conferre.
- 4 Adserere, omnem sanguinis reiectionem per superiora semper esse malum.

Confutatio dissentientium circa
sputum sanguinis.

Ad primum, Gal. 4. de loc. aff. cap. 5, Nos
uerò sanguinem qui à cerebro ad gurgulionis
partes internas, ut ad fauces affatim descē-
dat, tuſiēdo educi ſæpenumero conſpexi-
mus, quippe gutturi ſubito irruens tuſim mo-
uere poteſt: ex quibus reprehendit Medicos,
qui eruptionem periculoſiſſimam tanquam
pulmone affecto credebant.

Ad ſecundum, Auic. cap. de ſig. ſpu. ſang.
Et quandoque eſt ſpumofus ſanguis ex cana
pulmanis proueniēs. Et paulò poſt, Et ſpuma
cū dolore pectoris ſignificat locū aegritudinis
unde non ſemper erit à pulmone ſpuma, &c.

Ad tertium, Auic. 10. 3. de cur. ſpu. ſang.
Caueant à cibis calidis & omnibus caleſa-
cientibus, ſed aperitiua ſunt calida, igitur nō
conferunt. Præterea Hipp. aph. 7. aph. 37, Cu-
ra cum acerbis & refrigerantibus, nō calidis
& prouocantibus: ſed in hoc caſu fac ut mo-
net Gal. 5. meth. ubi per ſectionem uenæ men-
ſtrua prouocat, & nō aperitiuus. Nec ſtyptica
cū aperitiuis admiscenda ſunt, quā alcerū ab

altero facile in operatione impediatur.

Ad quartum, Gal. aph. 4. com. 25. inquit, eam quæ supra fit per os solam excretionem non esse semper malam, illa quæ fit per nares omiſſa, quæ etiã nō est mala, quoniam Hipp. aph. 7. aph. 37, Quicūque euomunt ſanguinē, ſi ſine febre quidē ſalutare, &c. igitur non ſemper erit mala, &c.

De purulentis & tabe ſiue phthiſi.

Empyema eſt puris collectio in media inter thoracem & pulmonem regione. Tabes uerò quæ à Græcis φθίσις dicitur, eſt pulmonis uel thoracis ulceratio cum febre de bili ac tuſſicula corpus conſumens: nam à uerbo φθίω, quod eſt diminuo, dicta eſt: ex ulcere enim corpus cōſumitur, diminuitur, ac colliquatur. Hæc differt ab hectica, quum omnis phthiſicus ſit hecticus, & non econtra: præterea hectica tam ab ulcere, quàm à non ulcerato pulmone oritur. Marasmus etiam ipſe conſumptionem corporis importat quæ à febre acuta dependet. Tabis tres ſunt ſpecies: una quum corpus non alitur,

ita ut summa macies oriatur, à Græcis ἀτρεφία dicta. Altera, ubi malus corporis habitus est, in quo ferè omnia alimenta corrumpuntur, & hanc Græci καχεξία uocant. Tertia est quæ à Græcis dicta est φθίσις, & fit quum à capite in pulmonem catarrhus descendit, & frequens tussis oritur. Interdum tamen à medicis pro uno & eodem morbo accipiuntur.

Loci consentientes de empyemate & phthisi.

Paul. lib. 3. cap. 32. ἐμπύημα κατὰ τὰ κε-
νὰ τῆ θώρακος ἢ τοι καὶ τὸν ὑπεζωκότα σπλῆ-
ναται, id est, si uerbum uerbo reddideris, Em-
pyema in uacuis thoracis regionibus, uel in
membrana costas subcingente colligitur.

Gal. lib. de tum. præter naturam, cap. 3.
ἐμπύους, hoc est purulētos dicunt, quibus pus
in media inter thoracem & pulmonem re-
gione fuerit collectum. Similis sensus habetur
5. meth. cap. 8. & aphor. 6. comment. 27. &
4. de loc. affect. cap. 5. Aet. ser. 8. cap. 67,
Phthisis propriè est ulceratio pulmonis ad

sanguinis spuitiones consequens. Gal. aphor. 7. comment. 16, Quam propriè phthoen nominant Græci, hanc Hippocr. phthisim appellat, quæ pulmonis ulcera insanabilia consequitur, & totius corporis cū febre parvam extenuationem. Vide etiam hanc definitionem in lib. de fin. med. & 5. de loc. affect. cap. 3. Vide etiam Mesu. ibi, Phthisis est detrimentum desiccationis & consumptionis, cadens in corpus ex calore febrium habitualium & ulcere pulmonis.

De causis empyematis & phthisi.

Empyema fit uel à sanguinis eruptione, uel ab ulcere, aut ab inflammatione abscessa & rupta, aut à catarrho à capite ad pectus fluente. Causæ primitiue phthisis sunt aër, motus uolenti corporei, regio borealis frigida & sicca, cibi & potus salsi & acres ac caput replentes, casus, percussio, autumnus pluuiosus, & temperies ægri frigida & sicca, &c. Causæ antecedentes sunt destillatio acris mordicans ac corrodens, aut præcedens peripneumonia iam putrefacta & ulcerata,

aut pleuritis rupta, aut putrefactio & corrosio præcedens in substantia pulmonis, aut aliqua causarum sputi sanguinis uenam aperiens, &c. Causa coniuncta est ipsa materia producens phthisim ad actum, &c.

Loci consentientes de causis empyematis & phthisis.

Paul. lib. 3. cap. 32, Purulenta screatio fit uel propter sanguinis eruptionem, aut ab ulcere in pulmone, aut ab inflammatione abscessa & rupta, aut à destillatione à capite fluente ad pulmonem, &c. De causis primitiuis plura habes ex Auic. 10. 3. cap. 15. ibi, Et causa extrinseca est sicut casus & percussio, aut multiplicatur quum æstati boreali sicca succedit autumnus pluuiosus, &c. Vide de his Arcul. fusius. De causis antecedentibus loquitur Mes. cap. de phthisi, ibi, Ulceratio huiusmodi causam habet, aut ex præcedenti catarrho acuto, ulceratino, instillante in pulmonem, quandoque ex præcedenti pleuritide aut peripneumonia, &c. lege, eum fusius. Lege etiam Auic. 10. 3. tract. 4. cap. 19, ibi, Cau

ſæ ulcerum pulmonis ſunt catarrhus mordi-
catus, &c. Vide etiam Gal. 4. de loc. affe.
cap. 8. fuſius de his cauſis pertractantem &
alios practiſantes, &c.

De ſignis empyematis & phthiſis.

Signa ab exeuntibus ſunt ſputū ſaniei cum
ſignis ſuis, urina eſt naturalis, uerū inter-
dum oleaginea, interdum habet furfures, quæ
omnia humidi conſumptionem ſignificant: in
proceſſu morbi lenteria aut diarrhœa ſu-
peruenit, & ſudor in fine digeſtionis. Signa
à qualitate mutata ſunt febris continua uni-
formis, genæ liueſcunt, pedes tumefcunt, car-
nes conſumuntur, ungues curuantur, palli-
di apparent. Signa ab actione laſa, malè dor-
miunt, pulſus minutus, frequens, uniformis, di-
uerſus in fine, anhelitus naturalis, ſed in fi-
ne ob uirium imbecillitatem diuerſus, appe-
titus deiectus, & quod ſurſum uergit, ſædi eſt
odori, &c.

Loci conſentientes de ſignis.

Hippocr. prædict. 2. tex. 60, Cognoscuntur

purulenti principio si febris non dimittit: sed
 interdum tenuior, noctu uehementior. Si copia
 sudoris elicitur, ac tussendi cupiditas adsit,
 nec quidquam tamen dignum commentatio-
 ne expuunt, si oculi caui redduntur, maxilla
 ruborem contrahunt, unguis manuum curuan-
 tur, digiti potissimum summi calescunt, in pe-
 dibus tumores consistunt, neque cibum appe-
 tunt, & pustulae circa corpus erumpunt,
 &c. B. Causas horum signorum habes in com-
 ment. Galen. Lege de his Paul. lib. 3. cap. 32.
 ibi, Phthisis confirmata, &c. Lege etiam Gal.
 2. de morb. cau. ca. 7. & fusius 1. de diff. feb.
 ca. 9. Lege etiam Aet. & Paul. ibi, Pus collectum
 attestatur grauitas pectoris, tussis ualida sic-
 caque, &c. De signis preparatorum ad phthi-
 sim loquitur Gal. & Hipp. aphor. 5. aphor.
 9. ibi, Tabes fiunt, &c. Et Auic. 10. 3. trac. 4.
 cap. 20. ibi, Isti sunt alati, habentes pectus stri-
 ctum, &c. ubi infert quod collum gracile &
 longum praeseferunt, & humeros ad modum
 alarum & scapulas quasi a pectore semotas
 habent, si macilenti sint, & carnem cum humorum
 acrium influxu mollem habeant, ad phthisim

inclinati sunt. Vide de his fusius Arcul. & Galen. de diff. feb. 1. cap. 9. Cognosce etiam ex Gal. & Hippo. prognost. 2. tex. 62. Quatuor eruptionis suppurationis signa, quæ sunt dolor, spirandi difficultas, tussedo, & screatio: quæ si contineantur, & uehementer infestent, celerè significant eruptionem: si minus, diuturniorem, &c.

De cura phthisis & empyematis.

In primis an phthisis curari possit, lege Conciliatorem differentia 193. Si curanda erit, unica erit intentio, ut uidelicet causam tam conseruatricem, quam productricem amoueamus: quæ si fuerit à sanguine, per sectionem uenæ reiteratâ: si à bile, per cholagoga: si à phlegmate, per ea quæ pituitam educunt: quanquam sciam Auicen. à Raze in hoc differre, ut ipse solutiua ad causam remouendam exhibeat, quæ à Raze ratione phthisis factæ interdiciuntur. Si uerò fiat phthisis à pleuritide, cura erit in capite pleuritidis nota. Si ab empyemate, tunc purus concoctio adiungetur, deinde euacuetur: nam suppuratio si tum

Rr.i.

patur, uel deorsum tendet, & expurganda erit per aluum, intestina, ac uesicam: si sursum, uersus pulmonem, tunc per asperam arteriam elicta tussi educetur. Verum si neutra harum uia à natura tentetur, superest tantum, ut locus in quo sanies consistit, ita aperiatur, ut extrudi possit. Si phthisis proueniat ab ulcere, tunc cura erit ut in primis ulcus abstergatur cum hydromelle, aqua hordeacea, cum cicerum ac zachari, uel cum decocto hysfopi, &c. deinde fluxus destillationum prohibeatur cum his quæ pulmonem roborant, sicut est syrupus myrthinus, puluis pulmonum uulpis, &c. Tertio, residuum permanens exiccetur cum melle & galbano, deinde ulcus consolidetur cum bolo armenio. Aliqui exhibent lac quod abstergendi & conglutinandi uires habet: sunt qui exhibent aquam hordeaceam cum cancris fluuiatilibus coctam, & præcipue confert, &c.

Loci consentientes de cura phthisis
& empyematis.

Mesu. cap. de phth. Primam rem complens

que abscindunt nocumēta catarrhi, & si cau-
 sa eius fuerit ex empyemate, peripneumonia
 & pleuritide, cura eorum dicta est. Secundam
 rem complent euacuationes causas abscinden-
 tes, unde si cognoueris ex plenitudine sangui-
 nis, phlebotomamus ex basilica: si choleram
 abundare, euacuamus. Auicē. cap. de empye.
 Cūque eruperit sanies, & existimas quōd
 pauca sit, ut mundificetur cum sputo ad qua-
 draginta dies, tunc oportet ut administren-
 tur post eam abstersiua, lauatiua, mundifi-
 catiua, dādo ea in potu, quum incipit expui,
 id quod erumpitur, & cum decocto hyssopi
 rad. lilij, syrup. de melle, &c. Paul. lib. 3. cap.
 32, Puris concoctio primū adiuuanda est
 fomentis, cataplasmatibus: promouet etiam ru-
 pturam uomicæ sani lateris incubitus, mulsæ
 sorbitio & succus ptisanæ cum melle. Valen-
 tius decoctū hyssopi & thymi cum melle, &c.
 Vide latius de his Galen. 5. meth. cap. 8. &
 Aet. ser. 8. cap. 65. & de cura ulcerum, 5. me-
 theo. cap. 1. & Auic. de cura ulcerū partium
 pectoris, & inuenies quæcunque à me dicta
 sunt, &c.

Rr. ij.

Observationes in cura.

Galen. 5. meth. cap. 8, In ulcere pulmonis primum fac, ne magno æger utatur respira-
tu, sed semper agat silētium. Præterea statim à ruptura uasis facta, curā incipias, quò cru-
entum adhuc uulnus priusquam phlegmonem
excitet, glutines. Mes. cap. cit. Quando con-
solidatio & cōglutinatio uulneris queritur,
tunc cibaria sint desiccatiua, non eleuata in
gradu, multa exiccationis, & sint cōglutinan-
tia, ut sunt extremitates porcorum & hædo-
rum, &c. Et paulò infra, Prohibeatur eis o-
mnis lubricitas uentris & constipatio visce-
rum: nam lubricitas uehemens resoluit uirtu-
tem, &c.

Conferentia tabidis.

Conferunt tabidis, ius adipis capræ bibitū,
amylum, barba hirci cum aqua hordei, beto-
nica, lutum armenium, butyrum, decoctio can-
crorum, dragacantum, sænugræcum, gumi al-
borim, peucedanum, pix humida, plantago,
portulaca, confectio dicta mirabilis. Mes. in
cur. tuss. hu. loch de pino, de papauere, Troc.
de papauere Haly. Phthisicis conferunt ra-

dix acori cum ptisana, & betonica, berben-
 ca, cancri cum aqua hordei, decoctio scilicet
 citoniorum, cocleæ cum uino, iecur apri uel
 lupi, semē lini, lutum armenium, marrubium,
 porrum, pulmo cerui, plantago, saluia, stercus
 uaccarum, confectio de satyrion Mes. confe-
 ctio dicta mirabilis, confectio de iacur. Mes.
 in curanda phthi. diadragacantum, diape-
 nidion, diarrhodon, diapapauer Nic. phylo-
 nium rom. loch de spodio Auicen. loch al-
 bum Mes. in cu. russ. hu. syrup. de papauere,
 niolaceus de hyssopo, de psyllo. Mes. Triasan-
 dali Nic. Troc. de camph. Mes. de citonys Se-
 rap. de arsenico & zacharum ros. nouum.

De prognosticis phthisis & empyematis.

Aer. ser. 8. cap. 65, Quoniam rumpuntur
 suppurationes uel sursum uel deorsum. Quæ
 uerò sursum, in uacuum thoracis locum fun-
 duntur, & periculosiores sunt. B. Nota quòd
 suppuratio multis modis terminatur, aut sta-
 tim sua multitudine suffocat, aut à collunie
 pulmo putrescit, unde phthisis, aut sputo ex-

Rr. iiij.

630 DE CONSEN. MEDIC.

purgate liberatur, aut per uiam magnæ uenæ
ad uesicā cū urina crassa extruditur, aut per
uiā secessus per intestina euacuatur, aut per
tumorem in cute pectoris enatum & ruptum
educitur, qui modi serè omnes præter primos
optimi reputantur. Hippo. aphor. 5. aphor.
11, Qui à tabe molestantur, si sputum quod
extusciunt, graue olet iniectū carbonibus, &
capilli à capite defluunt, lethale. B. Capilli
defluunt uel ob maximum alimēti defectum,
uel ob humorum perniciosam corruptionem,
& est pessimum signum.

Hippoc. aphor. 5. aph. 12, Quibuscūque ta-
be laborantibus capilli à capite defluunt, & alui
profluuio superueniente moriuntur. Et aphor.
5. aphor. 14, A tabe habito profluuium alui
superueniens, lethale. Et aphor. 6 aphor. 27,
Quicumque suppurati, aut aquam intercutem
patientes uruntur, aut secantur, si pus aut
aqua uniuersim effluxerit, omnes moriuntur.
B. Vide etiam aphor 10. & 13. & 22. & 29.
lib. 3. circa hanc materiam: item 8. lib. 4. Et
aphor. 7. aphor. 16, A puris sputo phthisis
& fluxus: quū uerò sputum retinetur, moriuntur.

tur. Aet. ser. 8. cap. 67, Difficillimè curantur
 ulcera pulmonis, eo quòd citra tussim non
 repurgantur, & à tussi mutuo ulcus corrum-
 pitur. Præterea pharmacorum vires ad ulcus
 pertingere non valent, priusquam in uentre
 permutantur. præterea pulmo per spiratio-
 nes semper mouetur, & tussiendo lancinatur.
 Itidem si curentur, ita ut fistulosa & callo-
 sa cicatrices relinquantur, progressu tempo-
 ris fricantur, & leui ex occasione recidi-
 uantur. B. Vide de his fusius Gal. 5. met. cap.
 8. & 7. de compos. med. per loc. Intellige ta-
 men tu ut Gal. q̄ ulcera in superficie pul-
 monis facta curari possunt, sed antiqua &
 à phlegmone facta difficulter, uel planè nū-
 quā sanari possunt. Vlcera uerò pectoris fa-
 cilius curantur, tū quia carnosum est pectus,
 tū quia paruo motu indiget, tū quia substā-
 tiam ita mollem & ad erosionem pronā non
 habet ut pulmo. Vide de his latius Gal. loc.
 cit. & 4 de loc. aff. cap. 5. ibi, Vlcera in
 pulmone, &c.

Hippoc. aphor. 5. aphor. 15, Quicumque ex
 morbo laterali suppurantur, si in 40. diebus
 Rr. iiij.

purgatur à die qua fit ruptio, liberatur, si minus ad tabem trāseunt. Et prognost. 2. tex. 63, Supersunt, quos febris eodem die dimiserit, & cibum citius appetunt, & à siti liberati sunt, & uenter exigua & cōsistentia deijcit, & pus album leue & cōcolor est, & sine labore ac tussi ualida reijcitur. Qui uerò contrarium habent, pereunt, &c. Et 2. prognost. tex. 52, Quicumque dolor circa thoracem & pulmonem non desinit, adhibitis opportunis auxilijs, in suppurationem uerti sciendum est. Vide textus alios sequentes ad prognosticum etiam maximè spectantes.

Gal. 5. meth. cap. 8, Si phlegmone semel inuaserit, exigua glutinādi est eius spes, in longius tamen protrahere potest tempus, &c. B. Ratio est, quia in pulmone nec sanies nec pus elui potest, quod in phlegmone soluta prima est intētio, nec uulnus glutinari, quum in perpetuo motu ob respirationē pulmo sit.

Authores dissentientes circa empyema & phthisim.

■ Adferere, omne empyema esse per incisionem uel unctionem curandum.

- 2 Adserere cum Erasistrato, nihil ex tho-
racis spatium in pulmonem posse recipi.
- 3 Adserere, phthisim fieri posse à siccitate
per se.
- 4 Adserere, humiditatem per se posse pul-
monem ulcerare.
- 5 Adserere, phthisim ex ulcere pulmonis
antiquo esse curabilem.
- 6 Adserere, lac nullo modo competere
phthisici.
- 7 Adserere, zacharū rosaceum recens nul-
lo modo conferre phthisici.
- 8 Adserere, abstergentia expurgantiāque
solum in phthisi conuenire.

Confutatio dissentientium cir-
ca empyema & phthisim.

Ad primum, Galen. aphor. 6. comment. 27,
Visione tantum indigent qui plurimum ha-
bent puris, adeo ut desperent per spuitiones
posse expurgare: sed omne empyema tale non
est, igitur nec per incisionem curandum, &c.

Ad secundum respondet Gal. 5. de loc. aff.
cap. 3. ibi, si namque vel ex thoracis spatium in

pulmonē quippiam recipi impossibile esse sibi persuadentes, &c. & ibi docet modum & viam qua fit hic transitus. Similiter & 5. meth. cap. 8.

Ad tertiū, Gal. aphor. 3. cōment. 16, Morbi tabitudines nominati ad has duas sequuntur constitutiones, & ad frigidissimam, ex qua nōnulla ex uasis quæ sunt in respirationis instrumentis dirumpuntur, & ad alteram quæ coniunctam habet cum caliditate humiditatem, quarum occasione caput repletum mittit ad pulmonem fluxiones: à sicca uerò constitutione omnia alia magis quàm tabitudines consequuntur, & sic à siccitate nullo modo phthisis oritur.

Ad quartū, Cōciliator differētia 193 in eius appēdice inquit, q̄ humiditas per se non causat phthisim, nisi fuerit coniuncta humido catarrhali uel caliditati uel frigiditati.

Ad quintum, Gal. 5. meth. cap. 8, Vlcera pulmonis non modò ad curandū sunt difficiliora, sed quibusdā etiā impossibilis eius cura uidetur, & hoc ratione & experientia. Ratione, quoniam pulmo est semper in motu: sed

quæ sunt sanāda, quiete indigēt. Experiētia,
quia neminem eorū ita affectorum sanatum
uiderim. Item 4. de loc. aff. cap. 8. multos ex
hoc morbo defecisse, imò inquit, quapropter
omnes perire necesse est.

Ad sextū, Gal. 5. meth. cap. 12, Veteres ue-
rò etiā mulierē lactātem, ijs qui phthoc con-
sumeretur, ad stare uoluerūt, quorum sentētiæ
ipse quoque accedo, &c. Vbi lac summopere
cōmendat. Itidem adserit septimo meth. cap.
sexto, Præterea id quod est facilis assum-
ptionis, optimæ digestionis & bonæ nutritio-
nis, itē optimè humectās, cōsolidās & abster-
gēs, cōfert phthificis: sed lac habet has cōdi-
tiones, ut refert Auic. igitur est dandū phthi-
ficis. Quare si ab alijs irritetur, idcirco fit,
quia in febre putrida non competit, &c.

Ad septimū, Auic. decima tertij, tra. 4. ca.
6, Vnum de maximè conferentibus phthifi-
cis est, zucharam rosaceum, & ex eis quæ
multotiens sum expertus, in corporibus &
regionibus diuersis est, ut utatur pane zu-
charo ros. & si angustetur anhelitus, detur
in potu syrupus de hyssopo: & si inflāmatur,

636 DE CONSEN. MEDIC.

dentur trochisci de camphora, &c. Mesu. Ex rebus mirabilis iuuamenti ad consolidationes & sanationes ulcerum pulmonis est zucharum ros. recens & supra quod non præterijt annus, &c.

Ad octauum, Conciliator differetia 194, Medici plerunque errant circa phthisis curationem, eo quod uolentes purgare saniem tantum abstersiuis, eam expurgantibus utuntur, ut sanguinis sputum denuo inducant, &c. ibique notat zucharum ros. non nisi præcedentibus mundificatiuis esse exhibendum, &c.

De pleuritide.

Pleuritis duplex, uera & mendosa. Vera est subcingentis costas pectoris membranae cum suis musculis inflammatio, cum dolore punctiuo & acutissima febre. Mendosa uero est inflammatio in panniculis pectoris extrinsecis. Intrinsecus enim in pectore tres continentur membranae, quarum quaedam à Græcis dicuntur *πνεύμονες*, id est subcingentes Latine, Arabicè pleurae: quæ uero rectè per medium thoracis ad iugulum feruntur, &c.

φρακτορες, id est intersepientes, barbarè mediastinum dicitur, deinde diaphragma, &c.

Loci consentientes de pleuritide.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 3, Inflammationes quæ in subcingētes costas mēbrana ac muscu-
lis illi continuis fiunt, morbum quem latera-
lem uocant, efficere solent. Hæc eadem sen-
tentia est iuxta Gal. de part. art. med. cap.
4. & de constit. art. med. cap. 15. & aphor.
6. cōment. 33. ibi, Qui acidum ructum, &c.
Mesu. Pleuresis quædam uera, quædam non
uera. Vera est apostema cadens in pāniculis
& lacertis, &c. Non uera quæ fit in lacer-
to & uelamine extrinsecus, &c. Vide de his
Auic. decima tertij, cap. de pleuritide. Item
Alex. & Aer. ser. 8. cap. 68. ibi, Pleuritis ex-
quisita & propria est inflāmatio membra-
næ extrinsecus latera succingentis, dolorem
punctiuum uehementer inferens, cum acutis-
sima febre, &c.

De causis pleuritidis.

Causa primitiua sunt casus, percussio pe-

etoris, denudaréque se post laborem in aëre frigido, uenti septentrionales, aquæ frigida potus & similia. Causæ antecedentes sunt humorum influxus, uel eorum superabundantia, uel retentio superfluitatum exire consuetarum. Causæ coniunctæ sunt sæpius sanguis & bilis inflammationem actu producentes, rarò pituita, rarissimè melancholia, quia quod est densius, rarò ad hæc membra penetrat, &c.

Loci consentientes de causis pleuritidis.

Gal. lib. de cōstit. art. med. cap. 5, Inflammatio ex humorum influxu suboritur, quia hæ partes non æquè ut cutis sunt densæ & cōpactæ, sed raræ potius. Et aphorif. 6. comment. 33. idem adserit, ibi, Quum unaquæque inflammatio ex alicuius humoris, &c.

Auicē. decima tertij, cap. de pleu. Et materia huius apostematis ut plurimum est cholera, aut sanguis cholericus, quoniā in membris tunicosis non penetrat, nisi subtilis sanguis cholericus uel purus, &c.

Mesu. cap. de pleu. Commune est intrinsecis ac extrinsecis pñiculis ab omni materia apostemari, uerùm à sanguine & cholera frequentius, à phlegmate & cholera nigra rarius, &c. & hæc de causis antecedentibus & coniunctis. De causis uerò primitiuis lege Arcul. Gord. Sauona. & Auic. ibi, Et quandoque facit pleuresim multitudo potus aquæ frigida, & frigus additum, & facit euenire caliditas uehemens, & potus uini puri, &c.

De indiciis pleuritis.

Signa pleuritis inseparabilia sunt febris acuta, dolor punctorius, modò ad iugulum, modò ad præcordia tendens, spiratio frequens & exigua, pulsus serinus ac durus, tussis magna, interdum cum screatu, interdum absque sputis, quorum signorum si unum deficiat, uera pleuritis esse non potest. Signa materie inflammationem efficientis sumunt ex colore sputi, unde si rubeus fuerit, sanguinolenta erit inflammatio: si flauus, biliosa: si spumofus, pituitosa: si niger, bi-

lis affata. Signa pleuritidem ab inflammatione hepatis interstinguētia sunt, quia loco, pulsu, dolore, colore & tussi differunt. Loco, quia infra costas in dextra tantum parte sentitur durities uel tumor. Pulsu, quia in inflammatione hepatis undosus est. Dolore, quia non acutus, sed grauis. Colore, quia facies malè colorata. Tussi, quia adest sine screatu spirationēque maiori, cōtrā uerò in pleuritide. Signa quibus differt peripneumonia à pleuritide sunt, quia in peripneumonia pulsus est undosus, & genarum malae rubent ac si fūco deliniarentur. Signa quibus differat à phrenitide sunt, quia pleuritis sine alienatione, praesertim dum incipit, prouenire solet: contrā uerò phrenitis cum alienatione incipit, & cum anhelitus constrictione desinit, &c.

Loci consentientes de indi- ciis pleuritidis.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 3, Huius signa inseparabilia sunt, febris acuta, dolor perinde ac si locus intēdatur uel pungatur, spiratio fre-

quens & exigua, pulsus parvus arteriam duram & quodammodo intensam demonstrans, tussis magna cum sputis coloratis, nonnunquam sine his, &c. Orib. aphors. 1. comment. 16. ibi, Accessiones, &c. Signa inquit pleuriticorum sunt quatuor, scilicet tussis, respiratio difficilis, febris, & dolor acutus, quorum unum si deficiat, pleuritis esse non potest. B. Habentur hæcmet signa ab Hippoc. 4. de vic. in mor. acu. tex. 72. & lege causam horum signorum ex ipso Gal. in comment. Gal. de constit. art. med. cap. 15. ex colore sputi, quis humor peccet, nobis demonstravit, ibi, Si sputum colore rubro inficitur, tunc sanguinolentum erit: si flauo, biliosum: at si spumosa excreentur, pituitosum: si niger fuerit screatus, tunc iudicandum an fluxio siue biliosa siue sanguinolenta assetur, &c. Lege etiam fusius 5. de loc. aff. cap. 3. & aphor. 6. comment. 33. ibi, Quæ à flauis ac ruffis sputis fit ex biliosis humoribus, &c. De alijs signis quibus ab alijs morbis interstinguatur pleuritis, fusius habes iuxta Paul. lib. 3. cap. 33. & à Gal. 5. de loc. aff. cap. 3. De signis pleu-

ritidis mendosa fit mentio à Galeno ibidem,
 5. de loc. aff. ibi, Sunt & alij laterum dolores
 cum febre & exigua respiratione, &c. &
 sunt hæc, grauitas lateris sine tussi, nullū red-
 ditur sputū, dolor extrinsecus est, tumor de-
 inde extrā apparet, &c. Signa concoctionis
 pleuritidis habetur ex Galeno in cōment. 12.
 lib. primi aphorif. ibi, Accessiones & consti-
 tutiones morbi indicant, &c. Lege Galenum
 etiam secundo de loc. aff. cap. 9. ibi, Quòd si
 tussiendo nihil expuat, fieri potest ut nihilo
 minus pleureticus sit ille, &c.

De cura ipsius pleuritidis.

Cognoscas id in primis licet, an notha uel
 uera sit pleuritis: si notha, tunc cura tenta-
 tiua utitor cum fotu tum humido tum sicco,
 quale est decoctum camomillæ, anethi, melli-
 lothi, semine lini, fœnugræci, &c. uel saccu-
 lum ex sale, milio, fursure, &c. & cum his
 quæ potius uentrem leniunt, quàm ualidè sol-
 uant. Si uera fuerit pleuritis, uel ad resolu-
 tionem, uel suppurationē, uel ad alium mor-
 bum trāsmutabitur. Si ad resolutionem, tunc

in primis id quod influit reuellendum cum sectione uenæ, cum leuibus clysterijs, cum cucurbitulis cruribus applicitis, cum fricatione partium inferiorum. Secunda intentio erit materiae preparatio, quæ si fuerit sanguinea uel biliosa, præparabitur cum syrupo uiolaceo, iuiubino, cum aquis uiolarum, hordei, citruli, melonis indi, cucurbitæ, &c. uel cum decocto rerum pectus frigidantium. Verum in materia biliosa requiritur id quod plus infrigidet & humectet quàm abstergat, in sanguinea plus abstergat quàm humectet, in pituitosa plus abstergat quàm infrigidet, quale est decoctum hyssopi & syrupus de liquiritia, hydromel & oxymel. Tertia intentio est euacuatio à loco, in quo fit inflammatio, & perficitur cum sectione uenæ ex eodem latere patiente, uel solutione uentris, ubi materia ad has partes declinet: nam quò natura uergit, eò ducere oportet per loca conferentia, & hæc fiet tutius per cassiam, mannam, rheubarbarum. T. de agarico, de uiolis, &c. Quarta intentio erit spusti euocatio ac facilis eductio, & perficitur

Ss. ij.

cum iuleb & Syrupis iam dictis, uel aliquo eclegmate, uel inunctione ex oleo uiolaceo, amygdalino dulci, &c. Quinta intentio est residui resolutio, quæ fiet cum topicis in modum emplastri & fomenti cum camomilla, &c. Si uero ad suppurationem uertatur, prima intentio erit puris cōcoctio, quæ fiet cum emplastris ac unctionibus mollientibus, sicut cum oleo amygd. dul. butyro, adipe gallinæ, &c. Secunda intentio est rupturæ uomicæ promotio, quæ fiet cum ualida tussi, & cum his quæ dilatant pectus, qualis est mulsæ sorbitio, incubitus eiusdem lateris cum ualido corporis motu, &c. Tertia intentio est, absterfusio cum aqua sacchari uel hydromelle, cum iure cicerum. Quarta intentio erit conglutinatiō, & perficitur cum bolo armeno & cum similibus, &c. At si ad alium morbum transmutetur, cura eiusdem morbi curabitur, &c.

Loci consentientes de cura pleuritidis.

Hippoc. 2 de uic. in mor. ac. tex. 1, Lateris

dolorem siue is per exordia fuerit, siue postea exortus sit, tentare calidis fomentis dissoluere non abs re existit, &c. & hæc de cura nothæ tentatiua, ubi laudat fomēta ex aqua calida, & quæ ex sale & milio parantur. Auic. de cur. pleu. plura habet, ibi, Verūm humida cūm non iuuant, non nocēt, &c. De cura ueræ pleuritis loquitur: deinde Hippoc. 4. de uic. in mor. ac. tex. 73. ibi, Si dolor sursum uel ad clauiculam, uel ad mammam, uel brachium ascenderit, uenam brachij internam secare oportet, qua parte dolor afficit, sanguinemque auferre pro corporis habitu, anni tempore, etate, immò si dolor acutus fuerit, usque ad animi defectum detrahes, postea clysterē exhibebis: si uerò sub thorace dolor fuerit, pleuretico uentrem subpurgabis. Lege etiam secundo de uic. in mor. ac. tex. 10. II. ubi non ad animi usque defectum uenam secare iubet, sed eousque extrahere, donec rubidior multò, aut pro rubido liuidus fluxerit, &c. Quoniam latere secunda sit uena, dubitauit primus Gentilis, deinde omnes neoterici: quanquā meo iudicio ess. ij.

ficaciores sint eorum rationes, qui à parte laesa dicunt extrahi, quàm qui ab opposita. Pro his lege Manardum lib. 12. epistolarum ad Iacobum Pharusum, plures rationes adducentem. Galenus secundo de uic. in mor. ac. comment. 11, Tutius est per uenæ sectionem euacuare, quàm per purgantis medicamento administrationem, etiam si ad hypochondriorum regionem dolor finiatur, immò per uenæ sectionem nullum impender periculum, eo discrimen maximum subeunte, quod per purgationem têtatur, maximè quû morbus hic acutus sit cum febre uehementissima. Quòd etiam diuersio ad hanc intentionem spectet, lege Auicen. ibi, Oportet ut prohibeas materiam euenientem cum euacuatione & attractione, &c. De secunda intentione loquitur Mesu. ibi, Mundificationem corporis oportet ut præcedant preparatiua ad materiei digestionem necessaria, & si materia fuerit cholericæ, requiritur infrigidatio maior cum humectatione non spoliata à uirtute abstersionis, &c. Si materia erit sanguinea, requiritur uirtus infrigidationis

minor, & abstersionis maior: si phlegmatica, requiritur minor infrigidatio, & maior abstersio. De tertia intentione loquitur Auicen. decima tertij, de cur. plen. ibi, Dicamus igitur, quod cura est phlebotomia, si sanguis fuerit uincens, & si est humor alius, euacua non cum eis quæ sunt sicut myrobalani, &c. Paul. lib. 3. cap. 33, Recentiores omnibus uenam incidunt, ueriti, ut opinor, turbationem, quam purgatio solet accersire, &c.

De quarta intentione plura habes ex Mesue, ibi, Quintam rem compleri administrationes medicinarum sputum facilitantium, quæ fiunt cum humectantibus & lenificantibus, procedendo ad res temperatæ abstersionis, &c. Auicen. loc. cit. Oportet ut sit tua magnifica intentio ad hoc ut sputum facile sit, & ex eis quæ multiplicat sputum, est dormire super latus infirmum, &c. De alijs intentionibus curatius habes etiam plura ex Auicen. loc. cit. ibi, Et ex eis quæ sunt sollicitè attendenda est, ut succurras maturationi egritudinis, & si sanies fiat, oportet
Ss.iiij.

ut succurras cum mūdificatione, &c. lege de his uberius Mes. Marc. Cat. Arcul. Gordonium, & ceteros practicanes.

Obferuationes circa curam tentatiuam.

Mesu. cap. de pleu. Et canon est, debere ab humidis & debilioribus incipere, & quāto compactior & siccior fuerit materia, tanto tardius ad fortiora prorumpere, ne resoluitur quod est subtile, & cadat durities in residuo. Cauēdum insuper, ne uapor ex euaporatorijs ad nares aegri ascendat, dissolutionem enim & tristitiam & anhelitus constrictionem generat, &c.

Hippocr. secundo de uic. in mor. ac. tex. 9, Verū si fomentis dolor non placetur, non diutius calefacito: siccat enim id pulmones, atque ad suppurationem excitat, &c.

Obferuationes in phlebotomia.

Auic. decima tertij, cap. de pleu. Cūque phlebotomas & euacuas, & non sedantur accidentia, tunc scias quod prohibitio collectionis, quam quæris, difficilis est: non igitur

tur reiteres phlebotomiam, ut non congeletur materia, quæ habitura est collectionem. Et post hæc, Dispositio debilitatis uirtutis non est quæ tolerare possit phlebotomiam & solutionem, sed necessarium est tunc uti clysterijs, &c. Mesu. Oportet phlebotomiã præponi solutius, nisi uentris fuerit constipatio, tunc enim præcipimus lenire prius naturam, &c.

Observationes in solutiuo pharmaco.

Auic. decima tertiâ, cap. I, In solutiuo est timor magnus, ipsum nanque interdum mouet, & quandoque non soluit, & quandoque superfluit. Vide de his Gal. 2. de uic. in morb. ac. comment. 2. deinde inquit Auic. Nec soluatur uenter cum pharmaco laborioso, sed leniente, & uitetur styptica, sicuti myrobalani.

Conferentia pleuritidi.

Conferunt dolori lateris & pleuritidi, amygdale, anethum, berbena, betonica, bdelium, brassica, galbanum, gentiana, malua, capillus Ven. uiolæ, hordeū, passulæ, iuiubæ, peucedanū, saluia, uerbascum, urtica, iris il-

650 DE CONSEN. MEDIC.

lirica, colatura furfuris cocti in aqua hor-
deacea, althea, alchana, camomilla, carica,
hyssopus, penidij, zucharum uiolatum, &
quaecunque dicta sunt superius in capite pe-
ripneumonia.

De prognosticis pleuritidis.

Hippocr. aphor. 3. aphor. 23, Hyeme uerò
morbi laterales, &c. Et aphor. 6. apho. 33,
Qui acidum eructant, non ualde morbo la-
terali corripuntur. Et aphor. 6. aphor. 16,
A morbo laterali uel pulmonia habito, alui
profluuium adueniens, malum. B. Intellige de
fluxu à natura non regulato: nam qui à uir-
tute regulante fit, etiam in principio, bonum,
nisi ullum aliud accidens fuerit, quod uirtu-
tē prosternat: unde Auic. Et fluxus in princi-
pio apparēs, bonū est signū, &c. Et aphor. 5.
aphor. 8, Quicumque morbo laterali laboran-
tes in 14. diebus non repurgantur, ū ad sup-
purationem uertuntur. Et aphor. 15. eiusdem,
Quicumque ex morbo laterali suppurantur, si
in 14. diebus purgantur, à die qua fit eru-
ptio, liberantur: si minus, ad tabem transeunt.
Auic. decima tertij, cap. de pleu. Quæ est

propinqua cordi & parti sinistra est decre-
 rior, sed ad hoc ut maturetur conuenien-
 rior, & quæ est remotior à parte sinistra,
 est salubrior, sed ex parte resolutionis & ma-
 turationis magis inobediens. Et paulò pòst,
 Et apparitio fluxus sanguinis narium est ex
 signis bonis ultimis in pleuresi. B. Adde tu,
 quòd non tantum à naribus, sed ab hæmor-
 rhoidibus & matrice proueniens sanguis in
 casu laudatur. Galen. 10. meth. cap. 5, Si pul-
 monis uel membrana quæ costis subrenditur,
 uel uentriculi, uel iecinoris phlegmone sit,
 quæ has partes occupet, non modò his qui
 imbecilles sunt uiribus, sed etiam quibus ua-
 lentiores sunt mortifera esse solet. Hippoc. 3.
 prorrh. tex. 5, Dolor lateris ex spuetu bilio-
 sis, si absque ratione euenerit, in furorẽ agun-
 tur. B. Facto scilicet bilis ad cerebrum transi-
 tu. Auic. decima tertij, tra. 4. cap. 1, Et
 quando accidit prægnantibus est pernicio-
 sum, & accidens decrepitis ob debilitatem
 uirium in spuen-do interficit. B. Nam solet
 hominem interimere uel ex eius uehemen-
 tia symptomatum, uel ex præfocatione.

652 DE CONSEN. MEDIC.

Primo modo pręgnantes moriuntur, secundo decrepiti non ualentes materiam extrudere. Hippoc. lib. de aere & aqua, Qui habet uetrem natura humidum, minimę morbo laterali atque alijs morborum generibus corripiuntur. B. Hic locus citatur à Gal. aphor. 6. comment. 33. & ratio est, quia abundante bile aut pituita salsa & acri irritatur aluus ad deiectionem, in qua plures humores excerni solent, &c.

Authores dissentientes circa pleuritidem.

- 1 Adserere, pleuritidę posse fieri absque febre, Anaxionis exemplo.
- 2 Adserere, profluuium alui in omni pleuritide esse signum periculosissimum.
- 3 Adserere, pleuritidem plerunque fieri à tenui pituita.
- 4 Adserere, reperiçuiua in pleuritide iam facta conferre.
- 5 Adserere, pleuritidem dextrĩ lateris de-
teriorem quàm sinistri.

Confutatio differentium circa pleuritidem.

Impugnat primum Gal. aphor. 1. comm. 12. ibi, In morbo laterali acuta quidem febris una cum spirandi difficultate & tussi & dolore lateris pungente signa passionis significatiua nominantur. Et 5. de loc. aff. ca. 3. uocat haec signa inseparabilia, igitur absque febre fieri non potest.

Ad secundum, Gal. aphor. 6. comment. 16, In mediocri uero morbo laterali profluum alui superueniens potest prodesse ratione euacuationis, & magis quam signa concoctionis apparuerint, inesse passionibus, neque adest timor, sed morbus est citra periculum.

Ad tertium, Gal. aphor 6. comment. 33, Pulmo in omni parte rarus ac latus, promptius est omnes suscipere humores, membrana autem subcingens plus bilioso, ob hanc igitur causam, quibus pituita natura superabundat, raro a morbo laterali corripuntur, &c. Vbi habes non plerumque a pituita fieri.

Ad quartum, Gal. 2. meth. cap. 17, Parcius ad pectus est adstringentibus utendum, quando

alia humores, qui phlegmonem excitant, in pulmones & cor nonnunquam reprimant. Et paul. post, Quippe foras trahere potius, quàm reprimere in eo debemus. Itidem ait Auic. decima terij, in ser. communi de cur. doloris. Vnde non mirum si Mes. à Gord. hac de re derideatur, quum in eo morbi principio principiante nullum opus medici ab infirmo petatur.

Ad quintum respondet Conciliator diff. 100. & tenet quòd deterior sit respectu situs materiae, item ratione nobilioris partis, item quia seuiora fiunt symptomata, &c. Lege fusius ubi de peripneumonia agit.

De cordiaca passione.

Sunt cordis passionēs se inuicem consequētes numero tres. Prima, est cordis imbecillitas. Secunda, est palpitatio. Tertia, est cardiaca syncopa. Nam facta imbecillitate cordis uehementi agitur uirtus, unde palpitatio ex qua deinceps syncopis oritur, nec inter se differūt, nisi secundū magis & minus. Palpitatio est quaedam dilatatio atque contra-

ctio præter naturæ ordinem facta: cardiaca
uerò Syncopa est innati roboris labefactatio
& languor siue præceps uirium lapsus.

Loci consentientes de cardiaca
passione.

Mesu. de agritud. cor. A Egritudines cordis
sunt, debilitas pulsus, tremor & Syncopis, non
aliter inter se differētes, nisi sicut debiles &
fortes. Debilitas facta fortis, usque adeò ut sit
agitatua uirtutis, facit tremorem, tremor su-
perueniēs generat syncopim, ultimitas in syn-
copi est extinctio & mors. B. Nota quid Ara-
bes pro palpitatione cordis tremorem dicūt,
nescientes inter palpitationem & tremorem
interstinguere. Sed de his fusius dicemus in
fine huius morbi. Gal. lib. de tre. & palp.
cap. 5, Palpitatio est quedam dilatio at-
que contractio præter naturæ ordinem. Et
12. meth. cap. 5, Syncope est præceps uirium
lapsus. Auic. decima tertij, cap. 6, Syncopa
est destructio maioris partis plurium uirtutū
motiua ex sensibilibus propter debilitatem
cordis & aggregationē totius ad ipsam, &c.

De causis syncopæ.

Causæ syncopæ sunt uel extraneæ uel interaneæ. Extraneæ sunt ambientis aëris malitia, uel res uenenatæ, uel animalium uenena, uel aliquis animi deflexus, qualis est ingens dolor, timor, &c. uel plures motus, uigilie, respirationis prohibitio, &c. Causæ interaneæ uel primario affectu fiunt, uel per consensum totius & partis. Si primario affectu, erunt uel mala intemperies, calida, frigida, sicca, humida, uel mala compositio obstruens & spiritus præfocans, uel solutio cōtinui: quæ si fuerit in superficie, mors usque ad diem secundum prologatur: si ad uentriculos penetret, statim interficit: uel erit aliqua inflammatio uel abscessus, ex quibus breuiter aut aliqua mora facta mors sequitur. Si per consensum totius corporis, tunc uel erit febris acuta colliquans, uel uehemens raritas corporis, ex qua magna sudoris copia elicitur. Si per consensum partis, uel erit ab ore uentriculi, uel à mala hepatis dispositione, aut uteri strangulatu, aut à retentis menstruis, aut à uermibus, aut ab immodica hæ-

morrhoidarum euacuatione, aut à medicamento fiet.

Loci consentientes de causis
syncopæ.

Gal. 12. meth. cap. 7, Occasiones quibus syncopæ succedunt, sunt sex, dolor uehemens, uigilia, immodica inanitio, interdum motus, & principiorum intemperies. Et cap. 5. eiusdem, Fit syncope ex ambientis aëris malitia, uel ex uenenatis facultatibus, uel ex animalium uenenis, uel ex aliquo affectu animi & pluribus motib⁹, ex uigilijs, ex immodica eius tenuitate, ex continentium corporum raritudine, ex respiratu prohibito, & ex nutrimenti defectu, &c. De alijs uerò causis loquitur 5. de loc. aff. cap. 2 ibi, Affectus cordis si primario affectu fiant, erunt aut male intemperies, aut uenenosus humor, aut erysipellis, aut inflammatio, aut alius quispiam præternaturalis tumor, &c. Lege de alijs à me recitatis totum hoc caput. Et 12. meth. ibi, Si per consensum ab ore stomachi, &c. Vide etiam de his quæ per compatiendi rationem fiunt Mes. lōgo satis sermone pertra-

Tt. i.

658 DE CONSEN. MEDIC.

stantem. & Auic. decima tertij, cap. 6. & Paul. lib. 2. cap. 38. Similiter uide Aet. & reliquos practi-
cantes: nam Auic. tres causas po-
nit, quarum prima est attractio, totius aut
maioris partis spiritus ad cor: secunda est
præfocatio spiritus in corde, spiraculum non
inuenienti: tertia est paucitas spiritus in to-
to, ita ut non superfluat præter illum qui est
in minera, &c.

De signis syncopæ.

Signa ipsius syncopæ est animi defectus,
pulsus parui, extremorum frigus & sudor fri-
gidus perfringens. Signa primarij affectus sunt,
quia nulla manifesta causa in alijs membris
inuenitur, nec in ore stomachi, quum nõ ad-
sit nec uomitus, nec nausea. Signa malæ com-
plexionis calidæ sine materia sunt caliditas,
æstus, incēdium, febris, pulsus frequens & ue-
lox. Signa compl. frig. sunt pulsus & anhel-
tus tardus, rarus, præcesseruntq; longa ægri-
tudo, sanguinisque euacuatio, &c. adest
somnia, color pallidus. Signa siccæ cōp.
sunt extenuatio corporis, nulla sentitur hu-

miditas, pulsus durus, &c. Si sanguis uel bilis peccet, sentitur caliditas, pulsus magnus, plenus, fortis. Si melancholia, adest timor, tristitia, sollicitudo, pulsus durus, &c. Si pituita, abest sitis, cor percipitur, ac si in aqua nataret, pulsus mollis, &c. Signa oppilationis sunt diuersitas in pulsu percepta cum imbecillitate & paruitate, &c. Signa per consensum sumuntur à membris communicantibus materiam: nam si à cerebro, tunc precescit dolor capitis, uertigines, imaginationes falsæ. Si ab hepate, cognoscitur ex debilitate, caliditate & grauitate in eo percepta cum suis alijs morbis. Si à pulmone, cognoscitur ex difficultate spirandi, ex tussi & ex catarrho. Si à stomacho, cognoscitur ex uomitu, nausea, difficultate digerendi, &c.

Loci consentientes de signis
syncopæ.

Paul. lib. 3. cap. 34, Nota ipsius sunt, resolutio animæ q; defectus, pulsuum paruitas, extremorum frigiditas, & in sudorem proruptio. At si cor incaluerit, magnam crebramque edit respirationem: si refrixerit, exiguam & ratam.

Tr. ij.

De signis primarij affectus & per consensum, lege Auic. decima tertij, ca. 7. ibi, Et quando syncopis non habet causam manifestam, & est cum tremore cordis frequente, & non est, quod est in ore stomachi causa faciens ipsam, tunc ea est cordialis confirmata: illa uerò cum qua est nausea & conturbatio, est stomachalis, &c. Loci de alijs signis habetur fusius ab ipso Auic. cap. de signis tre. cordis: similiter ab Arcul. Sauo. & Gor. & ab alijs.

De cura tremoris cordis ac syncopæ.

Primum regimen erit contrarium causæ efficienti tremorem siue palpitationem: nam si fuerit causa calida, regimen erit frigidum, cordiale: si frigida, calidum, &c. Secunda quæ occurrit intētio, erit digestio, præsertim si ab aliquo humore fiat, in causa calida cū frigidis, ut cum syrupo uiol. de ribes, de suc. acetosæ, de limonibus, acetosa simp. cū aquis uiolarum, rosarū, boraginis, nenupharis, &c. Tertia erit euacuatio, quæ peccante sanguine (uirtute roborata) fiet per sectionem uenæ

in parua quantitate, aut peccante bile, per
leuia pharmaca, qualis est infusio rheubar-
bari in rebus cordial. cum myrobalanis citri-
nis, cum manna ac cassia. Pituita uerò su-
perabundante cum diaphinicone, electuario
indo, cum myrobalanis, chebulis & agarico,
additis semper rebus cord. calidis, in melan-
cholia peccante cum confectione hamech, pi-
lulis indis de lapide lazuli, &c. Quarta in-
tentio est reuulsio, qua reuellimus materias à
corde, & deducimus ad membra ignobilia
cum fricationibus, cucurbitulis, cum sectione
uenæ saphenæ, cum lotionibus & clysterijs,
&c. Quinta est robur cordi addere, remo-
uendo intemperiem calidam cum frigidis, ut-
puta cum rosis, camphora, sandalis, acerosa,
nenuphare & similibus: in causa frigida cū
calidis, ut cum buglossa, zedoaria, melli-
sophyllo, cort. citri, musco, ambra, &c. aut
cum compositis, utputa cum zucharo boragi-
naceo, buglossaceo, electuario de gemmis,
diambra, diamusco: hinc etiam parari
possunt epithemata, unctiones, sacculi, pul-
ueres, &c. Syncopis maximè si in paroxysmo

Tt. ij.

fuerit, tres in eius cura requirit intentiones. quarum prima prohibet resolutionem spirituum, qui remanserunt, ne omnino resoluantur: Et fit cum irroratione faciei cum aqua rosea acetosque mixta, uel aqua frigida uel uino. Secunda regenerat spiritus, et uirtutem roborat, unde huc spectant aromatica, et quae citò reficiunt, qualia sunt uinum, oia sorbilia, aqua carnis, et similia. Tertia excitat uires, et conuertit uapores et spiritus ad exteriora confricatione extremitatum, cum pro-uocatione sternutationis, facta cum aceto et helleboro albo, etc.

Loci de cura syncopæ.

Auicenna undecima tertij, tract. 2. cap. 4. de cura à causa calida inquit, Et stude ut sit aer infrigidatus ultima infrigidatione, ut sint rorationes et odoramenta aromatica camphorata, etc. Vbi commendat etiam res in cibo acetosas cum succis fructuum agrestibus et malis acetosis, etc. Pro secunda intentione inquit, Da ei ad sorbendum syrupum de fructibus, etc. Pro tertia intentione in ma-

teriali omni feratur auxilium cum euacua-
 tiuis in sanguineo cum phlebotomia & ex-
 tractione sanguinis ultima, &c. Lege cum
 fusius, & plura inuenies à me dicta. Lege
 insuper Arcul. Marc. Catin. Sauon. & Gor-
 dian. & ceteros neotericos. De cura syn-
 copæ loquitur Galen. 12. meth. cap. 5, Quum
 essentia uirium, quibus regitur corpus tum in
 spiritu, tum in solidorum corporum tempe-
 ramento consistat, hac si integra sint, serua-
 ri debent: si corrupta, ad integrum reuocan-
 da. Quæ igitur portio defluit, hanc appo-
 nendo resarcimus, quod alterascit, in debi-
 tam temperiem per contrariam alteratio-
 nem uindicemus, &c. B. Habes curam il-
 lius syncopæ quæ per consensum oris uentri-
 culi fieri solet ab ipso Galen. 12. meth. cap. 3.
 præcipuè si à crudis crassisque humoribus
 fiat: si uerò à flaua bile, habes similiter cu-
 ram cap. 5. eiusdem lib. ibi, At quibus ex fla-
 ua bile, quæ os uentriculi infestet, syncopa
 incidit, &c. Lege Paul. A Egi. ca. 36. & 37.
 lib. 2. omnia ex Galeno satis bellè recitan-
 tem, &c.

Tc. iij.

Quot modis dicatur medicina cordialis.

Auicē. in lib. de uiribus cordis, Septem modis dicitur medicina cordialis: Primò, quia reficit spiritus & nutrit, ut uinum: & de hoc etiam loquitur ipse secunda primi, summa de pulsibus, & undecima terti, in cura syncope, similiter aqua carnis, oua, & similia. Secundò, quia illustrat spiritus, ut margarita & siricum. Tertiò, quia congregat substantiam cordis & spiritus, prohibendo resolutionem eorum, ut charabæ, terra sigillata, bolus armenius. Quartò, quia amica est cordi, quale est dulce & odoriferum. Quintò, quia per uirtutem suam alterant & uiuificant roborando per qualitates manifestas, qualia sunt simplicia temperata, ut borago, buglossum, aurum. Sextò, quia euacuant depurando humorem melancholicum à corpore, aut euacuando quod nocet cordi, ut sunt myrobalani, &c. Septimò, quia sua proprietate occulta roborat ac cōfortat cor, ut hiacynthus, semina citri, buglossum, &c.

Observationes in cura.

Auic. undecima tertij, tract. I. cap. de can. ulceribus cor. Oportet ut sit uelox studium in cura malarum dispositionum cordis, ita ut non fiat error, quia incorrigibilis esset, quod non accidir alijs membris, &c.

Observationes in euacuatione.

Auic. loc. cit. Observamus ne superfluat & cadat uirtus, deinde post euacuationem uiuificemus uirtutem. Repletio sanguinea remouetur phlebotomia basilicæ dextræ, & repletio uaporosa cū phlebotomia basilicæ sinistrae. In alijs euacuationibus misceantur medicinae cordiales, &c. Mich. Sauon. de mente Auic. inquit, Audaciores esse debemus in administrando phlebotomiam in aegritudinibus cordis quā pharmaciam, nam phlebotomia non peruenit ad cor ledendo sicuti pharmacia cum suis uaporibus.

Observationes in remouenda mala complexione.

Auic. in cura calidæ, Si inueneris uirtutem debilem, & inueneris extinctionē, non erit ex-

cusatio, quin permisceas frigida calidis. Mar.
 Cat. Non debemus excessiue calidis & frigi-
 dis uti, & quum infrigidare desideramus,
 medicinam calidam aromaticam miscere de-
 bemus, quia frigida claudunt uias, & pene-
 trare non possunt, uel hæc simul miscemus
 ut naturalis calor & spiritus unà conseruen-
 tur: nam Auicen. confidimus, quòd si natura
 fuerit fortis, discernet inter frigidum & cali-
 dum, & afferet frigidum cordi, & calidum
 spiritui, &c. Vide eum fusius. Gal. 12. meth.
 cap. 5, Ad robur uirtutis conseruandum, &
 ad syncopalem accessionem, quo minus dere-
 pente incidat, cauēdam, singulare præsidium
 est temperamenti custodia, &c. Vide Mesu.
 de his, &c.

Nocentia ac conferentia cordi.

Nocent cordi, alsebrā, colocynthus, euphor-
 bium, genista, mezereon, lac, scamonium. Con-
 ferunt debilitati, syncope, & tremori, aurum,
 caro cochlearum, margaritæ, menta, melissa,
 & xyloaloes, ambra, borago, cinnamomū, cro-
 cus, granata acetosa, lapis lazuli, acetosa, my

IN CVR. MORB. LIB. III. 667

robalani, aqua florum myrthi, rosa, poma acetosa, sandali, sēna, spica inda, spodium, os de corde cerui, omphacium, zingiber, perdix, siricum, argentum, been, acetositas citri, coralli, coriandrum, doronici, emblici, endiuiā, epithimum, folium, charabe, mumia, rheubarbarum, persica, uinum, oua. Composita sunt diamargariton Nic. electuarium de pomis Mes. diamusculus dulcis, aromaticum muscatum Mes. electuariū de gēmis Mes. plirus arcoticon Nic. cōfectio xyloaloes Mes. diasenā, dianthos, diarrhodon Nic. electuarium lactiscans Mes. zucharū ros. boraginaceum, diambra, ambra cum ligno aloe & osse, de corde cerui cum aqua rosacea in modū pilularum, electuarium de citro, praelator regum Mes. gallia muscata, oleum millinum Mes. oleum basiliconis Nic. persica & pyra condita, rob de ribes, de berberis, de sumach, de pomis, de granatis acetosis, de citro, syrupus ros. de pomis, de acetosa, theriaca magna Auic. triphera ioanitiij Mes. theodoricon magnum, troc. de xyloaloes, de musco alman, potio muscata Nic. sotyra cōfectio, etc.

De prognosticis syncopis
& palpitationis.

Hippoc. aphor. 4. aphoris. 65, In febribus circa uentriculū & fortis aestus & cordis tremor uel dolor, malum. Et aphor. 2. apho. 41, Qui frequenter ac fortiter absque causa manifesta exoluuntur, derepente moriuntur.

Paul. lib. 3. cap. 34, Si syncope ualida sit, medicina locus non est, sed si uires adhuc tantillum constent, aliquando ad sanitatem recursus est, &c. Gal. 12. meth. ca. 6, Existimandi sunt insanabiles, qui uiribus iam languentibus aliquod eorum uiscus phlegmone infestetur, quoniam nutrire eos assidue non possumus, nec seruare eos, si non nutriantur: licet, &c. Auic. undecima tertij, tract. 2. cap. 6, Et scias quod syncopis confirmata curam non recipit, & propriè quando perducit ad uiriditatem faciei & conuersionem colli, & ille cuius res peruenit ad hoc, tunc quum caput eleuat, statim moritur. B. Tria requiruntur ad hoc, ut confirmata dicatur, primum quod sit continua, secundum ut sit uehemens, tertium quod nulla adsit causa manifesta, ut dictum

est in aphor. Gal. 12. meth. cap. 5. Si copia humorum crudorum vires premant, & propter tum multitudinem tum crassitiem exiguos animalis meatus obstruant, iam multis nominibus exitialis est syncope, &c. Auic. loc. cita. Quumque confirmatur in corde malitia complexionis, non recipit curam, & quando non est confirmatio, non facile curatur, apostema quidem calidum est interficiens statim, & frigidum ex eis est, quæ sunt difficilia. quumque cor non toleret ut apostemetur, quomodo tolerabit ut collectio & saniositas in ipso fiat? cor longinquius est ad hoc ut toleret solutionem singularis. Et quando accidit, ut penetret usque ad ventres eius, interficit statim: & si non est penetrans, postponitur eius interfectio usque ad secundum diem. Et quando permutantur materiae expulsæ ad cor ex pleuritide, & peripneumonia sunt causæ magni timoris & mortis subitæ. Et quando calor purus aut frigus purum peruenit ad cor moritur, & quandoque uidi congelatum loqui, & iam moriebatur cum sudore, &c. Lege hunc locum fusius.

Authores dissentientes circa cardiacas passiones.

- 1 Adserere, idem esse palpitationem & tremorem cordis.
- 2 Adserere, syncopim frequenter accidentem esse signum mortale.
- 3 Adserere, sectionem uenæ usque ad syncopim non esse faciendam cum Auerrhoe.
- 4 Adserere, uinum in defectu animi non esse exhibendum.
- 5 Adserere, in actu syncopis reficientia spiritus non præmitti debere stypticis.
- 6 Adserere, syncopim & lipopsychiam nullo modo inuicem differre.

Confutatio dissentientium circa cardiacas passiones.

Impugnat primum Galen. lib. de tre. & palp. cap. 5. ibi, Tremor est partium quæ sursum uicissimque deorsum feruntur, inuoluntarius motus, sed sursum ferri & distrahi, & ferri deorsum & contrahi non idem est, igitur nec tremor & palpitatio idem sunt, &c.

Ad secundum Gal. aphor. 2. com. 41, Non

es circa cap

over acciden-

1234

Ad quintum respondetur, quod actu existens syncopis refici uirtus desiderat, & sic præcedet reficientia styptica, sed si timeatur de futura syncopi, ob nimiam euacuationem, debent præmitti styptica, & hæc ex Galeno 12. meth. cap. 6.

Ad sextum, Galen. 12. meth. cap. 5. loquens de succis grauātibus, ac obstruentibus, inquit, Quod si nec obstruant, nec onerent, syncopē ū certē nō inferunt, sed quas lipopsychias Græci uocant: ubi lipopsychiā à syncopi differre dicit. Præterea syncopis accipitur tāquam genus, lipopsychia tanquam species, igitur aliquo modo inter se differunt, &c.

De vomitu, nausea, & uuluo- losa subuersione.

Vomitus est motus facultatis expulsiuæ stomachi, cum quo expellitur id quod est noxium per uiam oris.

Loci consentientes de vomitu.

Galen. 6. de sympt. cau. cap. 2, accipit nau-
seam pro uomitu, dum inquit, Nausea est ex-

pultriciſ facultatiſ motuſ deprauatuſ , quo
 per gulā id celerrimē euacuatur, quod uētri-
 culo eſt noxiuſ. Interdum accipitur nauſea
 pro præuia ad uomitū diſpoſitione, ſicuti pri-
 mo de loc aff. ca. 4. dū inquit, Quòd ſi humor
 quiſpiam in ipſiſ uentriculi tunicis continea-
 tur, nauſea quidem uexabit, ſed inaniſ & ſi-
 ne uomitu, & quæ irritat duntaxat, nullū hu-
 morem euacuans, &c. Et octauo de cōp. med.
 per loc. ca. 2, Appellant eoſ ſtomachicoſ, qui-
 buſ nauſea cōtingit, & maximē ſi ad uomi-
 tum impellat: erunt igitur quatuor ſcinnicem
 ſequētia ſymptomata, primum ἀπεψία, quæ
 fit quum ſtomachuſ intemperie uitioſuſ , aut
 humoruſ redundantia cibos auerſatur : hæc
 dum creſcit, nauſeam parit, ex qua adhuc au-
 ctā, ſubuerſio oritur, quæ fit dum funduſ ſto-
 machi ad ſuperiora uertitur, unde quum ue-
 hemenuſ eſt ſubuerſio , uoluuloſa à Galeno o-
 ctauo de compoſ. med. per loc. cap. 3. dicitur,
 non minus ac ſi uehementi contentione &
 uiolētia, ueluti in uoluulo ſiue ileis, dum ſter-
 cora uomuntur, ſubuerſio fiat, à qua demum
 uomituſ ſiue reiectatio fieri ſolet, &c. Auic.

Vii.

13. ca. de uom. Vomitus & subuersio sunt motus stomachi ad expellendum ex eo quod est in eo per uiam oris.

De causis vomitus & nausææ.

Causæ procatartice sunt aër corruptus foedi odoris, cibis & potus in odore & sapore malus, aut nimia eius assumptio, aut mala eius preparatio & unctuositas, motus à cibo statim laboriosus, ira & cetera animi accidentia, imaginatio alicuius rei obscenæ, similiter casus, percussio, ueneni potus & animalium uenenosorum morsus. Causæ antecedentes per essetiam sunt mala intemperies, calida, frigida, aquea, & flatuosa, materia stomacho inherentes uel natantes, quæ grauando, pungendo ac extendendo uomitum excitant, item acuitas sensus oris stomachi, mala compositio, sicuti accidit in oppilatione pylori, id est, ianitoris, uel morbus in numero, ut uermis mordicando ac pungendo, solutio continui, inflammatio & abscessus pustula, dolor & imbecillitas ipsius stomachi, &c. Causæ per consensum uel fiunt à toto, ut in febris, & tunc

uel est creticus uel symptomaticus, sicuti accidit in febribus malignis, & est pessimus: uel fit à parte, sicuti à cerebro materias transmutere, uel ipso percusso & uulnerato, uel ab hepate, splene, intestinis, &c.

Loci consentientes de causis vomitus.

De causis primitiuis lege Arcul. & ceteros practitantes. Gal. 6. de sympt. caus. cap. 2. circa medium, Huiusmodi excretiones fiunt interim grauatò ob multitudinem uentriculo, ut quum plurimum cibi ingestum est, interim ob rem mordacem, quèadmodum per cruditates cibus ingestus, uel acidum ructum uel nidore, uel amarore, uel acrimoniam refert: & in hoc genere continentur pituitosa ac biliosa & acerosa excrementa, tum ibi nata, tum ex uniuerso habitu animantis in ipsum deriuata. Est & tertium causarum genus, quibus uentriculus ad uomendum concitatur, nulla uel graui uel mordaci re ipsum irritare, sed ob id duntaxat, quod præter naturam quippiam in eo continetur. Vocantur præter naturam quæcunque postquam conco-

Vñ. y.

676 DE CONSEN. MEDIC.

Et sunt, alere non possunt. quare non tam acida pituita & salsa, uerum dulcis, & sanguis quandoque in uentriculo consistentes ipsum ad uomitum impellunt, &c. Lege etiam Gal. 1. de loc. aff. ca. 4. Item aphor. 6. com. 1. &c. Habes etiam de his causis sensum Auic. 13. tra. 5. cap. 8 ibi, Et id quod commouet os stomachi ad uomitum, aut est qualitas operatiua operatione materiae, ex qua leditur membri communicantis ut cerebri, aut aduentus percussiois, aut materia grossa imbibita, aut infusa in ipso corrumpens cibum, &c. Lege eum fusius. de his Arcul. uberius agit, &c.

De signis vomitus, &c.

Signa ad uomitum praecedentia sunt, nausea, subuersio, tremor, labiorum & hypochondriorum tensio. Signa uomitus qui sit per consensum sunt: quod si à toto, uel à parte fiat, in eorum augmento uomitus & nausea augeatur, & in eorum morbi decremento minuitur. Indicia per essentiam sunt primò, si à nuda & mala intemperie sine materia fiat,

quod tristis quidam aderit sensus in ore uentriculi, nec ulla aderit in uentriculo grauitas, nec ructus exiens erit alicuius extranei saporis, sed frequens & inanis aderit nausea absque uomitu. Signa à mala intemperie cum materia sumuntur à grauitate percepta, à ructus sapore siue amaro, dulci, acido & sctido, à siti si humor sit calidus, à putrefactione & ab eo quod uomitur. Indicia obstructionis pylorō sunt tarda cōcoctio & cibi descensus, nisi morae in causa sint aliæ cause. Signa uermium erunt commotio quædam, siue titillatio circa uentriculum. Signa solutæ continuitatis sumuntur à dolore, ab exitu sanguinis, & à similibus, &c.

Loci consentientes de signis vomitus.

Auicē. decimatertia tertij, tract. 5, Signa vomitus antecedentia sunt nausea, subuersio: tremet labium, accidit tensio hypochondriorum. Signa humoris calidi putridi sunt sitis, & sapor malus in ore, & putrefactio appa-rens, &c. Vide de alijs signis eum fusius. Ga-
Vu. iij.

len. lib. de plen. circa finem libri, de his etiam
 signis mentionem fecit, ibi, Patet stomachum
 hoc loco appellari os ipsius uentriculi, ubi si
 pituita colligatur, appetitiones excitat: si
 uerò bilis flaua fuerit, sitim & cibi fastidium
 pariet, præterea os erit illis amarulentum.
 At si atra bilis, morosi & tristes & sine si-
 ti, saliuâque plurimum illis scatet: nec ta-
 men omnes cibum fastidiunt, imò eorum in
 quibus atra bilis acida fuerit, nonnulli sa-
 tis famelici sunt, &c. Lege etiam primo de
 loc. affect. cap. 4. ibi, Rursus distinguendo
 inuestigabimus, num ab intemperie ipsius uen-
 triculi hoc eueniat, an à flaua bile in ipso
 contenta, an à iecinore malè suo officio fun-
 gēte, an is ex uniuerso defluat corpore, an e-
 tiam in ipso gignatur uentriculo, &c. B. Ex
 hoc loco postremo elice, quòd ex frigido ci-
 borum cupiditas excitatur, &c. lege de sig.
 omnibus Arcul. & Sauon. & Gord. fusiſſimè
 loquentes. Vide etiam Platearium, &c.

De cura vomitus.

In cura vomitus primùm considera an e-

balis sit, an humoralis, item an creticus an
 symptomaticus: si cibalis, uel per essentiã, uel
 consensum. Si per essentiam, tunc quatuor e-
 runt curandi intentiones: prima est causæ uo-
 mitus remotio: secunda est uentriculi robo-
 ratio: tertia est diuersio & accidentium cor-
 rectio: quarta est uictus ratio. Prima igitur
 & secunda intentio uno & eodem tempore
 cum contrarijs moderatè stypticis alteranti-
 bus malam complexionem remouebit. Ter-
 tia perficietur cum renulsione, cum cucurbi-
 culis suppositorijs, clysterijs, frictionibus:
 quod si acciderit, syncopis eisdemet auxi-
 lijs, ut suprà dictum est, curabitur. Quarta
 intentio sit moderantia in cibo & potu, par-
 ticipent aliqua stypticitate remedia & ci-
 baria, si inque facilis concoctionis, saporis
 nō ingrati, uinum laudabile, & quod patien-
 ti placeat, &c. Si uerò fuerit uomitus per cō-
 sensum, tunc moderanda erit siue totius siue
 partis consensientis dispositio, similiterque ro-
 borāndus erit stomachus cum his quæ exterius
 & interius applicari possunt: deinde cum
 diuersionibus prohibere fluxum humorum

Vñ.iiij.

ad stomachum. Quòd si uomitus sit creticus, tunc uel integrè indicatur, & sic naturæ relinquendus: uel in aliquo deficit, & tunc in eo quod deficit, supplere oportet: si uerò superfluat, compescendus est. Vomitus uerò symptomaticus uel ex stomacho prouenit, uel ab alijs membris aliunde deriuatur. Si primò, tunc intentiones medendi erunt tres, prima euacuatio humoris in uentriculo contenti: secunda est stomachi intemperies corrigenda, simulque stomachus roborandus: tertia est diuersio, ne fluant ab alijs membris humores, & accidentium correctio, quæ omnia etiam supra relata sunt. Si ab alijs membris proueniat uomitus, similiter in primis euacuandam, deinde diuertendum, & membra tam mandantia, quam suscipientia roboranda, ut alterum ne mittat, & alterum ne suscipiat prohibeamus, &c. Vomitus igitur si non fuerit qualis esse oporteat, tunc si sanguis cum alijs humoribus peccauerit, secunda erit uena communis, maximè etiam si ex suppressione menstruum & hæmorrhoidarum proueniat. Si uerò à sanguine peccent alijs humores, tunc fa-

Et aliquali preparatione, sicuti in bile peccante, cum oxysachara, syrup. de agresta, de granatis, de citro, de limonibus, de endiuiā, de citonijs, de papauere, cum aquis endiuiæ, plantaginis, lupulorum, &c. In pituita cum rhodomelle, syrup. de absinthio, de menta, de bisantijs, de fumo terra, de epithimo cū aquis mentæ, absinthij, &c. Fiat euacuatio in bile cum rheubarbaro, myrobalanis, cit. pilulis aloephanginis: in pituita cum rheubarb. & myrobalanis cheb. agarico, &c. Reuulsio fiat ut dictum est cum cucurbitulis natibus ac coxis affixis, cum ligaturis iuncturarum, cum lotionibus pedum, cum proritatione urinae & sudoris. Fluxus etiam intercipitur uias obstruendo, humores incrassando, & uentriculum roborando, cum diacitonite & troc. de olibano Razes, &c.

Loci consentientes de cura vomitus.

Auicē. decimatertia tertij, trac. 5. cap. 12, Sermo uniuersalis in cura uomitus est huiusmodi, ut qui generatur à corruptione ad-

ministrationis cibi, rectificetur, & adiuvetur ex quibusdam confortantibus stomachum boni odoris, calidis & frigidis, secundum quod convenit, & ille cuius causa est materia mala, aut plurima, euacuetur illa materia cum ebibitis, & clysteribus, & minor etiam cibus, & subtilietur, &c. Gal. 1. de loc. affe. cap. 4. Igitur si ipsum quod molestat nil aliud quam intemperies fuerit, calidam refrigerando, & frigidam calefaciendo, illico hominem iuvenis, maxime si uideris refrigerantibus tum medicamentis, tum uictus ratione hominem sanari & calorificis lædi, &c. Lege fusius Galen. 8. de cōpos. med. per loc. cap. 1. ad finem, & cap. 3. ibi, Vomitus ob imbecillitatem grauari stomachi aborti curantur, &c. Vide de his Arculeum & Gordonium, &c.

Observationes in cura vomitus.

Hip. aphor. 4. aphor. 6. & 7, Graciles & facile uomētes purgare superius, cauentes hyem: uomentes uerò difficulter & mediocriter carnosos, per inferiora, cauentes aestatem. B. Quomodo & quibus conueniat uomitus

habetur ab Hippocr. in lib. de salubri diata
tex. 17. ubi inquit, Vomitus hoc modo irrita-
re oportet homines obesos, ieiuni uomāt cur-
rendo, aut celeriter eundo, graciliores & im-
becilliores à cibo uomitum pronocent. Lege e-
tiam tex. 20. & 22. eiusdem, & uide in com-
ment. latius Galenum. Gal. lib. de sect. uen. ad
finem, Caue ne noxam stomacho inferas: nam
stomacho læso multæ aliæ corporis particule
leduntur, &c.

Observationes ante vomitum.

Ioan. Arcul. cap. de uom. & eliciuntur ex
Auicen. quarta primi, cap. de uomitu, Insue-
ti prius ad uomitum assuescant leuibus uomi-
tiis, ne ad insueta tam citò fiat trāsitus. Se-
cundò, ante uomitum præcedat uentris leni-
tio, & cibetur cibus diuersarum uirtutum mi-
xtis ex incisuiis, abstergentibus, uiscosis, dul-
cibus, unctuosus, acetosis, &c. Tertiò, ante
uomitum fac, quòd extrema & stomachus
sint calida, & quòd tempus sit calidum in
meridie, &c.

Observationes post
vomitum.

Ioan. Arcul. Finito uomitu lauet sibi faciem cum aqua rosacea, cui parum aceti sit admixtū, lauetque os ex uino. Tardet cibum per duas horas, & quū cibatur, tribuatur res boni odoris & suauis saporis, pauca quantitatis, facili digestionis, uelocis penetrationis, pauca superfluitatis, dormiat & non bibat, &c.

Gal. 8. de compos. med. per loc. cap. 3, Erit ob id curationis scopus, ut simul ad affectas partes odoratas qualitates imponamus, quales aromatum sunt: nam quemadmodum graueolentia omnia stomachum subuertere solent, sic odorata corroborare, &c.

• Conferentia vomitui.

Conferunt uomitui, absinthiū, acetum scillicum, acetosa, omphacium, allium, aloes, anethum, anisum, aurata piscis, betonica, calamētū, castanea, caepe, citonium, citrum, coriandrum torrefactum, grisomila, endiuia, fœniculum, phystici, cariophyllum, mala granata, acerosa, lupinus dulcoratus, mastix,

mellissa, myrthus, mespila, nux muscata, olibanum, origanum, pyra, piper, poma, pulegium, pruna, rosa, rosmarinus, sumach, spica, scenoanthos, tamarindi, uua non recentes, acacia, etc. Cōposita sunt, alipta, moschata Nic. antidotū hemagogum Nic. aqua thermarū, aluminosa, rosacea, aromaticū ros. Mes. Cōfectio alchanzi Mes. diacitomiten, diaolibanum Nic. electuariū de myrtho Auicen. phylonium Nic. cum posca, menta cum aceto, musc. almans. hiera picra, Gal. pilula arom. Hally. rob de ribes, de acerosa, de agresta acetositaris citri, de berberis, de citonijs cornuum, fructuum, granatorum, pyrorum, pomorum, sy. de agresta, de menta, de acerosa, de succis, acetosus de citonijs Mes. de fructibus Auic. de citonijs, de granatis, de rosis, troc. de rosis, de olibano almans. sotira Nic. rosata nouella Nic.

De prognosticis vomitus.

Hippoc. aphor. 1. aphor. 2, In perturbationibus uentris & uomitibus spontaneis si talia purgētur, qualia purgari oportet, cōfert & leuiter ferūt: si minus, cōtra. Et apho.

4. apho. 22, Morbis quibuscumque incipientibus si attrahibilis uel supra uel infra exierit, lethale, &c. Et aphor. 7. eiusdem, Vomentes uero difficulter & mediocriter bene carnosos per inferiora, timentes astatem. Et aphor. 6. aphor. 15, A longo alui profluvio habito spontaneus uomitus superueniens morbum soluit. B. Hic nota naturam esse medicorum magistrum: nam retractionem edocet, quam imitari debet medicus. Et aphor. 7. aphor. 3, A uomitu singultus & oculorum rubor, malum. B. Quotiescunque uentriculus ab humoribus infestatur, uel per uomitiones uel inferne eos abicit, & statim a singultu liberatur: quum uero singultus non desinit, duorum alterum significat, uel cerebrum, uel uentriculum non mediocre pati inflammationem, &c. Et aphor. 7. aphor. 10, Ab ileo uomitus, singultus, desipientia uel conuulsio, malum. B. Quia nil ad inferiora descendere significat. Et aphor. 37, Eidem quicumque euomunt sanguinem, si sine febre quidem, salutare: si uero cum febre, malum: curare uero acerbis & refrigerantibus. B. Intellige de uo-

mitu qui à uentriculo tantum prouenit, non à pulmone. Est enim salutaris uomitus, quum nullius inflammationis suspicionem afferat, praesertim si sine febre fuerit. Vide Gal. in comment. Hippoc. prognost. 2. cap. 7, Vomitus utilissima est, si pituita ac bile mixta quam maxima est, si non multa, non crassa est: syncerior enim deterior est. Et tex. 39, Si uomitus fuerit prasea, aut humida, aut nigra, quodcunque ex his fuerit, malum. Et tex. 40, Si idem homo omnes uomit colores, exitiale admodum est. Et tex. 41, Vomitus liuida si graue olet, ocysimam indicat abolitionem. Et tex. 42, Omnis subputris ac foetidus odor in omni uomitione malus, &c.

B. Habes rationes ex Galen. quur syncerum deterius sit permixto, & de alijs quæ tibi in legendo apertissima erunt, &c. Auic. tertia-decima terti, tra. 5. cap. 8, Et ex nausea est, quæ est signum crisis, & quandoque est signum malum, sicut in febribus pestilentialibus. Et quum multiplicatur in conualescentibus, indicat conuersionem: & in administratione uomitus cum aequalitate, est in-

amentum maximum, & assiduatio eius maxime debilitat uirtutem stomachi, & facit eum lacunar superfluitatum. Et uomitus quidem creticus euadere facit spasmus: nam accidit febricitanti spasmus aut epilepsia, & subito euomit humorem ut flos aris & euadit. Et multotiens uomitus sanat ex singulis clamoso. Et ex administratione uomitus cum æqualitate conseruantur renes, & curantur nocumenta eorum, & nocumen:um pedum, & eruptio uenarum, &c. Et deterior uomitus est ille uomitus sanguinis, nisi secundum necessitatem sit. Et amatur quidem ut administretur in mensibus, & melior horarum uomitus est, quæ est post balneum & cibum, &c.

Authores dissentientes circa vomitum.

- 1 Adserere, uomitum quolibet tempore & in omni homine posse tuto prouocari.
- 2 Adserere, uomitum non nisi à re grauante uel mordaci irritari.
- 3 Adserere, in syncopi ex consensu uentriculi facta non conferre uomitum.

Confutatio dissentientium
circa vomitum.

Ad primum, Gal. aphor. 4. comment. 7,
Cui imperandus est uomitus, oportet ut sit
gracilis & facilis ad uomendum, & quod non
sit hyems: & sic non quolibet tempore pro-
uocandus, nec in omni homine. Nam medio-
criter carnosos & difficulter uomentes per
inferiora, non per superiora purgandos ad-
monet, &c.

Ad secundum, Gal. 6. de sympt. cau. cap.
2, Est & aliud causarum genus, quibus uen-
tricus ad uomendi impetum concitatur,
nulla uel graui, uel mordaci re ipsum irri-
tante, sed ob id duntaxat quod præter na-
turam quidpiam in eo continetur.

Ad tertium dicitur, quod est opinio Gal.
I art. cur. ad Glau. cap. 14. quod prouocetur
irritando stomachum. Itidem Auic. 2. 3. de cu-
ra syncopis. Item Haly abbas 6. pract. cap. de
syncopi: & in hoc latret Auerrhois quantum
libet, uerum si syncopi cum sudore fieret,
tunc nequaquam fieri iubet Auicem. loco ci-
tato, &c.

De corruptione concoctionis
& eius imbecillitate.

Concoctio est secundum qualitatem, quam nimirum uenter facit, dum cibos sibi similes reddit, alteratio, quæ trifariam leditur, uel omnino abolita est, & talis permanet cibus, qualis ingestus est: uel imbecilla fit, & cibus tardè concoquitur, unde βραδυπψία, id est tarda concoctio à Græcis dicitur: uel deprauata est, & tunc cibus in alienam qualitatem permutatur, unde ἀνψία, id est cruditas appellatur. Cibus uerò interdum & ipse ita corrumpitur, ut nullam concoctionem admittere possit, & nullum proprium nomen habet, &c.

Loci consentientes de corruptione concoctionis.

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 1, Concoctio est secundum qualitatem, quam nimirum uenter facit, dum sibi similes cibos reddit, alteratio, &c. lege eum fusius.

Et tertio de sympt. cau. cap. 4, Alteratrix similiter uel omnino abolita est, quum cibus secundum omnes qualitates talis permanet,

qualis assumptus est: imbecilla, quum tardè
concoquit: deprauata, quum in alienam qua-
litate cibi permutantur, &c. lege eum fu-
sius. Lege etiam 6. de symp. cau. cap. 1. ibi, Ar-
bisariam uitium fieri potest: aut enim tardè
alterantur cibi, ut uix propriam transmuta-
tionem suscipiāt: aut corrumpuntur omnino
ut nullam concoctionē admittant: illud βρα-
δυπεψία, hoc uerò nullum proprium nomen
habet. Vide Auic. 13. 3. Tr. 3. cap. 1. ibi, Et ci-
bus aut conuertitur ad id quod facit dige-
stionem integram, aut cōuertitur ad id quod
digeritur digestionē aliqua non integra, &c.
lege eum fusius.

De causis corruptionis, con-
coctionis, ac eius im-
becillitatis.

Causæ primitiue imbecillitatis concoctio-
nis sunt aēr corruptus, foetidus, uaporibus
malis admixtus, similiter uentriculi uel ali-
cuius membri sibi compatiētis caliditas ni-
mium dissoluens, aut frigiditas calorē nati-
uū extinguēs. Cibus qui sua qualitate mala,
aut sua quātitate confici nō potest, aut quia

Xx.ij.

intempestiue, aut non recto ordine, aut quum diuersimode ingeritur. Potius similiter quum bibitur plusquam ad cibum spectet. Coitus in cibo, & accidentia animi immoderate spiritus commouentia, &c. Cause antecedentes & coniuncte per se sunt mala uentriculi compositio, mala figura, ut si fuerit maior uel minor quam deceat, uel figura rotunda, quum naturaliter oblonga sit. Causa similiter erit lapsus ad frigidam & siccam intemperiem, & humores cuiuscunque generis in uentriculo superfluentes. Per consensum a roto fit etiam imbecillis concoctio, sicut in febribus, hydrope, crisi, &c. A parte, ut laeso cerebro, splene, hepate, &c. Causa corruptionis uel erunt in uentriculo, uel in cibis aut in rebus superuenientibus. Si in uentriculo, uel fiet per proprios uentriculi morbos, ex quibus corruptio ciborum sequitur, sicuti ex solutione continui, ex eius inflammatione, &c. Si in cibis, uel corruptio fiet per suam malam qualitatem, uel uaporosam, uel acidam, aut fetidam, aut putridam, &c. uel per suam quantitatem, ut dictum est, &c. In re-

bus superuenientibus sicuti ab errore externo
accidente, uel à uitiosis humoribus in ipso
cumulatis.

Loci consentientes de causis.

Gal. 6. de sympt. cau. cap 1, Causa cōmunis
est alteratricis potentiae à scopo aberratio.
Fit autem bifaria, uel à potētia ipsa affecta,
uel ab externo errore. Potentia rursus bifa-
riam lēditur, uel per suam ipsius essentiam,
aut per aliquē instrumentorū morbum. Error
triplex est, uel à uentriculi excrementis, aut
à cibis, aut dormiēdi tēpore. Per suam essen-
tiam ex intēperie quadā agentium qualita-
tum. Per instrumentorum morbos, ut per erysi-
pelata, œdemata, phlegmones, scirrhos, ab-
scessus, & propter alios morbos simplices &
cōpositos in uentriculo existētes, quibus ma-
lè uenterculus concoquit laesa existente eius
potentia. Interdū etiam animal non conco-
quit, aut ob immodicam ciborum potuūque
quantitatē, aut prauam qualitatem, aut quia
intempestiuē, aut non recto ordine ingeran-
tur, &c. Lege Gal. 1. de loc. aff. cap. 3 ibi,
Corruptionē ciborū tres sunt differētiæ, &c.

Xx.iiij.

Auic. 13. 3 cap de corrupt. dig. Et ad summū
 causa in hoc aut est in cibo, aut in recepto-
 re cibi, aut in rebus accidenibus superuenien-
 tibus eis, &c. Vide eum fusius: nam ibi omnes
 causæ recitantur, quæ nuper à me dictæ sunt,
 &c. Vide etiam Gal. 3. de loc. aff. cap. 6. ibi,
 Quia concoctionis opus, &c. ibique intelliges
 quod digestio fit in fundo uetriculi, sicuti in
 eius ore ipse appetitus, &c. Lege etiam
 Arcul.

De signis corrupt. concoctionis,
 ac eius imbecillitatis.

Indicia debilis concoctionis cognoscuntur
 ex grauitate, extentione, & ex mala cibi to-
 lerantia. Cognoscuntur etiam ex uisu & pa-
 tientis relatu, ex uentositate, ex rugitu, ex
 mora cibi in stomacho, ex pauca corporis re-
 fectione, faciei que pallore, & ex multo spu-
 ro. Signa diminutæ concoctionis sunt, si post
 decimam horam ructus odorẽ malum redo-
 leat. Signa corruptæ sunt, si nidorosum, foeti-
 dūmq; aut aliā non consuetā qualitatẽ sa-
 piat. Signa mala temperatura & mala cō-

positionis solutique continui ex dolore, & ex his quæ de uomitu dicta sunt, iam patent. Intemperiem uerò frigidam & humidam attestatur, sitis modica, sapor insipidus, acidus ructus, color linguæ albus, pallor uultus cum albedine. Calidam uerò & siccam demonstrat sitis assidua, sapor oris amarus & ructus foetens nidorosus, color linguæ flauus, pallor cum flauitie. Attestantur esse in stomacho flatû rugitus & extensio. Signa corruptæ cōcoctionis & materiæ corruptæ sunt foetor, sapor inconsuetus & horribilis, nausea, uomitus, singultus & syncopis. Vbi uerò mora fuerit plurium dierum, & non continuò hæc adsint, aliunde materiam prouenire indicium certum est, &c.

Loci consentientes de signis corruptionis.

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 1, Corruptiones nidorose sunt à calidioribus & biliosioribus, acidæ à frigidioribus & magis pituitosis. Acidæ quidem creantur quæ pituitosæ sunt & frigida, fumosæque calida & biliosa. Et paulò

Xx.iiij.

post, Tardas etiam concoctiones cibi difficulter corruptibiles faciunt, si ultra quam vires tolerant sumantur, similiter et uigiliae, etc. lege locum fusius. Auic. 13.3. Tra. 3. cap. 4, Illam quae levis est significans grauitas et extensio et remanentia cibi in stomacho longior, etc. Vide Auic. fusius hic, et in cap. de corrupt. digestionis. similiter Arcul. Cord. et ceteros practi- cantes, et habebis quaecunque à me recitata sunt, etc.

De cura corruptae concoctionis & eius imbecillitatis.

Considerandum an per se uel per consensum ab alijs partibus afficiatur stomachus. Si per se, tunc si à modica repletionem fiat, per somnum longum sanabitur: si uero à multa repletionem, tunc educto per uomitum cibo iam corrupto cum alijs humoribus admixtis, primum stomachi discrasiam per sui contrarium curato, et causis quae alteratricem facultatem debilitant auferro, uentriculumque roborato. Vnde in causa frigida roboratur uentriculus, simulque materia praeparatur cum Syrup. de

absinthio, de menta cum mina citoniorum
aromatica, cum rhodomelle, cum aquis absin-
thij mentæ. Roborant etiam uentericulum plu-
rimæ confectiones, sicut aromaticum rosa.
diagalanga, diaciminum, diatrion pipereon,
etc. In causa calida primùm facta euacua-
tione uel per uomitum uel per secessum, ma-
teriæ preparatio fiet cum syr. rosaceo, &
alijs quæ supra in cap. uom. memorata sunt.
At si per consensum morbus fiat, tunc quod
transmittit membrum, corrige per euacuatio-
nem & reuulsionem, & stomachus ne humo-
res aliunde fluentes recipiat, roboretur, &
sui demum intemperies permutetur, resque nō
naturales in contrarium ordinentur, etc.

**Loci consentientes de cura corru-
ptæ concoctionis, &c.**

Aet. ser. 9. ca. 24, Si à ciborum corruptio-
ne fiat cruditas, statim per uomitum tollenda
est corruptio. Quod si quis natura difficul-
ter euomat, enemate succurratur. Si à defectu
uentriculi, cum his quæ concoctionem adiu-
uāt curato, etc. Auic. 13. 3. tr. 3. ca. 5, Cū fue-

rit debilitas digestionis à causa leui, aut à repletionem antecedere nō plurima, tunc sufficit in ea lōgitudō somni, &c. lege eū fusiū. Lege etiam cap. 7. ibi, Primum est ut educatur corruptum in stomacho cum uomitu aut solutione uentris, & rectificetur regimen, &c. lege eum ulterius, & inuenies quodcunque dictum est: lege Arcul. & Mar. Catinariū, &c.

Observationes in cura cibandi.

Aet. ser. 9. cap. 24, Ad cauendam cruditatem prauiderē debemus, ut neque in multitudine, neque in qualitate eorum quæ in cibo accipiuntur, neque in acceptionis opportunitate, neque in ordine delinquat, sed quacūque cōcoquere ualeat, ea tantū ingerat, &c.

Auic. 13. 3 tra. 3. ca. 7, Caue à frigidis subtilibus (quoniam subtilia corrumpuntur in eorum stomachis) non uomat ante cibum, ne stomachus debilis fiat, sumatque res stomachum roborantes, &c.

Observationes in topicis.

Gal. 8. meth. ca. 5, Quacunque applican-

tur stomacho, sint ualde calida: nam tepida firmitudinem uentriculi dissolunt, & talia in duplici uase calefacienda sunt, ne eorum facultas uitietur, &c. Nota etiam quæcūque dicta sunt de uomitu circa stomachum supra, &c.

Conferentia concoctioni & stomacho.

Conferunt stomacho, & concoctioni proficiunt hæc simplicia calida, ut sunt absinthium, agaricus, aloes, calamentum, calamos aron, cardamomum, cinnamomum, ciperi, nuxes cupressi, citrum conditum, phistica, galanga, gallia, gariophyllum, grana pini cum zucchero, macis, mastix, laudanum, menta, oliua, olibanus, oua, passula, rheub. scoria ferri, uinum, xyloaloes & zucharum. Composita calida sunt, aromaticum ros. garyophyllatum, diaciminū, confectio Alexandrina, confectio de xyloaloes, de galanga, de citonys, de scoria ferri, cerorum Alexandrinū Mesemplastrū diaphinicon, oleū masticinū, de absinthio, de mēta, pilula stomachica, aloephagina, syr. de absin. de mēta, de

700 DE CONSEN. MEDIC.

fumo terra, de cort. citri, theriaca magna, tri-
phera minor, troc. de ros. de absinthio, hiera
Gal. Simplicia frigida sunt, acetosa, acetum,
agresta, aqua chalybeata, belirici, berberis, ci-
tonia, corallus, coriandrum, emblici, endiuia,
cicorium, uinum & aqua extinctionis ferri,
granata, lzarabe, chebuli, lactuca, myrobala-
ni, myrthus, mespila, persica, poma, pruna da-
mascena, ribes, rosa, sorba, sumach, smaragd⁹,
perdix, pellicula interior stomachi gallina-
rum, capillus Veneris, coriandrum, &c. Com-
posita frigida sunt, diacitoniten, diarrho-
don, electuarium de sorbis, rob de ribes, de
berberis, de sumach, de citonijs, de pyris,
de pomis, de granatis, de citro. syru. de myr-
tho, ros. zucharum ros. oleum citoniorum,
ros. &c.

De prognosticis corruptæ conco-
ctionis & eius imbecillitatis.

Anic. 13. tract. cap. 3. Quandoque perdu-
cunt debilitas digestionis & conuersio cibi
ad phlegma, ad tremorem & frigus extre-
mitatum, & commotionem paroxysmi febris,

uerum pulsus non est pulsus ut initio febris.
 Et dicitur in libro mortis uelocis, Qui habens
 nauseatiam satietatem & tarditatem di-
 gestionis, bothor apparens niger super oculos
 eius similis ciceri, & rubet pars eius, & ui-
 ridus fit pars alia, tunc ipse moritur in 17.
 Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2, Quum coctionis
 gradus quatuor enumeretur, primus fit in ue-
 triculo, secundus in uenis, tertius in qualibet
 parte, quartus qui alterationis species est as-
 similatio dicitur. Porro concoctio uel omni-
 no deficit, uel deprauata est. Si deficit, cor-
 pus assumpto cibo non pascitur, & fit atro-
 phia. Si deprauata est, fiunt uirilignes, leu-
 cas & elephas: uide eum fusius. Auic. 13. 3.
 tra. 3 cap. 1, Sanguis qui non est digestus di-
 gestione conuenienti naturæ non recipitur à
 membris, sed putrescit & foetet, nec fit ex eo
 nutrimentum, nec bona assimilatio: unde non
 mirum si sequatur lycteria, hydrops, scabies,
 &c. Immo corrupta digestio in conualescen-
 tibus semper recidiuam pronunciat, &c.

Authores dissentientes circa
concoctionem.

- 1 Adserere, hominem posse uiuere naturali-
ter pluribus diebus sine cibo.
- 2 Adserere, à siccitate & humiditate abs-
que alijs qualitatibus actiuis coctionē l.edi.
- 3 Adserere, posse assignari tēpus moræ ci-
borum in stomacho.

Confutatio dissentientium
circa concoctionem.

Impugnat primum Gentilis & experien-
tia, nam quum recitasset ex Alberto, uetulam
in Lombardia uixisse per 40. dies sine cibo,
ipse inquit, Hæc difficilia sunt in homine a-
pud me: nam tales humores deberent potius
putrescere & carere regimine naturæ, quàm
nutrire, &c. Vnde naturaliter loquendo, non
solum impossibile est, sed etiam non creden-
dum, &c.

Ad secundum, Auic. de noc. digest. Verū sic-
ca & humida nō perueniunt ad hoc secūdu
plurimum, ut appareat ex eis solis cū aqua-
litate ambarum aliarum qualitarum nocu-

mentum in digestionē: igitur non ledunt absque alijs qualitatibus.

Ad tertium, Quum diuersimodè loquuti sint authores de hac re, idcirco tale tempus assignari impossibile existimo: nam Auerrhois dixit, quòd tempus moræ est, 16. horarum: Gentilis, 10. horarum. Auic. de cur. feb. phlegmatici, inquit, Hora cibi sit post paroxysmum teporem & eradicationem eius, & ante paroxysmum ad minus quatuor horis. Vbi concludi posset, quòd stomachus in spacio quatuor horarum sit à cibo uacuus: nam superius dixerat, Caue ne occurrat paroxysmus, nisi uentrem habeat uacuum, &c.

De appetitu canino.

Quum appetitus ad naturalem actionem pertineat, nō ad animalē, ut ipse Gal. ait, ad appetitum necesse est ut præcedat inanitio, deinde inanitarum partiū naturalis appetitus, hunc mox sequitur uentriculi per uenas suctio, deinde suctionis sensus qui est fames, demum animalis appetitus omnium ultimus: hic erit duplex, alter ad cibum, & est

appetitus calidi & sicci, alter ad potum, & est appetitus frigidi & humidi. Quorū uterque trifariam aboleri potest, si uel suctionis sensus pereat, uel suctio non fiat, uel corpus non inaniatur: unde dicimus quod appetentia, uel est abolita, uel imbecillis, uel deprauata. Abolita, quum nihil quis appetit: imbecillis, quum in appetendo deficiat: deprauata, quum immoderatam cibi portionisque exhibitionem appetat, aut ad alienae qualitatis desiderium uertitur. Appetitus igitur caninus erit plurius, quā possit digeri intensior appetentia, à cuius assumptione animal non satiatur: alienam qualitatem appetere est, ac si ea quae secundum naturam non sunt, quis appetat, qui morbus à Galeno citatus. i. pica siue malacia, eo quod utero gerentes mulierculas infestet, uocatur, ita ut carbonem extinctos & testas & similes absurdos cibos appetant, &c.

Loci consentientes de appetitu canino.

Gal. 4. de symp. cau. cap. 7. de his longiori

sermone pertractat, quem fusius uidere poteris. Facit etiam mentionem de appetitu canino, 6. de loc. aff. cap. 2. ibi, Qui canina appetentia uexantur, &c. Et 5. de loc. aff. cap. 6. locus affectus demonstratur, ibi, Quæ aut canum more, &c. Et est os uentriculi deuoratorum pondus sustinere non ualens, &c. Similis etiam sensus habetur in com. apho. 20. lib. 2. Vide etiam latius Auic. tertiadecima tertij, tex. 8. cap. 10. de corruptione appetitus: & Aet. ser. 9. cap. 20. & 23. de uitioso appetitu: uide etiam Arcul. & alios, &c.

De causis appetitus canini.

Causæ quæ caninum appetitum excitant sunt plures, quandoque excitatur hic appetitus post diuturnas euacuationes ac febres prolixas, interdum à uirtute retentrice corporis, quandoq; à uermibus cibum assumptum deuorantibus, interdum à catarrho ad uentriculum stillante. Sed ad summum tres erunt præcipue causæ, frigiditas scilicet cogens ac exprimens, calliditas resoluens, & inanitio consumens, frigiditas erit uel ab acida pituita uel à melancholia, &c.

Y.i.

Loci consentientes de causis
appetitus canini.

Auic. 13. t. 2. cap. 12, Multotiens excitatur hic appetitus caninus post euacuationes & febres prolixas resoluentes, & quandoq; accidit ex debilitate uirtutis retentivæ in corpore, & quandoque propter caliditatem superfluum in ore stomachi resolventē, &c. lege locū hunc fusius: Gal. 4. de symp. cau. ca. 7, Canina appetētia binæ sunt causæ, quarum una est acidorum humorum uitiū, altera est plurima per totum corpus inanitio, siue ipsa caloris uim sequatur, siue retentricæ facultatis imbecillitatem, &c. Habes etiam in 2. apho. cōment. 21, quod canini appetitus uel propter solam intemperaturā frigidiorē, uel propter humores acidos, quos exorbuīt os uētriculi, fiant. Similis sensus habetur à Paulo lib. 2. ca. 51. & ab Aet. ser. 9. ca. 21. & 22. sed latius consule Gal. loco citato: nam præter alia, plura exempla affert de siti immodica, sicuti de messore q̄ uinū, in quo uisera extincta fuerat, bibit & mortuus est: Itē de eo qui ex ueteri uino inebriatus, & de his qui

in naui aquam marinam bibere ausi sunt,
 & de quodam febre ardenti laborante, &c.
 quorum causa erat salsus uel biliosus humor
 uentriculum mordicans. Quod uerò uermes
 sint causa appetitus canini, legere poteris
 non solū Auic. sed & neotericos omnes, &c.

De signis appetitus
 canini.

Signa humorum acidorum in uentriculo
 sunt, multa deiectio eorū quæ deuorata sunt.
 Signa inanitionis ipsius habitus exacta in-
 anitio, nec cibus per totum corpus distribui-
 tur. Signa frigiditatis sunt eo quod nulla uel
 parua adest sitis, copiosa adest deiectio, ad-
 est etiā fames assidua, & cibi assumpti gra-
 uitas, flatus multiplicatio, praua concoctio
 cum singultus copia. Signa caliditatis sunt
 sitis uehemens, corpus non impinguatur, nec
 quicquam per uomitum uel per secessum ex-
 cernitur, &c.

Loci consentientes de signis
 appetitus canini.

Gal. 4. de symp. cau. ca. 7, Canina appetē-
 Ty. ij.

tia si ab acidis humoribus fiat, cognosces. quia eorum quæ fuerunt ingesta, multa fiet deiection: si ab inanitione, quia per habitus exactam inanitionem cibus per corpus non digeratur, &c. Razes 9. almans. Si cibus nec eum grauat, nec ipsum euomit, nec per secessum expellit, signum est à ui caloris morbum fieri: si uerò assidue famem patitur, & cibus post assumptionem grauat, ita ut uel uomere, uel per secessum reijcere necesse sit, signum est morbum à frigore oriri, &c. Lege etiam Aët. ser. 9. cap. cit. Auic. 13. tra. 2. ca. 13, Signum eius qui fit post euacuationes & ægritudines est antecessio earum, &c. Signa eius qui fit ex frigore sunt paruitas sitis, multitudo facis, inflatio, &c. Signa ex caliditate sunt fortitudo sitis, & non est uomitus acetosus, & natura est ut plurimum constricta, &c. Signa eius qui fit ex debilitate uirtutis retentiuæ est multitudo egestionis crudæ, &c. Signa ex humore acetoso aut melancholico sunt paucitas appetitus, & aciesit as eructationis, &c. Vide Arcul. etiam & alios practiçantes, &c.

De cura appetitus canini.

Omnem operam dabis in remouenda causa : nam si fiat post euacuationes & febres prolixas, tunc reficientibus unctuosus quæ os stomachi mundificat opus est, sicuti eclegma est ex oleo amygdalino dulci cū zucchero paratū. Si fiat à retentricis facultatis imbecillitate, tunc per cōtrarium eius cōplexionis curato, ut si humida cū siccis, si calida cū frigidis, &c. Si fiat à catarrho, tūc cura erit: prout dictum est in capite destillationū. Si uerò fiat ab acida pituita, quemadmodum sæpius fieri solet, tunc his potissimum utendum est quæ incidunt ac repurgent, ut sunt dulcia, salsa, & alioqui abstergeria calida, qualis est hiera Gal. deinde uinū dulce. Prosunt etiam calida pingua, sicut butyrū cum brodijs pinguibus, cinnamomo, garyophyllis & croco paratum. Si uerò fiat à uermibus, conferunt ea quæ uermes interficiūt, deinde utetur stypticis. Si fiat à calore plurimo resolvente, remoue cum frigidis tam intrinsecè quàm extrinsecè applicis poros carnis obstruentibus, ut cum oleo myrthino ros. &c. abluātūrq; aqua

Yy. iij.

710 DE CONSEN. MEDIC.

frigida & aceto, nisi quod prohibeat: cibi uero sint frigidi, craffi, uiscosi, quales acidi, acetosi & congelati, unde confert etiam in hoc casu panis azymus & similes cibi, &c.

Loci consentientes de cura
appetitus canini.

Auic. decimatertia, tra. 2. ca. 14, Verū illos quibus accidit hoc post febres fortes & euacuationes, oportet cibari ex unctuosisque mundificant os stomachi, quæ non sint malæ substantiæ, quale est oleum amygdalarum dulcium cum zucchero, &c. Illis uero qui pariuntur ex debilitate uirtutis retentivæ, licet secundum plurimum debilitetur propter frigus, tamen debilitatur omnis uirtus propter omnem malitiam complexionis, idcirco oportet ut cognoscas complexionem, & opponas cum contrarietate curæ, &c. Hip. apho. 2. aph. 21, Famē Δωπνξίς, id est, uini porio soluit. Gal. in comment. inquit pro fame intelligi debere non naturalem quæ ex longa inedia, aut ab alia euacuatione facta sit, sed tantum appetentiam caninam, quæ uini porione & cibis pinguibus & oleaginis cura-

tur, quia hoc symptoma plerunque fieri solet à frigida intemperie, siue nuda, siue humoribus imbuta, unde uinam calefaciēdo excludit humores & stomachi intemperiem emendat.

Obiectio.

Videtur hoc in loco Auic. discordare à Gal. i. in ordine assumendi: nam Gal. uino præmittit pingua, Auic. pinguibus uinū, dum inquit, Ipsum sanat sumptum in potu calefactum in ieiuno. Præterea Auic. non semper laudat uinum, ut Gal. maximè, si adsit uentris solutio, quum dicat, Oportet ut omne uinum tunc deuitent, &c.

Responsio.

Dicimus uinum tantū conferre post pingua, uomitus ratione, sed ad resoluendum humorem uiscidum, ieiuno stomacho ut Auic. In reliquis uerò sunt concordēs, si bene considerentur. Paul. lib. 2. cap. 15, Quoniā igitur à pituita potissimum acida constituitur affectus, ijs utendum est, quæ hanc incidant repurgēque, ut sunt dulcia, salsa, & alioqui abstergentia calida, &c. Aët. ser. 9. cap. 22, Iy. iiij.

Nullo alio tutiori medicamento expurganda est acida materia, quàm picro appellato pharmaco, quod non tantum calefacit, sed dissecat, repurgat, extrahitque ex profundo oris uentriculi, quin & uetri robur addit, ne facile humorẽ nociuũ suscipiat: appetitus uero qui à fortitudine caloris prouenit, nõ hoc medicamento, sed ijs tantum indiget, quæ cutẽ condensare ac spissiore reddere possunt, ut est oleum ex immaturis oliuis expressum: abstineant à potu uini & ab omnibus quæ tam intrinsecus, quàm extrinsecus calefacere possunt, &c. Lege Auic. ibi, Et similiter cura ei est, quæ accidit propter resolutionem plurimam, &c.

Conferentia appetitui canino.

Conferunt canino appetitui omnia pinguiora, uinum, diaciminum, diatrion, pipereon, emplastrum aggregationis. Auic. 3. 5. emplastrum purgamẽti ferri Haly. 14. antid. theriaca. Serap. hieralogonion Haly. 7. antid. hiera picro Galen. &c.

De prognosticis appetitus canini.

Auic. 13. Tra. 2. ca. 12, Et scias quod appe-

ritus caninus multotiens perducit ad bulimū
 & subet & mortē, &c. Gal. 4. de sympt.
 cau. cap. 7, Non mirum si affecto ore uentri-
 culi, ubi appetentia consistit, quādoque do-
 lores & animi defectio sequatur: nā tum ob
 exactam sentiendi uim, tum ob situs uicini-
 tatē hoc cōtingere potest, &c. immō ex ner-
 uorum aut arteriarum consensu cardialgia,
 morbus comitialis, grauis sopor & deliria cō-
 sentiente cerebro eueniūt, &c. Hip. aph. 5.
 aph. 27, Qui noctu bibere appetunt, ijs ad-
 modum sitientibus si superdormierint, bonū,
 &c. B. Quia cōquiescentia per somnum subdescē-
 dit id quod sitim efficiebat. Et nota q̄ qui
 ex humidi defectu ualde sitiunt, ijs dandus
 est potus: nam succurrere defectui, est, inquit
 Gal. medicinale Theo. Vide tamen de siti in
 lib. de febris infra, &c.

De bulimo.

Bulimos, est intensus membrorum appeti-
 tus cum deiectione appetentiæ stomachi, un-
 de uenæ fiunt uacue, sed stomachus respuit
 ac abhorret cibum, &c.

Loci consentientes de
bulimo.

Auic. decimatertia, tra. 2. cap. 15, Bulimus uocatur fames uaccina, & est membrorum fames cum satietate stomachi, & uena quidem sunt uacua, & stomachus cibum respuit, &c. Gal. aph. 2. comment. 21, Passio bulimos appellata est casus potentiae appetitricis à frigiditate exteriori, qui à fame quidem inchoauit, sed non habet amplius eam adiunctam, &c.

De causis bulimi.

Causa primitiua sunt motus per loca niuosa & frigida, uel mala uentriculi intemperies, uel eius imbecillitas, uel frigiditas uirtutem attractoriam & sensibulum mortificans, similiter & inanitio, &c.

Loci consentientes de causis bulimi.

Gal. 4. de sympt. cau. cap. 7, Accedit ad hoc bulimos, id est, uehemens fames, quæ fit quum simul penuria, imbecillitate & refrigeratione uenterculus afficitur, &c. Auicē.

13. tra. 2. ca. 15, Et multoties accidit iter agē-
tibus in frigore & congelatis, quorum sto-
machi ex frigore uehementi inspissantur, &
causa eius est malitia complexionis, mortifi-
cans uirtutem sensibilem & attractiuam, &
fit ex humoribus, &c.

De signis bulimi.

Signa bulimi recitata sunt suprā capite
de appetitu canino, nam communia prope-
modum sunt. De his uide Gal. lib. de fin. med.
ibi, Bulimos est ingens fames, & dispositio,
in qua fit cibi inquisitio ex paruis interual-
lis: qui hac detinentur, resoluuntur & conci-
dunt, decolorēsque fiunt, perfrigescunt ijs ex-
trema corporis, & torquetur stomachus, uix-
que pulsus percipitur, &c.

De cura bulimi.

Quum morbus fiat à frigore exteriori, cu-
retur cum calidis aromaticis in quibus adsit
stypticitas, deglutiāntque panem infusum in
uino odorifero Cretico, deinde fiat aliqualis
diuersio, ligando extrema manuum & pe-
dum. Somnus interdicator, pungantur

ac suscitentur, cum urtica & uirgis paruis
 suauiter flagellentur, fiântque emplastra cir-
 ca regionem uentriculi ex odoriferis ac cor-
 di congruentibus, & si aduenerit syncopis,
 tunc spargatur eorum facies ex aqua frigi-
 da, stringanturque manus ac pedes, euellan-
 turque capilli: quum uerò syncopis desinit,
 statim cibentur, &c. In causa calida utantur
 frigidis uelut rosa, nymphaea, uiola, coriandro
 preparato, sandalis, camphora, fiântque epi-
 themata frigida ex aqua ros. nenupharis cū
 sandalis, &c. Cibaria sint boni nutrimenti cū
 omphacio cōditi. Potus sit uinum granatorū
 cum iuleb ros. ungatur etiam stomachus cum
 oleo ros. myrrhino, &c.

Loci consentientes de cura bulimi.

Auicē. decimatertia tertij, tra. 2. cap. 17,
 Est cura casus appetitus, & oportet ut odo-
 rentur cibi promouentes appetitum, habē-
 tes species & fructus odoriferos & aromati-
 ca odorabilia, in quibus est stypticitas, ut con-
 gregetur uirtus, & deglutiāt panem infusum
 in uino odorifero, &c. Vide hunc locum fu-

sius, & omnem curam intelliges. Lege etiam Aet. serm. 9. cap. 20. de cura perditionis appetitus, nam ambo hi morbi simul coincidunt, &c. Vide etiam Arcul. & Marc. Cat. &c.

De prognosticis bulimi.

Aet. ser. 9. cap. 6, Asidui bulimi & exolunt, & in animi deliquia incidunt, quibus agrè auxilium reperitur. B. Nota quòd syn-
copis ex bulimo, tum ob corporis inanitionem, tum ob oris uentriculi nocumentum, cui cor compatitur, accidere solet: quæ si longo durauerit tempore, plerunque egros ad interitum perducit, &c. Intellige etiam de bulimo quaecunque dicta sunt de prognosticis appetitus canini.

Authores dissentientes circa bulimum.

- 1 Adserere, idem esse bulimum & appetitum caninum.
- 2 Adserere, uinum in quolibet appetitu canino conferre.
- 3 Adserere, cibaria crassa tantum in bulimo & appetitu canino competere.

Confutatio dissentientium circa bulimum.

Ad primum respondetur, quod definitiones utriusque datae sunt, quae manifestant non idē esse. Præterea Gal. aphor. 2. com. 21. in fine eos reprehendit dicens, quod pro generali & uniuersali faciūt specialem & particularem. Præterea bulimos tantū à frigiditate exteriori fieri potest, & non appetitus caninus. Demum bulimos incipit cum fame, sed perseverat sine fame, quod non facit appetitus caninus, &c.

Ad secundum, Gal. eodē in com. Talem famē uini potio sanat, nō autē eam quae ex longa inedia, uel alui profluvio, aut fluxu sanguinis, aut alia aliqua facta euacuatione, &c.

Ad tertium respondetur, quod & si cibaria crassa, eo quod magis sedent appetitū, uideantur congrua, nihilominus tenuia danda sunt, cum quia uirtus imbecillus est, cum quia facilius per membra distribuuntur, &c.

De dolore stomachi & eius flatu.

Dolor stomachi est eius quidam tristis sen-

sus à mala intemperie nuda uel materiali,
aut à soluta continuitate proueniens, cuius
cause primitiue sunt percussio, casus, offen-
sio stomachi uel membri consensientis, ut ce-
rebri, nerui intestinorum, uel regimē cibi in-
ordinatum, uel aliarum rerum non natura-
lium. Cause antecedentes sunt nuda intempe-
ries, uel cum materia acri & mordicante, uel
à sanguine, pituita, aut potus aquæ frigida,
aut flatu extendens, aut soluta continuitas
sicut ab ulceribus, uel ab aliquo abscessu. Cau-
se coniunctæ sunt ipsi humores, uel reliqua
dolorem stomachi actu efficiunt, &c.

Loci cōsentientes de causis do-
loris stomachi.

Auic. de curatione tertij, tra. 2. cap. 1, Do-
lor stomachi accidit aut propter malitiā cō-
plexionis absque materia, aut cum materia,
& propriè acuta mordicativa, aut propter
solutionē continuitatis ex causa uentosa ex-
tensiuā, aut mordicatiuā adusta, aut aggre-
gatiuā ambarū rerū simul, sicuti est in aposte-
matibus calidis, &c. Lege eū ulterius, & in-
uenies etiam causas, quorū dolor accidat ante

comestionem, & sedatur quum comeditur,
 &c. Consule in hoc etiam Arcul. 9. almans.
 Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2, spiritus in uen-
 triculi spatijs oriri solet, quum humores pi-
 tuitosi ibi contenti, uel cibi ab imbecilli ca-
 lore in uapores resoluuntur. Nam ut absolu-
 tum frigus uaporem non excitat, ita calor ma-
 gna ex parte quæ comprehendit uincens plus-
 quam pro uaporis generatione cibum exte-
 nuat, nisi fortè suapte natura in flatum trans-
 eat. Quare relinquitur quòd à calore imbe-
 cilli cibos non omnino conficiente, sed quo-
 dammodo dissolvente, flatu siue spiritus exo-
 riatur, &c. Lege etiam fusius Galen. de caus.
 flatu, 14. meth. cap. 7. ibi, Porro halituosum
 spiritum in animalis corpore ex succis, &c.

De signis doloris stomachi.

Signa bilis sunt mordicatio, dolor puncto-
 rius, sitis, oris siccitas atque amaritudo. Si-
 gna pituitæ sunt, oris salsedo, præsertim si sal-
 sa fuerit pituita, inflatio, grauitas sensibilis,
 aliquando frigiditas: interdum fit sitis ratio-
 ne doloris & clamoris, item adest uomitus præ-

uitosus, pallor faciei, &c. Signa flatus sunt eructatio, rugitus: ructus fiunt uel strepitus, extensio in hypochondrio, iuuatur per emissionem strepitus, dolor permutatur frequenter. Signa apostematis sunt appetitus destructio, eminet in parte exteriori, praesertim si fuerit circa os uentriculi: si uero fuerit in fundo, concoctio destruitur, nec apparet eius eminentia, adest febris, &c. Cognoscuntur ulcera ex sanie & reliquis exeuntibus, &c.

Loci consentientes de signis doloris stomachi.

Auicē. decimatertia, tract. 2. cap. 2, Et mordicatio cum inflatione est significatio materiei calidae propter qualitatem acutam, uel salsam: si mordicatio non est stabilis, imò renouatur, significat effusionem cholerae ex hepate, &c. Et signa ex uentositate sunt eructatio & rugitus & extensio in hypochondrijs, &c. De his consule Arcul. fusius. Galen. 6. de sympt. caus. ca. 2, Cognoscitur flatum esse in uentriculo, quoniam si per os reijcitur, facit ructum: si per inferiores partes, flatum

Zz. i.

reddat uel strepentem uel sine strepitu : quòd si per neutram partem deferatur, symptoma uentriculi efficit ob imbecillitatem non potentis spiritum redundantem & nebulosum expellere, &c. lege hoc totum caput: nam ex flatu acuto ac tenui sono, & similiter ex borborygismis diuinare te docebit, quia ex parte flatus procedat, & alia ad rem facientia: lege etiam neruicos, &c.

De cura doloris stomachi.

Diuersimodè curabitur dolor, prout causa efficiens fuerit : nam si nuda ac sola intemperies mala sit in causa, tunc sola alteratione per contrarium curabitur: si uerò materialis intemperies in causa fuerit, tunc curandi intentio quinque intentionibus perficietur. Prima erit circa regimen sex rerum non naturalium, ita ut in contrarium cause omnia adhibeantur, ut in calidis frigida, & econuerso. Secunda est doloris mitigatio, quae statim in opus dirigenda est, quoniam stomachus sit membrum sensitivum, ex cuius lésione facile totum corpus comparitur. Haec duobus modis perficitur. Primò abscindendo ab foris causam,

Et hæc fit cū solutiuis et sectione uenæ: quod
 si materia nimis stomacho adheret, ac fixa
 et compacta persistat, ita ut aliqua præpa-
 ratione indigeat, præparanda tunc erit pro-
 ut in altera intentione dicetur. Interim al-
 ter sedandi modus erit cum rebus anodinis
 quæ parari possunt per forus, cataplasmata,
 cerata, olea, etc. Forus fiunt cum floribus ca-
 momillæ, anethi, melliloti, et semine lini,
 fœnugraci, altheæ, etc. Deinde in casu ne-
 cessitatis ad opiata concurrendum: unde in
 causa frigida damus phylony rom. 3. 5. us-
 que ad 3. i. cū modico uino, et in calida tan-
 tundem requiei Nicol. etc. Tertia intentio est
 humoris peccantis præparatio, unde in causa
 calida procedimus cum syrupo acetoso simp.
 uel oxysacchara, syrupo de endiuiâ, uiol. de
 agresta cū aquis endiuiâ, lupulorū, uiolarum,
 etc. Quæ bilis si aliunde flueret, præparanda
 esset cum his quæ aliqualem in se stypticita-
 tem continent, ut cum syrupo ros. de semine a-
 cetosæ, de granatis, de citonij, cum aquis en-
 diuiæ acetosæ, plātaginis et cichorij, etc. In
 causa frigida cū rhodomelle, oxymelle simpl.

Zz. ij.

Et compos. scilliticòque Syrupo de absinthio,
 de menta, si fuerit pituita salsa, cū syr. uiol.
 Et oxymelle simplici, cū aquis camomille, en-
 diuæ: si melancholia cum syr. de fumo terræ,
 de epythimo aceroso simplici. syr. uiol. Et cum
 aquis fumi terræ, lupulorum, boraginis, etc. si
 sanguis extrahatur per uenæ sectionē. Quar-
 ta intentio est euacuatio, quæ in materia bi-
 liosa ita parabitur. R. manna electæ mast. 3.
 xij. electuarij de semine ros. 3. ij. semē syr. uiol.
 3. i. cum decocto fructuū Et florum cord. fiat
 potus. Vel in materia crassa cum cassia dia-
 phinicone. In melācholia cum cassia Et con-
 fectione hamech: laudatur insuper hiera Ga-
 len. simpl. pilulæ aleophāgina, etc. Si in cau-
 sa fuerit uērositas, curato post euacuationem
 factam cum calefacientibus Et exiccantibus,
 præsertim si materiam fouentē habuerit, un-
 de in hoc commendatur cucurbitula cum ma-
 xima flamma applicita. Item fiant forus ex
 decocto mēta, absinthij, camomille, calamen-
 ti, pulegij, rutæ, cinnamomi, galangæ, calami
 arom. etc. uel cum oleo in quo ruta, apium, cu-
 minum, maratrum bullierint. etc. Quinta in-

sentio est malæ complexionis derelictæ remo-
tio, quæ si fuerit calida, frigidis remouebitur:
si frigida, cum calidis, quæ parantur per cera-
ta cataplasmata, linimenta, &c.

Loci consentientes de cura do-
loris stomachi.

Auic. 13. tra. 2. cap. 3. Cura eius qui est ex
malitia complexionis calidæ sine materia est
in potu sumere lac acetosum, & aquam frigi-
dam, & in cibo pullos, perdices, cucumeres, cu-
curbitā, portulacā, &c. & sic intelliges de fri-
gida cōplexione, quod per contraria curetur.
Quod doloris mitigatio tribus dictis modis
fieri possit, lege etiam Auic. 2. primi, doct. 2.
sum. 2. ca. de cau. sedādi dolorem. Item quar-
ta primi, cap. de sedatione doloris. Lege etiā
neotericos practicantes Arcul. & Mar. Cat.
Mich. Sauona. Razem & Bauerium fol. 66.
&c. Auic. 13. tra. 2. cap. 3. loquens de præ-
paratione simul & euacuatione humoris do-
lorem efficiētis, inquit: Et quando dolor fue-
rit ex humore cholerico calido, euacuabis, &
administrabis syrupum acetosum cum aceto
Zz. ij.

in quo fuit infusum absinthium, &c. Galen.
 14. meth. cap. 7, In curatione omne princi-
 piū est totū corpus euacuare ea euacuatione
 quā ferre potest: purgatio sit uel missio san-
 guinis, uel purgatio tum per ea quæ subter
 expellunt medicamenta, tum per quæ supra,
 ut uomitoria, deinde per ea, ut uno uerbo
 me expediam, quæ calefaciunt & exiccant,
 &c. Gal. 12. meth. cap. 8, De cura flatu uen-
 triculi cōmendat cucurbitulam maxima cum
 flamma admotam, & ita hoc præsidium ua-
 lere, inquit, ut incātamenti cuiuspiam simi-
 le uideatur. Et 8. meth. cap. 5, Flatus sanan-
 di sunt, oleum in quo ruta & semina quæ
 flatus discutiunt, suere incocta, ut sunt apij
 cumini, marathri, atq; alia id genus. Et 14.
 meth. cap. 7, Est illud, inquit, cōmune praece-
 ptum omnium serē quos uitiosus succus creat
 morborum, quod in fine calefacientibus &
 exiccantibus sit utendum, &c. Vide Aet. ser.
 9. cap. 27. ex Archigene curam, & Auicē.
 13. tra. 2. cap. 3. ibi, Et dolores quidem sto-
 machi frigidos & uentosos sedat, &.

Obferuatio circa curam do-
loris ftomachi.

Marc. Cat. de mēte Auic. Debemus in pri-
mis cū diligētia & bona dura procedere, &
caufam cognoscere, ne si error cōtingeret, ob
id quod ftomachus chylum generat, talis er-
ror toti corpori communicaretur, &c.

Nocentia ac conferentia do-
lori ftomachi.

Dolorem & mordicationem inducūt ble-
ta, bulbus, fructus cedri, dactyli, grana pini,
iuniperus, lac, rapa cruda, scamonium. Cōfe-
rūt dolori & mordicationi, abfinthiū, aloes,
acerofa, acetum scilliticum, betonica, cala-
mus aromaticus, corallus, coriādrum, fursur,
galāga, gariophyllū, gentiana gariophylla-
ta, granata, acerosa, lactuca, maiorana, men-
ta, mellilotū, nepita, nux moschata, ostraea,
oua semicocta, origanum, puritaria, passula,
peucedanū, portulaca, pulegium, rheubarba-
rū, rosa, ruta, rubus, lac sicomori, siliqua, si-
samus, spica, spina alba, scenoanthos. Cōpo-
sita sunt alphendidicon. Auic. certia quinti,

Zx. iiij.

728 DE CONSEN. MEDIC.

Apozima de absinthio quarta quinti Auic.
 Athanasia maior Haly. 6. antido. Cēratum
 hyssopi, filiagrios hyssopi Pauli, stomaticon
 Mes. secūda antid. electuariū de carui. Auic.
 de ambra Serap. electuariū indum de baccis
 lauri, gallia muschata, infusio hieræ Mes.
 oleum de absinthio, de menta, de costo, nar-
 dinum, rosaceū, masticinū, myrthinū, de cito-
 nys, pilulæ aleophangina, masticina de hie-
 ra cum agarico hieræ simpl. Quadrumeron
 confectio Nic. Rob granatorum de citonijs,
 theodoricon magnum Auic. theriaca maior,
 theriaca diateffaron, triphera magna Nic.
 triphera saracenica Mes. troc. de diarrho-
 don, de absinthio, de rosis, unguentum cardu-
 meni Auic. secunda antid. zucharam ros.

De prognosticis doloris
 stomachi.

Auicē. 13. tra. 2. cap. 1, Et quandoque mo-
 ritur subito propter aduētum doloris ad cor.
 Secundo, et quandoque descendit dolor, et
 facit prouenire colicam. Tertiò portendit in
 pragnātibus præfocationem matricis. Quar-
 tò, timetur in illo in quo prolongatur dolor

stomachi, quod attrahat apostema stomachi.
 Quintò, Hippoc. in lib. mortis festinae, Quan-
 do apparet cum dolore stomachi super pe-
 dem dextrum quoddam simile uesticae, tunc pa-
 tiens moritur in uigesimumseptimum diem.
 Et si habet dolorem uentris, & apparet in
 supercilio eius uestigium & bothor, similis
 fabae, deinde fit ulcus, tunc ipse morietur, &
 huic accidit subet, &c.

Authores dissentientes circa
 dolores stomachi.

- 1 Adserere, succum absinthij magis con-
 ferre stomacho, quam ipsius herbam.
- 2 Adserere, in omnibus maximis doloribus
 sectionem uenae semper conuenire.

Ad primum, Auic. 13. tertij, Quoniam suc-
 cus eius est separatus à stypticitate retēta in
 herba, idcirco non ita conducit stomacho ut
 ipsa herba, quae ob partem terream in se ma-
 nentē sit magis styptica & cōfortatiua, &c.

Ad secundum, Auic. quarta primi, Tibi quo-
 que cauere debes à minutione in hora fortis
 doloris, item cauendū à phlebotomia in cor-

poribus habentibus subtilitatem nimiam oris stomachi, quoniam ex ea in syncopin cadunt. Præterea in frigido, crasso ac viscoso humore non competit, igitur non semper competit, sicuti etiam in dolore vires prosternente non competit, &c.

De imbecillitate hepatis.

Hepatis imbecillitas est alteratricis facultatis in proprijs actionib⁹ impotētia absque alicuius visceris malo manifesto, &c.

Loci consentientes de imbecillitate hepatis.

Gal. 8. de compos. med. per loc. cap. 6. ad finem, Imbecillitas hepatis est citra manifestum aliquod in viscere malum in proprijs actionibus impotentia alteratricis facultatis. B. Intelligendus est hic Gal. de alteratrice facultate, & si ad unguem eam non expresserit: nā huic attractoria & retētrix & expulſoria tanquam principaliori seruiunt.

Auic. 14. tra. 2. ca. 1, Hepaticus est ille cuius est debilitas absque re manifesta in ope-

rationibus hepatis, &c. Inuenio iuxta Gal. in lib. fin. med. iocinorosos appellari, quos iecoris dolor cum tumore & duritie & corporis colore malo comitatur, & his febris ardens superuenit, & lingua arefcit, quæ omnino euenire solêt, quum alteratrix facultas suo non probè fungitur officio: ad ipsam enim pertinet sanguinem generare, unde à Gal. 5. de loc. aff. cap. 7. sanguifica speciatim alteratrix dicitur, & ab Auicenn. digestiua. lege Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2.

De causis imbecillitatis hepatis.

Causæ primitiue sunt casus & percussio super hepate, & quaecunque à rebus non naturalibus prouenire possunt, malè dispositis. Causæ antecedentes sunt uel per se uel per consensum: per se fiunt uel à mala intemperie sine materia, uel ut placet Auic. cum materia abscessum, uel erysipelam, uel œdema generante: per consensum uerò, uel à toto, ut in febribus, uel ab aliqua parte quaecunque sit debilitante fieri solent. Causæ coniunctæ sunt uel ipsa intemperies, uel quid aliud facultatem alteratricem actu imbecillitans, &c.

Loci consentientes de causis
imbecillitatis hepatis.

(Auic. 14. tra. 2. cap. 1, Et id est aut propter malitiā cōplexionis singularis sine materia, aut cum materia, cuius principium est ab hepate, aut à membris alyis, sicut est fel quādo non trahit choleram, aut splen quādo non trahit melācholiā, aut renes, aut uestica, aut matrix propter uehementiam fluxus sanguinis, & propter uehementiam retentionis menstruorum, &c. Et quandoque non est propter malitiā cōplexionis solā, immò propter apostema sanguineū, erisypelam undimiam, aut propter ulcus, &c. B. Nota an hoc loco decipiatur Auic. Nam dictum est à Gal. nō solū in descriptione iam dicta, sed etiā 8. de compos. med. per loc. cap. 6. quòd hepatica peculiariter appellata citra tumorem præter naturam contingat, &c. Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2, Intemperies quæ alteratricis facultatis imbecillitatem parit, si calidior, quā oporteat, fuerit, interdū biliosum, interdum melancholicum excrementū efficit: si frigidior, pituitosum & aquosum excremen-

tū similiter parit. Lege in super Gal. 5. de loc. aff. cap. ult. ibi, Omnium facultatū essentia, &c. Itē 3. de sympt. cau. & Aet. ser. 10. ca. 1, Et Paul. lib. 3. ca. 46. & Arcul 9. almās, &c.

De indiciis imbecillita-
tis hepatis.

Indicia sumuntur à colore corporis, ab egestionē, à dolore leui, ab intēperie calida, frig. sic. & hum. à facultatibus ipsius hepatis. Si uerò per consensum morbus efficiatur, ex membri lesione, à quo fit consensus. A' colore cognoscitur, quia si à flaua siue pallida bile, aut à pituita fiat, tota cutis erit alba siue pallida, siue flaua: ab egestionē, quia quæ egeruntur, similia carnis loturæ apparent. A' dolore leui, quia sicut ex cibo uentriculus premitur, ita ex chylo iecur, unde dolor leuis accidit: à cōplexione cognoscitur ex eo, q̃ à suis cōtrarijs inuatur: à facultatibus hepatis, nā si ab alteratrice, sanguis diminutē erit cōcoctus, qualis est sanguis pituitosus, aut superflue erit concoctus, qualis est biliosus & adustus. Si ab attractoria facultate morb⁹ fieret, tūc uix prima cōcoctione celebrata, chy-

lus egreditur, quum ad iecur attrahi nō possit: si à retentoria, tunc id egreditur quale intrauit: si ab expuljoria, tunc id non expellitur quod est superfluum, sed admixtum sanguini cernitur: aut cognoscitur ex eo, quòd multæ ad uentriculum fluunt humiditates. Sunt & harum facultatum alia indicia: nam si sanguis corruptus sit, uel ad putredinem declinatus, uel colore uariis uel pituitosus, tunc alteratricem cognoscimus esse diminutam: si totius corporis adsit macies & imbecillitas, tunc attractoriam uim esse imbecillem coniectamur, & sic de reliquis. At si morbus per consensum fiat, cognoscitur ex alterius membri læsione: nam si per cōsensum fellis fieret, tunc ex colore icterico cognoscitur: si ex consensu stomachi, ex concoctionis malitia, & sic de reliquis, &c.

Loci consentientes de indiciis
imbecillitatis hepatis.

Auicē. 14. tra. 2. cap. 2, Color est ex rebus quæ significāt secundū plurimū dispositionem hepatis, &c. Et egestio & urina similes aquæ carnis significāt debilitatē hepatis in

generādo sanguinē, &c. Cōplexiones autē significātur ex radicibus prādictis, &c. Lege fusius hunc locū, & indicia à me dicta inuenies. Gal. 5. de loc. aff. cap. 7, Igitur alui quū sedimina aqua, in qua mactata caro abluta est, similia esse uideris, tunc efficacissimū esse affecti iecoris signū non dubites. Et paulō pōst facit mētionem de cōplexionū signis, ibi, Calida intēperies hepatis, &c. Habes tamē rem magis expeditā 8. de compos. med. per loc. cap. 6, ibi, Calida igitur intēperie circa hepar existēre, colliquationes sūt primū humorum, deinde carnis ipsius hepatis, &c. Similiter habes signa facultatum hepatis 5. de loc. aff. cap. 7, ibi, Si attractrix facultas afficitur, tunc cibus in uētriculo in saccū transmutatus relinquitur, &c. Vide 8. de cōpos. med. per loc. cap. 6. fusius de hac re. Item Paul. & Aet. & Arcul. &c.

De cura imbecillitatis hepatis.

Perficitur hac cura quatuor medijs. Primo, remouendo causam imbecillitatis. Secundo, roborādo hepar. Tertio, remouēdo si quae aduenerint symptomata. Quarto, regulando

agrum in sex rebus non naturalibus. Causa
 si fuerit primitiua, ut potus aque frigida,
 remoue eā cum calidis, ut puta cum potu uini,
 & abstineat se ab aqua, & sic de reliquis
 causis primitiuis. Si causa antecedens in he-
 pate fuerit intemperies calida, remoueat
 frigidis stypticis hepatis conducentibus, fri-
 gida calidis aromaticis aperientibus, humi-
 da siccis, &c. Si uerò fuerit apostema, ulcus,
 uel aliqua alia soluta cōtinuitas, curabis per
 ea quæ ad apostemata, ulcera, & solutā con-
 tinuitatē faciunt, ut aliās dictum est. Si cau-
 sa sit per consensum ab alio membro, tunc il-
 lius membri mala dispositio remouenda est
 cum euacuatione, reuulsione, ac membri ro-
 boratione, ne quid amplius ad hepar, trāsmi-
 tatur, demum hepatis nocumentum iam im-
 pressum remoueat, &c. 2. Robur hepatis fit
 decem medijs, ut ex Auic. & neotericis elici-
 tur 1. Cum leuiter calefacientibus, ut natu-
 ralis eius temperies seruetur, & hoc intelligi
 potest de his quæ ad penetrandum exhiben-
 tur 2. Cum leui apertione, quā semper de ob-
 structione hepatis timor sit, & tunc utimur

N. MEDIC.
IN CVR. MORB. LIB. III. 737

physticis & absinthio. 3. Cum maturatione
& lenificatione, quæ cum passulis & uino
granato conficitur. 4. Cum abstergentibus
quæ parantur cum aqua hordeacea & hy-
dromelle. 5. Cum incidentibus, ut cum uino
granatorum, quod ad acetū uergit. 6. Cum
his quæ moderatam in se stypticitatem ha-
bent, ut scenoantho, rosis, absinthio. 7. Cum
prohibētibus putredinem, ut cinnamomo, cas-
sia lignea. 8. Cum exiccantibus, ut cum spo-
dio. 9. Cum mundificantibus, ut cum melle
& uino subtili. 10. Cum his quæ à proprie-
tate ualent, ut spica, lupi hepar, limatijs
rheub. passulis. Verū in his memoriæ in-
terim mandandum, quanam facultas prin-
cipaliter laesa sit, ut eius robori magis inten-
das: nam attractoria uis calidis & siccis, sed
magis calidis: retētoria frigidis & siccis, sed
magis siccis roboratur: alteratrix calidis &
humidis, licet magis calidis: expultrix calidis
& humidis, licet magis gaudeat humidis,
&c. In causa igitur frigida cōueniūt absin-
thiū, rheubarbā, troc. de rheub. diacurcu-
ma, sy. de absinthio, de eupatorio. Itē electua

Aaa.i.

riū Gal. in tex. Auic. descriptū, ibi, R. ligni
aloes, rosarum, spicæ, nardi, cinnamomi an.
3. ij. ꝯc. In calida cōueniūt cichorium, aqua
limatiarū, diarrhodon Abbatis, triasandali.
T. de rosis, syr. de endiuia, de cichorea cum
rheub. 4. Cibaria nullam crassitiem, uel uisco
sitatē participant, carnes sint boni nutri
menti, unde conueniunt uitelli ouorum sorbi
lium cum cinnamomo ꝯ pipere aromati
zi. Item passulæ limatiæ, ꝯc. Potus sit aqua
bordeacea cum aliquantulo mellis, ꝯc.

Locī consentientes de cura
imbecillitatis hepatis.

Auic. 14. T. 2 cap. 3, Vt plurimū debilitas
hepatis est propter frigus aliquod aut humi
ditatē aut siccitatē aut propter materias ma
las retētas in ipso, ꝯ propter hoc plurimum
curæ eius est cū calefactione subtili, cū aper
tione ꝯ maturatione ꝯ lenificatione per
mixta cū stypticitate cōfortāte ꝯ prohibēte
putrefactionē, ꝯ sit cū medicinis aromati
cis, in quibus est apertio ꝯ maturatio, ut cro
cus. Et quandoque indigemus propter reten
tionē materiæ in ipso phlebotomia ꝯ solu

rione uentris, &c. Gal. 8. de compos. med. per
 loc. cap. 6, Scopus curationis in eiusmodi af-
 fectionibus sit communis quidem iuxta in-
 temperiei contrarietatem: peculiarem uerò
 per cuiusque contrarium. Verum in his siue
 exterius applicitis, siue intra adhibitis, sem-
 per aliquid ex adstringentibus miscere oportet
 ut iecoris robur seruetur, &c. Et 2. meth.
 cap. 16, Siquidem in uentriculo & iocinore
 robur resolui est perniciosissimum, &c. De
 cura facultatū hepatis laboratiū habes ple-
 nē iuxta Auic. loc. cit. ibi, si debilitas à dige-
 stina prouenit, cōforta cum stypticis aroma-
 ticis: si à retētiua, adde in confortatione de
 stypticitate & minus de calefactione, &c.
 Lege fusius, & inuenies cetera à me iā pridē
 exarata: lege etiā Arcul. in hoc, & Marcum
 Cat. De cibis lege etiā ibi Auic. Et cōuenien-
 tiores cibi sunt, in quib⁹ nō sunt crassitudo &
 viscositas, &c. lege eū fusius & Arcul. &c.

Observationes in curatione.

Auicē. Medicinæ hepaticæ sint apertiuæ
 cum leui caliditate, quarū uirtus sit lenitiua
 & abstersiua, nec stypticitate careant, quum

Aaa. ij.

hepar sit membrum laxum, &c.

Nocentia & conferentia im-
becillitati hepatis.

Nocēt hepati aloes, assa, colocynthis, dactyli, helleborus, euphorbiū, esula, ficus, lac, mezereon, oxymū, serpentaria, serapinū, scamoniū, scabra, triphera ferruginea Nic. Conferunt imbecillitati, & eam roborant absinthium, acorus, aloes boni, amygdala amara, ammoniū, asarum, berberis, calamus aromaticus, cinnamomum, cortex citri, costum, cuscute, crocus, cichoriū, endiuiā, eupatoriū, phytici, fumus terrae, granata acetosa, lactuca, laudanū, lignum aloes, liquiritia, hepar lupi, macis, mastix, myrobalani, cit. nux musc. origanū, passula, rheubarbarū, rosa, rosmarinus, rubea, spica, spinachia, scenoanthos, Composita sunt citonia condita, conditum de citro, de succo citoniorū, de muscho, diarrhodon, dialacca, diacurcuma, diarcos, letificans Mes. el. de myrcho Mes. de camphora Auic. empl. diaphinicon, diaspermator, gallia sebelien Mes. oleum masticinum, amygdalarum amararum, irinum, costinum, pilula ag-

gregatiua, de rheub. stomaticæ Auic. de agarico Serap. syr. de endiuia, de cichorea cum rheub. de acetositate, diarrhodō, de fumo terra, de absinthio, tro. de ligno aloes, de rosis, de aniso, de absinthio, de lacca Haly, de eupatorio, hiera Damasceni, tudiarū rosa. &c.

De prognosticis imbecillitatis hepatis.

Auic. 14. tract. 2. cap. 2, Et multoties perducit ad hydropem & colicam phlegmaticam, &c. Arcul. Debilitas hepatis notabilis quum inueterata fuerit, aut difficillimè, aut fere nunquam emendatur: lege etiam Gal. 8. de compos. med. per loc. &c.

De inflammatione iocinoris.

Inflammatiō est calidi sanguinis influxus quæ in hepatis substantia, uel in eius gibbosa uel concaua parte, aut in musculus uel tunicis colligentibus, uel in uenis eius accidere solet: nec inquirendum utrum in uenis mesenterij hoc accadat, quoniam si in concaua iecoris parte fuerit inflammatiō, etiam in uenis mesenterij necessariò erit.

Aaa. iij.

Loci consentientes de inflammatione hepatis.

Auic. 14. T. 3. cap. 1, Apostematū in partibus hepatis accidentium quædam fiunt in ipso hepate, quædam in lacertis positæ super ipsum, & alia sunt quæ accidunt in meseraicis: & eorum quæ fiunt in ipso, quædam accidunt in partibus eius superioribus & ad latus gibbosum, & alia in partibus inferioribus, & ad latus concavum, & alia in uelaminib⁹ & pāniculo & in uenis ipsius, &c. Lege Gal. 5. de loc. aff. cap. 7. & 13. meth. cap. 14. ubi etiam inquit, Quòd cauo iocinoris phlegmone obseſſo, protinus etiam uenas quæ in mesenterio sunt, una phlegmone laborare necesse sit. Vide etiam Gal. in lib. de tum. præter naturam cap. 2. ibi, Inflammatio est calidi, &c.

De causis inflammationis hepatis.

Causa primitiua est nimius calor ex immodico motu, aut ex sole igneque acquisitus, aut acre medicamentum, aut nimius potus, uel cibus calefaciēs, percussio aut torsio, &c.

Causæ antecedentes uel per se sunt in hepate,
uel per cōsensum sūnt. Per se sunt intēperies
calida, malos humores attrahēs, aut intēpe-
ries frigida quæ alteratricē & expultricem
debilitat, unde tumores fieri possunt: similiter
obstructio ex qua humores retinētur, aut do-
lor materiam ad iecur attrahens, aut iecoris
imbecillitas. Causæ coniunctæ phlegmonis est
sanguis copiosior, quàm pars postulet, in ipso
hepate contentus, &c.

Loci consentientes de causis in-
flammationis hepatis.

Galen. 13. meth. cap. 6, Istius caloris causa
aut est immodicus motus, aut ex sole & igni
tepor, aut acre medicamentum, &c. Auic.
14. tra. 3 cap. 1. etiā de alyis primitiuis cau-
sis loquitur, ibi, Et cibi quidem calefacientes
& crassi, & qui non digerūtur ualde adiu-
uant ad faciēdum apostemata in hepate, &
quandoque accidit propter percussione[m] &
torsione[m], &c. De causis etiam antecedētib[us]
hic uerba facit ibi, Causæ illius sunt cōplexio
frigida prohibēs digestionem & expulsionē,
aut debilitas stomachi, aut oppilatio cōgregās
Aaa.iiij.

humores, &c. lege eum fusius. Gal. 13. meth. cap. 3, Communis omnium phlegmonum generatio ex sanguinis influxu est copiosioris, quam pars postulet. Causa uero quur influit sanguis, tum à partibus mittentibus, tum ab his quæ ad se attrahunt, peruenire potest: mittunt enim partes, quum nimium copia superuacua est, aut quum à sua qualitate molestantur: quæ uero attrahunt, ea ob morbosum calorem attrahunt, uel ob sui, uel uicinæ partis dolorem, aut ob partis recipientis imbecillitatem, ut restatur Gal. 23. meth. cap. 5. Lege etiam de his Gal. 13. meth. cap. 6. ibi, Dolor prouenit, uel ob intemperiem & uultus confusionem, & distorsionem & tensionem, uel obstructionem quãdam, &c. Lege etiam 14. meth. cap. 1. ibi, Inflammatio fieri solet, quum sanguis copiosus in aliquam particulam procubuit, &c. Lege de his uberius Arcul. 9. almans. &c.

De indiciis inflammationis hepatis.

Indicia hepatis inflammati sunt dolor inseparabilis in dextro hypochondrio, grauitas

in eo maior quàm in oppilatione, forma corporis mutatur: apparet enim in facie & in alijs membris tumor siue inflatio: color tendit ad citrinum uel pallidum, nulla adest pulsatio, ut in ceteris inflammationibus, costæ nothæ ut plurimum dolent, exigua & sicca tussicula adest, singultus quoque sequuntur, dormire non ualent super latus dextrum, & super sinistrum dormire graue est, febris adest acuta. Signa quando adest in gibba parte sunt grauitas maior, quàm in concaua, singultus minor, tensio apud suspensoria manifestior fit tactui, præcipuè in debili, tussis sicca, difficultas anhelitus maior, ob consensum diaphragmatis, urina pauca cum mordicatione, lingua est citrina, ad nigredinem decliuis. Signa quando fuerit in concaua, singultus maior, grauitas minor, eò quòd à stomacho sustentatur, tussis parua, & anhelitus paruus, dolor uehementior, nausea, appetitus destructio, sitis uehemens, uomitus biliosus, frigus extremitatum, & nigredo linguae & syncopis, &c.

Loci consentientes de signis
inflammationis hepatis.

Gal. 5. de loc. aff. cap. 7, Iecur affici de-
clarant in dextra præcordiorum parte gra-
uitas, dolor tota præcordia contrahens, &
ipsius usque ad iugulū extēsiō, exigua tussis,
linguæ color in primis ruber, deinde niger,
ingēs ciborū fastidiū, sitis inexhausta, uomi-
tus tū sincera bilis, tū quæ ouorū vitellis si-
milatur, quæ postea æruginis colorem refert,
aluus adstringitur, si inflammatio cū eius vi-
sceris imbecillitate excitetur, spiritus adest
difficultas, febris acuta, &c. Et paulò post,
Inflāmationes in simis iecoris partibus fasti-
diū, nausæ, uomitū biliosum, sitim ingētem,
tussim atque dolorē usq; ad dextræ partis iu-
gulū excitant, nōnunquā utrique parti dolor
adest, nothæ costæ cōsentiunt. In gibba uerò
parte inflāmatione existēte, præter dicta, tu-
moris cumulus cōprehensim conspicuus in su-
perficie tactui, maximè si abdomen gracile-
scat, cōprehenditur, dolores circa respiratio-
nem, & tussiculæ magis intēdūtur cum dolo-
re ad iugulū extēso, ut detrahi uideatur ma-

gis quàm intima parte. Si uerò in rectis muscu-
lis inflāmatio accidat, tumor erit præter na-
turā oblongus, atque per totū uētre[m] extēsus,
umbilicū cōprehendēs, &c. Lege de his Auic.
14. tract. 3. cap. 2. ibi, Signa communia sunt,
quòd inuenit æger grauitatem sub hypochon-
drijs inseparabilem, & inuenit illic dolorem
uehementem, &c. Lege similiter Arcul. 9. al-
mans. Item Gal. 2. de loc. aff. cap. 9, ibi, Si
incognita nobis fuerit inflāmatio, iubendum
est ægro, ut magnā edat respirationem, &c.
Vide etiam de hac re Paul. lib. 3. cap. 46. &
Aet. ser. 10. ca. 3. & Gal. 2. de loc. aff. ca. 8.

De cura inflammatio-
nis hepatis.

In curatione hac tota adhibenda est dili-
gentia, ne hepatis læsio per totum corpus di-
spargatur. Erunt igitur intentiones curationis
sex, prima erit reuulsio. 2. repercussio. 3. hu-
moris preparatio. 4. euacuatio. 5. resolutio.
6. malæ cōplexionis derelictæ remotio, cū re-
gimine sex rerū non naturalium. Reuulsio fiet
cū sectione uenæ basilicæ, aut cephalicæ, quæ
fienda sit ex opposito, an ex eodem late-

re, dubitat Conciliator differentia 198. quæ
 fusius uidebis. Diuertimus etiam cum frictio-
 nibus, ligaturis, cucurbitulis circa partes ex-
 tremas positis, & similibus. Repercussio fiet
 tum per exteriora, tum per interiora. Conue-
 niunt extrinsecus epithemata & inunctiones
 ex oleo ros. de citonijs, uel ex aquis rosarum,
 solatri cum syndone madefacta & hepatis
 applicita, quibus addi possunt pulueres
 ex sandalis rub. & al. & cit. ex rosis, cor-
 ticibus & floribus granatorum, & aliquid
 camphoræ: sed in materia frigida accipimus
 aliquid absinthij mastice cum oleo ros. ma-
 sticino, &c. Intrinsecus ualent syr. ros. de
 succo acetosæ, plantaginis, cichorij, cap. si-
 ne aquis, in causa frigida: rhodomel, syr.
 de duabus rad. oxymel cum syr. ros. Et hæc
 faciunt etiam pro tertia intentione, uno ta-
 men animaduerso, quod styptica tantum
 in principio, sed cum materia iam fluxa est,
 alijs non stypticis uti possumus, ut syr. ace-
 ros. simp. uiol. de endiuia, de fumo terræ,
 &c. Euacuatio fiat rursus peccante sangui-
 ne, cum sectione uenæ hepaticæ, aut pec-

IN CVR. MORB. LIB. III. 749

cante cholera cum rheubarbari infusione,
aut cū alijs pharmacis, prout millies dictum
est. Resolutio fit cum his quæ resoluunt, ad-
dendo aliquid quod nonnihil stypticitatis
secum afferat: & huc spectant inunctiones,
cataplasmata, & epithemata cum anetho,
mellislotto, althæa, camomilla, rosis, ab-
sinthio: similiter cum oleo anethino, camo-
millino, ros. &c. Si uerò ad suppurationem
uerteretur, tunc suppurantibus utendum,
qualis est decoctio passullarum, caricarum,
althæe, maluarum, semen lini, fœnugræci,
cum oleo amygdalarum dul. cum pinguedi-
ne gallinæ, anatis, butyro, ex quibus pa-
ramus cataplasmata, &c. Maturata in-
flammatione tunc uomica, uomitu, tussi &
sternutamentis, & similibus prouocanda
est: deinde abstergenda, si in gibba fuerit
parte, cum urinam prouocantibus & ab-
stergentibus, qualis est aqua hordei, cice-
rum rub. hydromel, hydrosaccharum, &c.
Si in concava, cum his quæ per secessum edu-
cunt, qualis est cassia, serum caprinum, ta-
marindi, &c. deinde consolidandum erit, si-

ue conglutinādum cum bolo armenio & terra sigillata, &c. Quòd si abscessus ad duritiē permutetur, quanuis rarò curationem admittat, nihilominus cum emollientibus procedemus, sicuti cum althea, maluis, &c.

Loci consentientes de cura inflammationis hepatis.

Gal. 13. meth. cap. 6, Communis omnium phlegmonum curationis indicatio est euacuatio: quæ uerò adhuc in generatione sunt, in ijs prior euacuatione est influentis in affectū locum sanguinis inhibitiō, &c. Et cap. 11. eiusdem lib. Quum iecur inflammationem patitur, tum reuellendus, tum educendus, qui ad iecur fluit, sanguis est, interna in dextro cubito infecta uena, propterea quòd è directo & ampla uia cū uena, quæ caua dicitur, societatem habet, qua non apparente media secanda est: quòd si ea nec se ostenderit, reliqua ac tertia incidenda est, &c. Ex quibus notare debes, quòd stante uirtutis robore modo κατ' ὄν, id est, è directo extrahatur

MEDIC.
IN CVR. MORB. LIB. III. 751

sanguis : & si alia atque alia uena secetur,
non multum referre, quum singula uena sibi
in euacuatione respondeant. Auic. 14. tra.
3. cap. 12, Phlebotoma igitur in primis, & nō
hesites in hoc, quum non est prohibitio for-
tis, & extrahe sanguinem abundantem. Et
scias quod indiges in initio eius eo quod est
simile in casu de percussione & in frigidita-
tione, &c. Gal. 13. meth. cap. 16, In iecinoris
phlegmone, etiam si nihil affluat, reprimen-
tibus utendum : & reddit binam rationem :
primò quia in principio parum est quod af-
fluit, tum magna ex parte non crassum, tum
recipientis partis uirtus ualentior : secundò,
quia nondum in afflicta parte uiolenter im-
pactum est. Quum uerò phlegmone in suo ui-
gore consistit, contrario modo omnia se ha-
bent, adest enim multitudo sanguinis crassi
ac impacti, tum uirtus partis debilior, ut à se
superuacuo emolliri nō possit. De digestionem
lege Auic. ibi, Medicinæ conuenientes aposte-
matibus hepatis in initio rei, quū illic est ca-
lidas superflua, sunt, aqua endiuie & aqua
solatri cum syr. acetoso, zucharino, & aqua

hordei, arnoglossæ, cuscute, cucumeris, cucurbitæ, &c. De euacuatione loquitur Gal. 13. meth. cap. 15. ibi, Considerandum an in gibba uel in caua parte fiat inflammatio: si caua parte, purgare per aluum conuenit: si in gibba, per urinas. Lege etiam 14. caput huius, ibi, Expelli iecinore oportet, quicquid in totum atræ bilis, tum saniei ex phlegmone prouenientis iam collectum est, &c. De regimine resolutionis loquitur etiam Auicē. ibi, Quapropter indiges ut incipias à regimine resolutionis materiei in hac ægritudine: plusquā sit tua inceptio in reliquis apostematibus, timeto lapideitatem & duritiem, &c. De cibo & potu habes plura ex Gal. 13. meth. ca. 14. ibi, Poscit ergo tum iecur ipsum, tum os meatus, qui bilem transmittit, cibos & pharmaca quæ obstructa recludant, qualia sunt nō lenta, sed quæ tenui consistētia sine qualitate mordente (nam à mordentibus phlegmones irritantur) non dulcia, quia à dulcibus tum iecur tum lien intumescunt. Talia igitur erunt, ut in cibis ptisana, & in pharmacis oxymel cum aqua mixtum, puni-

ca mala, & quaecunque adstringunt, interduntur, quum bilis meatus os arctet, & bilem ipsam excerni prohibeant, & phlegmonas ipsas quæ in cavo sunt uisceris irritent, magis quàm in gibbo: nam quum ad gibbum perueniunt, iam quæ assumuntur, mutata sunt, ut sic nec adstringat uel mordeat, &c. Auic. in fine ca. Cibus autem melior est chisch hordei, in frigidat enim & abstergit, & non facit acquirere oppilationes, & festinat eius penetratio: panis non ex frumento, sed ex simila, & ex oleribus, lactuca & attriplices, ex fructibus granata dulcia, &c.

Obiectio.

Miror mirum in modum, mala punica, dulcia hinc ab Auic. concedi, tum quia adstringunt, tum quia ex dulcibus hepar intumescit, & aquam hordeaceam hic concedi, & in altero sequenti textu renui, ibi, Et aqua hordei quanuis abstergat sine mordicatione, tamen est dulcis, & dulce facit incurrere oppilationes, &c. tamem à Raze, Serapione & Haliabate commendatur, &c.

Bbb.i.

Responsio.

Gentilis putat Auic. tex. corruptum, & loco aqua hordei, legi debere aqua mellis. Vide tu commentatores Auic. & intelliges causam alterius obiectionis.

Observationes in cura inflammationis hepatis.

Marcus Cat. de mēte Auic. Statim, inquit, succurrendum est huic aegritudini, non tantū in iecore, sed in quocunque membro principali, alioqui cura esset uana, &c. Galen. 13. meth. cap. 8, Prohibendum ne tumor augeatur, nec suppuretur, cauendo etiā ne ad scirrhū conuertatur: nam facile tumor in duritiē euadit, &c. Auic. 14. tra. 3. cap. 12, Nullis remedijs succurrendum, ni prius facta sit sectio uenae, aut antequam pharmacum non conueniente sectione sit exhibitum. Nam, inquit, si phlebotomas, & dimittis materiam in hepate, & administras styptica & apocrustica, procul dubio induratur apostema. Caue tamen in exhibendo pharmaco, ne nimium soluentibus utaris, nam hepar ultra quod imbecille reddunt humores, etiam commouent, ut

N. MEDIC.
O.
interdum maiori copia ad locum laesum re-
fluant, &c. Vitandum insuper ne urinā pro-
uoces morbo in concaua parte existente, aut
soluas uērem, si in gibba parte tumor fuerit,
&c. Gal. 13. meth. cap. 12, Quaecunque ieci-
nori intrinsecus uel extrinsecus applicantur,
non sint actu frigida: nam ultra quòd ad lo-
cum difficulter penetrarent, meatus etiā cutis
occluderent, &c.

Observationes de repellentibus
& resoluentibus.

Auic. loc. cit. Repellentia sint in styptici-
tate remissa, & nisi tumoris augeatur cali-
ditas, cum aperiētibus & incidētibus misceā-
tur: resoluentia citius in iecoris inflammatio-
nibus sunt applicanda, quàm in cæterorum
membrorum tumoribus, &c.

Conferētia inflammationi hepatis.

Conferunt inflammationi hepatis agresta,
attriplex, berberis, camphora, capillus Ven.
acetositas citri, cucurbita, endiuia, cichoreū,
hepatica, lupuli, mercurialis, nymphaea, por-
tulaca, rheubarbarū, rosa, sandali, semperui-
ua, solatrum, spodium, sumach, tamarindi,

Bbb. ij.

uiolæ. Composita sunt, confectio de acetosis
 Mes. electuarium de psyllo Mes. ceratum de
 sandalis, emplastrum de frumento Mes. de
 semperuiua Haly, oleum irinum rosaceum,
 syr. acetosus de pomis, de portulaca, triasandali
 Nic triphora persica, troc. de sandalis
 Mes. de spodio, de camphora, unguen. ros.
 uiol. hiera, siracost. Mes. papauer cum oleo
 rosaceo, &c.

De prognosticis inflammationis hepatis.

Auic. 14. tra. 3. cap. 1, Et apostema quod
 est in gibbositate est deterius eo quod est in
 concanitate. Et apostema hepatis siue calidū
 siue frigidum oppilationem facit, & non re-
 linquit corpori nisi sanguinem aquosum, &
 cum hoc debilitat hepar in separando aquo-
 sitatem, quæ si in meseraicis continetur, est
 causa hydropisis carnosæ & asclitis. Item
 quando permutatur calidum ex hepate ad
 splenē, est bonum: si uerò ex splene ad hepar,
 malum. Et cap. 2, Interdū omnis species apo-
 stematum hepatis perducit ad hydropem: &
 scias quòd quū apostemati hepatis associa-

tur uentris solutio, est mortale. Et cap. 16,
Non euadit aliquis ex apostemate duro qui-
escente & confirmato. Hippoc. aph. 7. aph.
46, Quorum hepar suppuratur, aduritur, si
pus purum & album fluxerit, euadunt: nam
in tunica his pus continetur: si uerò qualis
amurca fluat, pereunt. B. Quia si pus album
& purum fluat, signum est, quòd ad carnem
hepatis usque corruptio non pertingit, sed
tātū in eius tunica fuisse: si uerò ut fæx olei
fluat, tunc declarat substantiam hepatis esse
corruptam, idcirco non ab re moriuntur, &c.
Hippoc. aphor. 7. aphor. 17, In hepatis in-
flammationibus singultus malum. B. Quia ex
magnitudine inflammationis stomachus cō-
patitur, unde fit singultus. Hippoc. aphor. 6.
aphor. 18, Vesica discissa aut cerebro aut
corde aut septo transuerso, aut aliquo ex
tenuioribus intestinis, aut iecinore, lethale
est, &c.

Authores dissentientes cir-
ca morbos hepatis.

¶ Adserere, aquam hordeaceam nō conue-
nire in inflammationibus hepatis.

Bbb. 14.

2 Adserere, profluuium uētris in apostemate hepatis ex abundanti materia non esse mortale.

3 Adserere, nutrimentum uiscosum non nocere hepati.

4 Adserere, hepati supercalesaeto cerusam tanquam frigidam esse applicandam.

5 Adserere, stypticiora magis conuenire in hepatis apostematibus quàm stomachi.

6 Adserere, in apostemate hepatis phleboto-
miā potius in pede, quàm in brachio fiendā.

Confutatio dissentientium cir-
ca morbos hepatis.

Ad primum, aqua hordei nō solūm ab A-
uicē. sed à Serapio 4. tra. ca. 2. & à Rhaze
in lib. diuis. & à Gal. 13. meth. ut suprà. Ma-
ximè igitur dum commendatur conuenit.

Ad secundum, Auic. Quum hepatis aposte-
mati sociatur fluxus uentris, est mortale: &
intellexit propter materiæ exuberationem.
Similiter factus ab imbecillitate hepatis est
mortalis, ut uolunt Auic. commentatores.

Ad tertiū, Serapio, Indiget hepar cibis &
potibus, & medicinis apertius, non uiscosis,

sed subtilibus, non mordicatis neque dulci-
bus, neque stypticis & ponticis, eò quòd oppi-
lant, &c. igitur, &c.

Ad quartum respondet Conciliator diffe-
rentia 197, quòd per se cerusa nocet hepato,
quanuis cum alijs quæ suam uirtutem introse-
rant, possit interdù iuuare, sed melius esse cum
alijs aromaticis operari, &c.

Ad quintum respondetur per ea quæ dicta
sunt in cura. Nam Auic. 13. tra. 4. ca. 1, Quo-
niã ex magis stypticis grande nocumētum re-
sultat, eò quòd hepar uelocius quàm stoma-
chus correspondet duritie, quam inducunt
styptica, &c. & sic non conferunt magis he-
pati quàm stomacho, &c.

Ad sextum, Auic. allega. cap. inquit, Phle-
botoma, si tibi possibile est, ex basilica: & si
nō, ex nigra: & si non, ex cephalica: eò quòd
directius hepar respiciunt. Et hoc etiam ha-
bes ex Galeno in cura: igitur magis in bra-
chio, quàm in pede.

De morbo regio.

Icteria dicta est ab ictero aue, quã nos gal-
bulam siue ficedulã dicimus, de qua facit men-

Bbb. iij.

tionem Martialis, dicens:

*Galbula decipitur calamis, & retibus ales
Turget adhuc uiridi cum rudis uua mero.*

Dicta est etiam Aurigo à colore auri, uel arcuatus morbus, à cælestis arcus colore, aut morbus regius, eò quòd morbo affectos apparatu regio & ludis lasciuus uti perutile est. Horatius,

*Aut mala quæ scabies aut morb⁹ regius urget.
Est autem morbus regius per totum corpus bilis suffusio, quæ interdum nigra, interdum flaua est, ex qua color citrinus uel niger apparet, &c.*

Loci consentientes de morbo regio.

Plin. Ictericis auis à colore uocatur, quæ si spectetur ab icterico, sanari id malum tradunt, & auem mori. De deductione horum nominum lege fusius Cornel. Cel. & Act. ser. 10. ca. 17. & neotericos omnes. Galen. lib. finit. med. Aurigo seu morbus regius arcuatusue est bilis refusio in cutem, quo fit ut superficies tingatur, luteaque fiat, & uitiatur cutis, &c. Auicenn. decimaquinta tertij, cap. 3, Icteritis

est coloris corporis fæda alteratio ad citri-
nitatem uel nigredinem tendens, ob cursum
humoris citrini & nigri ad cutē sine putre-
factione, &c. B. Similis definitio legitur etiam
penes Concil. diff. 78. adiungit tamen Auic.
sine putrefactione: quia re uera dum bilis pu-
tresceret, non icteritiam tantum, sed febrem
tertianam produceret. Vide Aet. ser. 10. cap.
17. & Paul. lib. 3. cap. 50.

De causis morbi regii.

Causæ si extrinsecæ fuerint, tres erunt: scili-
cet, uirus alicuius animalis, assumptio ciborū
icteritiam efficientium, uel bilem generantium
& obstruentium, & nimius labor in sole ca-
lido. Intrinsecæ uel fiunt ab hepate uel ab a-
lijs membris. Si ab hepate, uel erit mala in-
temperies calida uel frigida cum abscessu uel
sine abscessu, aut obstructio, aut facultatis
attractoræ uel secernentis imbecillitas. Si à
splene, tunc in causa est apostema, uel obstru-
ctio, uel mala complexio, uel eius facultatis
imbecillitas, & sic de alijs membris intelli-
gi. Interdū fit per morborū indicationes, &c.

Loci consentientes de cau-
sis morbi regii.

Galen. 5. de loc. affec. cap. ult. Morbus re-
gius nonnunquam fieri solet iecinore nequa-
quam affecto per morbi iudicationem. In-
terdum citra morbi iudicationem, dum san-
guis extranea quadam corruptione in bilem
uertitur, qualis ferarum morsu fieri solet, aut
assumpto ueneno. Interdum fit ab obstru-
ctione, aut ab inflammatione, aut à scirrho
iecinoris, aut citra hæc ab ipsa tantum ieci-
noris intemperie præter naturam mutata,
aut à iecinore suo munere non fungente, aut
ob splenis uitia. Interdum ab attractricis fol-
liculi fel continentis imbecillitate, aut quia
folliculus est obstructus, aut quia eius facul-
tas secretoria est imbecillior. Interdum fit
etiam ob obstructis aut infirmis uasis, quæ ab
ipso exorta ora sua in hepar extendunt, &c.
Auicenn. 15. cap. 3. ibi, Ictericia citrina aut
fit multitudine generationis cholerae citrinae,
aut propter euacuationis eius prohibitionem,
& multitudo eius generatur ab hepate pro-
pter causas calefacientes, aut propter apo-

stemata in hepate, & in meatu cholerae, aut propter oppilationem retinentem choleram in felle, aut propter caliditatem complexionis cholerae, &c. Lege fusius, & tam intrinsecas, quam extrinsecas causas ictericæ intelliges. Vide & Gordonium & Arcul. in proprio cap. Gal. 4. apho. com. 62, Tres sunt affectus, quibus morbus regius solet aduenire, tumor durus, inflammatio & obstructio. B. Nam dum sanguis expurgatur, & bilis à uenis ad meatus bilem recipientes transfertur, si trium alterum adfuerit, necesse est sanguinem non expurgari, sed unà cum ipso bilem per totum corpus differri, unde morbus regius oritur. Vide Paul. lib. 3. cap. 50, & Auicem. de oppilationibus hepatis, ibi, Materia quæ generat oppilationem aut est humor oppilans propter suam crassitiem, &c. lege eum fusius, &c.

De signis morbi regii.

Signa communia sunt, pigrities & tumor ad motum grauius, dulcibus cibis auersantur, uariis imaginibus uexantur, pruritus totius corporis adest, difficulter exudat, alba oculo

rum, & faciei tempora, & mala pallorem
demonstrant, &c. Signa mala hepatis tem-
peraturæ per ea quæ de imbecillitate hepa-
tis diximus satis nota erunt. similiter & abs-
cessus signa per ea quæ retulimus de inflam-
matione hepatis, &c. Signa oppilationis
sunt grauitas, dolorque sub dextra parte, nul-
lo tumore uel urgente febre percepta: item si
egestio flaua non egrediatur, sed alba. Signa
imbecillitatis expulsiuæ facultatis sunt, si u-
rina nullo colore infecta excernatur, etiam si
nulla grauitas percipiatur. Cognoscitur etiã
ex attractoria facultate fieri, si nausea, uo-
mitus, amaritudo oris, nullo apparente in ie-
core grauitatis sensu adfuerit, & flauus co-
lor paulatim & non subitus fiat. Signa ue-
neni erunt, si nulla prius existente humo-
rum malitia, sed ex homine sano statim icte-
rus euadat: nam absque mora uirum per to-
tum corpus diffunditur. Signa sumpta à crisi
sunt, si febres præcesserunt acutæ, & alia quæ
crisim indicare solent. Signa quæd per con-
sensum totius corporis fiat erunt ex febribus,
quæ tenues sanguinis partes in bilem commu-

tant. Signa quòd fiat à cisti fellis sunt quòd accidit subito, & egestio est alba, adest amaritudo oris & sitis, & si porus, qui uadit ad stomachum, est oppilatus, tunc urina est colorata, spissa, crocea, egestio tincta crocea, &c.

Signa quòd ex splene fiat, sunt durities splenis, grauitas, & icteritia potius nigra quàm flaua, &c.

Loci consentientes de signis morbi regii.

Aet. ser. 10. ca. 17, Còmuniter omnibus ictericis adest pigrities & tumor ad motum grauians, &c. Gal. 5. de loc. affect. cap. ult. Si per morbi indicatiù icterus fiat, indicatiù erit, quòd excrementa & urinae secundù naturam se habebunt. Si sanguis externa corruptione in bilem uertatur, indicatiù erit totius corporis praesinus siue porraceus color. Si ab obstructione folliculi fellis fiat, signum erit quòd citra febre morbus regius accidit, urgetque in dextra praecordiorum parte grauitatis quidam sensus. Si uerò ab inflammatione uel alio abscessu, tunc febris aderit cum biliosis deiectionibus, & in dextra praecordiorum parte dolor.

Si ab intemperie hepatis humorum corruptio contingat, tunc totum corpus herbis candenti pallore infectis assimilatur, interdum plumbeum aut magis fuscum colorem refert. Si ob splenis vitium, tunc colores veniunt multò nigriores quàm ab hepate, &c. Lege de his 9. de compos. med. per loc. cap. 1. B. Nota tamen quòd uelle ex colore tantum affectum sedem diuinare, est malum, ut Galen. refert 5. de loc. affect. cap. cit. de Stesiano exemplum asserens, &c. Lege etiam Auicem. 15. tra. 1. cap. de signis icteritiae citrina, Natura omnia illa nuper à me recitata habet, quae tu latius uidere poteris: si enim omnia in unum congererem, longè à negotio res librum excederet. Vide de his Arcul. & Gord. Paul. & ceteros practiçantes. Similiter de icteritia nigra lege Gal. 6. de loc. affect. cap. de affect. lienis, & Aet. serm. 10. cap. 17. Vide etiam Auicem. de signis oppilationis hepatis, ibi, Signa oppilationis sunt, &c.

De cura morbi regii.

Morbus regius indicatoriè ex febris per

fectè solutis eueniens, uisibilis ad cutem trās-
lata, si multum crassa, balneis uel rebus dis-
cussorijs facilè curabitur, quale est balneū ex
aqua dulci, uel ablutio oculorū & totius cor-
poris cum aceto albo calido, & succo citri,
in quo bullierint flores camomille, &c. Ve-
rū si crassa fuerit, in primis extenuantibus
uti oportet, deinde discussorijs. Si à causis
primitiuis fiat aurigo, tunc singula remo-
ueantur, ut si morsus uiperarum sit in cau-
sa, curetur ad externas partes uirus dedu-
cendo, & membra principalia tuendo. Si cau-
sa sint per cōsensum à toto, ut in febris, re-
moueatur febris cum euacuatione, sectione uo-
næ & soluentibus. pharmacis, deinde infrigi-
dantibus, ne sua caliditate sanguis in bilem
conuertatur. Si uerò fuerit caliditas hepa-
tis uel alterius membri, remoue per infrigi-
dantia, cauendo obstructionem, & membra
demum roborando.

Cura Arcuari ex multitudine bilis qua-
tuor habet intentiones: Prima est euacuatio,
ne dum superfluit bilis, ipsa suæ multiplica-
tionis sit causa, quæ fieri interdum debet

cum sectione uenæ, interdum cum pharmaco, ut cassia, manna, rheubarbaro, electuario, de suc. ros. ros. Mes. diaprunis sal. &c. Secunda est humoris præparatio, & fit cum aceto simp. syr. de endiuia, uiol. de cichorea, de suc. acetosa, de agresta, de limonibus, de acetos. citri cū aquis & decoctis similibus. Tertia intentio est discrasie mēbri derelictæ remotio: unde in causa calida conuenit tale epithema: R̄. aquæ endiuie lib. i. ros. un. ij. sandalorum spodyana. drac. i. aceti un. i. spicæ scrup. i. Misce, & cum syndone applicetur hepati, uel fiat ceratum sandalinum. Electuaria sunt tria sandali, diarrhodon, troc. de camphora. Quarta intentio erit sex rerum non naturalium ad frigidum & humidum declinantium, de quibus satis aliàs diximus, &c. Cura icteritiæ ex obstructione quatuor etiā intentiones requirit, prima humoris obstruentis incisio, extenuatio atque reseratio, & fit cum syrupo bisantino, cum aceto de duabus rad. rhodomelle, oxymelle, syrupo de eupatorio, de cichorea, &c. cum aquis fœniculi, apij, cuscute, & eupatory. Consulerem tamen in hoc,

ut prius stomachus cum cassia uel pilulis aleophanginis purgaretur, antequam ista exhibeantur. Secunda erit euacuatio, quæ perficitur cum ijs quæ bilem crassam & pituitæ admixtam purgant, ut puta cum rheubarbaro, agarico, diaphinicone, diaturbir, & ænemate acri, quod ad intestina superiora pertingeret. Tertia intentio est palliditatis uel fædi coloris ablatio, & oclusarum uiarum aperitio, & fit cum rebus aperientibus & urinam prolicientibus, ut cum decocto apij, fœniculi, asparagi, brusci, petroselini, aqua raphani, uel decocto marrhubij, prasii, cicerum, rub absinthij, centaurij minoris, cuscute, uel cum infusione cartami in lacte in ore Aui-cen. uel cum dialacca, diacurcuma, diacalamento, troc. de rheubarbaro, de eupatorio, &c. Quarta intentio sit circa regimen, quod calidum & aperiens & extenuans instituat. Curatur Aurigo, si à facultatum siue iecoris, siue folliculi fel continentis imbecillitate fiat, prout de hepatis imbecillitate iam dictum est, &c.

Ccc i.

Loci consentientes de cura
morbi regii.

Gal. 9. de compos. med. per loc. ca. 1, Ictericus qui ratione indicationis februm sunt, curantur balneis aquarum potabilium, & olei discussorij affricu, omniumque rarefacientium cutem, quale anethinum oleum & camomillum. Qui uero regium morbum ex obturatione incurrunt, per omnia quaecunque strenue extergent, etiam si medicamentariam substantiam habeant, & calidae sint facultatis, curantur. Conueniunt ictericis ex inflammatione hepatis quaecunque inflammationes sanant. Si uero inflammatio & obturatio simul coincident, laxantibus, simulque extergentibus opus erit: fugienda tamen quaecunque medicamentaria substantia & calidae facultatis existunt, etc. Auic. 15. tra. 1. ca. 6, Scias quod in tertio in curatione ictericitiae ad duas res redit, quarum una est, ut remoueatur ictericitia cum eo quod resoluit ipsam a cute & ab oculo cum medicinis lauatiuis & solutiuis educentibus materiam facientem ictericitiam. Secunda uertitur ad causam & abscindit eam, & est aut

rectificatio complexionis, aut confortatio uirtutis, aut regimen apostematis, aut apertio apostematis, aut apertio oppilationis, aut euacuatio per phlebotomiam basilicæ, &c. Aet. serm. 10. cap. 18, Secatur uena quibus copia sanguinis unâ cum bile in toto corpore abundat, aut quibus dolor uel distensio circa præcordia fuerit. Et de purgatione loquens dixit, Quare in principio purgare non oportet, priusquâ per deoppilatiâ bilis attenuetur. Nanque mali causam purgationes in principio datæ præbuerunt, &c. Galen. 5. de loc. affect. cap. ult. Quibus morbus regius citra febrem accidit, urgente in dextra præcordiorum parte grauitatis cuiusdam sensu, ijs omnibus obstructions aperiens & cibis & potibus & medicamentis extenuantibus, deinde medicamentum quod bilem ducere possit exhibens, eorum plurimos una die sanitati restituimus, &c. Lege de his omnibus intentionibus Arcul. Gordonium, Marcum Catin. & ceteros practicaues. De cibo & potu & de alijs sex rebus non naturalibus lege Auicen. 15. cap. 6. ibi: Et cibus qui-

Ccc. ij.

772 DE CONSEN. MEDIC.

dem ictericorum. Et cap. 7, ibi, Cibi in omnibus illis sint cibi leues. Vide eum fusius. Vide & alios supra scriptos authores.

Observationes in cura.

Auicen. 15. cap. 6, Omnes qui habent icteritiam ex causa calida, deuitent iram, & motum primum & balneum, &c.

Conferentia morbo regio.

Conferunt icteritiæ absinthium cum apio uel adiantho, acetosa, acorus, aphodillus, agaricum, aloes, alcacangi, assarum, attri-plex, berbena, betonica, ciclamen, calamentum, chamædrys, chamepitys, camomilla, cassia, siliqua, centaurium, cartamum, curcuma, cuscutha, helleborus, endiua, eupatoriū, epatica, fœniculum, lactuca asini, lumbrici, lupulus, marrhubium, menta, multipedum aseliue, nepita, origanum, peonia, perdix, peucedanum, aqua raphani, rheubarbarum, rosmarinus, rubea tinctorum, aqua salicis, sulphur cum ouo, scariola, scolopendria siue citrach, stercus asini pulli bibicum, tamarindi, tamariscus, urina, urtica, hyssopus. Com-

IN CVR. MORB. LIB. III. 773

posita sunt, confectio de ravedseni, de eupatorio Mes. decoctum fumi terræ & coltulae, diarrhodon Nic. electuarium de psyllio, rosatum Mes. diaphinicon, oleum de cartamo, de absinthio, syrupus bisantinus de fumo terræ, de absinthio, de cichorea cum rheubarbaro, oxymel scilliticum, sotira Nicolai, theriaca, triasandali, triphera persica Mes. triphera saracenica Nic. Tro. de rheub. de rosis, de eupatorio, de camphora, uinum scilliticum, pilule Indæ de fumo terræ, &c.

De prognosticis morbi regii.

Hippoc. aphor. 4. apho. 62, Quibus in febribus morbus regius ante diem septimum acciderit, malū. Et aph. 64. eiusdem lib. Quibus in febribus morbus regius septimo uel nono, uel undecimo, uel quartodecimo supervenerit, bonum, nisi dextrū hypochondrium obduruerit: si uerò non, bonum. B. Morbum regium in febribus accidere ante septimum, malum ex eo est, quia uel ab inflammatione, uel à duro hepatis tumore, uel ab ipsa obstructione oriri indicat: post septimū uerò, bonum, nisi ex dictis quispiam affectus hepatis acciderit. Vide

Ccc. ij.

tamen pro aphor. isto Hipp. 4. de vic. in morbo ac. com. 81. Hip. aphor. 6. aph. 42, Morbo regio laborantibus, si fiat hepar durum, malum est. Et apho. 5, Qui morbo regio laborant, non admodum uentrosi sunt. B. Quum nec uentris imbecillitate, nec pituitoso humore, à quibus fieri solet ipse flatus, icterici laborant, idcirco flatuosi non esse possunt. Auicē. 15. cap. de ict. In omni oppilatione in meatu hepatis ad fel, aut in meatu fellis ad intestina, quæ est ex incarnatione, aut porro, non speratur sanitas. Et in eo qui habet icteritiam frigidam, qui non curatur, nec resoluitur eius materia, est timor, & pluribus eorū associatur mors subita. Et quando multiplicatur remanentia urinæ albæ cum icteritia, aut parum tinctæ, est deterius, & magis timendū ne cadat habens eam in hydropem. Et ad summam, dum non remouetur apostema, & reëtificatur dispositio, non habeas spem in curatione ipsius icteritiæ, &c.

Authores dissentientes circa
morbum regium.

1. Adserere, icteritiam ante septimum appa

rentem, semper esse malum indicium.

2 Adserere, ictēritiam post septimum appa-
rentem absque tumore hepatis, esse bonum si-
gnum simpliciter.

Confutatio dissentientium cir- ca morbum regium.

Ad primum respōdetur, esse uerum, nisi ictē-
ritia cum alia euacuatione cōiungatur, ut pu-
ta cum sudore uel uentris fluxu: nā tunc est bo-
na. Et hoc uoluit Gal. in fine com. 62. 4. aph.

Ad secundum respondetur, quod ictēritia
proueniens in 7. 9. et 11. non est iudicanda
bona, nisi materia concoctio præcesserit: Et
hoc uoluit Auic. ubi de signis ictēritiæ deter-
minat. Vnde, inquit, si ictēritia accidat in 7.
aut 9. cum signis laudabilibus, sine hepatis læ-
sione, tunc erit bona: si minus, neutiquā. Igi-
tur non simpliciter bona, etc.

De splenis affectibus.

Scias quod omnia morborum genera huic
membro accidere possunt, sicuti intēperies ca-
lida, frigida, humida, sicca, siue nuda, siue cū
aliquali materia, qualis est imbecillitas sple-
Ccc. iij.

nis aut mala compositio, aut obstructio, quæ nihil aliud est quàm morbus in uis lienis, prohibens naturalium aut superfluarum humiditatum transitum, quæ per ipsum transire naturaliter consueuerunt: aut solutio continui, qualis est dolor, qui est splenis quædam tristis sensatio, nõ per carnem ipsam splenis, sed potius per panniculum eam contegentem facta. Hinc etiam abscessus plures enumerantur species, ut dura, mollis, biliosa, sanguinea.

Loci consentientes de splenis affectibus.

Auic. 15. T. 2. cap. 1, Spleni accidunt omnes species aggritudinum, quæ sunt mala compositio, compositio, sicuti oppilationes, et solutio continuitatis, et similia, et apostemata cum speciebus suis, etc. Gal. 6. de loc. aff. ca. Quum itaque splen multa habeat accidèria cum hepate cõmunia, illa nulla re differre uidentur, nisi quòd quædã magis, quædã uerò minus alterutri euenire solet, etc. Lege de alijs Arcul.

De causis affectuum lienis.

Causa imbecillitatis splenis est ipsa intemperies calida, frig. humi. sicca, etc. Causa ob-

structionis sunt uel cibi crassi & atrabilarij, aut aliquod apostema uel flatus crassi obstru-
entes. Causa doloris est soluta cōtinuitas siue à mala intemperie, siue ab apostemate, siue à flatu crasso facta. Causæ apostematum sple-
nis procatarticae sunt aër crassus, uinū cras-
sum, & cibi atrabilaris. Causæ antecedentes & coniunctæ nonnullæ per se existunt, aliæ per consensum. Per se sunt, uel expultricis im-
becillitas, uel attractoriæ fortitudo, aut alte-
ratricis debilitas, aut obstructio illius uenæ per quam atra bilis ad os stomachi deferitur. Materia uerò efficiens apostema uel est san-
guis niger, uel alij humores, quauis rarò pi-
tuita. Per cōsensum sunt totius ut in febribus, uel partis ut in hepatis intemperie, aut in ute-
ri menstrua retinens, &c.

Loci consentientes de causis
affectuum lienis.

Quòd intemperies sit causa imbecillitatis, lege Gal. 5. de loc. affe. cap. ult. ibi, Omnium facultatum essentia, &c. Et 6. de sympto. cau. cap. 2. Auic. 15. T. 2. cap. 9, Oppilatio quan-
doque fit ex uenositate, quandoque ex apo-

stemate & ab humoribus, secundum quod sci-
uisti, & Gal. 9. de compos. med. per loc. ca. 2,
Splen à natura celerrimè indurari solet, san-
guine nimirum in uenis obturato, & ob cras-
sitiem neque excerni, neque discuti facilè po-
tente. Auic. 15. cap. 13, Dolor splenis aut fit
propter uentositatē & inflationem, aut pro-
pter apostema magnum, aut propter solutio-
nem continuitatis, aut propter malitiā cōple-
xionis, &c. De causis apostematū lege fusius
Arcul. 9. almans. Alex. lib. 3. ca. 25, Oborun-
tur in liene non rarò, ut dictū est, inflamma-
tiones, quarum uniuscuiusque singuli humo-
res possunt existere cause ut sanguis, bilis,
&c. Similiter Auic. loc. cit. ubi inquit: sed
phlegmaticum accidit rarò. Lege neotericos
omnes, præsertim Arcul. & Gord.

De signis affectuum lienis.

Signa temperatura calidæ sunt sitis, infla-
tio lienis, corruptio attractoriæ facultatis. Si-
gna frigida sunt, casus appetitus, fastidiosa
fatieta, rugitus ac ructus copia, imbecilli-
tāsque attractoriæ facultatis. Signa sicca

sunt durities corporis, imbecillitas, crassities sanguinis, & color nigerrimus. Signa humida sunt, corporis mollities, nigredo ad albedinem declivis, &c. Signa obstructionis sunt gravitas lateris sinistri, distentio & dolor, nec adsunt signa alicuius abscessus. Signa attractoriae facultatis sunt totius corporis ex sanguine purpureo nigrities & obstructio. Signa retentricis affectae sunt, vomitus sine febre uel alia occasione. Signa inflammationum lienis cognoscimus ex dolore, feruore, distensione, febre, & ex eo quod ad tumidam duritiem, quae scirrhus dicitur, paulò post desinit: hys etiam os foetet, gingivae exeduntur, ulcera in cruribus cicatricem non recipiunt, deinde affecto iecore hydropici fiunt, &c.

Loci consentientes de signis
affectuum lienis.

Auic. 15. tra. 2. cap. 2, Calidam significant complexionem sitis & inflatio in sinistro, & corruptio uirtutis attractivae. Frigidam significant debilitas attractionis & casus appetitus, & iteratio fastidiosa satietatis, &c. lege

eū ulterius. De signis obstructionis lege Paul. lib. 3. cap. 49. ibi, At si lienem grauitas & distentio, & etiam dolor exerceat, maior obstructio ostenditur, &c. De signis facultatum lienis loquitur Gal. 6. de loc. affe. cap. 1. ibi, Si alteratrix facultas imbecillis sit, sanguis ex iecore in uniuersum corpus impurus transmittitur, quocirca color nigror euadit. Si uomitione uerò sanguis melancholicus excernatur, qui per inferiora interdum decedere uidetur, indicium est, quòd retentrix facultas imbecillis sit. At si euacuatione suppressa mœstiria melancholica superueniat, & cibi auidissimè concupiscatur, acida maximè existente, quæ ad uentriculum transferatur melancholia, expultricem laborare indicium est.

De signis apostematū lienis loquitur Paul. loc. cit. ibi, Inflammationis notæ sunt, feruor, dolor, distentio. Et paulò post, In duritiem occallescit, hoc pressis uitio os fœtet, gingivæ exeduntur, &c. B. Quæ gingivæ corrodantur ratio est, quia uaporis corruptio ad partes gingivarum ascendens eas exedit. Lege de

IN CVR. MORB. LIB. III. 781

his Auic. de signis apostematum splenis, ibi,
Communicant apostemata splenis in graue-
dine, magnitudine, &c. Lege etiam Alexan.
Tral. lib. 3. cap. 25. Item Arcul. & Gord.

De cura affectuum splenis.

Cura complexionis simplicis est alteratio
& regimen contrarium, ita ut causa remo-
ueatur. Si uero fuerit mala intemperies, cali-
da cum humoribus, tunc tres opus erunt inten-
tiones: prima alteratio siue humoris dige-
stio, quæ fit cum syrup. acetoso simpl. syrup.
uiol. de endiuia, de fumo terræ de lupulis cū
aquis endiuia, fumi terræ, lupulorū, cichoriū,
&c. Secūda erit euacuatio, quæ fit cū rheu-
barbaro, manna, cassia, pilulis aureis aggre-
gatiuis, electuario de suc. ros. &c. Tertia est
resolutio debilis cum roboratione mēbri, ita
ut mala intemperies remoueatur: & fit cum
zucharo ros. uiol. tria sandalis, diarrhodone,
uel per ea quæ extrinsecus adhibentur, inun-
gendo cum oleo rosaceo, uiolaceo, &c. Tem-
peries uero frigida curatur cum his quæ hu-
morem pituitosum præparant, quale est oxy-

mel simpl. & compos. scilliticūque, rhodomel, Syrup. de duabus rad. bisantinus, euacuatio cum agarico, hiera Gal. diaphinicone, &c. Remouetur mala intemperies de relictis cū electuario diamusc. dul. de baccis lauri, ungendo extrinsecus cum oleo de spica, de ruta, de capparibus, &c. Cura materiae uentrosæ similiter digeritur, euacuatur ac resoluitur, & pro resolutione conueniunt diaciminum, diatrion pipereon, theriaca. Extrinsecus resoluunt, fofus ex anetho, ruta, pulegio, calamento, semine anisorum, cimini, fœniculi, similiter oleum rutacē, de capparibus, &c. Cura inflammationū, quatenus ad causam antecedentem attinet, euacuatione & reuulsione indiget: quatenus uerò ad causam coniūctam, tunc sicuti in alijs abscessibus in primis repellendum, in morbi incremento repellentibus cum aliquali resolutione utendū, in statu & declinatione resoluendum, nisi abscessus in suppurationem uertatur, quia tunc suppurantia opus sunt. Euacuatio igitur in causa antecedere, si humoris copia cum sanguine abundet, tum à uena communi, tum ab

ea quæ inter annularem & minimum digi-
 tum collocatur, sectio fieri debet, uel reten-
 tis mēstruis, uel hemorrhoidib⁹ à uena in ta-
 lo pedis. Euacuantur alij humores, prepara-
 ta prius cum coctione eorum materia, per ea
 quæ millies dicta sunt. Reuulsio fiet cum enæ-
 mate splen reficiente, aut hemorrhoidarum
 & menstruorum prouocatione, &c. Cura a-
 postematis duri tres similiter requirit inten-
 tiones, prima preparatio humorum cum sy-
 rup. de epithymo, fumo terræ, oxymelle, &c.
 Secunda, euacuatio, quæ fit cum confectio-
 ne hamech, cassia, myrobalanis indis, epi-
 thymo, &c. pilulis indis, de fumo terræ, de
 lapide lazuli, &c. Tertia est mollificatio
 & resolutio, quæ perficitur cum unguentis
 ceratis, cataplasmate, fotu, &c. de quibus
 plura habes iuxta Arcul. & Gord. Cura fa-
 cultatum affectarum hismet remedijs perfi-
 citur, si modò quidpiam austerum adiunga-
 tur, &c. Cura doloris est, ut eius causa remo-
 ueatur: quæ si fuerit mala intemperies, ca-
 lid frig. per contraria remouebis: si flatuosa
 materia, curam habuisti: si ex inflammatione,

cura earum cura, & utere anodinis, prout
aliàs in alyis doloribus dictum est. Cura ob-
structionis splenis sit perinde ac de icteritia
dictum est, &c.

Loci consentientes de cura
affectuum splenis.

Gal. 13. meth. cap. 2, Vbi lien phlegmone
inuadit, in sinistra manu secanda est uena,
si quidem quod euacuandum sit, communis est
indicatio. Et 9. de cōpos. med. per loc. cap 2,
Deinde attenuantibus opus est pharmacis, ci-
tra manifestam caliditatem, ut ne uehemen-
ter incrassescat succus crassus in ipso obtu-
ratus. Quò uerò actiones ipsæ conseruentur,
ex austeris aliquid his admiscetur, quale etiā
adstringentium genus. Ea gratia igitur ama-
ra ualde medicamēta ipsi offerimus, & quæ-
dā ex austeris ipsis admiscemus. Et 13. meth.
cap. 16, Quotiens obstructio quæ in eum inci-
dit, aut phlegmone potissimum ad scirrhum
perueniunt, tum ea quæ obstructions eximāt,
tum quæ dissecant, ualentiora exigit. Nam
quale medicamentum iecori est absinthium,
tale est lieni capparis cortex; & quale est ic-

cori eupatorium, tale est spleni scolopēdrium,
 &c. Alex. lib 3. cap. 23, Calidiori & sicca
 lienis intemperatura contrariis medicamen-
 torum auxilijs, frigoris & humectantibus
 subueniendum est: frigida uerò & humida
 calorificis & arefaciētibz præsidijs succur-
 rere expedit, &c. lege eum fusius: nam ibi
 plura ad curam facientia intelliges, & de-
 mum omne genus eduliorum in morbis sple-
 nis congruentium etiam percipies. Lege insu-
 per Arcul. Mar. Cat. & Paul. lib. 3. cap. 49.
 & Auic. 15. Tra. 2. cap. de cura splen. Item
 Aet. & Gord. & omnia à me recitata in-
 telliges.

Obseruationes in cura splenis.

Gal. 13. met. cap 16, Valēiora tantò ma-
 gis lieni congruunt, quantò crassiori utitur
 alimento, &c.

Auic. 15. tra. 2. cap. 3, Est proxima cura-
 tionibus hepatis, & indiget ut sint medicinae
 fortiores & penetrabiliores: penetrare uerò
 faciunt ea, quae obseruāt uirtutem super eos,
 quousque perficiunt operationes suas, &c.

Ddd.i.

Observationes de phlebotomia.

Auic.loc.cit.cap.5, Et phlebotomia plurima apostemat splenem, euacuando subtile, & remanendo crassum: idcirco Razes dixit non multum referre de uena secanda, dummodo uulnus illatum longè pateat.

Observationes circa localia in cura splenis.

Auic.loc.cit.cap.6, Applicanda in curatione seruent latus stypticitatis, sed cum cautela calefactionis uehementis, ne materia ad crassitiam & duritiem festinet: nam ambo uiscera ad duritiem opportuna sunt, sed misceantur cum eis medicina, in quibus sit incisio aliqua cum caliditate equali. Et cap.7, Et scias quòd res calida ualde non sunt multum cōuenientes spleni, propterea quòd indurant & exiccant, & prohibet à resolutione, &c. Itidem fatetur Paul. & Gal.

Observatio circa medicamenta.

Gal.13.meth.cap.17, Sanè duplex ratio est eius medicamentorum usus, quum partes superiores posita laborant, per ea quæ edun-

tur & bibuntur, inferiores per id quod fit per
clysterem infusum, &c. Paul. lib. 3. cap. 49,
Cibus cōpetit tenuis, acris, siccus, portio pau-
cissima.

Auic. 15. tra. 2. cap. 7, Omne lac, præter
lac camelarum, est malum spleni. Et in admi-
nistratione ciborum melius est, ut admini-
strentur ante eos balneationes longæ, deinde
assumat incisiva, subtiliatiua, & faciētia si-
rim, & sumat in potu uinum mixtū cum aqua
marina & subtili, & regimen per tres dies.
Lege Gal. 13. meth. cap. 17. ibi, Scirrho labo-
rantibus cōuenientia medicamenta, &c. lege
etiam Alex. Tral. lib. 3. cap. 23. nam fusissi-
mè de omnibus cibis ibi pertractat, &c.

Nocentia spleni.

Nocent spleni lagana, bouina carnes, da-
ctyli, ficus, lac, lentes, uinum dulce, crassum,
nouum, aqua cruda, frigida, omnia unctuosæ,
legumina, olera, caseus antiquus salitus, aues
aquaticæ, omnes fructus aquosi, omne splē, &
omnis aēr crassus, paludosus, autūnalis, &c.

Conferentia spleni.

Conferunt splenis affectibus frigidis, ab-
Ddd. ij.

sinthium, acorus, agaricus, apium, ammoniacum, agrimonium, assa, aristologia, betonica, chamædrys, capparis, caules, cyclamen, cyperus, costus, ebulus, hederæ, helleborus, epithimū, lapatiū, lapis lazuli, lapis armenus, lentiscus, liliū, mel, menta, mercurialis, nasturtium, nux mosch. oua, origanum, passula, pastinaca, peonia, politrichū, pulegiū, prasiū, pulmo uulpis, raphanus, ruta, radix capparorum, radix genestæ, salvia, sandaraca, senna, serpillū, stachas, scolopēdriū, spica, squilla, tamariscus, urina hominis, urtica, hyssopus, iris, uinū extinctionis auri, &c. Cōposita calida sunt diacurcuma, diatrio pipereō, syru. de calamento, de stachade, de absinthio, de fumo terræ, troc. de absinthio, de capparibus, hiera, &c. Frigida sunt simpl. acetum scilliticum, aqua chalybeata, bleta, corallus, cornu cerui ustum, lactuca asini, morus, myrobalani omnes, uitis, uiola, &c.

De prognosticis affectuū spleni.

Auic. 15. tra. 2. cap. 4, Si spleneticus inuenit dolorem interiōrē, est magis saluus, quia in ipso adhuc speratur sensus. 2. Quādo acci-

dit fluxus uētris cū sanguine, est melius, quia
 speratur cū ipso resolutio materiei splenis: si
 autē perseuerauerit, aduenit ei lubricitas hy-
 dropica, & morietur. 3. Qui catarrhum ha-
 bet, non ei accidit splen. B. Quia humiditatis
 copia humidā intēperiem arguit, ex qua ra-
 rō atra bilis cōtingere solet. 4. Qui habet do-
 lorē in splene suo, & currit ex eo sanguis ru-
 beus, & apparent in corpore eius ulcera al-
 ba non lēdētia, morietur in die secūdo: & si
 non, cadit appetitus. 5. Quādoque terminan-
 tur apostemata splenis fluxu sanguinis na-
 riū, & propriē ex latere sinistro, & aposte-
 matibus apud aures difficilis suppurationis
 & apertionis propter crassitiem materiei.
 6. Et laudabilior urina eorū est crassa, san-
 guinea, & urina in qua est fæx viscosa:
 quādoque significat sanitatē splenis & de-
 structionem eius. Vltimò, inquit, apostemata
 splenis cōverti ad iecur, malū: ecōtra uerò, bo-
 nū. Hippoc. aphor. 6. aph. 43, Quicūque lie-
 nosi difficultate intestinorū capiūtur, is su-
 perueniente longa difficultate intestinorum
 aqua intercutis aut lenitas intestinorū adue-

Ddd. iij.

nit, & moriuntur. Et apho. 6. aph. 48, Lienosis difficultas intestinorum superueniens, bonum. Lege etiam de hac re aphor. 22. tertij lib. ibi, Autumno uerò, &c. lege etiā Arcul.

Authores dissentientes circa morbos splenis.

- 1 Adserere, materiam in splene posse educi conuenienter per uias urinæ.
- 2 Adserere, omne genus lactis in splenis duritie conferre.

Confutatio dissentientium circa morbos splenis.

Ad primum: impugnat Gal. 13. meth. cap. 17, ubi inquit, gibbum hepatis expurgari per renes, sed lien per intestina: quum per renes euacuari, nulla lieni uacuando uia pateat.

Ad secundum respondetur, quòd lac ex eo, quòd obstructionem inducit, nequaquam conceditur: uerum quum lac camelarum à proprietate lieni conferat, idcirco laudatur ab Auic. & hanc ob causam non omne genus lactis conceditur, &c.

De malo habitu.

Malus habitus, quem Græci καχεξία

dicunt, est prævia quædam ad hydropem dispositio, ex mala hepatis concoctione proveniens, &c.

Loci consentientes de malo habitu.

Paul. lib. 3. cap. 47, Principia aquarum cutem subeuntium vocare Græci καχεξία, Latini malum corporis habitum consueverunt. Aet. ser. 10. cap. 19, Quum corporis habitus in aquositatem diffunditur, καχεξία à Græcis appellatur. Avic. 14. tra. 2. cap. 3, Quum corrumpitur digestio hepatis, & communicat super ipsum debilitas, in primis accidit dispositio ad hydropem antecedens, & vocatur cachexia, &c.

De causis mali habitus.

Causa ipsius cachexiæ sunt longitudo alicuius morbi, durities splenis uel hepatis, consuetarum excretionum prohibitio, depravata hepatis siue stomachi alteratio: quæ si omnino corrumpatur, non amplius cachexiâ, sed aliquam hydropis speciem efficiet. Denique quæcunq; causæ hydropis esse possunt, dum leues existant, omnino cachexiâ inducunt, &c.

Ddd. iiij.

Loci consentientes de causis
mali habitus.

Aer. ser. 10. cap. 19, Hæc affectio ut plurimum ex longo morbo congregatur, aut ex uiscere quopiam in scirrhum indurato, maxime hepate, splene, aut à consueta & cohibita excretionem aliqua. Auic. 14. tra. 4. cap. 3, Fit à corruptione digestionis, uel ab hepatis imbecillitate, & quandoque accidit propter congregationem aquæ in pulmone, &c. B. Hæmet sententiam habes ex ipso cap. de signis peripneumoniæ, ibi, Et quando prolongatur tempus cum peripneumonia, facit incurere agrum in inflammationem pedum, &c.

De signis mali habitus.

Primum corpus albicat uel flavescit ob totius malam intemperiem, concoctiones impediuntur ob hepatis uel uentriculi imbecillitatem, remanet tamen ciborum appetentia à frigido elicitæ, deinde fastidium & defectus animi accidit ob uenenosam materiam ad cor exhalantem, respiratio rara ob consensum pulmonis uel diaphragmatis, extrema corporis inflantur, præsertim si anasarcam

cachexia precedat. Urina & sudor paucus ob aquosam humiditatem retentam, quæ per consueta loca expurgari nequit, testiculi inflantur, dummodo ascitem cachexia præcesserit, ulcera adsunt incurabilia ob sanguinis sinceri defectum, &c.

Loci consentientes de signis
mali habitus.

Aet. ser. 10. ca. 19, In hac affectione universa corporis miscella laxior fit ac emollescit, corpusque totum cum virore albicat ac inualidum est: nam inter eundem crura vacillant, concoctiones in primis, manente etiã appetitu, impediuntur, fastidium accidit, respiratio fit rara ac debilis, quæ motibus ac actionibus condensatur. Lege Auic. loc. cit. cap. 3. ibi, In primis permutatur color corporis & faciei ad albedinem & citrinitatem, & apparet inflatio in palpebris, & facie, & extremitatibus manuum ac pedum, &c. Lege fusius, & intelliges cætera à me dicta, &c.

De cura mali habitus.

Cura requirit quatuor intentiones. Prima erit circa regimen, ita ut aeger in cibo & po-

tu parcus sit, non comedat ad satietatem, nec nisi celebrata digestionē: sitire ac famescere in hoc casu utile: fugienda est ciborum multiplicitas, aqua interdicatur, nisi alia coheret necessitas. Cibaria igitur in hoc casu sint calida, tenuia & exiccantia, praesertim in causa frigida, in calida uerò econuerso. Secunda est euacuatio: unde si à menstruis uel haemorrhoidibus suppressis morbus proueniat, uel ab alia excretionē prohibita, fiat sectio uenarum: si uerò à uitiatis humoribus, tunc purgatio ex hiera utilis est, uel ex agarico, pilulis de rheubar. hieralogodione, electuario indo, diaphinicone, prout materia exegerit. Tertia intentio est humorum preparatio, unde si fuerit bilis mixta, conuenit syr. bisantinus de endiua, cum aquis absinthij cichorii: & in materia non ualde frigida ualet syr. de eupatorio acetosus simpl. & in materia crassa ac uiscosa oxymel scilliticum, syr. de absinthio, & in materia melancholica syr. de epithymo, de hyssopo, &c. Conueniunt etiam in hac intentione diacurcuma, dialacca, triasandali, diarrhodon, troc. de ros. de

absinthio, &c. Quarta intentio est diuersio, quæ fieri potest per uomitum, quia extrahit ab hepate per uenas meseraicas, tum quia ex infimo loco materias eradicat, tū quia à stomacho & ab adiacentibus partibus optimè auertit. Clysteres etiam laudantur, eò quòd à stomachi fundo euacuant, tū quia eductio per uentrē naturalis magis est, q̃ per uomitū, &c.

Loci consentientes de cura
mali habitus.

Aet. serm. 10. cap. 19, Cibi eorum sint simplices, qui facile concoqui possint, &c. Lege eum fusius. Auic. loc. cit. cap. 4, Cibus habetium cachexiam sit ex eis, in quibus est suauitas & confortatio naturæ, sicut alcubungi, id est perdices, & sint uina eorum odorificata, cū eis quæ sunt gariophylli, cinnamomum, crocum, &c. & ex fructibus, granata dulcia, & de citronijs parū nō nocet, & misceantur cum cibis ea quæ sunt sicut sinapis, porrum, allia, &c. Paul. lib. 3. cap. 47, Victus sit tenuis, siccus, &c. De euacuatione loquitur Aet. loco cit. ibi, Si hæc affectio ex consuetæ excretionis cohibitione contingat,

excretionem irritare expedit, aut uenam incidere, si nihil præpediat: si minus uena incidenda sit, conuenienti purgante pharmaco, & maximè ex hiera oportet, &c. Auic. loc. cit. Considera an humores sint choleric, & educantur solutione uentris cum hiera picra: nam educit superfluitates absque humiditatibus innatis, &c. Lege eum fusiùs. De humorum præparatione lege Arcul. & neotericos: lege etiam Auic. ibi, Et ex eis quæ cõferunt, eis ualde sunt syr. de absinthio in ieiunio, mitridatum & diacurcuma, & dialacca, & diaspermæon, &c. De ultima intentione lege etiam Auic. ibi, Et utatur uomitu antecibum: est enim regimen bonum eis in principio rei cum raphano infuso in syr. acetoso, & in fine cum helleboro, &c.

Observatio in regimine.

Auic. 14. tra. 4. cap. 4, Oportet quòd regimen eorũ sit, superfluitates prohibens, &c.

Observatio in sectione venæ.

Paul. lib. 3. cap. 47, Iis qui copia uiriosorum humorum laborant, uacuatio sanguinis per uenam noxia est: purgatio autẽ ex hiera

permultum utilis. Auic. loc. cit. Ante uenæ sectionē pracedant quæ sanguinem purificant, qualis est hiera.

Obferuationes de folutio- ne ventris.

Auic. loc. cit. Primū humorum qualitates confiderentur & purgentur: quòd fi nouiffimè materia aggregetur, figi eam nō permit- tas, fed reiterata purgatione educes. Secun- dō, cauendum ne eorum ftomachi à folutiuis ledantur, quare cum foluentibus aromatica ſunt admifcenda. Tertiō, ſex purgationum modos enumerat. Primus, per ea quæ uētre ſoluunt, & obſtructiones aperiunt. Secundus, per clyſteria attenuantia & reſoluentia. Ter- tius, per moderatum exercitium & per pau- citatem potus. Quartus, per balnea cū aquis non calidis. Quintus, per uomitum ante ci- bum. Sextus, per cibos exiccantes, aperiētes, & attenuantes cum aromaticis, &c.

Conferentia malo habitui.

Conferunt cachexia, ſpica, cinnamomum, abſinthium, eupatorium, ſemen urticae, cha- mæpitys, urina hominis, helleborus, ſanſucus,

maiorana, cricius, handacocha. Confectio
alcacangi, de ravedseni, conditū de buglof-
sa, diacurcuma, dialacca, diacostum Mesu.
empl. Alex. Mes. omorusia Auic. theodoricon
magnum Haly, theriaca, diateffaron, triphe-
ra minor, pilulae de rheub. de alcacangi
Mes. troc. de diarrhodon, de rosis, de rheub.
de eupatorio, syr. acetosus de diarrhodon, de
absinthio, de fumo terrae, de squinanto uia-
sic. 5, &c.

De prognosticis mali habitus.

Aet. ser. 10. cap. 19, Senes facile hac affe-
ctione capiuntur, maximeque liberantur: pue-
ri uero facile pereunt ob uitalis roboris im-
becillitatem, aut ex succis ob cutis raritatem
facile transpirantibus. Qui in uigore sunt,
rarò incidunt, facileque inde se extricant: qui
uero malum diutius durat, in aquam inter-
cutem transit, &c.

De hydropo.

Hydrops est morbus à materia intra peri-
toneum contenta, quae ab hepatis imbecilli-
tate prouenit factus, ex quo uenter intumescit,
& interdum reliqua membra. Huius tres sunt

Species, prima ἀσκίτης, id est utricularis: secunda est τυμπανίτης, id est tympania: tertia ὑπόσφορα & ἀνάσφορα uel λευκοφλεγματία, id est, pituita alba dicitur. Ascites est morbus in quo ueteres crura intumescunt, superiores autē partes gracilescent ac marcescunt. Tympanias autem est morbus in quo plus flatuosi spiritus inuenitur, & minus humoris, ita ut si uenter percutiatur, tympani modo crepitū elidat. Anasarca uerò est morbus, quo totum corpus albidum redditur, atque humore circumluitur, ex quo aegris pudenda peruertuntur, & febres accidunt, &c.

Loci consentientes de
hydrope.

Auic. 14. T. 4. cap. 5. Hydrops est aggritudo materialis, cuius causa est materia exuberans frigida & ingrediens membra, &c.
Aet. ser. 10. cap. 20, Hydropis differentiae tres sunt: alius enim ascites ab utre dicitur, alius tympanitis à tympano, tertius sarcites iuxta carnem, à Græcis λευκοφλεγματίας nominatus, &c. hoc idē sentit Paul. lib. 3. ca. 48. & Alex. lib. 3. ca. 29. ibi, Hic morbus, &c.

800 DE CONSEN. MEDIC.

Gal. lib. finit. med. Hydrops, quæ anasarca, id est, per carnem dicitur, est quum totū corpus intumuit œdemate atque humore corpus circumluitur, &c. Ascites, id est, utricularius est in quo uenter & serotum cruráque intumescunt, superiores autem partes extenuantur, &c. Similiter Tympanias est quū in uentre spiritus plus inuenitur, humoris minus, & si quis pulsauerit, sonus exauditur, &c. Lege etiam Gal. de hac re aphor. 4. comment. 11.

Obiectio.

Quar tres tantū species facis, quū Theodorus lib. 5. quatuor enumeret, scilicet anasarcam, hyposarcam, tympanitem & ascitē. Præterea Hippoc. 4. de uic. in mor. ac. tex 3. duas tantū species esse declarat, una quidem hyposarca, altera cum inflationibus.

Responsio.

Distinctiones interdum dantur penes nomina rerum, interdum uerò penes causam efficientem, interdum penes locum læsum. Erūt igitur quatuor ratione nominis, ut Theodorus: erunt duæ ratione loci: nā aut in omnibus membris continentur, aut tantū in con-

cauitate uentris, & sic erunt duæ species ut Hippocra. erunt tamen tres, ut diximus, quia causæ tres sunt, &c.

De causis hydropis.

Causæ efficientes & primitiue sunt omnis causa exterior nocumētum in digestionem imprimens, & imbecillitatem maiorem quàm in cachexia inducens: regimen inordinatum in sex rebus non naturalibus, percussio, casus & offensio super hepar, &c. Causæ antecedentes sunt mala dispositio hepatis uel aliorum membrorum, quæ provenit uel à mala intemperie nuda, uel humoralis, uel à soluta continuitate, uel ab aliquo abscessu digestionem impediēte. Causæ per consensum erunt uel à toto, ut in febribus quæ calorem hepatis innatū imbecillitant, & digestionē præpediūt, uel euacuationes superflue calorem innatū extinguētes, sicuti euacuationes per uentrē, per uomitū, per sudorem, per menstrua, per sanguinis fluxum, &c. Vel erunt à membris particularibus, ut puta à pulmone, diaphragmate, abscessum uel aquam patiente, uel à stomacho ob malam eius intemperiem, uel à

Ecc. i.

splene ob eius magnitudinem & duritiē, &c. Causa coniuncta est materia ipsa frigida, membra alterans, & in tumorem attollens cū imbecillitate hepatis & digestionis eius assidue illam materiam regenerantis, &c. In anasarca igitur erit materia pituitosa, penetrans cum sanguine per membra. In ascite erit materia aquosa citra peritonium contenta. In tympanite est materia uentosa in illas partes diffusa, &c.

Loci consentientes de causis hydropis.

De causis primitiuis lege neotericos, precipue Arcul. & Sauonarolam, Gordonium, Platearium, & reliquos. De causis antecedentibus lege Auic. 14. tra. 4. cap. 4. ibi, Cause uerò antecedentes sunt omnes aegritudines hepatis complexionales, instrumentales, sicut paruitas & oppilationes, & apostemata calida, frigida, mollia & dura, &c. Lege eum fusius. Gal. 5. de loc. aff. cap. 7, In omnibus corporis partibus tum supernis tum inferioribus, pituitosus sanguis contineri conspiciatur in ijs morbis, quos Græci anasarcas &

leucophlegmatias nominant: proinde cōsen-
 taneum est, ut ob uisceris refrigerationem ci-
 bus iam redditus in sanguinem transmutari
 non possit, &c. Et inuenies per consensum
 etiam affici, ibi, Laborans aqua inter cutem
 molestari uidetur uitio existente in liene, uel
 in ieiuno, uel pulmone, uel renibus, aut tenui
 intestino, aut mesenterio, aut ubi sanguis plu-
 rimus per hæmorrhoidas excernitur, aut ob
 muliebri profluum, aut quum retinentur
 menstrua, aut aliam ingentem uteri disposi-
 tionem, &c. De causis particularibus loqui-
 tur Aet. ser. 10. cap. 20. ibi, Ascites fit quum
 inter pelliculam peritoneum appellatam, &
 intestina plurima aquosi humoris collectio
 fiat. Tympanias, quum flatu aere repleti ac
 superflui plurimam collectionem facit, &c.
 Sarcites uerò ab aquosa pituita ortum ha-
 bet, &c. Hoc idem sentit Auicenna. 14. tra.
 4. cap. 4. ibi, Ascitis causa est materia
 aquosa effusa in spacium uentris inferio-
 ris, &c. Vide Galenum de causis hydro-
 pis 2. de naturali facult. cap. 7. Item 4. aph.
 comm. 11. ibi, Quibus tormina, &c. Itē 4. de

Ecc. 4.

præſag. ex pulſibus, capite de meninge affe-
cta. Itē prognost. 1. tex. 1. ibi, Cuiusvis aquæ
intercutis genitura eſt, ubi ſanguificatio-
nis officium intercidat, &c. Hippoc. aphor.
7. aphor. 71, A' pituita alba aqua intercus
ſuperuenit. Vide Gal. in comment. Vide etiā
Paul. & Alex. lib. 3. cap. 29.

De ſignis hydropis.

Signa hydropis in genere octo ſunt. Primum,
eſt vitiatuſ color iuxta hepatis intemperiem,
ut in frigida albus & liuidus, in calida fla-
uus uel rubeus. Secundum, eſt inflatio oculo-
rum & pedum, ut in anasarca: excipitur tym-
paniaſ, in quo nulluſ tumor niſi in uētre cer-
nitur. Tertium, ſitit inexhauſta, quia humor
in hiſ locis retentus ſaluſ eſt & putrefactus.
Quartum, ciborum faſtidium, ſcilicet in cali-
da hydrope: nam in frigida appetituſ inua-
leſcit. Quintum, urinaſ paucitaſ, rubeaſ, præ-
ſertim in aſcite & anasarca, ubi nulla fit ſe-
paratio ſanguiniſ & bilis. Sextum, febres mi-
tes ac tepidaſ. Septimum, accidunt ulcera.
Octauum, nihil cruentum ſecerni ſolet, ma-
ximè in aſcite & tympaniaſ, &c.

Signa particularia Ascitis sunt gravitas sensibilis in uentre: & si percutitur, nullum sonum emittit, sed aqua à latere ad latus commota cernitur. Tactus est utris aquæ pleni. Nulla adest membrorum magnitudo, cutis tēsiō, paucitas urinae, pulsus paruus, frequens, & ad duritiē decliuus. Signa hyposarcæ sunt inflatio totius corporis, uelut in defuncto corpore impinguantur membra, & propriè facies, & cū premittur digito, remanet fovea: nulla adest suminis inflatio aut commotio, ut in ascite & tympanite, fluxus interdū sanguinolentus, pulsus undosus, latus & lenis. Signa tympanitis, egreditur sumen plurimo exitu, nulla adest gravitas, sed tensio plurima, membra ad ariditatem tendunt, & percusso uentre sentitur sonus utris flatu non aqua pleni: adest ructationis uoluntas, ex qua leuius se habet: pulsus ut plurimum uelox & frequens, ad duritiem decliuus, nulla adest inflatio pedum, &c. Signa distinguenda hydropem à prægnante sunt, quia ab umbilico infra prægnantis uenter extenditur, in hydrope uerò infra & supra, &c.

Ecc. 14.

Loci consentientes de signis
hydropis.

De signis in genere hydropis lege Auic. 14. tra. 4. cap. 8. ibi, Omnem speciem hydropis sequitur corruptio coloris, &c. lege hunc locum fusius. Gal. 5. de loc. aff. cap. ult. In anasarca per aluū nihil cruentū, neque in ascite, neque in tympania excerni solet, sed spatium quod est inter peritoneum & partes ei subiacentes aquoso humore impletur: his uero qui ex frigida aque potu hydropici facti sūt, uehementes ciborum appetitus fiunt, &c. De signis particularibus mentionem facit Alex. lib. 3. cap. 29. ibi, Quum in uentre circa abdomen humores aquosi collecti fuerint, &c. Lege etiā de hac re Auic. 14. cap. 9. ibi, Cum ascite est grauitas sensibilis in uentre, &c. Et cap. 10. loquens de anasarca, inquit, Apparet inflatio in corpore toto sicut accidit corpori mortuo, &c. Et cap. 11, In tympanite egreditur sumē plurimum exitu, &c. Vide fusius Arcul. & Sauonarolam. Hipp. prognost. 2. tex. 2. ibi, Si quibus ex inani parte consistit hydrops, &c. Lege etiam fusius Gal. in hoc commēto, &c.

De curatione hydropis.

In Ascitis cura tres tantum intentiones
 insurgunt, quarum prima uersatur circa uitae
 regimen, ita ut sex res non naturales ad ca-
 liditatem & siccitatem uergant, quum causa
 ascitis sit frigida & humida. Nam hepar etsi
 à causa calida primum molesteretur, nihilo-
 minus ex imbecillitate & spirituum resolu-
 tione tandem frigescit. Dieta igitur sit te-
 nuis, si uires patiantur. Cibaria parentur cū
 pipere, caryophyllis, &c. Vinum sit subtile, al-
 bum, paucæ quantitatis, aquam uitent. Alte-
 ra intentio est in remouenda causa coniun-
 cta, quæ perficitur cum pharmacis hydrago-
 gis, uel cum urinam prolicientibus, uel cū his
 quæ insensibiliter aquam resoluunt, ut sunt
 fomēta, emplastra, sacculi, cerata, &c. Solu-
 tina fiūt cū rheub. agarico, cū succo rad. iri-
 dis, ebuli & sambuci, cum soldanella, uel eius
 succo, cū electuario, & Mezereō quæ laureola
 dicitur, cū pilulis de serapino, de euphorbio,
 &c. Diuretica sunt syrup. bisantinus de dua-
 bus radicibus, oxymelle, syrup. de absinthio.
 Fomenta fiunt cum rebus calidis resoluen-

Ecc. iiij.

ribus ut salvia, maiorana, rosmarino, menta,
 absinthio, pulegio, camomilla, origano, folijs
 lauri, alumine, sulphure, sale, &c. Emplastra,
 quale est de granis lauri, de stercore caprino
 &c. Sacculi parantur ex milio, sale, fursure.
 Vnguenta, quale est illud Agrippæ, & mille
 alia quæ parari possunt. Conueniunt etiam
 diacurcuma, dialacca, troc. de rheub. Ter-
 tia intentio malam hepatis dispositionem
 remouet cū his quæ hepar roborant, aperiūt,
 ac obstructions dirimunt, extrinsecus cum
 ceratis & linimentis ex oleo rutæ camomil-
 lino paratis, intrinsecus cum confectionibus
 iam memoratis, &c. Quod si per hæc ascites
 non cessauerit, cute puncta aqua extra-
 hatur, &c. Anasarca siue hyposarca hisde-
 met intentionibus indiget: nam præter regi-
 men calidum & siccum etiam causa coniun-
 cta remoueri debet cum medicinis soluenti-
 bus & alijs, ut dictum est. Verū hoc plus
 habet, ut sectionem uenæ suppressis hæmor-
 rhoidibus, mensstruis, uel si ab aliquo aposte-
 mate fieret, & humorū præparationē requi-
 rit, quod in ascite minimè dictum est: & hoc

fit cum rhodomelle, syru. de duabus rad. de
 bisantio, oxymelle simp. &c. Aduerte tamen
 quòd syrupos in hoc casu simpliciter sine
 aquis & decoctis exhiberem, quò aqua apud
 me suspecta sint. Laudatur in hoc casu hiera
 simplex, rheub. agaricus, pilula de rheub. Ma
 la autem dispositio hepatis, si ab apostema
 re, uel ab obstructione eius proveniat, quo pa
 cto curanda sit, supra habuisti: quae si à ma
 la intemperie oriatur frigida, tunc damus ele
 ctuariũ diacurcumae, dialaccæ, rheub. hepar
 lupi, absinthium, eupatoriũ: in calida, diar
 rhodò, abs. triasand. In causa mixta troc. de
 rheub. cum speciebus diarrhodonis Abbatis.
 Tympanias uerò perinde ac dictum est cu
 randa erit, dummodo soluentia pharmaca iã
 dicta flatuosum uentum unã cum aquoso hu
 more resoluant, unde laudatur diaciminum,
 diagalaga, diamusculus, electuarium de baccis
 lauri, uel fofus ex rebus calidis & siccis, &c.

Loci consentientes de cura
 hydropum.

De regimine uictus loquitur Paul. lib. 3. ca.
 48. ibi, Cibus erit salsamẽtũ, sinapi & albia

810 DE CONSEN. MEDIC.

ex auihus syluestres & sicca magis. Inter ole-
ra asparagus, porrum, sinapi. Vinum sit ue-
tus & tenne, portio liberalis uitanda est, &
aqua in totum, calidioribus acrioribusque
eibus & auxilijs, ubi febris cum hydropes fie-
ret, abstineatur, &c. Auic. 14. cap. 13, Opor-
ret comedere cum mēsurā, & dimittere aquā,
ita ut prohibeatur à uisione aquae, ne dicam
à potu, quantum possibile sit, &c. Lege Alex.
de omnibus oleribus, piscibus, uolucris, le-
guminibus, siue bellarijs fusius cap. 30. De cu-
ratione per hydragoga loquitur Gal. 7. aph.
commēt. 56. ibi, Curatio hydropis fit per me-
dicamenta aquositate soluentia, per epishe-
mata, ac per ea quae ciendi urinam & in ua-
pores talē humorē soluendi facultatē habēt.

Item 14. meth. triplicem innuit curandi
rationem, prima ut tumorem in uiscere con-
tentum sanemus. 2. ut humiditatem soluamus.
3. ut per medicamēta urinam citemus. Habet
etiam, quod calidior & siccior temperies
exile corpus reddat, quod fit ex acuta exer-
citatione, & medicamentis attenuantibus, &
nictu, & animi cogitatione, &c. Paul. lib. 3.

ca. 48, Curatio cōmunis ab euacuatione incipit, uerū ascites & tympanias medicamentum aquam educens requirit, anasarca sanguinis detractionem, modò affectus ex hæmorrhoidæ uel mēstruis retētis oriatur, &c. Gal. 4. de uic. in mor. ac. tex. 3. ibi, Hydropū duæ sunt naturæ. In comment. Anasarca, inquit, interdum sanguinis detractionē, dum incipit, expostulat, si ex retentione hæmorrhoidarū uel muliebrium, uel ex quapiā quæ ita sit plethorica causa inciperit: tympaniam uerò & ascitē nullus per sanguinis missionem sanare ausus est, &c. Lege Auic. 14. tra. 4. ca. 13, Similiter Mar. Cat. & Arcul. Gord. & Alex. de cura hydropū in particulari. Gal. 3. de rēper. ca. 3, Medicamē id quod cātharides recipit, hydropicis prodest, tamen si cātharis ipsa uesicā omnino ulcerat: uerū ubi per ea quæ admiscētur castigata, corpori plurimo humore grauato offertur, & illū & per urinas expellit, &c. Et 14. meth. ca. 13, Huius euacuationem medicamētis quæ digerant molimur, uel chirurgia in ascite, adhibita punctione, quā paracentesin uocant, &c. Lege quomodo

812 DE CONSEN. MEDIC.

hac fiat pūctio ex Arcul. & Gulielmo Plac.
& ab alijs omnibus qui chirurgiam pertra-
ctarunt, &c.

Obferuationes de euacuatione.

Auic. 14 trac. 4. ca. 13, Primū in ascite a-
qua, in anasarca pituita, in tympanite flatus
euacuetur. 2. Soluentia ita soluant, ut nihil he-
pati & uētriculo mali inferāt, sed sint leuia.
3. Reiteretur euacuatio, ne materia multum
congregetur, cauendo ne pro uice ita copiosa
sit, ut uircutem deijciat. 4. A soluentibus sta-
tim hepar & uentriculū cum stypticitate mo-
deratē aromatica. 5. Prouocetur uomitus ut
materia in uentriculo contenta euacuetur. 6.
Enemata conueniunt, dummodo causam an-
tecedentem & coniunctam euacuare possint.

Obferuationes de sectione venæ.

Gal. 4. de uic. in morb. ac. com. 3, Primum
si expedit in principio fiat: secundum non est
fienda, nisi sui causa fuerit retentio sangui-
nis, uel aliqua plethorica causa, uel inflam-
matio hepatis, &c. Auic. loc. cit. Sectio uenæ
mitanda est, quatenus sit possibile, & si tuum

fit consilium de phlebotomando, minue prius
materias dominantes, &c.

Observationes in attenuantibus
& incidentibus medicinis.

Auic. loc. cit. quatuor habet annotatu di-
gna. Primò, quòd misceatur cum rebus, hepar
& uenter roborentibus. Secundò, quòd
uarianda sunt & mutanda, eò quòd natura
ab eo quòd est consuetū nō patitur. Tertiò, q̃
in puluerē redigantur, ut citius ad parē he-
patis gibbā perueniāt. Quartò, q̃ post eorum
usum iura pingua exhibeamus, ne urinarū
meatus exhauriantur. B. Caue tamen ex hoc
textu, ne decipiaris, quū in omni specie hydro-
pis iura sint suspecta. In puluerem, intellige ut
Gal. crassiusculum. De observationibus circa
uictum, lege fusius Alexan. lib. 3. cap. 30.

Nocentia ac conferentia hydropi.

Nocet hydropi, usus aceti assiduus, bouine
carnes, lentes cum corticibus, mezereō, aloes,
& quicquid hepatis temperiem molestat ac
corrūpit. Cōferunt hydropi absinthium, aga-
ricus, anisum, apium, betonica, calamentū, ca

lamus aromaticus, chamæpirys, chamædrys,
 cācharides, electuariū, cuscute, cichoriū, suc-
 cus radicis ebuli, helleborus, eupatorium, fe-
 niculum, carica, fumus terræ, chebuli, lac asi-
 ninum, caprinum, lactuca limaciæ, meū, me-
 zereon, myrobalani, myrthus, origanum, pasti-
 naca, perdices, petroselinum, prasiū, rheu-
 barbarum, rosmarinus, ruta, sansucus, sambu-
 cus, sinapis, scilla, scenoanthos, urina, hype-
 ricon, hyssopus, iris. Cōposita sunt, unguen-
 tum Agrippæ, confectio alcacangi, dialac-
 ca, diacurcuma, diatrion pipereon, empla-
 strum Aristarchi & Andromachi Mes. pilu-
 la de rheub. de agarico, theriaca, triphera fer-
 ruginea, troc. de lacca, de rheubarbaro, de li-
 gno aloes, unguētum Artanitiæ mag. confectio
 de mezereon, de eupatorio Mes. oleū de cher-
 ua, de mezereon, pilula de mezereon, theria-
 ca, diateffaron, &c.

De prognosticis hydropum.

Hip. aph. 3. aph. 22, Autūno plurimi æstivi
 morbi, febres quartanæ & erraticæ, & aquæ
 inter cutem, &c. Vide Gale. in comment. Et

IN CVR. MORB. LIB. III. 815

aph. 4. aph. 11, Quibus tormina & circa umbilicum dolores, & lumborum dolor, qui neque à medicamento, neque aliter soluitur, in hydropem siccam firmatur. Et aph. 6. aph. 8, Aqua intercute laborantibus ulcera in corpore facta difficulter sanantur. B. Quia exiccare exostulant, sed hoc difficillimum ob humiditatis immoderantiam. Et aphor. 6. aph. 27, Quicumque suppurati, aut aquam intercutem patientes, uruntur aut secantur: si pus aut aqua uniuersum effluxerit, omnes moriuntur. B. Eò quòd natura subitaneas mutationes non tolerat. Et aphor. 6. aphor. 35, Aqua intercutem laborantibus tussis superueniens, malum. B. Intellige, nisi à materia à capite in subiectas partes stillante tussis oriatur: nam si aquosa humiditas adeò excreuerit, ut asperas arterias occupet, periculum de suffocatione imminet. Et apho. 6. apho. 43, Quicumque lienosi difficultate intestinorum capiuntur, superueniente aqua intercute moriuntur. Et aphorif. 7. aphorif. 5, In mania dysenteria aut hydrops, uel mentis alienatio, malum. Et aph. 48. eiusdem lib. Aqua intercute laboras,

816 DE CONSEN. MEDIC.

si à tuſſi habeatur, deſperatus eſt. Et aph. 56. eiusdē, Quibus hepar aqua plenū in omētum eruperit, his uēter aqua repletur & moriūtur. B. Quia effluere ad omentū aqua non poteſt, niſi aliquo modo excedatur, unde mors ſequitur, &c. Et aph. 6. aph. 12, A diuturnis ſanato hæmorrhoidibus: ſi urina non ſeruatur, periculum eſt aquam intercutem uel tabē aduenire. Et ap. 14. eiusdē lib. Ab aqua intercute habito, ſi aqua è uenis in uētreſ defluxerit, ſoluitur morbus. Et prognost. 2 cap. 1, Aqua intercus omnis ſi ex acuto morbo exiſtit, malum eſt: non enim ſedat febrem, ſed dolorem admodum infert ad mortem. B. Eò quòd inuenire remedia, quæ utrique affectioni ualida reſpōdeant, difficillimum eſt. Auic. 14. tra. 4. cap. 3. multa habet prognostica: Primò aſciſes malignior omnibus, deinde hypofarca, deinde tympanitis. Secundò, deterior hydrops illa eſt, quæ fit cum ægitudine acuta & uehementius timenda, quæ homini tēperaturæ calidæ & ſiccæ aduenit: non enim ſine cauſa maxima per contrariū ſuæ cōplexioni ægroat. Tertiò, hydrops ex duritiæ ſplenis magis

salua est, quàm quæ à duritie hepatis prouenit. Quartò, si ex hydrope, dyspnœa, & cōstri-
ctio anhelitus contingat, & solutio uentris,
propinquā mortē in tribus diebus significat.
Quintò, & dicitur quòd quando hydropico
descendit sicut caro, prænūciat mortem eius.
Sextò, & habenti melancholiā resoluitur me-
lancholia, eò quòd hydrops eā humectat. Se-
ptimò, & scias quòd fluxus uētris in hydrope
est mortalis. Octauò, dictum est quòd quādo
in facie hominis, aut in manu eius sinistra
mollities, & in naso pruritus accidit in prin-
cipio, quòd moritur in secunda uel tertia die.
Nonò, & si fuerit apostema durum, tunc non
speretur in sanatione hydropis quæ sequitur
ipsum: nā etsi aqua euacuetur qualibet eua-
cuatione, redit tamen & replet, &c.

Authores dissentientes cir- ca hydropem.

- 1 Adserere, cachexiam non præcedere hy-
dropem quæ paulatim facta sit.
- 2 Adserere, tympaniam ita à frigiditate fie-
ri, sicuti ascitem.

Fff. i.

3 Adserere, hypofarcā esse ascite deteriore.

4 Adserere, in ascite hydrope semper incisionem esse opportunam.

5 Adserere, omne genus lactis in ascite nullo modo competere.

6 Adserere, tussim in hydrope semper esse signum malum.

Confutatio dissentientium circa hydropem.

Ad primū: Auic. 14. ca. 3, Quando corrumpitur digestio hepatis, & antecedit eius debilitas, in primis accidit dispositio ad hydrope antecedēs, quæ uocatur cachexia: sed semper digestio hepatis in qualibet specie hydropis corrumpitur, & antecedit eius debilitas: igitur semper præcedit cachexia. Et hæc opinio confirmatur à Dino, unde maximè decipiuntur, qui contrarium adfirmant.

Ad secūdum: Gal. aph. 4. com. 11, Videtur autem à maiori frigiditate generari aquosus hydrops, quem asciten uocant, à minore tympanias: nam humida substantia in flauosum aërem sine calore aliquo trāsmutari non potest, & sic isti decipiuntur, qui oppositum

struunt, &c.

Ad tertium: Auic. 14. cap. 3, Ascites est malignior omnibus, &c. Præterea illa species est deterior, quæ causas & symptomata seuissimam habet: sed ascites est huiusmodi, cum adsit sitis uehemens, grauitas, suffocatio & syncope: igitur erit hyposarca deterior, &c.

Ad quartum: Conciliator diff. 199, refert ex Gal. neminem uidisse ex incisione liberatum. Præterea Auic. loc. cit. de incisione myrach, Scias, inquit, quod parum proficit, nisi in corpore forti ualde, quando potens est tollerare sitim & minorationem cibi. Vnde non oportet ut audeat fieri, dum possibilis est alia cura, &c. imò, ut refert Conciliator, plerique ex hac incisione moriuntur.

Ad quintum: Auic. loc. cit. Non respicias ad illud quod dicitur in ipso, ex hoc quod decipiuntur sophistæ, quod natura lactis est contraria hydropi: imò scias quod hoc medicamen est iuuatiuum per illud quod est in eo de abstersione, & est conueniens per id quod est in eo de proprietate. Et paulò infra, Et scias quod lac camelarum & caprarum Ars

Eff. 4.

bicarum est uehementis iuuamenti, &c.

Ad sextum, Gal. aph. 6. com. 35, Neque enim quū ex alia sit occasione, in homine a-
quam intercutē patienē, tussis est signum exi-
tiale, sed quando ex ipsius morbi ratione, &
sic non est perniciosum signum.

De leuitate intestinorum, id est lienteria.

Leuitas intestinorū, quæ λιεντερία à Græ-
cis dicitur, est celerrima ciborum expulsio, in
qua nulla alteratricis facultatis actio cerni-
tur, sed tales cibi quales deuorati sunt secer-
nuntur.

Loci consentientes de leui- tate intestinorum.

Galen. aphor. 6. comment. 1, Leuitas inte-
stinorum est uelox exitus eorum quæ come-
duntur ac bibuntur, quæ talia deiciuntur,
qualia deuorata fuere, quibus egredienti-
bus nulla mutatio alteratricis facultatis in-
uenitur, siue in qualitate, siue consistentia, co-
lore & odore, &c. Lege de hac re Gordonij
definitionem & aliorum neotericorum.

De causis leuitatis intestinorum.

Causæ procatartica ipsius lienteriae sunt cibi, potus, & pharmaca secundum qualitatem, quantitatem, & ordinem uentriculum infestantia, inter quæ aer quoque humidus connumeratur.

Causa antecedentes & coniunctæ sunt mala stomachi intemperies, humores uel nimium frigidi, uel mordaces, flatu quoque non sinens stomacho cibum inhaerere, unde putrefit & expellitur. Item ulcera, abscessus, & similia dolorem stomacho inferentia, siue per se, siue per aliorum morborum consensum, ita quod nec uentriculus ciborum contactum toleret, unde facultas expultrix ad id expellendum irritatur. Item stomachi ac intestinorum imbecillitas, ex qua retinere contenta ne exiguo quidem tempore possunt, sed illico, perinde ac si graue aliquod onus deponerent, ea secernunt, &c.

Loci de causis.

Galen. apho. 6. com. 1, Causa leuitatis intestinorum est triplex: quarum prima est mala retractoris facultatis stomachi intemperies: secunda fit ab humorum mordacitate superfi-

Fff. iij.

ciem uētriculi exulcerāre: quare cibi & potus quum ad locū ulceratū perueniūt, membrū illos continere non potēs, absque coctione illos deiecit. Tercia est, quū pituita in uentriculo continetur, quæ cibū & potū extra uentriculū & intestina lubricare facit, &c. Itidē adserit aphor. 4. cōment. 12. Auic. 16. tra. 1. cap. 2. præter causas assignatas enumerat etiā solutiuarū medicinarū impressionē in superficie intestinorū & stomachi. Itē imbecillitatē digestionis, quæ deficiente cibus corrūpitur & expellitur. Itē catarrhū cibū corrūpentē, itē ciborū malā qualitātē, quantitātē, malitiā sui ordinis, artificiū, & denique uērositatem & inflationē. lege etiā Auic. 13. cap. de lubricitate stomachi. Itē Gal. 6. de sympt. cau. cap. 1. Itē 1. de loc. aff. cap. 3. Item 6. de sympt. cau. cap. 2. ubi de nausea loquitur. Itē 6. de loc. aff. cap. 1. ibi, Sunt quædam accidentia, quæ haud absurdē intestinis & uētriculo simul affectis euenire credūtur, ut lenteria. Vide etiam Paul. lib. 3. cap. 4. Item Marcū Cat. qui omnes causas ad octogenerium numerum reducit, cap. de Lienteria.

De signis leuitatis intestinorū.

Signa in genere sunt exitus cibi & potus indigesti, dolor in regione stomachi, & agritudo eius precedēs, sicut nausea, subuersio, uomitus: & hic fluxus ordinē non habet, sed quādo cūque cib⁹ sumitur, egreditur, &c. Signa si à medicamine fiat, sunt, dolor & mordacitas stomachi, præcessit pharmacū, & statim sequutus est fluxus, sapor etiam testatur pharmacū, &c. Signa intēperiei frigida & humida sunt albedo faciei & lingua, paucitas sitis, tarda digestio, multitudo sputi, non adest grauitas uel nausea stomachi, & existēte pituita adest dolor stomachi, acetosa eructatio, læditur à frigidis, nausea adest & uomitus. Signa intēperiei calida sunt, oris amritudo, sitis, uomitus frequēs, bilis, sapor amarus, & humores calidi per secessum emittuntur, &c. Signa ulcerum sunt uomitus saniei, eructatio, pus redolens, dolor, &c. Signa apostematis sunt, tumor, durities, grauitas, assiduus dolor, febris continua, &c. Signa flatus sunt, quum sentitur flatuosus morus, dolor modò unā, modò alteram stomachi partē

Fff. iij.

molestat, iuuantur si crepitum uel ructum emittant. Signa imbecillitatis facultatum sunt, si imbecillus sit digestiua, egreditur cibus sine digestionem, si retentrix uel expultrix, egreditur uelociter. Signa interstinguencia lienteriam stomachi & intestinorum sunt, quia lienteria intestinorum, id est cæliaca passio habet cibum satis bene educitū, dolor est in intestinis, & præcessit ægritudo intestinorū: & econuerso, si fuerit stomachi, &c.

Locī consentientes de signis
leuitatis intestinorum.

Paul. lib. 3. cap. 40, Verū in utroque leuitatis genere celerius quā in cæliacis, quæ assumpta egerūtur, tamque intensa est cruditas, ut alimenti assumpti genus cognoscatur, &c. Lege de his signis Auic. 16. tra. 1. cap. 3. ibi, Fluxus stomachicus non habet ordinem neque horas, in quibus per seipsum crescat, immò est secundum regimen: nam si digestiua est debilis, egreditur sine digestionem: si retentrix & expulsiua debilis, egreditur uelociter, &c. lege eum fusius de alijs signis. Itē Arcul. & Gord. & Mar. Car. qui breuiter omnia

lienteria signa exponit: lege etiam alios ne-
sericos.

De cura leuitatis intestinorum.

Consideranda est in primis a qua causa
hic morbus proueniat: nam si ex parte cibi
corrupti, tunc uentrē soluere uel uomitū pro-
uocare utile est. Si uerò ex nimia cibi quan-
titate assumpta fiat, tunc facta euacuatione
paucus cibus exhibeatur, deinde mala sto-
machi complexio corrigatur: si autem causa
fuerit nimia humiditas in uentriculo conten-
ta, tunc medendi insurgunt quatuor inten-
tiones. Prima erit circa uictum: nam cibari-
di sunt ex chondro, oriza & pane, cum ali-
quibus adstringentibus, ut malis punicis, py-
ris, malis cydonijs, uel diacironite: conueniunt
etiam testes gallinacei & pisces saxatiles,
&c. 2. Intentio est humoris frigidi præpa-
ratio cum rhodomelle, sy. de menta, de absin-
thio, cum decoctis uel aquis mentæ, absinthij.
3. Intentio est euacuatio, quæ fit per solutio-
nem uentris, ac per uomitum, maximè mate-
ria in suprema parte uentriculi contenta,
cum pilulis aleophraginis, masticinis, & de

326 DE CONSEN. MEDIC.

hiera simpl. diaphinicone & diacitonite solutino. 4. Intentio est uentriculi roboratio, ac discrasia derelictae ablatio: & perficitur cum exterioribus unguentis calefacientibus, ac stypticitatē in se habentibus, quale est oleū de spica, de absinthio, de mastice, de menta, de citonys, item cum emplastris & ceratis eandem uim seruātibus, ex menta, absinthio, rosis, scenoantho, spica, balustys, galanga, ciperro, &c. Roboramus etiam cum interioribus electuarijs adhibitis, quale est aromaticum ros. diaciminū, diagalanga, diacitoniten cum speciebus & zacharo. Si uerō causa fuerit materia calida, uictus & regimē declinet ad frigidū: digestio fiat cum syr. ros. de granatis, de cydonys, de myrtho. Euacuatio, cum rheubar. aloe lota, hiera simpl. Robur denique indimus, ac malam derelictam intemperiem remouemus cum zacharo ros. diarrhodonē Abb. cōfectione de tribus sandalis, &c. Si uerō causa fuerit ulcus, primò oportet abstergere, deinde cōsolidare, utputa cum rhodomelle, abstergere & conglutinare cum bolo armeno, &c. Si causa fuerit uerositas, pri-

mum fiat euacuatio ac digestio, praesertim si materia fouens sit, deinde resoluetur cum electuario de bacca lauri, uel fomero, uel unguentis & emplastris ex rebus calidis stomacho conferentibus, &c.

Loci consentientes de cura
leuitatis intestinorum.

Mar. Cat. Cura uariatur secundum uarietatem causarum, &c.

Gal. 8. meth. ca. 5, Cibadi sunt fluere adhuc uentre ex polenta & pane, quem Graeci oxylipe uocant, qui minimum aceti habeat: inspergere tamen poleram debebis, ubi scilicet uenter adhuc plus iusto excernit, uel mali punici, uel pyrorum, uel malorum succo citoniorum: si amplius uenter non excernit, sufficit alica ad modum prisanae preparata, hoc est, aceti habens pauxillum, similiter gallinacei testiculi, saxatiles ex albo iuxta pisces, & fructuum aliquis ex his qui adstringunt. Lege de his cibis Paul. A Eg. lib. 3. cap. 40. ibi, Si biliosa sit deiectio, &c.

Lege etiam Auic. 13. tra. 5. cap. 7. ibi, Et sic cib⁹, &c. Vide etiam Gal. in lib. de san. tuen-

828 DE CONSE N. MEDIC.

da, &c. De cura mala cōplexionis plura habes etiam ex ipso Auic. in loc. cit. ibi, Quod si causa fuerit ex frigore, cū calefactiuus curētur ebibitis: & si illic fuerit materia, euacuetur, & administretur uomitus in omni septimana: & si fuerit malitia cōplexionis calida cū materia, oportet ut educatur humor cū facilitate, &c. lege fusius, & omnem curam intelliges. Lege etiam Arcul. 9. almans, & ipsum Aet lib. 9. cap. 51. Item Auic. 16. tra. 2. cap. 2. de fluxu stomachi lubricatiuo, &c.

Obseruationes in cura.

Marc. Cat. cap. de lien. Medicinæ soluentes sint quæ à lōginquo non attrahant. Auic. 16. tra. 2. cap. 2, In quibus non sunt ulcera, fac ut permisceas styptica fortis stypticis, cum medicinis calefactiuis in potu & in emplastris, & utantur medicinis naturam iuuuantibus & confortantibus spiritum, ut chiriaca magna, &c.

Conferentia leuitati intestinorum.

Conferūt lienterie, fœtus ex balauſtijs, radix bedegar, castanea, cupressus, aqua uel

uinum extinctionis ferri, sex uini cum aqua
myrthi : cataplasmetur fraxinus, charabe,
licium, lini semen, margarita, ossifraga, ani-
sum, polygonum, hypocystis, zingiber. Comp.
athanasia Nic. diacironiten Nic. mitrida-
tum Nic. cum decocto balaustiarum, miua,
michlera, pilula styptica Nic. electuarium
inventionis nostrae, Mes. electuarium de myr-
tho, Mes. sufus de myrtho Mes. confectio de
seminibus Mes. pedes constringere, manus in
feruentem aquam mittere.

De prognosticis leuitatis intestinatorum.

Hippoc. aphor. 4 aphor. 12, Quorum alii
intestinatorum leuitare laborant, hyberno tem-
pore supra purgari malum, &c.

Et aphor. 6. aphor. 1, In longis leuitatibus
intestinatorum si ructus acidus fiat, qui prius
non erat, signum bonum.

Auic. 16. tra. 1 cap. de causis fluxus, Lien-
teris quae fit propter complexionem frigi-
dam & humidam est ducens sua longitudi-
ne ad hydropem, & est in summo difficilis cu-
rationis, quum confirmatur. 2. Facta à uirtu-

830 DE CONSEN. MEDIC.

re medicinarum soluentium interdum perducit ad dysenteriam & ulcera intestinorum. 3. Inquit Hippoc. quòd omnis fluxus uentris post aegritudinem subito est malus, significans mortē propinquam. 4. Et singulus cum accidit habentibus fluxum uētri, est significatio mala, significās siccitatē facientē arefactionē. 5. Et Hippoc. dixit, quòd habentibus lubricitatem intestinorum uomitus est malus, & iudicium occultam habet causam, &c. Hercules cap. de lien. Succedēs fluxibus antiquis, & ad chronicas aegritudines mortalis. Et perseverans ex debilitate consentiua perducit ad hydropem siccam, & tandem ad mortem, &c.

Authores dissentientes circa leuitatem intesti- norum.

1 Adserere cum Erasistrato, muscosa & sanguinolenta cum crudis excrementis excerni.

2 Adserere, non posse inueniri lienteris speciem, in qua semper adsint acidi ructus.

Confutatio dissentientium
circa leuitatem inte-
stinorum.

Ad primum: Gal. aphor. 6. commēt. 1, Hæc
Erasistratus inquit, nescio qua ductus opi-
nionē, adijciens crudis excrementis muscosa
ac sanguinolenta: hoc enim nullus apposuit,
neque eorum qui eius ætate claruerunt medi-
corū, neque eorum qui posterius fuerūt, &c.

Ad secundum: Gal. eodem cōment. Quacū-
que à pituita uentriculū refrigerāte fiūt leui-
tates intestinorū, semper cū ipsis sunt acidi
ructus, ut casus quidā, & sic species liēteria
inuenitur, in qua adsunt isti ructus acidi.

De dysenteria.

Quæ à Græcis δυστερία dicitur, Latini
difficultatē intestinorū, seu tormina uocāt.
Est autē dysenteria flux⁹ uētris sanguinolē⁹
cum excoriatione & ulcere intestinorū, &c.

Loci cōsentientes de dysenteria.

Gal. lib. fin. med. Dysenteria est intestino-
rum ulceratio cum phlegmone & cruento-
rum faciūque similiū strigmentorum secretio-
ne, non sine alui intestinorūque morfu ac

832 DE CONSEN. MEDIC.

cruciatus. Lege etiam Gal. 6. de loc. aff. cap. 1. ibi, Sane in presentia nomē dysenteria, &c. Paul. lib. 3. cap. 42, δυσεντερία ἐλκοσίς ἐστι τῶν ἐντέρων. Lege etiam Aet. ser. 9. cap. 43.

De causis dysenteria.

Hic affectus uel per se, uel per consensum fieri potest. Per se uel ab externa uel ab interna causa orietur. Ab externa, sicut à frigidityte, ardore, uenenatorum pharmacorum potu, & ab acris cibis, &c. Ab interna, sicut ab humoribus acris paulatim erodentibus, sicut à bile, pituita salsa, ab atra bile, exusta, uel ab aliquo abscessu abrupto. Per consensum fit totius, ut in fine febrium, uel parietis, sicut à crassioribus intestinis, à meseraicis, à gracilioribus, hepate, &c.

Loci consentientes de causis dysenteria.

Auic. 16. tra. 1. cap. 2, Et excoriatio est dolor abrasionis ex superficie intestinorum, quæ aut est à materia cholericæ, uel sanguineæ acutæ, aut uirulentæ, aut saniosa, &c. lege

fufius hunc locum. Gal. aphor. 6. comment. 3, Difficultates intestinorū fiunt ex humoribus acris intestinorū, summa primū infestantibus, deinde progressu temporis se profundentibus, ita ut ulcera putrilagini obnoxia, uentriculo etiam cōpatiēte efficiātur, &c. Vide etiam Gal. 5. de loc. aff. cap. ult. Itē 1. de loc. aff. cap. 2. Vbi demonstrat quòd affectus à quapiā causa ortus, non semper remota causa remoueatur, sed permanentē habeat dispositionem, afferens de dysenteria exemplum. Hippoc. aphor. 4 aphor. 11, Quibus tormina & circa umbilicū dolores, &c. Galenus tormina fieri inquit uel propter morsum uehementem, uel spiritum flatuosum qui non habet exitum. B. Nota tamen, quòd tormina siue σποφοι non semper pro dysenteria accipiuntur, sed pro intestinorum torminibus, qui à mordacitate humorum, uel à spiritu flatuoso fieri solent, ut testatur Gal. aph. 5 com 41.

De signis dysenteriae.

Signa dysenteriae sunt dolor, uentris punctio, & frequens assellatio, in qua frust. intestinorum cernuntur. Signa ulceris sunt sa-
Ggg. i.

nies exiens, excoriatio, & foetidus odor. Locus ulceris pluribus modis cognoscitur, primum ex dolore supra uel infra umbilicum existente: nam in superioribus dolor magis uehemens est, quàm in inferioribus: præterea uomitus, nausea, & singultus interdum uentriculo ex consensu patiente fiunt. Cognoscitur etiam ex corticibus intestinorum exeuntibus: nam tenues & parui ex gracilibus, crassius uerò & lati ex crassis intestinis descendunt. Cognoscitur etiam ex tempore: nam quum inter dolorem & assellationem prolixum est tempus, tunc ex gracilibus: si breue, ex crassis. Cognoscitur etiam ex qualitate eius quod egreditur: nam à superioribus proveniens est magis foetidum, & sæpenumero loturæ carnis simile. At quod ab inferioribus intestinis prouenit, ex dolore infra umbilicum, & ex sanguine, & sanie ante faeces exeunte cognoscitur. Vlcus plurimæ sordis esse deprehenditur à longa ægritudine, & à quantitate eius quod egeritur, & ex dolore non sensato. Vlcus sordidum à corrosiuo secernitur ex uirulentia, aquositate albida, odore graui: ac

corrosiuū est uehemētis doloris factorisq; colore ad nigredinē uergēte. Signa ulceris profundi sunt sanguis plurimus exiēs post abrasionē intestinorū, itē agritudo uehemēs, &c.

· Loci consentientes de signis dysenteria.

Gal. 6. de loc. aff. cap. 1, Dysenteria non statim fieri solet, sed protinus ab ipsius initio bilis mordax secernitur, quū deinde interaneorū abrasiones sequuntur, postea paululum cruoris simul excerni uidetur, quādo affectus ipse in dysenteria esse censetur. Considerandū insuper num per se sola abrasiones exeant, aut simul cum quopiā pingui excernatur, quia tunc indicium est in crassis intestinis ulcus cōsistere, &c. lege hunc locum fusius, & omnia signa intelliges. Lege etiam Gal. primo de loc. aff. cap. 1. ubi pro exemplo inquit, Quum intestini tunicam per dysenteriam deiectā cōspexeris, &c. Vide etiā Gal. 5. de loc. aff. cap. ult. Item lege Auic. 16. cap. 3. ibi, Communia signa sunt dolor, punctura & alchurati, & quod ulcera cognoscuntur per excoriationem, odorem foetidum &

Ggg. ij.

per alchurati, id est abrasiones intestinorū,
 ꝛc. Lege fusius hunc locū, ꝛ inuenies quæ-
 cunque à me sub breuitate recitata sunt. lege
 etiam Arcul. ꝛ Act. ser. 9. cap. 43. ibi, Si cir-
 ca intestina crassa ulceratio contingat, ꝛc.

De cura dysenterix.

Requiruntur in cura dysenteria quatuor
 intentiones: prima circa regimen, unde si ul-
 ceratio intestinorū à causa calida pendeat,
 cibaria ꝛ aër ad frigidum alteranda erunt:
 unde comeduntur ona sorbilia, hepar gallina-
 rum, sorbitiones frumentaceæ, ꝛ permitten-
 tibus febribus etiam lac, oriza, dulciarij pa-
 nes, amyllum, ꝛ quæcūque humores obducunt
 ꝛ spissant, ꝛ quæ corpora laxata ꝛ ra-
 refacta adstringunt ꝛ siccant, ut pulres ex
 alica, ex oriza, milio, ꝛc. conceditur inter-
 dum ob stomachi imbecillitatem uinum, cæ-
 terum aqua pluuialis frigida aliàs conuenit.
 Secunda intentio uersatur circa causam ex-
 coriationis, quæ si fuerit à biliosa materia,
 primum humores, deinde abrasiones, demum
 sanguinem educere, statim non expectata di-
 gestione, euacuanda erit, cū myrobalanis citri-

nis & rheubarbaro nō usto ut aliqui, & facta aliquali euacuatione, tunc materiā præparamus cum syr. ros. de citonijs, de endiuia, myrthino cū aquis endiuia, plantaginis, acetosæ rosaceæ, &c. & facta digestionē iterum euacuamus cū rheub. Et pro roborando hepate epithema paramus cum sandalus, rosis, aqua endiuia, rosarum, spodio, &c. Deinde styptica exhibēda sunt. Si uerò causa fuerit sanguis ultra iā prædicta, uena secetur. Tertia intentio est circa excoriationem: quæ si fuerit sine ulcere, tunc lauare & conglutinare opus est. Lauamus cū aqua hordei, uitel-
lis ouorū, & racharo rubeo per clysterem infusis. Cōglutinamus quotiēscūque in profundo non est immersa excoriatio, sed tantū superiores partes attingit: & hoc fit cū albumine ouorū, gūmi Arabico, adipe renū caprarū, oleo rosaceo, cum bolo armenio, dragacanto, brodio pingui, uel cum aqua hordei, si lauare simul ac conglutinare quærimus, omnia per clysterem infusa. Si uerò excoriatio cum ulcere iuncta sit, tūc duplex erit intentio, quarū prima erit abstergere ac mū-

Ggg.iiij.

838 DE CONSEN. MEDIC.

dificare, secunda consolidare. Mundificamus
 cum decocto furfurum frumēti, uel aqua mel-
 lis, iure cicerum rub. aqua lactis, urina, lixi-
 uio dulci, uino rub. rhodomelle, uel decocto
 piscium salitorum & oliuarum, demum cum
 decocto, troc. de arsenico, &c. Consolidamus
 postea cum rebus stypticis, quale est decoctū
 lentii, rosarū, balauftiarū, cor. granatorum,
 sumach, coriandrorū: & addimus boli arme-
 ni, sanguinis draconis, terræ sigillatæ, thuris
 an. 3. i. ouorum binos uitellos, ut clystere ma-
 gis intestinis adhareat. Quarta intentio est
 fluxus cohibitio, ne ex superfluo fluxu uirtus
 prosternatur. Idcirco intrinsecus conueniunt
 syru. ros. de citonijs, de granatis, troc. de spo-
 dio cū semine acetosæ, zucharū ros. trias an-
 dali, myua citoniorū cum corallis, spodio, san-
 dalis, &c. quæ nisi profuerint, ad narcotica
 procedendum, ut cum aithanasia, phylonio
 Romano, uel cū suppositoio ex licitio, quod
 filo complicandum est, ut cū lubeat, possit
 extrahi. Extrinsecus autem profunt linimen-
 ta ex oleo myrtheo, masticino, uel de citonijs,
 cum aliquo puluere styptico, uel emplastro

de diaphinicone Mes. Proderit etiam suffu-
migium siue lauacrum ex uino rub. in quo
styptica aliqua incocta sint, lauando ma-
nus & pedes, uel fumum in ferro recipien-
dum, ferro continuè in dicto uino excande-
scente, &c.

Loci consentientes de cu-
ra dysenteriae.

Paul. lib. 3. cap. 42, Alimentum erit per
initia, oua ex lacte, sorbitiones frumenta-
ceae per se & cum lacte, lac mediocriter
coctum, holera non sunt necessaria, gusta-
re tamen possunt endiuia coctam, inrybum
& arnoglossum, &c. poma adstringentia, dū-
modo carnes reijciantur, cruda esui danda,
& aqua potioni frigida, sitque coelestis, &
laso stomacho uinum propinandū, &c. B. le-
ge Auicen. 16. tra. 1. cap. 4. ibi, Ex cibarijs
eligat frigida & facientia conglutinationem,
&c. & 16. tra. 2. cap. 7. ibi, Et cū uolueris
cibare, &c. Lege etiam fusijs Aet. ser. 9.
cap. 43. & intelliges sigillatim quacūque ad
Ggg. iiij.

nictum pertinent, &c. De secunda intentione loquitur Auic. 16. Tract. 2. cap. 7. ibi, Oportet te considerare quæ sit dispositio causæ facientis excoriationem & ulcera intestinorum, & an fiat uel facta sit à ruptura, à repletionem, ab apostemate: & si fiat, prepara in abscindendo eam & constringendo ipsam: & si fuerit necessaria euacuatio propter malitiā humoris fluentis, fac eam cum timore & cautela, &c. Galen. 12 meth. cap. 2, At sanguinis missio, quæ scilicet uires non deiecit, symptoma spectantis medici opus non est, sed eius qui totum affectum adimere studet. B. Intellige, si intoto fuerit repletio, aut si in causa fuerit iecur sanguinem multiplicans, uel sanguis hemorrhoidarum uel menstruorum retentus, &c. Auic. loc. cit. Et rheubarbaro inest proprietas mirabilis in ulceribus intestinorum, & fluxu excoriatiuo, & propriè quando datur in potu cum aqua arnoglossæ & pauco uino, &c. Lege Auic. loc. cit. cap. 3. de cura ulcerosi, ibi, Et multotiens sanat, &c. & habebis multa pro secunda intentione. Gal. 6 de loc. aff. cap. 1, Si in

superioribus intestinis fuerit ulcus, ab epotis
 medicamentis petendum est praesidium: si ue-
 rò in humilioribus, clysterem submittere ma-
 gis conuenit. B. Hoc idem sentit Auic. loc. cit.
 ibi, Oportet ut cures id quod est in supe-
 rioribus intestinis, &c. De tertia intentione
 loquitur fusius Auic. 16. Tra. 2. cap. 7. ibi, Et
 non cures in corrosione, nisi de medicinis con-
 ferentibus corrosioni, ut sunt mundificatiua,
 abstersiua cum exiccatione & stypticitate:
 & quum sciueris quod ulcera sunt sordida,
 mundifica cum eis quae sunt aqua mellis, &
 fortior aqua salis, aqua oliuarum salita:
 & si necesse fuerit, administra tro. de Arse-
 nico, &c. Lege Gal. 5. meth. cap. 1. ubi me-
 thodum sanandi ulcera demonstrat, quam
 non inutile foret, si ad hunc locum transfer-
 res. Vide etiam 12. meth. cap. 1. ubi habet du-
 plicem curandi uiam, quarum altera uacat
 symptomati, altera penitus morbo: lege locum
 fusius, lege etiam de hac re Arcul. & Sauo.

De 4. intentione loquitur Auic. eodem in
 loco, ibi, Et quando non cessat dolor, tunc se-
 deat infirmus in cinna, in cuius aqua deco-

Etia sint styptica cum aliquanto anethi, fœnus
graci & althea: & si adeò fortis fiat, ut ap-
propinquet syncopis, non erit excusatio nar-
coticorum, &c. lege de his Marc. Cat. Gord.
& Matthæum de Grado, &c.

Observationes circa victum.

Auic. 16. tra. 1. cap. 4, In cibis eorū oportet ut non sit mordicatio, nec salsedo plurima, nec acetositas plurima nociua quæ virtutem expulsiuam moueant: quantitas cibi sit pauca. Secundò, cibaria sint actū frigida non sumat in potu nisi infrigidatum: nam frigidum constringit, tepidum uerò resoluit. Tertiò, & rectius est, ut non comedant cibos plurium specierum. Quartò, & scias quid dormire est ex rebus magis iuuatiuis. Quintò, & si cum fluxu fuerit tussis, dimittat id in quo est acetositas uehemens & stypticitas, &c.

Observationes circa pharmaca & syrupos.

Marcus Cat. Non exhibeantur solutius quæ noceant loco ulcerato, ut scamoniata. Auic. loc. cit. Cūque administras medici-

nas, tunc incipe cum singularibus: si uerò non ualent, tunc tende ad composita. Et sint restrictiua, aut exiccatiua, aut constipatiua, aut infrigidatiua, aut conglutinatiua, &c. Et non oportet ut sit superfluitas in assatione eorum, ne liquefiat eorum uirtus. B. Ex his intellige, quòd noua non sit opinio de non urendo rheubarbaro, sicuti plures existimarunt, sed Auicenna, &c.

Obseruationes circa
narcotica.

Auic. loc. cit. In narcoticis est timor, licet quādoque accidat, ut sint necessaria, & non oportet ut administrentur, quandiu ab eis excusatio esse potest. Et quando necessaria est administratio, non exhibeantur eis quorum infrigidatur corpus, & debilitatur uirtus, & id apparet in pulsu, &c. Hoc idē adserit Alex. lib. 3. cap. 10. ubi de præpostero medicorum imperitorum iudicio facit mentionem Auicen. Et ex regimine clysteriorum est, ut clyster fiat paulatim per uices, & pingua clysteria sedant dolorem ulcers corrosiui, sed non sanant.

Observationes circa
curationem.

Auic. 14. cap. 15, Nullus creticus fluxus cohibendus est, nisi superfluous fuerit, quia tunc à natura non regulatur, sed à multitudine humorum, uel ab eorum acredine provenit. Item nullus fluxus est constringendus, ni primum materiam peccantem euacuaueris, uel saltem minoraueris. Item fluxus diuersorum colorum nunquam cohibendus, quia multitudinem humorum ac diuersitatem significat, si uirtus tolerauerit. Item infirmus nō adeat sedem, quotiens molestatur, sed retineat, &c.

Conferentia dysenteriae.

Simplicia frigida ad dysenteriam conferentia sunt, acatia, hypocystis, balaustia, galla, gūmi Arab. lutum Armenum, spodiū, granata, sumach, berberis, acetosa, portulaca semen, coriandrū, plātago, rosa, myrthus, mora immatura, citonium, glans, aqua chalybeata, camphora, lithargyrium, panicum, milium, phlomos, nenuphar, cornu cerui ustū, pyra pōtica, papauer, lapis hematites, sanguis draconis, charaba, agresta, bleta nigra, corallus,

MEDIC.
INCVR. MORB. LIB. III. 845

corigiola, dragacantum, lactuca, licium, lentes, mespila, hordeum, opium, partes animalium, semperuina, &c. Composita frigida sunt rhob de ribes, de berberis, de citonijs, troc. de charabe, de terra sigillata, de spodio, emplastrum diaphiniconis Mes. electuarium de sorbis, michleræ, diacitonites, diarrhodon Nic. & acharum ros. triasandali, manus christi, parlatum, &c. Simplicia calida sunt uinum nigrum, stypticum, chalybeatum, thus, ciminũ, anisum, cortex citri, colophonia, laudanum, caseus, coagula, nuclei dactylorum, oriza, acorus, althea, aqua piscium salforum, butyrũ, bitumen Iudaicum, caro leporis, charta combusta in clysteri, cypressus, fenugracum, lignum aloes, mastix, rheubarbarum, adeps caprina, hircina, arietina. Composita sunt theriaca antiqua, & phylonium, arhanasia magna Mes. & Nic. troc. de eupatorio, &c.

De prognosticis dysenteria.

Hip. aph. 4. aph. 24, Difficultas intestinorũ si ab atra bile inceperit, lehalis est. B. Quia nihil ab ulcerato cæcro differt, uel quia nullũ

pharmacum illi continuo adhaerere potest. Pro expositione aphor. huius lege 22. aphor. ibi, Deiectiones nigrae, &c. usque ad 24. Et aphor. 4. aphor. 26, Aⁿ difficultate intestinorum habito si ueluti carunculae exeant, lethale est. B. Quia carnem in his concreescere uel cicatricem induci non speramus. Nota tamen, quod dysenteria habet triplicem differentiam. Prima, quum pinguia quaedam corpora excernuntur. 2. quum ex superficie intestinorum interiore quaedam rameta exeunt. 3. quum intestinorum substantia abraditur, & haec est incurabilis, &c. Hippoc. aph. 6. aph. 3, In longis difficultatibus intestinorum inedia ex fastidio malum, & cum febre peius. B. Intellige si accidat in processu morbi: nam dictum est aph. 7. aph. 6, In morbo diuturno fastidium cibi malum. Et aphor. 6. aphor. 43, Quicumque lienosi difficultate intestinorum capiuntur, uis superueniente longa difficultate intestinorum, aut aqua intercute, aut leuitate intestinorum, moriuntur. Et aph. 2. aph. 10, In profluuijs alui mutationes excrementorum iuuat, nisi ad mala mutatio fiat, &c. Et aph. 5.

aph. 34, Mulieri uterū gerenti si aluus plurimū profluat, periculū est ne abortiatur. Et aph. 6. aph. 48, Lienosis difficultas intestinorū aut dysenteria superueniens, bonum. Et aph. 7. aph. 5, A' furore difficultas intestinorū bonū. B. Ratione trāsmutationis, quū à capite ad inferiora humores noxi trāfferantur. Et aph. 7. aph. 24, A' deiectione sincera difficultas intestinorū malū. lege etiā aph. 30. lib. 7. ibi, Quibus in alui profluuijs excrementa spumosa sunt, &c. Aet. ser. 9. cap. 43, Dysenteria in colo aut recto cōsistens, facile curatur: quæ uerò in tenuib⁹ intestinis, maximè in ieiuno, difficile. Secūdò, quæ post abscessuū eruptiones fiunt, graves sunt: & quæ cū inflāmatione oboriuntur, & quæ cum febre & apperitus perditione, pessimæ, quæ pori aspectum habent, sūntque nigra, plurima graueolentia: & quæ unā cum excrementis pelliculus cum sordibus mixtis emittunt. Tertiò magis in his deficiunt mulieres quàm uiri, magis senes & pueri quàm iuuenes, &c. Auic. 16. tract. 1. ca. 2, Primū magna effusio sanguinis puri post dysenteriam ualde mala, quia ad intima

adeò penetrarunt ulcera, ut uenæ scindantur. Secundum, ulcera intestinorum perducunt ad hydropem. Tertium, conuulsio, uomitus, singultus & conturbatio rationis post dysenteriam, mortem significant. Quartum, in lib. Hippoc. Qui habet dysenteriam, & apparet post eius aurem sinistram ueluti res nigra similis orobo cum uehementi siti, moritur in decima, & non tardatur, nec euadit, &c.

Authores dissentientes circa dysenteriam.

- 1 Adserere, omnem uehementem fluxum in principio morbi factum, esse compescendum.
- 2 Adserere, dysenteriam à sanguine deterioris esse curæ, quàm à bile.
- 3 Adserere, dysenteriam ab atra bile semper esse lethalem.

Confutatio dissentientium circa dysenteriam.

Ad primum, Damascenus in aphor. Si quis per multum tempus neque uomitus, neque solutionem uentris habuit, & ei subito eueniet, uidendum ne restringere festines, quia huic corpus prauis expurgatur humoribus, unde

Auic. 16. tertij dixit, fluxum fluxu curari: uerum si imbecillitas uirium ex fluxu fieret, esset restringendus. uide Concil. differ. 200.

Ad secundum dicimus, quod deterioris curæ est dysenteria ab atra bile: nam Gal. 4. aphor. commet. 24, Quæ ab atra bile fit, insanabilis est: deinde quæ à bile & à pituita salsa, deinde quæ à sanguine.

Obiectio.

Auic. ponit deteriore esse, quæ est per adustionem cholerae amaræ, quàm nigræ: itidem Haly. Abb. in sua praxi, Quomodo igitur deteriore dicis, quæ ab atra bile fit?

Responsio.

Dico quod ratione subitæ impressionis deterior est quæ à bile adusta fit, sed ratione eradicationis deterior est quæ fit ab atra bile. De hac re lege Concil. differentia 101.

Ad tertium respondet Gal. aph. 6. comm. 43. quod qui durum habent lienem, ijs superueniens dysenteria soluit dispositionem. Quare si atra bilis aliunde prouenerit, nec fixam ac permanentem causam in intestinis habuerit, salubris est & non lethalis: & hanc solutionem habet.

Hhh. i.

bes ab Auic. 3. can. cap. de solutione uentris
omniū modorū, & sic nō est semper lethalis.

De fluxibus hepaticis.

Omnis fluxus, qui uitio hepatis accidit,
hepaticus solet appellari, & eius species sunt
nouem, ut chylosa, pituitosa, biliosa, atrabi-
laris, sanguinea, lotiua, foetida, uirulenta, &
ultima, quando caro hepatis nigra & crassa
expellitur. Chylosa est, quando pars chyli uel
totus chylus egreditur, & hoc uitio hepatis
& non uentriculi. Pituitosa duplex: altera à
crassiori pituita, altera ab aquosa. Biliosa
uerò etiam uaria & multiplex est iuxta bilis
species, sicut flaua, uitellina, prasina, erugi-
nosa, &c. Atrabilaris similiter fluxus niger
est, sicuti sanguis niger, aut nigri uini fæx,
aut melancholiæ per adustionē bilis genitæ,
aut melancholiæ naturalis, uel per adustio-
nem præter naturam genitæ. Sanguinea, quā
cruentam uocat Gal. interdum retinet pro-
prium colorem, interdum niger est sanguis,
interdum paucus aut multus, interdum con-
tinuus & interpolatus. Lotiua uerò est flu-
xus rei aquosæ, quæ cedit ad colorem rubeū,

IN CVR. MOR. LIB. III. 851

Est sicuti carnis recētis lotura. Fœtida est fluxus rei fœtētis, siue sit humor, siue sanies, siue hepatis substantia corrupta. Virulenta est fluxus rei subtilis, tendentis ad citrinitatem aut rubedinem ad modum uirulētiae. Vltimus est fluxus, ex quo res nigra non facile diuisibilis egreditur, et est substantia hepatis per putrefactionē uel adustionē separata.

Loci consentientes de fluxibus hepaticis.

Quod tot sint species fluxuum hepatis, quos nuper recitauimus, lege Arcul. et Sauonarolam, et maximè Auic. ubi agit de solutione uentris omnium modorum, et de expulsionibus rerum ex hepate et splene. Galen. 6. de loc. affect. cap. 1, Nonnulli antiquorum præter hanc, quæ ab ulceratione intestinorum fit, dysenteriam, aliam quoque cruentam ob excretorum speciem nominarunt, in qua syncerus interdum et plurimus sanguis, interdum ueluti limus et feces ipsius non parua quantitatis excernitur, etc. Lege etiam Gal. 2. de loc. aff. cap. 5.

Hhh.ij.

De causis fluxuum hepaticorū.

Causæ chylosi fluxus sunt quinque. Prima, quum chylus est pluris quantitatis, quàm pro nutriendo corpore deceat. 2. est paruitas hepatis copiam chyli continere non ualentis. 3. est abscessus in meseraicis, uel in cōcauo hepatis. 4. est obstructio attenuatoria aut carnosæ, aut coarctatoria harum partium. 5. est imbecillitas attractricis siue retentricis facultatis, &c. Causa pituitosi fluxus est mala complexio frigida hepatis, destruens alteratricem siue digestiuam facultatē. Causa aquosi fluxus est corruptio alteratricis facultatis, et fortitudo expulsoꝝ facultatis. Causa biliosi fluxus est copia bilis genita ab intēperie hepatis calida, uel regimen calidum, qualis est usus ciborum acrium, amarorum & salsoꝝ, item ira, & motus in sole, febres ardentes, abscessus calidi, obstructions cystis fellei, & quæcunque possunt sanguinem adurere & bilem gignere, &c.

Causæ fluxus melancholici sunt sex, mala intemperies hepatis calida adurens, aut frigida congelans. Secunda, ulcus in substantia

heparis emittens pus nigrū. Tertia, obstructio
 heparis, qua patefacta exeunt denigratae ma-
 teriae, iandiu retentae. Quarta, fortitudo uir-
 eutis tales faeces separantis ac expellentis.
 Quinta, imbecillitas facultatis retentoriae &
 alteratricis fecalem fluxum inducentes, &c.
 Causa sanguinei fluxus uel est scissura ue-
 nae, uel copiosa eius multitudo, aut obstru-
 ctio uenae chyli, aut abscessus, aut imbecil-
 litas attractricis facultatis. Causa lotiui
 fluxus, uel est imbecillitas concoctricis fa-
 cultatis, aut retentoriae, quae non adeo usque
 chylum retinet, ut perfectè digeri possit: aut
 est imbecillitas secernentis facultatis, non se-
 parans aquositatem à sanguine ob heparis
 imbecillitatem. Causae harum imbecillitatum
 sunt interdum mala intemperies aut absces-
 sus aut obstructio. Causae foetidi fluxus sunt
 longa mora humoris retenti in loco prae-
 naturali, uel ulcus, uel apostema, à quibus sa-
 nies malè olens secernitur, interdum ipsius
 heparis putrefactio. Causae fluxus uirulen-
 ti est facultas expulsoria humores ceticè
 uel symptomaticè expellens, uel sanguinis ex
 Hhh. ij.

aliquo apostemate in hepate aut meseraicis rupto resudatio. Causæ fluxus substantiæ hepatis sunt putredines, adustiones, ulcera corrodentia substantiam hepatis.

Loci consentientes de causis fluxuum.

Vide in alios neotericos Arcul. de his fusissimè differentem. Galen. in art. med. cap. 88. de signis hepatis patientis. Item de diff. eorū quæ excernuntur multa habet, quæ ad hunc locum adduci possunt. Paul. lib. 3. cap. 42, Iecoraria dysenteria fieri solet, quia iecur alimentum distributum non probè conficit, & retentrix eius facultas uel alteratrix imbecillis est. Galen. 1. de nat. hum. tex. 41, Fieri, inquit, frequentissimè à multa sanguinis copia in uenis contenta, quæ à natura per uenas perinde excernitur, ac in mulieribus per uterum, & alijs per nares uel mariscas: uide etiam Galen. 9. de compos. med. per loc. cap. 5. Item 2. de loc. affect. cap. 5. Vide insuper Alex. li 3. de Iecoraria dysenteria. Itē Gord. & alios neotericos.

De signis fluxuum hepaticorum.

Signa fluxus chylosi sunt nota illis qui chy-
lum cognoscunt, & est albus subtilis, ut prisa-
na hordeacea. Signa quum fit à paruitate he-
patis sunt, quia à generatione contractum est
hepar, & quòd iuuatur à paucitate cibi.
Signa quòd fiant ab apostemate siue ab ob-
structione, sunt satis nota per ea, quæ dicta
sunt de imbecillitate hepatis. Signa fluxus bi-
liosi cognoscuntur per colorem & substan-
tiam eius quod egreditur. Signa fluxus pitui-
rosi aquosi, cognoscuntur ex precedenti re-
gimine, ut ex comestione fructuum, ex potu
aquæ superfluo. Signa malæ complexionis he-
patis & apostematis, & obstructionis pa-
tent ex supradictis. Signa fluxus humoris
melancholici cognoscuntur ex colore nigro
tendente in rubeum, & interdum est uelu-
ti fæx uini, uel sanguinis nigri congelati. Si
est à caliditate, humor magis lucet, magis-
que foetet, & præcedit liquefactio humorum,
& fluxus uentris uirulentus & febres, &c.

Quando fit à frigiditate, adsunt signa in cō-
trarium, &c. Si proueniat ab apostemate ru-

Hhh.iiij.

pto, primò præcesserint signa apostematis, sicuti gravitas, dolor, & febris continua. Si ab obstructione, præcesserunt signa obstructionis. Signa sanguinei fluxus ex hepate, sunt hepatis nocumenta præcedentia. Si à ruptura venæ, præcessit casus uel percussio hepatis, sanguinisque copia egreditur, quæ nec facile, nec statim supprimi potest. Sanguis acutus cognoscitur ex ciborum acredine, & ex eo quod per loca dum transit, mordicat. Obstructio hepatis cognoscitur ex gravitate, tumore, &c. Signa lotii fluxus cognoscuntur à chylo non probè digesto exeunte simili loturæ carnis. Cognoscitur ab imbecillitate retentricis uel digestivæ, ex caliditate & frigiditate in hepate comenta: nam à frigiditate debilitatur digestiva siue alteratrix, à caliditate retentrix uirtus. Signa fluxus fœridi sunt ipse fœtor rei egredientis. Signa virulenti, sunt signa hepatis calidi sub cute subtili, & signa inflammationis hepatis liquefacientis. Signa substantiæ hepatis exeuntis sunt nota, quoties res exiens similis est hepati, quod nil aliud est quàm sanguinis coagulum, nec diuidi po-

test, nec in aqua solui sicut frustum sanguinis concreti, &c.

Loci consentientes de signis.

Arcul. omnia hæc signa habet, & multò plura quàm dixerim, 9. almans. cap. proprio. Gal. 6. de loc. affe. cap. 1, Discernitur hæc à uera dysenteria, quia ab initio tenuis sanies sanguinis ab hepate reijcitur, deinde aucto malo crassus humor facibus uini haud assimilis. Præterea in iecinoris excrementis nihil abrasum expellitur, & interim per duos uel tres dies euacuatio supprimitur, sed rursus redeunte malo excrementa prioribus multò peiora excernuntur, quod in intestinorum ulceribus haudquaquam apparet, &c. Paul. lib. 3. cap. 42, Si retentrix uel alteratrix imbecillus est, sæpe eiusmodi descendunt, ut recens in eis caro lota esse uideatur. Lege Aet. de hac re. & Alex. Gord. & alios neotericos.

De cura fluxuum hepaticorum.

Fluxus chylosus, si à nimia quantitate chyli proueniat, cibis detur in minori quantitate. Si fuerit nimium crassus uel uiscosus, den

tur attenuantia & incidentia, sicuti ius cic-
 cerum & decoctiones apertinae cum radic. fo-
 niculi, petroselini, &c. Si fiat ab hepatis par-
 nitate, cibari debet frequentius cum cibis te-
 nuibus, boni nutrimenti & paucarum super-
 fluitatum, sed parum pro uice. Si fiat ab apo-
 stemate, tunc fiat diuersio & euacuatio cum
 sectione uenae, deinde topica suis temporibus
 congruentia adhibeantur. Si uerò fiat ab ob-
 structione uel ex debilitate attractoriae fa-
 cultatis, tunc tres opus sunt intentiones: pri-
 ma digestio, quae fit cum syrup. de duabus ra-
 dicibus, bisantino, oxymelle simpl. syrupo de
 eupatorio, de cichorea cum rheub. cum aquis
 aperientibus, qualis est aqua absinthij, foeni-
 culi, cuscute, cichorij: quibus etiam interdum
 adhibemus syrupum de endiuiā, ros. &c. Se-
 cunda est euacuatio, quae fieri poterit cum
 rheubarbaro, agarico, pilulis de rheubarbaro,
 de eupatorio. Tertia est malae complexionis
 derelictae in hepate ablatio, quae perficitur
 cum cōfectionibus & electuarijs, qualia sunt,
 diacalamentum, diacinnamomum, theriaca,
 diacurcuma. Troc. de lacca, de rheubarbaro,

de eupatorio . Et in causa calida, diarrho-
don, triansdali cum seminibus frigidis ape-
rientibus, &c. Omnis præterea fluxus hepa-
ticus siue à caliditate, siue à frigiditate pro-
ductus, quatuor intentionibus curari debet.
Primò regimine uitæ, secundò remouendo cau-
sam ipsius fluxus, tertio roborando omnes he-
patis facultates, quartò corrigendo sympto-
mata. Regimen in fluxu chyloso erit ex cali-
dis uel frigidis, prout hepatis discrasia re-
quiret: ut plurimum tamen ad siccum cum
stypticitate aliqua temperata uictus tendat.
In fluxu bilioso regimen sit frigidum & hu-
midum cum temperata stypticitate. In fluxu
melancholico interdum ad frigidum, inter-
dum ad calidum, interdum ad tenuitatem,
interdum ad crassitiem, iuxta longitudi-
nem & breuitatem morbi uictus ordinetur,
cum uirtutis robore. In fluxu lotiuo sit ex
his uictus qui nutrimentum bonum pauca-
rum superfluitatum inferat, facilisque dige-
stionis, spargaturque uices. Causa fluxus re-
mouetur in pituitoso fluxu, euacuando primū
humorem pituitosum cum decocto iridis &

360 DE CONSEN. MEDIC.

myrobalanorum chebulorū, & educendo per
 urinam cum dialacca & uino albo, &c. In
 fluxu cholericō euacuetur per cholagoga cū
 decocto prunorum, tamarindorum, myroba-
 lanorum cit. rheubarb. &c. In fluxu melanco-
 lico cum myrobalanis Indis, epithimo, sena, in
 sero decoctis cū cōfectione hamech. Et si mul-
 titudo sanguinis adfuerit, fiat sectio uenæ, &
 aperiantur hæmorrhoides & menstrua pro-
 uocentur: in fluxu lotiuo educatur aquosi-
 tas multiplicata per secessum, per urinā, per
 sudorē. In fluxu foetido procedatur, primum
 cū mundificantibus & solutiuīs, prout humor
 corruptus exegerit, ut puta cum decocto hor-
 dei aut hydromelle, oxymelle, &c. Similiter in
 uirulento mundificetur uirus cum decocto pru-
 norum, tamarindorum, myrobalanorum cit.
 &c. Roborantur facultates hepatis, & dis-
 crasia frigida aufertur cum calidis tempera-
 tis, quales sunt passulæ, phistici, auellanae, cin-
 namomum, hepar lupi, caro limatiarum, cro-
 cum, &c. In causa calida cum endiuiā, cicho-
 rio, semine sandalis, uino granatorum, aqua
 plantaginis, portulacæ, cum camphora, &c.

In melancholico cum syrupo de absinthio, de eupatorio, de epithimo, cum diagalanga, diacalameno, theriaca, mithrydato, &c. In lottiuo, cum electuario de passulis Auicen. & quibuscunque in capite debilitatis hepatis dictis. Corriguntur accidentia, ut si adsit exco-riatio, cum mundificantibus ac abstergentibus, ut puta cum aqua hordei, adipe renum caprae, albumine oui, & vitello, oleo uiolaceo, &c. Dolor auferatur cum clysterijs modò abstergentibus, modò anodinis, modò stupefacientibus, prout opportunum uidebitur, &c.

Loci consentientes de cura fluxuum hepaticorum.

Auicen. 16. tra. 2. cap. 1, Iam sciisti causas fluxus hepatici, & sciisti curam cuiuscunque causae: oportet igitur ut redeas ad id, & cures malitiam complexionis eius, & apostematam, & debilitatem, & oppilationem, & repletionem eius, scilicet unumquodque cum eo quod dicitur in capitulo suo: & cum haec feceris, iam curasti. Lege Arcul. Gord. Marcum Cat. Aer. & Paul. Aegin. & intelliges omnia.

Observationes in euacuatione.

Marcus Catin. Oportet cauere ne euacuemus cum rebus nocētibz hepatis, ideo utimur rheubarbaro in infusione.

Observationes in topicis agendis.

Auicēn. 16. trac. 2. cap. de cur. fluxus hepatici, Et multotiēs linit insipiens hepar in hac assellatione cum inspissantibus sanguinem & extinguentibus hepar, per hoc quod sunt frigida: & in hoc est mors & preparatio ad putrefactionem, &c.

Conferentia fluxui hepatico.

Cōferunt fluxui hepatico bolum cypricum potū, uel per clysterē impositum emplastrum diaphiniconus, Mes. & quacunque supra recitauimus, &c.

De prognosticis fluxuū hepaticorū.

De fluxu chyloso loquitur Acul. sic: Fluxus chylosus nisi pendeat ab apostemate, ut plurimum curatur. Hippoc. aphor. 7. aph. 56, Quibus hepar aqua plenum in omenum

eruperit, ijs uenter aqua repletur & moriuntur. Arcul. Fluxus cholericus perducit ad excoriationem & ulcera intestinorum, prout cholera erit magis uel minus acuta ac adusta, & curatur, nisi ab apostemate orium habuerit. De fluxu melancholico lege aph. 4. apho. 21. ibi, Deiectiones nigrae, qualis est sanguis niger, sponte uenientes, siue cum febre, siue sine febre, pessima, &c. Et aph. 4. aph. 22, Morbis quibuscumque incipientibus si atra bilis uel supra uel infra exierit, lethale. Et aph. 4. aph. 23, Quibuscumque ex morbis acutis aut diuturnis, uel ex uulneribus, siue quouis alio modo extenuatis, nigra bilis, siue uti sanguis niger de subter exierit, postridie moriuntur. Et aphor. 4. aphor. 24, Difficultas intestinorum si ab atra bile inceperit, lethalis. Et aphorism. 4. aphorism. 25, Sanguis quidem supra, qualiscumque fuerit malus, infra autem bonus est. Arcul. Fluxus sanguinis nigri facientis & sanguinis rubei est deterior quam fluxus nigri: alij uero fluxus si ab humoribus ortu habeant, ut plurimum curantur,

si ab apostemate uel ulcere, nunquam aut
difficulter sanantur.

Authores dissentientes circa
fluxum hepaticum.

- 1 Adserere, in omni fluxu hepatico conue-
nire styptica.
- 2 Adserere, in fluxu hepatico tenuē nictum
non esse exhibendum.
- 3 Adserere, fluxum hepaticum esse facilis cu-
rationis.

Confutatio dissentientium cir-
ca fluxum hepaticum.

Impugnat primū Auic. 16. tertij, de cura
eius, ubi inquit: Illud quod cadit de errore in
hoc est, ut dentur illi qui habet fluxum hepa-
ticum oppilatiuum, medicinae constipatiuæ,
addentes in oppilationem, ipsam confortan-
tes ut stringant materiam, & id ad errorem
maximum perducit.

Ad secundum respondet Conciliator diffe-
rentia 202. dicens: Sunt quidam modernorum
qui in hac passione præcipiunt non esse diæ-
tam tenuem exhibendam, cuius contrarium

indicat Auic. dicens, In assumptione assellationis hepaticæ plurimum est, ut non appropinquet panis, quia hepar non recipit ipsum, imò rectius est, ut sit contentus aqua sanic bis in die, &c. Igitur iuxta Conciliatorem & Auic. tenuis uictus cōuenit, & nō ecōtra, &c.

Ad terciū, Haly abbas. 7. practica, Dysenteria hepaticæ medela perdifficilis est, & perpauci liberamur ab ea. & subdit, Multi enim parum cognoscunt hepatis debilitatem & eius causam. Galen. 5. de loc. aff. quosdam cognouisse ait, quibus fluxus hepaticus acciderat ex debilitate hepatis, & perisse ex pauca curatione. Præterea auctores succinctam huius morbi causam idcirco scribunt, quia parum fidunt de eius salute, & sic potius est incurabilis, quàm curabilis, &c.

De tinesmo, id est intestinali fluxu.

Tinesmus, est mala recti intestini dispositio, in qua egerendi prompta quadam cupiditas cum gemitu ac conatu acri adest, paucis admodum sequentibus excrementis muscosis ac sanguineis. Hic duplex est, uerus &

Iii. i.

mendosus. Verus, quum causam sui recto intestino affixam tenet. Mendosus, quum causa non est fixa, sed aliunde ueniens eum producit, sicuti materia fluens per intestina ad anum, &c.

Loci consentientes de tinesmo.

Gal. lib. fin. med. Tinesmus est dispositio recti intestini ad partes inferiores pertinens, in qua impetus cupiditatēque desidendi plures, sed paucae excretionēs sequuntur, &c. Aet. ser. 9. cap. 43, Tinesmus est egerendi promptitudo, quæ differri ac deuitari non potest, nihil tamen præterquam pauca cruetum aspectum habentia propellens, &c. Lege de hac re Paul. lib. 3. cap. 41. Et Galen. 6. de loc. aff. cap. 1. ibi, At ulcera quæ recto intestino oriuntur, &c. lege etiam Mar. Cat. & Arcul. Auic. 16. tra. 2. cap. 16, Primum oportet te scire indispositionem tinesmi, an sit tinesmus uerus, an tinesmus mendosus, &c.

De causis tinesmi.

In genere considerandum, num causa in lōganone existat uel à supernis partibus descendat. Si causa erit fixa in recto intesti-

no, tunc erit uel inflammatio, uel ulcus corrodens, uel fistula, uel occulta hæmorrhoides, uel ragadia, uel abscessus durus. Si uerò à supernis partibus defluat, uel erit humor impactus pungens ac stimulans, ut pituitosus, salsus, biliosus, aut atrabilaris adustus: uel erunt cibi acuti, salsi, uiscoli, uel pharmacum acutum mordax, aut suppositoriū acre, uel mala intemperies frigida absque alio complexu, &c.

Loci consentientes de causis
tinesmi.

Paul. lib. 3. ca. 41, Causa tinesmi est inflammatio in longanone facta cum molli ac laxo tumore, quod œdema uocāt, quæ stercoris insidētis suspicionē præbet, quod exitū quærat. Auic. 16. tra. 1, Et causa Zair, id est, tinesmi, aut est apostema calidū aut durū, aut mollicificatio lacerti, aut tensio ex qua lacertus impeditur ab operatione sua, aut superfluitas salsa, aut baurachia, aut chylus grossus, aut cholera ingrediens, aut frigus adueniens, aut lōgicudo sēsionis super durū, aut crassities fæcis, aut eius durities, aut hæmorrhoides, aut fi

Iii. ij.

stula, aut ragadia, aut rugitus, aut corrosio,
aut grauitas sensata, &c. lege Arcul. & a-
lios, &c.

De signis tinesmi.

Signa quòd adsit tinesmus sunt desiden-
di cupiditas cum conatu ad excernendum, u-
bi primum pingue, deinde muscosum & cru-
entum egeritur. Signa inflammationis uel abs-
cessus sunt, grauitas, dolorque continuus, qui
nec emissionem stercoris remouetur, excremen-
taque difficulter excernuntur, mollientia &
anodina ualde conserunt, alijs in contrarium
laedentibus. Signa ulceris sumuntur à praece-
dentibus rebus, ut ab humoribus ulceranti-
bus, sicut in dysenteria: aut à fluxu flauo,
prasino, & nigro precedente: aut ex absces-
su ad uomicam deueniente, aut ex pharmaco
exulcerante iam assumpto. Signa fistulae &
hemorrhoidarum uel ragadiarum cognoscen-
tur ex his quae suis in locis dicuntur. Signa hu-
morum sunt, quia si à bile efficiatur tinesmus,
cognoscetur ex uictu precedente, bilem mul-
tiplicante, & ex alijs bilem indicantibus, si-
cut ex punctione in recto intestino, ex flauis

excrementis, & quod à calidis lèditur, &c. Si pituita, cognoscitur à pituitosis excrementis, à pruritu in intestino recto, & ab alijs pituitam indicantibus. Si ab intemperie frigida absque alio complexu, aderit desidendi nòluntas & conatus ad excernendum, sed nihil egreditur, à calidis deinceps iuuatur. Si à flatu incluso, tunc indicium erit, quod emissio flatu statim tinesmus cessat, & retento augetur, &c.

Loci consentientes de signis
tinesmi.

Aet. serm. 9. cap. 43, In principio si grauis distensionis sensus circa imum uentrem fiat, & maximè circa partem dextram, coniectare oportet stercorum multitudinem in caeco intestino insitam esse, &c. Galen. nulla alia signa ponit pràter quaedam communia, quæ sunt desidendi cupiditas cum conatu ad excernendum, ubi primò pingue, deinde cruentum egeritur, &c. Auic. 16. cap. 3. multa signa affert, ibi: Tinesmi autè diuisiones significant id quod egreditur, &c. Vide in hoc Razen 8. commem. & Arcul. 9. Almans.

Iii. ij.

De curatione tinesmi.

Si causa tinesmi fuerit bilis uel pituita sal-
sa, tunc clysterius lauatiuis indiget: sed pri-
mum prohibeatur causa antecedens cum di-
uersionibus & euacuationibus, deinde causa
coniuncta remoueatur cum clystere ex aqua
hordacea Zuch. & nitellis ouorum in causa
calida parato, aut in frigida, cū rhodome-
le, aqua cicerum, sero caprino, &c. Quod si
ab inflammatione uel ab alio abscessu fieret
tinesmus, considerandam num per uiam de-
fluxus fiat, & tunc fluxus causam euacuatio-
ne & diuersione, si opus fuerit, amputabi-
mus. Euacuatio fiet per sectionem uenæ uel
cum pharmaco leniente. Diuersio fiet cum
urinam uel sudorem prouocantibus, cum cu-
curbitulis, frictionibus, &c. In causa coniuncta
si fuerit calida, in principio repellendū cum
anodinis, ut cum oleo rosaceo, myrrhino: &
in causa frigida, cum oleo camomillino, ane-
thino, sycamino. In augmento repellentibus
calida resoluentia & emollientia addantur,
quale est oleum liliorum alborum, adeps re-
um caprae, bdellium, butyrum. Quod si ab

ulcere fiat tinesmus, tunc eductis primùm si quæ fuerint facibus, ulcus abstergetur cum hydromelle, uel rhodomelle: uel si putredo cogat, addatur aqua salsa, uel decoctio aluminis, quibus interdum addi potest unguenti Aegyptiaci uncia una: quo deinde repurgato, tunc his, quæ ad cicatricem perducunt, opus erit. Si uerò fiat à facibus siccis, curetur cum emollientibus sæpe reiteratis. Si à mala intemperie frigida, cum calefacientibus tam in uictu, quàm in medicamine exhibitis. Si ab intemperie calida, cum refrigerantibus anodinis. Si à flatu, per ea quæ flatum resoluunt. Quòd si dolor magis urgeat, nec per anodina cessare uelit, tunc urgente necessitate ad soporifera ueniendum, inter quæ laudatur suppositorium de licio, filo tamè appēsū, ut ad libitum possit remoueri, item athanasie Nicolai 3. i, etc.

Loci consentientes de cura tinesmi.

Aet. serm. 9. cap. 43, Si impacta fuerit stercoreū multitudo in caco intestino, tollēda erit cum emollientibus clysteribus, ut fursurū deco-

III. iiij.

eto, fœnugraci, melle, oleo, &c. lege cum fu-
 sius. Auic. 16. tra. 2. cap. 16, Si fuerit fœx sic-
 ca, cura cum clysteribus lenitiuis. Si fuerit ca-
 liditas, indigebis eis quæ sunt castia, fistula &
 Syrup. uiolaceus. Si fuerit causa frigus adue-
 niens, cum portionibus & clysteribus calidis,
 &c. Et si fuerit causa apostema calidum, stis-
 de in retinendo id quod currit ad apostema,
 & curetur in principio sui cum phlebotomia
 & cū minoratione cibi, &c. lege cum fusius:
 lege etiam Arcul. 9. almans. & Marc. Catin.
 & reliquos practicantes. Serapio, Cura tenas-
 monis uertitur ad causam & ad morbum. Ad
 causam triplex intentio: Prima, prohibitio ma-
 teriæ imbibitiæ in intestino. Secunda, eius reso-
 lutio. Tertia, est sedatio acuitatis materiæ, &
 æquatio malæ complexionis eius, &c. Razes
 lib. diuis. cap. 72, In fine, inquit, iuuantur ha-
 bentes tenasmonē suppositione collyrii plus-
 quam reliquis curationibus, &c.

Observationes in curatione.

Arcul. 9. almas, Clysteria communiter de-
 bent esse paucæ quantitatis, ut decem uel duo-

decim uncijis: nō enim oportet ut trāseant ultra intestinum rectum, & cum hoc melius retinentur. Item collyria sint usque ad digitos septem. Auic. 16. tra. 2. cap. 16, Et scias quod frigus facit tenasmon in pluribus horis. B. Quia materiam frigidam siue calidam impingi illic cogit. Arcul. Sint omnia cibaria humida, insipida, pauca dulcedinis, uirētur sicca, amara, acria, salsa, acetosa, & quacūque faciem exiccant & exasperant. Vide Auic. ibi. Et quum cum cibus, &c.

Inducentia ac cōferentia tinesmo.

Inducunt tinesmū, colocynthis, euphorbiū, sarcocolla, scamoniū. Cōferūt tinesmo adeps porci, capræ clysterizatus, balauſtia, bdelium, brassica, cauda equina, colophonia suffumigium, scænuſtium, ferruginis cum aceto suffumigium, gummi Arab. ius galli ueteris, piscium, charabe, lac asini, litium, lini semen coctum cum oleo ros. malua, meu, eneasma, nasturtium, myrrha cū olibano & croco, oleum persicorum, origanum, pini cortex, porrum, psyllium, sanina, spica storacis, suffumigium

874 DE CONSEN. MEDIC.

phlomos, therebentina, ruta, confectio de stora-
 race Mes. electuarium nigrum Haly. 16. ant.
 Miclea Auic. 4. 5. Troc. de Almezereon, de
 balaustys Auic. 8. quinti, &c.

De prognosticis tinesmi.

Razes 8. com. Tinesmus plurimum fit post
 dysenteriam, & quod non fit post dysenteriam
 est leuioris curae: idem adserit Auic. dicens: Fa-
 cilius est id quod non succedit dysenteriae. Hip.
 aph. 1. ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ τενεσμούς ἐλγρονῶς
 ἐκτρώσιν ποιεῖ. id est, Mulierem in utero ha-
 bentem tinesmus innatus abortire facit, qui a-
 phor. tantum in translatione Constantini in-
 uenitur, nulla nec a Theodoro, nec a Leonice
 no facta mentione. Auic. 16. tra. 1. cap. 2, Et
 singultus quum accidit habentibus fluxum uen-
 tris, & proprie habentibus tinesmum, est signi-
 ficatio mala, significans siccitatem facientem a-
 refactionem, &c.

De doloribus in genere.

Alcius nunc exordiar de doloribus in ge-
 nere aliquid demonstrans, deinde ad morbum
 colicum me conferam. Dolor est tristis sensa-

tio à subita ac uiolenta mutatione facta, & tantummodo ad tactū, & non ad alium sensum. Dolorum igitur differentiæ sumuntur à loco, ut si dolor sit in omnibus intestinis, uel in eorum parte. Si uerò sit in omnibus, tunc erit uel cum motu, uel cum quiete. Si cum motu, erit tertio: si cum quiete, uocabitur nomine generis, dolor. At si sit in parte, uel erit remissus, & uocatur ab Auic. punctio, uel intensus, & in crassis intestinis, & erit colica dispositio. Si in gracilibus, erit ileus siue uoluolus. Rursus dolorum species sunt sex, scilicet punctoria, grauis, stimulans, extensiuæ, pulsatilis, & ulcerosa. Punctorius dolor circa membranas potissimum consistit. Grauis circa hepar, lien, renes. Stimulans circa partem ossibus uicinam, & in cute fieri potest. Extensiuus pertinet ad partes, quibus nullæ sunt arteriæ, ut membranae, cutis, adenes, quibus nullæ insunt arteriæ: nam inflammatae extensiuo tantum dolore uexantur. Pulsatilis circa ipsas arterias uel in partibus ipsas continentibus, & in inflammationibus consistit. Ulcerosus non solum ad cutem, sed ad imas quoque partes

uelut ad ossa extenditur.

Causa horum sunt, quia punctorius, ulcerosus & stimulans fiunt à bilioso uel pituitoso humore salso, aut à corrupto sanguine, aut à uermibus suis aculeis pungentibus, aut à quopiam ulcere. Grauis uerò extensiuus ac pulsatorius à materia pituitosa, crassa, uel ab atra bile grauantē & extendente, uel à flatu incluso, aut à copia alicuius materie extendentis, &c.

Loci consentientes de doloribus in genere.

De diff. doloris lege Gal. 12. meth. cap. 7. Item de elementis primo. Item in lib. de placitis Hippoc. & Platonis. Quod ad sensum pertineat, lege Gal. in lib. de cōstit. art. med. cap. 8. Item de inæquali intemperie cap. 3. Item 3. de sympt. diff. cap. 3. De diff. dolorum Auic. Arcul. & plerosque alios practi- cantes. De speciebus dolorum, lege Gal. 2. de loc. aff. cap. 3. 7. & 8. ubi loquitur de morbo colico.

De dolore colico.

Morbus intestini plenioris, quem Græci

colicon uocāt, nihil aliud est quā dolor sa-
tis intensus in intestinis crassis, maximēque in
colo uocato, cum quo ea quae à natura ad
inferiora expelluntur, difficulter exeunt, ut
sunt humores, excrementa, uermes, flatus.

Loci consentientes de do- lore colico.

Gal. lib. finit. med. Colica dispositio est cō-
stitutio plenioris intestini diuturna, in qua
spatijs temporis interiectis cruciatus intole-
rabiles, difficultates spirandi, sudores, per-
frictionēsque adoriuntur. Auicē. 16. Tra. 3.
cap. 6, Colica est passio integra, intestinalis,
dolorosa, cum qua sit difficilis exitus eius
quod egreditur per naturam, &c.

De causis doloris colici.

Causae uel per se, uel per consensum fiunt.
Per se binæ sunt, altera à mala intemperie
cal. frig. sicca, non autem humida, quum per
se dolorem non efficiat: altera à soluta con-
tinuitate. Intēperies calida dupliciter colicam
efficit, uel nimis calefaciendo, uel ni-
mis resoluendo & feces exiccando. Frigida
uel obstruendo, uel facultatem expulso-
riam

imbecillem reddendo. Soluta continuitas fit ab incisione, exesione, fractione, tensione, & tunc uel ab humore acri, uel multo, uel flatu, uermibus & abscessu. Cause per cōsen sum fiunt uel à uentriculo humores uel flatus aggregante, uel ab hepate, uel liene, materias ad intestina expellente, uel à renibus lapidem patientibus, uel à uesica, aut utero abscessum patiente, aut à toto, sicuti in febribus, quum ex uenis ad intestina humores extruduntur, &c.

Loci consentientes de causis doloris colici.

Gal. 12. meth. cap. 7, Porro naturalis notitia nos docet, uitium id corporis ex quo fit dolituum aut continuitatis diuisionem esse, aut alterationem aliquam. Primum illud speculabimur, cuiusnā naturæ esse debeat, quod continuitatem soluit: necesse igitur est quòd sit uel ructio, uel contusio, uel erosio, &c. Et in art. med. cap. de sig. Thorac. Dolor quencunque obsederit locum, aut continuitatis solutionem, aut subitam alterationem ostendit, soluitur cōtinuitas incisione, exesio-

ne, fractione, tensione: alteratur substantia & caliditate, frigiditate, &c. lege etiā Gal. 2. de loc. aff. cap. 5. Paul. lib. 3. cap. 47, Dolores grauiſſimi ſiūt plures ob cauſas: uel enim à crasso & pituitoſo humore intra uenas ſubſidente, uel à ſpiritu craſſiori flatuoſoque exitum non habente, aut ab inteſtini inflammatione, uel ab ulceribus ac mordacibus ſuccis infeſtātibus, &c. Lege de his Gal. 4. de loc. aff. cap. 7. ibi, Plures ſunt diſpoſitiones, quas per uehementes motus dolor comitatur, &c. Et Auic. 16. tra. 3. cap. 8. has cauſas etiā enumerat, & multifacit obſtructionē, ex qua fieri colicā aſſerit. Vide illū fuſius. Vide etiā de cauſis ſpiritus flatuoſi Gal. 12. meth. cap. ult. ubi à duplici cauſa fieri inquit, &c.

De ſignis doloris colici.

Indicia incipiētis colicæ ſunt, quia primū minimū quid excernitur, cōſuetudōq; excernēdi uariatur, appetitus minuitur: quum uerò ad incrementum tendit, dolores creſcunt, aluus ſiccior euadit, ita ut flatus ne quidem egredi poſſit. Vigiliæ ſitīſq; multiplicātur, & ſi quid excernitur, ſimile bubulo ſtercori cer-

nitur: quū uerò ad salutē tēdit, excrementa & flatus exire incipiunt, dolor de loco ad locum mutatur, nec adeò frequens est, sed per enamata remittitur. Si uerò ad mortem tendat, dolor est intēsiſſimus, non minuitur, non remittitur, nil excernitur, uomitus ad uomitum succedit, sudor frigidus apparet, &c. Signa distinguētia colicam à nephrit ſumuntur à quantitate, à loco, à motu, ab exeuntibus, à cauſis præcedētib; à quantitate: quoniam nephriticus dolor parū occupat ſpaciū, colicus quā maximū. nam totum uentrem & ſtomachū obtinet. À loco, quoniam nephriticus in renibus, colicus paulò altiori loco continetur. À motu, quoniā colicus ad plures partes mouetur, nephriticus fixus ac immobilis permanet. Ab exeuntibus, quoniam in colico fæces retinentur, ſed non in nephritico, uerū arenosa materia in urinis apparet. À cauſis præcedentibus, quia in colico deicitur appetitus, nauſea & uomitus ſiunt grauiore; ſed in nephritico non ita, ſed præceſſit urina arenosa uel craſſa. Signa interſtinguētia colicū à dolore uteri ſunt, quia ad

inferiora, uelut ad pubē & coxas dolor uterī,
 sed colicus ad superiora magis tēdit: item in
 dolore uterī præcesserūt mēsiū suppressiones,
 & si aluus leniatur, ac faeces educātur, nō ces-
 sat. at colicus habita sede placatur. Item in
 dolore uterī mulieres suffocari uidentur ex
 uaporibus eleuatis, quod colica non accidit,
 &c. Signa humorū colica sumūtur ab ætate,
 regione, tempore, uictu præcedēte & simili-
 bus. Signa pituitosa colica habētur, si uictus
 pituitā generās, si senilis uel puerilis ætas, si
 hyems, si regio frigida & humida præcesse-
 runt, si satietas, cruditas, ocium, si adsit gra-
 uitas, si obtusus dolor, si lōgioris moræ absq̃
 dubio colicā pituitosam esse cōiycies. Caue ta-
 mē ne interdū ex si i & inflammatione & u-
 rina rubea decipiaris, tanquā colicā calidā
 putans, ut inquit Auic. quoniā illud cōmune
 est omnibus colicis. Signa flatuosa colica sunt,
 quia præcesserunt causæ flatus, sicut potus a-
 qua frigid, holera, fructus, ructus, extensio,
 nulla adest grauitas sicut in pituitosa. Inter-
 dum etiam inflatio manu percipitur, nec e-
 gredientibus humoribus dolor mitescit, eò

Kl2l2.i.

quod in tunicis crassus flatus retinetur. Signa colicæ ab inflammatione sunt, tumor, durities tēsiua, dolor cōtinuus extendens, grauis permanens ac pulsans, febris acuta, sitis, uigilia, & interdum urinae retētio: similiter cum stercore ob abscessum uias comprimente.

Loci consentientes de signis
doloris colici.

Gal. 2. de loc. aff. cap. 5, Protinus affecto colo inflatio quædā & extēsiō, & flatus cōplures, & tormina, & excrementa flatibus plena uidebuntur, quæ stercorei bubulo simulentur: quinetiam cibi tum cupiditas, tū concoctio deterior euadit, &c. Lege Auicē. 16. tra. 3. cap. 7. ubi de signis colicæ absolutæ agit, & inuenies quæcunque à me sub breuitate enarrata sunt. Lege etiam Razē in 9. almans. cap. de doloribus uētris, & ibi etiam Arcul. Gal. 6. de loc. aff. cap. 1. & 2. ponit signa interstinguentia colicum à nephritico, ibi, Primū uomitū & nausea urgent, sed grauiore, & magis assidui dolente colo, &c. Lege etiam Auic. 16. tra. 3. cap. 10. Paul.

Lib. 3. cap. 43, Qui ex humore pituitoso laborant per totum abdomen, ac si pertunderetur colon, in alto excruciantur: adsunt tormina, ructus, nausea, uomitus porissimum pituita, alius retinetur: praecessit continuus ciborum frigidorum crassique succi usus, satietas, cruditas, ociū, &c. Lege Auic. 16. tra. 3. cap. 11. ibi, Quandoque significat colicam phlegma. anteceptio causarum phlegmatis ex satietate nauseatiua, & ex speciebus ciborum, & aetas, & regio, & hora, &c. Lege Gal. 12. meth. cap. ult. nā multa indicia declarat, dum curam aggreditur.

De cura doloris colici.

Omnis dolor in genere curā admittit dupliciter: primò remouendo eius causam, quæ ablata dolor euanescit, sed quia in ablatione causæ plura requiruntur, ut sunt humorum preparatio, reuulsio, resolutio, & euacuatio, quæ morā ad longū tēpus trahunt, idcirco alia insurgit curādi intētio, quæ est doloris remotio cū anodinis ex caliditate ac humiditate temperata constantibus, ex quibus plerunque

Kl. l. 3. ij.

mala intemperies illius membri aufertur, quibus etiam non proficientibus tertia medendi intentio oritur, quæ dolore cū narcoticis membrum stupefaciendo remouet, alijs præsertim nõ iuuatibus. Si igitur inducias dederit dolor, ab ablatione causæ incipiemus: si minus, sed intensissimè, agrū cruciet, cū secunda intentione procedemus, scilicet cū anodinis dolorem mitigantibus, quæ cum intrinsecus cum extrinsecus applicari possunt: in quorū numero laudantur enemata anodina & lenitiua, sicut ex decocto camomillæ, anethi, melliloti, semine lini, fœnugraci, maluæ, althea cum uncia cassiæ extractæ, & tantundem zuchari cum oleo de semine lini, butyro, &c. Conueniunt etiā iura pingua cū croco, aqua decoctionis camomillæ, &c. Extrinsecus cōueniūt inuentiones, cataplasmata, fofus, balnea, quæ parari possunt ex oleis camomillæ, anethi, &c. cataplasmata ex rebus anodinis, &c. quæ omnia nisi contulerint, ad narcotica transeundum, inter quæ debilior est egerthea, quæ stupefacit & resoluit, parum ualidior arhanasia, ualentius est philonium. A proprietate cu-

ranu colicam, stercus lupi, ossa mespilorum,
 castoreum, lūbrici terrestres puluerizati. Cu-
 ra colicæ pituitosæ quinque intentiones re-
 quirir: prima est uentris lenitio, secunda est
 humorum digestio, tertia est euacuatio, quar-
 ta residui resolutio ac membrorum roboratio,
 quæ intentiones non solum in pituitosa,
 sed etiam in biliosa & melancholica condu-
 cūt. Vētris igitur lenitio perficitur per lenien-
 sia, qualia sunt clysteria cum cassia, zucchero,
 hiera simpl. &c. Digestio fieri potest cum
 syr. de duabus rad. bisantino, oximelle simpl.
 & rhodomelle, modò materia sit uiscosa ac
 crassa. Euacuatio perficitur cū hiera simpl.
 cum diaphinicone, &c. Et nota quòd ma-
 teria in uis ductuum existens, absque alia
 preparatione euacuari debet, iuxta duo car-
 unia à Iacobo Foroiulensi posita, quæ
 sunt,

*Synocha cum colica phrenesi squinantis &
 anthrax,*

Materias crudas euacuare iubent.

*Resolutio residui fit cum oleis rutæ, liliorum
 alborum, camomillæ, in quibus concocta*
℞℥℥.ij.

sint cuminum, fœniculum, abrotanum, pule-
gium, anisum, &c. uel fiat cū electuarijs ca-
lidis, ut cū diamusco, electuario de baccis lau-
ri, aromatico ros. diagalāga, diacymino, &c.
Cibaria sint in colica lenientia ac roborā-
tia ob appetitus imbecillitatem, sintque cali-
diora & sicciora in frigidis doloribus, qua-
lia sunt porra & allia: sed ab initio morbi
ieiunare oportet: in sequentibus diebus ciba-
ria sint boni succi, uidentur cruditas & sa-
tietas. In doloribus à materia acri, uictus sit
humidior & frigidior, uidentur acria tam in
cibo quàm in potu, uidentur etiam in genere
omnia holera, legumina, graueolentia, &c.
Conueniunt aqua carnis, uicelli ouorum, me-
dulla panis in uino carica & passula, &c.
Cura fœcum siccarum perficitur cum lubri-
cantibus ac mollientibus, ut cū chysteribus ex
camomilla, anetho, althea, uiolis, fœnugræco,
cum oleo amygd. dulcium, butyro, &c. uel
cum iure galli, in quo coquantur tamarindi,
sebesten, &c. Cura inflammationis in colica
est, ut primū sanguis mittatur à uena cubi-
ti: secundò considerandum, num inflamma-

ratio ad suppurationem uel ad resolutionem tendat. Si ad resolutionem, in primis repercurientia in incremento, resoluencia cum reperiussiuis & mollientibus, in statu, discutientia cum mollientibus conueniunt. Si ad suppurationem, tunc suppuratio adiuuanda, deinde ad uomitum irritanda. Quæ rupta abstergentibus primò, & lenientibus, deinde conglutinatione indiget.

Cura flatuosa colica consistit tantum in resoluentibus flatum, qui si habeat materiã fouẽtem, frigidam, obstruẽtem, primò abstergentibus lenientibusque clysterijs, deinde incidẽtib; ac attenuantibus: & de obstruentibus indiget, quibus peractis educatur materia fouens, deinde resoluatur flatus.

Loci consentientes de cura doloris colici.

De cura in genere lege Arcul. & Mar. Cat. De cura pituitosa colica lege Galen. 12. meth. cap. 8. ibi, Dolores igitur, quos humor crassus excitauit, &c. Et de cura biliosa, ibi, Sin mordẽs humor sit qui affligit, &c. Et de cura ex inflammatione facta, ibi in eodem

Klxlz. iij.

loco, si sanguinis abundantia sit, quod dis-
tendat, ueluti in phlegmone fieri solet, pro-
ritus ubi uires ægri ualentes fuerint, sanguis
mittendus est, &c. Et de cura flatuosa etiam
mentionem facit, ibi, Pari ratione qui ex fla-
tuoso spiritu, &c. Auic. 16. tra. 4. cap. 2.
etiam curam habet ibi, Curatio uera est in-
cisio causæ, &c. Lege Paul. & Aet. fasius de
hac re. De cibarijs loquitur Auic. 16. tra. 4.
cap. 28, & 27. ibi, Colici indigent cibo le-
niente & roborante ob imbecillitatem appe-
ritus, &c. Lege etiam Paul. lib. 3. ca. 43. ibi,
In doloribus frigidus uictus sit calidior &
siccior, & per initia morbi à cibo abstinен-
dum: deinde acria assumantur, ut porra &
allia, in sequentibus sine boni succi, cōcoctu fa-
cilia, &c. lege Aet. ser. 9. cap. 30. particula-
rem de uictu mentionem facientem. Lege etiā
Razen in diuis ibi, Quñ sedatur dolor, &c.

Observationes in uictu.

Auic. 16. tra. 4. cap. 1, In regimine colica
interdicatur repletio, & si qua sit, per uomi-
tum expellatur, item sitis toleretur, aut si ab-
stinere nequeat, bibat parum, &c.

Observationes in curatione.

Marc. Cat. Oportet advertere ne differatur cura colicæ, quia est dolor intentissimus, citò uirtutem prosternens, etc.

Observationes de soluentibus pharmacis.

Auic. loc. cit. Cauendum ne in principio pharmacum ualde solutiuum exhibeatur: nã humores & schibala sunt plures, & fortè penetrare non possunt, sed incipiendū à lenientibus ac lubricantibus, etc. 2. In tribus casibus medicamenta ualde soluentia exhiberi debent. Primus, si materia antecedens in cōiunctam causam transeat, ut si à uenis ad intestina. Secundus, si humores adeò crassi existant, qui nec clysteris, uel leui pharmaco educi possint. Tertius, si usque adeò uehementis sit obstructio, ut nullo pacto per prædicta aperiri possit: item nullo modo hieræ addatur agaricus, nam facit eam retineri & profundari, etc.

Observationes in clysteribus.

Auic. loc. cit. Debemus esse contenti de clysteribus, quoniam à longinquis partibus non

atrahunt, nec humores commouent, nec febrē excitant, sicut pharmaca solutiuā: præterea clysteres absque nocumento reiterari possunt.

2. Si clysteres acuti non soluunt, supersedendū donec concocta sit materia: quādoque enim hepatis, cordi & capiti sua acredine nocent.

3. Non fiant clysteres, si quid crudi fuerit in uentriculo, ne ad inferiora trahatur: & hoc aduerte propter eos, qui in omni colica & in omnibus horis enemata imponi iubent. Mar.

Cat. Si in intestinis causetur excoriatio, non debemus fortia & acuta clysteria administrare: sed loco eorum lauatiua, & dolorem sedatiua. 2. Quod ager se taliter debet situare, ut clysteria declinent ad locum doloris. 3.

Quod reiteranda sunt pluries. 4. Quod suppositoria debent esse longa ad mensuram septē digitorum, ut uirtus eorum possit longius communicari, &c.

Observationes de narcoticis.

Mar. Catin. Non debemus narcotica à principio approximare, sed quando alia non sufficiunt: quia ex his materia infrigidatur ac incrassatur, si fuerit frigida, si oppilatiua,

magis oppilabitur: si uētositas, magis ineras-
sabitur. Hoc idem sensit Gal. 12. meth. cap.
8. ibi, Cauendus est magnopere in affectibus
qui à crassis & glutinosis humoribus fiunt,
&c. Item dixit quod extrinsecus hæc adhi-
bētur, & si intrinsecus præbeantur, sint bene
rectificata, &c.

Obseruationes de balneis & fomentis.

Auic. 16. tra. 4. cap 1, Cauēdum ne caput
uapores balneorum & fomentationum susci-
piat, & hoc cū frigidis applicitis. Mar. Cat.
Non debemus uti fortibus calefactiuis, neque
fortibus resoluentibus, ubi stet repletio ma-
terierum: nam augent dolorem, & materias
crassas subtiliant, & in uentositatem conuer-
tunt, nec competit remedium de allio à Gal.
7. meth. cap. 15. descriptum, nisi sit minora-
ta materia.

Nocentia & conferentia do- lori colico.

Inducunt colicam aqua aluminosa, capita
animalium, caseus, usus citri, citronia pōrica,
cucurbita, faba, fungi, granatū syluestre, lac

892 DE CONSEN. MEDIC.

omne, melones, menta, hordeum, pyra, tubera,
 &c. Conferunt ad colicam amygdala ama-
 ra & dulces, apium, besonica, calamentum,
 chamaleonta, cartamus, catapofia, castia, fi-
 stula, centaurea, colocynthis, enula, esula, eu-
 phorbium, galāga, galerita, aus carduelis,
 gith, ius galli decrepiti, hyosciam⁹, laurus, li-
 macia, matricaria, myrobalani, chebuli, na-
 sturtiū, oximū, cyclamē, polypodiū, radix pi-
 peris, ruta, sagapenum, sisamus, stercus canis,
 caprae, colūbi, lupi, porci, urtica, aqua mellis
 ferrea, diaphinicon, electuarium de baccis
 lauri, diaprasiun Nic. diacironiten laxa-
 sium, diaciminum, electuarium indum, ele-
 scoph, phylonium Rom. oleum de cartha-
 mo, laurinum, rutaceum, de piperibus, nardi-
 num, liliorum, pilula iliaca almans. foetida
 maiores Mes. sagenea Auic. theodoricon ma-
 gnum Auic. theriaca magna, troc. de uiolis,
 troc. de epithimo.

De prognosticis doloris colicis.

Hippoc. prognost. 2. cap. 13, Dolores qui
 cum febre affligunt circa lumbos & inferas
 sedes, si praecordia attingunt, inferas sedes

IN CVR. MORB. LIB. III. 893

relinquētes, exitiales admodum sunt: sed consideranda sunt alia signa: nam si quod horū prauum fuerit, desperandus est aeger. B. Intellige de his quæ symptomaticè mouentur ab una parte ad aliam. Hippoc. aphor. 2. apho. 6, Quicumque dolentes parte aliqua corporis dolorem non sentiunt, ijs mens agrotat. B. Id est, quicumque dolet, & doloris qualitatem non sentit, hic sensu agrotat: nō refert si sensum uel *ῥώμην*, uel animā dixeris. Et apho. 6. aphor. 7, Dolores uentris sublimes, leuiiores: qui uerò non sublimes, fortiores. B. Nota non secundum corporis longitudinem intelligi Hippoc. sed secundum profunditatem, id est, non secundum infimam & supremam corporis partem, sed secundum exteriorē & interiorē, &c. Et aphor. 6. apho. 40, Quibus dolor circa præcordia fit absque inflammatione, ijs febris superueniens mortum soluit. Et aphor. 7. aphor 26, In forti dolore uētris partium extremarum frigiditas, malum. B. Frigiditas fit uel ab inflammatione, uel ob caloris innati defectū (deficit calor, uel quia extinguatur, uel quia à multitudine suffoca-

rur)uel ob dolorem uehementem medias cor-
 poris partes occupantem, ad quē natura cō-
 tracta cum sanguine partes extremas tan-
 quam exangues relinquit. Et aphor. 7. apho.
 22, A uentris dolore diuturno suppuratio.
 Et aphor. 4. aphor. 11, Quibus tormina &
 circa umbilicum labores & lumborum dolor,
 qui neque medicamento, neque aliter solui-
 tur, in aquā intercutem siccam firmatur siue
 ἰσχυρῶς. Gal. 12. meth. cap. ult. Colica quæ
 à siccitate contingit, insanabilis est: cuius ra-
 tionem postea ipse reddit: lege eum. Auic. 16.
 tra. 3. cap. 8. & 9, Si colica erit incolumis re-
 tentio, non erit uehemens, & dolor mutabi-
 tur, & patiens ex administratione clysterio-
 rum ob exitum flatus & excrementi quietem
 inueniet. Si uerò fuerit mortalis, aderunt for-
 titudo doloris, uomitus, ad uomitum, sudor fri-
 gidus, extremitatum frigus, rationis turbatio,
 spasmus & retentio excrementorum: & si ue-
 stigium nigrum, uel bothor apparuerint, po-
 stridie moriuntur, &c.

De ileo.

Ileos, quem Latini uoluulum uocāt, est re-

nuium intestinorum dolor uehementissimus,
cum quo excrementorum per secessum diffi-
cilis fit exitus, &c.

Loci consentientes de ileo.

Gal. aph. 6. com. 44, Ileos est intestinorū
tenuium passio, in qua ob interclusam infe-
riorem uiam nulla excrementa inferius ex-
cernuntur. Aet. ser. 9, Voluulus est intestino-
rum affectio lethalem dolorē inferens. Gal. 6.
de loc. aff. cap. 1, Hunc ileon, id est, uoluulū
uocant, nonnulli etiam chordapson, quum sci-
licet tumor aliquis eminet in tenuiū intesti-
norum parte, ut uideatur intestinū chordarū
similitudine conuolutum. B. Chordapson ab
Aet. exponitur intestinorum emollitio, quæ
fieri dicitur, quoties admota manu durities
tactui succumbit: sed quoniam emollitio, si
durities adsit, intelligere nequeo, Galeni ex-
positio mihi magis placet. Vocatur etiam hic
morbus à Celso chordios.

De causa ileos.

Causa ileos est intestinorū uel obstructio,
uel retrictis facultatis fortitudo & attracti-
cis, uel porio frigida, uel intestinorū descensus in

scrotum. Obstructio deinde fit uel ab inflā-
matione, uel à tumore duro, uel ab alio quo-
piam abscessu, uel ab excrementis siccis, uel
ab alia intestinorum compressione facta,
aut à ueneni cuiuspiam portione, &c.

Loci consentientes de causis
ileos.

Gal. apho. 6. comment. 44, Visum est an-
tiquioribus medicis, uel ab inflationibus, uel
ab aridi stercoris obstructione huiusmodi
tenuium intestinorum affectus oriri. Idem
ait 6. de loc. aff. cap. 1, Vide etiā Gal. 6. de
sympt. cau. ca. 2 ibi, Fit etiam ab humoribus
præter naturam ad eò intestina obstipanti-
bus, &c. Paul. lib. 3. cap. 44. & Aet. ser. 9.
cap. 28, Fieri uoluulum dicunt intestinis unā
cum stercore in scrotum descendantibus: item
ex plagis quibusdam, ex frigore uehementi,
& ex acervata frigida portione. Auic. 16. tr.
4. cap. 29, Et quandoque accidit propter
portionem uenenorum facientium ileos. Inter-
dum fit ex fortitudine uirtutis retentricis,
nam gracilia intestina ob suam gracilitatem
magis ad retinendū sunt parata, quā crassa.

Vide Gal. 6. de sympto. cau. cap. 2. ibi, Quē-
admodum stercus per lethales uoluulos, &c.
Et Auic. loc. cit. uult quod ileos ab hisdeme
causis fiat, ac dictum est in colica. Haly Ab-
b. us lib. 9. cap. de col. enumerat primū apo-
stema calidum, obstructionem ex fimo sicco
uel ex humore crasso, rupturam abdominis,
priuationem ciborum, & potum lethiferi me-
dicamenti, &c.

De signis ilei.

Signa ilei sunt dolor supra umbilicum, ni-
hil ex facibus ad inferiora descēdit: Vomitus
interdum fecum, humorum & uermium: ru-
ctus inanes, factor oris & totius corporis, se-
quuntur etiam mala symptomata, qualis est
tremor cordis, uigilia, animi defectus, frigus
extremarum partium, sudor frigidus, urinæ
difficultas. Signa ueneni sunt imbecillitas ui-
rium, mollificatio & tremor cordis, nec ab
alia causa ista fiunt. Signa inflammationis
sunt dolor, durities facis, tumor, febris, &c.
Signa interstinguentia ileum à colica sunt. 1.
dolor uehementior quàm in colica. 2. locus
ilei supremam umbilici partem occupat, co-
ll. i.

lica infimam. 3. ileus magis tendit ad uomitum quàm colica, quum sit stomacho propinquior. 4. ileus non iuuatur à clysteribus & suppositorijs, sicuti colica. 5. In ileo maiora sunt & grauiora symptomata, quàm in colica, sicuti syncopis, tristitia, &c.

Loci consentientes de
signis ilei.

Galen. aph. 7. cō. 10, Primùm nihil in ileis ad inferiora descendit, & hoc est proprium & inseparabile indicium: uomitus non semper adest, nisi quando exitiales sunt, si uehementius distorqueatur, ascendit eis stercus & singultiunt, quidam desipiunt & conuelluntur compatiēte neruorum principio passioni uentriculi. Et 6. de loc. aff. ca. 1, Dolores uehementissimi in sublimioribus intestinorū partibus eueniunt grauitèr uomitionibus cruciantes, &c. Aet. ser. 9. c. 28, In principio adest dolor circunvolutus, uētriculi humiditas multa, exolutio, ructus inanes & nihil alleuiantes, murmura intestinorum, stercoris & flatus perfecta cohibitio: in uigore morbi, omnia sursum feruntur, adest uomitus bilis & pi-

tuia, totius corporis frigiditas, spirandi difficultas, &c. De signis distinguendis inter colicam & ileum lege Auic. 16. tra. 4. cap. 30. ibi, Amplius signa distinctionum colicæ cum signis ileos sumuntur, &c. Lege etiam de signis apostematum, ibi, Et factum ex apostemate, &c. Et nota hic in Auic. quod dicit, Et illic febris non erit, & tamen Gal. aphor. 6. comment. 44. inquit, Quâto maior ac grauior euadit, tanto maiorem febrem effici cōtingit, &c.

De curatione ileos.

Cura perficitur, ut dictum est, in colica per quatuor intentiones. Prima, cum regimine uitæ. 2. cum eius causæ ablatione. 3. cum euacuatione. 4. cum resolutione & roboratione. Victus igitur sit tenuior quàm qui dictus est in colica, si que boni succi, &c. Ablatio causæ ita erit, ut si uenenum sit, danda erit opera ut uomitus prouocetur propinato calente oleo, uel aliquo iure pingui, demum theriaca exhibeatur, uel quidpiã aliud, prout species ueneni magis requirit. Si uerò in causa fuerit obstructio, procedatur tunc cum

Lll. ij.

diffecantibus ac attenuantibus pharmacis, deinde purgante pharmaco aluus solvatur. Si fuerit inflammatio, eadem erit cura ac dictum est in colica. Si causa sit descensus intestinorum in scrotum, tunc intestina ad suum locum compellantur, & resupinato patiente fascia constringatur. Interim sectione uenae opus est, tum ob uenarum meseraicarum copiam, tum ob uehementissimum dolorem: cætera fiant ac dictum est supra.

Loci consentientes de cura ilei.

De prima intentione loquitur Aet. ser. 9. cap. 28. ibi, Cibi sint boni succi, &c. De secunda intentione loquitur Paul. lib. 3. cap. 44. ibi, Qui ueneni causa ileon patiuntur, compellendi sunt ut aquæ calidæ potu euomant, deinde oleo calente propinato, uel iure aliquo pingui, deinde interpositis aliquibus diebus theriaca exhibeatur. Quod si obstructio discutiatur purgante aliquo pharmaco, aluum inanire confert. Si ex intestini in scrotum descensu ileus accidat, in inguina intestinum compelletur, & fascia supinato patiente ligabitur. Auic. 16. tract. 4. cap. 31.

tria notat, primùm q̄ ileos est colica fortior,
 idcirco in cura properandum, iuxta illud
 Hipp. Extremis morbis extrema sunt oppor-
 tuna remedia. 2. quòd id quod bibitur, magis
 iuuat in ileo, quàm in colica: nec multùm re-
 ferre, an à bibitis uel à suppositis inchoetur.
 3. quòd in ileo magis sectio uena conuenit
 quàm in colica, &c.

Nocentia ac conferentia ileo.

Inducunt ileon argentum uiuum & caro
 porcina. Cōferunt ileo absinthiũ, acorus, aga-
 ricus, allium, betonica, chamædrys, chamæ-
 pitys, camomilla, centaurea, cyperus, eupato-
 rium, pastinaca, ruta, sauiba, stechas, turbit.
 Composita sunt, ung. alabaſtri, aragon, au-
 reum ung. Nic. ung. laxatiuum Nic. marcia-
 ton Nic. oleum lily bibicũ, oleum de cherua,
 confectio phar. Auic. 1. lib. 5. confectio Her-
 metis Auic. diacironiten Nic. electuarium du-
 cis Nic. phylonium catarcticum imperiale
 Nic. stomaticum calidum Nic. theriaca ma-
 gna, pilulæ sine quibus & fœtida, &c.

Lll. iij.

De prognosticis ilei.

Hippoc. aphor. 6. aphor. 44, Quibus ex stillicidio urinae ileos superuenerit, in septem diebus pereunt, nisi febre superueniente satis urina fluxerit. B. Quoniam adulterinum ac spurium uocauit aphor. Gal. idcirco damnatur ab Auic. eo quod causam aphor. ignoraret, quasi id non legerit Auic. quod in fine cōmenti inquit Gal. quod scilicet si ueritatē debet habere aphor. oportet multitudinem humorum crudorum unā cum multa frigiditytate causam arbutari, quam febris superueniens liquefaciat ac dissoluat, & per uiam urinae dissolutam natura emittat, &c. Et aphor. 7. aphor. 10, Ab ileo uomitus, singultus, desipientia uel conuulsio, malum. B. Quia intestina coguntur tandem ex se cū molestia contra naturam uidentis materiā molestantem extrudere, unde singultus, uomitus, &c. proueniunt. Aet. ser. 9. ca. 28, Familiaris ileos est puerulis, sed naturalis beneficio humiditatis euadunt: senibus uerò si accidit, nunquā conualescunt, in chordopso uocato subitum instat periculum, ut plerunque 3. uel 4. horā

non excedat. In inflammatione uerò si suppuratio uel longa mora contingat, periculo non uacat, quanquam sint ex eis qui seruati sint. Auic. 16. cap. 29, Et deterior ileos est, in quo expellitur per superiora stercus, deinde in quo est sudor foetidus habens factorem stercoreis: deinde in quo est anhelitus foetidus & eructatio foetida, &c.

Authores dissentientes circa
ileon & colicam.

- 1 Adserere, in colicæ principio conuenire narcotica.
- 2 Adserere, theriacam nouam esse uenenosam, & non esse exhibendam.
- 3 Adserere, cum Auic. ileon posse generari ex stranguria.
- 4 Adserere, ileon curari non posse per fluxum urinæ, mediante febre.

Confutatio dissentientium circa
colicam & ileon.

Ad primum respondet Conciliator differētia 204. per plures differētiās. Prima, sumitur à morbo uel ab accidēte, uel à uirium robore: unde nisi symptoma superet morbum
III. iij.

stante uirium robore, quòd nullo modo conueniunt. 2. diff. sumitur à causa morbi, uel à complexione morbi: unde permanēte uirium robore, & causa existēte frigida cum dolore remisso, non conueniunt narcotica, sed adhibenda sunt anodina: uerū si symptoma esset uehementissimum, & causa esset calida, ubi esset timor de casu uirtutis, tunc posset, sed magna cum cautela, exhiberi.

Ad secundum, Gal. 5. meth. cap. 13, Mulieri cū dormitura esset dedi theriacam quatuor menses antè confectam: habet enim id ætatis adhuc praualentem papaueris succū, qui in antiquatis ignauus redditur: igitur nō est uenenosa, & potest exhiberi.

Ad 3. Gal. aphor. 6. comment. 44, Aiunt enim quòd uesica inflammata angustia loci facta ex compressione in intestinis passionem affert, quæ ileos nominatur. Ego uerò multos me puto in tota uidisse uita, nonnullos tantū periclitantes, non paucos etiam mortuos, non potētes mingere, quorū nullus factus est ileosus: & sic tenet quòd ileos non generetur ex stranguria.

Ad quartum respondetur per id quod dictum est ex Gal. in eodem aphor. supra contra Auic. ibi, Multitudinem humorum, &c.

De renum & vesicæ calculo.

Morbus calculosus, qui à Græcis λιθίασις dicitur, est lapidis generatio ex humoribus viscidis & immenso calore orta, in qua urinæ excretio retinetur. Id tamen notum est, quod plerique medici attestati sunt, quod non solum in vesica & renibus, sed & in colo, pulmone, felle folliculo, iuncturis, stomacho & inguinibus lapides oriantur: unde lapides inter se differunt magnitudine, duritie, asperitate, colore, numero, loco & materia agente, de quibus satis copiosè infra mentionem faciemus.

Loci consentientes de renum & vesicæ calculo.

Galen. lib. finit. Med. Lithiasis, id est, calcularis morbus, est calculi generatio in renibus & vesica, ex qua urinæ excretio prohibetur. Quod calculi in partibus enumeratis gignentur, lege Gal. 6. de loc. cap. 1. ibi, Nonnulli à forti excernendi conatu, &c. Et 4. de

loc. aff. cap. ult. ibi, Quidam diuturna tussi
 uexatus frustum quoddam paruo grandinis
 grano, &c. Deinde se uidisse lapidem in fellis
 folliculo attestatur Gentilis, & in iuncturis
 & stomacho quidā Gilbertus, & in ingui-
 nibus Arcul. Aet. ser. 2. cap. 4, Consistunt la-
 pides in renibus iuxta ipsorum uentriculos
 aut parui aut maiores, interdū plures & pau-
 ciores, magnitudine, forma, colore, asperitate,
 & multitudine inter se differentes, &c.

De causis renum & vesicæ calculorum.

Causæ initiatrices sunt cibus potusque
 crassus ac uiscidus: causæ coniunctæ sunt bi-
 næ, quarum altera erit materialis, altera ef-
 ficiens. Materialis à crasso terreoque humore
 conficitur. Efficiens est ignea renum aut ue-
 sicæ caliditas, quæ tum naturalis, tum adue-
 titia esse potest, ut quæ ab aliqua re calida
 renibus adnata proueniat. Causæ uerò hu-
 mores in renibus tardantes erunt, uel expul-
 tricis imbecillitas, uel obstructio, quæ tum at-
 tenuatoria à superflua ac viscosa materia,

tum carnosā ab aliqua carne innata uel ab apostemate prouenit, &c.

Loci de causis renum & vesicæ calculorum.

Gal. 2. de natura humana, tex. 13, Plerique pueri qui plurimum uoraces sunt, humorem non modicum aggregant, quem crudum proprie uocamus, qui calculo gignendo in primis opportunus est, accedere calore, tanquam causa effectrice. Itidem asserit 3. aphor. commet. 26. ibi, Lapis est propria passio puerorum, qui ob edacitatem non paucos humores crudos coaceruant, &c. Auic. 18. cap. 16. tres causas calculi assignat, materiam scilicet quæ est humiditas uiscosa & crassa, uirtutem agentem, sicut est caliditas ab æqualitate egressa, & materie retentorem, qui est expultricis imbecillitas, quæ ab intemperie uel ab inflammatione & ulceribus oritur, &c.

Gal. 14. meth. cap. 4, Similiter & calculi generantur in renibus, asso scilicet in his crasso glutinosoque succo: prouenit enim hæc affectio ex ciborum crassorum succo, si quis liberalius his utatur, &c.

Obiectio.

*Quur non omnibus hoc uitium contingit,
quum utraque causa sit omnibus parata?*

Responsio.

*Dilucidatur hæc tua dubitatio à Gal. 14.
meth. cap. 16. ibi, Siquidem credendū est qui-
busdā esse dēfos admodum renes, uel per an-
gusta in iocinore ora, &c. lege eum, & rem
intelliges, &c.*

De signis renum & vesicæ
calculorum.

*Signa generationis calculi sunt urina exiēs
pura & aquosa, in qua non excernuntur a-
renosa iam prius uisa, sed retinentur. Signa
iam generati lapidis sunt dolor, grauitas, u-
rinæ suppressio, maximè si in utrisque reni-
bus lapis extiterit.*

*Signa motus lapidis sunt dolor uehemens
usque ad inguina communicans ad scrotū &
testes. Vehemēs inquam ob loci angustiam &
sensibilitatem, sed quum iam in uesica lapis
fuerit, dolor mitigatur & tandem mingitur.
Signa lapidis in uesica sunt pruritus puden-
di, ex cuius cōtractione penis intenditur, uri-*

na supprimitur, nec nisi magna cum difficultate & conamine emittitur. Sunt qui duos longiores digitos ano intromittant eleuatis prius sursum uersus cruribus, & aluo ab excrementis purgata, ut lapidem manifestè adesse sentiant. Arena insuper quæ subsidet, si rubra uel flaua fuerit, è renibus descēdit: si alba & cineritia, ex uesica. Egreditur autem arena, dum confirmari & dissolui lapidem contingit: quo confirmato, & obstructione completa, nō amplius arena exit, &c. Item lapis renum est rotundus, uesica est oblongus, &c.

Loci consentientes de signis
calculorum.

De his signis lege Auicen. 18. tra. 2. ca. 17, Signorum lapidis in renibus primum est urina crassa, quæ deinde incipit cōverti ad tenuitatem propter retentionem turbidi, &c. lege locum fusijs. Gal. 1. de loc. aff. ca. 1, Indicia lapidis in uesica sunt aqua similis urina, in qua subsident sabulosa quædam, laborantes assidue pudendum scalpunt, idque uel laxum uel intētum præter modum, postea de repente urina supprimitur. Vide Galen. 6. de

locis affectus, ca. 1. ibi, Nephritici dolores eodem in loco stabiles permanent, &c. Lege fusius. Acrius sermone 2. cap. 4. ibi, Adest loci dolor absque tumore foris apparente, & plura de signis annotatu digna inuenies. Lege etiam Arcul. 9. alm. plura enarrantem. Item Galen. 6. de locis affectus, cap. 1. ubi Hippocratem damnat in illo aphorismo, Quibus in urinis arenosa subsistunt, ijs uesica laborat calculo. Vide insuper Alex. Tra. lib. 3. cap. 34. Item Gord. & alios.

De cura calculorū renum & vesicæ.

Corpora quæ parata sunt ad calculum præseruatiuam curationem expostulant, at quæ actu egrotant, curatiua indigent. Præseruatio igitur has in se intentiones requirit: prima, ut materia quæ lapidē generat, nullo pacto efficiatur: secunda, ut si quæ facta sit, ne ad renes uel uesicam fluat, sed ad intestina mittatur, hoc efficit: tertia, ut si quid ex hac materia ad renes casu euenerit, ne illic figi ac retineri permittit: quarta, calorem renum qui est causa efficiens, remissiorefficit. Prima igitur intentio prohibet

omnia crassa & uiscosa tam in cibo quàm in potu, unde panes azymi, caseus, & animalium extremitates, & lacticia procul absint, similiter uitentur satietates & cruditates, sed attenuatoria sit dieta, urinam ciens, uitentur etiam dulcia, &c. Secunda, qua ex renibus ad intestina materiam diducimus, cōpletur per pharmaca leniētia, scilicet cum cassia uel decocto glycyrrhizæ, semine alchēchēgi, uel per enēmata lubricantia uētre, uel per terebinthum assumptum: nam ualde iuuat. Tertia non permittit figi materiam in renibus, sed eam expellit cum diureticis, ut cū brodio cicerum rubrorū, cum decocto glycyrrhizæ, in iure galli decrepiti, cum paritaria in sero lactis decocta, uel cum eius succo, &c. Quarta remouet, ac calorem intensum mitigat cum oleo uiolaceo, nenupharino, amygdalino, dulci, uitando ea quæ euidenter adstringunt, &c. Curatiua uerò ratio concretū in uesica uel renibus lapidē auferre intēdit, primò lubricādo uias cū cassia, & minuendo materiam per ea quæ frangūt lapidē, & urinā proritāt & ora uenarū referūt, facta in primis se

Etione uenæ, si sanguinis multitudo ob acutos
 dolores ad partem læsam se cōtulerit. Com-
 minuunt igitur lapidem quædā à proprietate
 occulta, quædam uerò à manifesta qualitate.
 Quæ igitur hoc à manifesta qualitate effi-
 ciunt, sunt pulegium, calamentum, origanum,
 saxifragia, radix graminis, amygdal. amar.
 Item radices petroselini, asparagi, brusci, scæ-
 niculi, apij, decoctum cicerum rub. reort. faba-
 rum & rad. maluarum, &c. Frangunt à pro-
 prietate occulta lapis Iudaicus, puluis lepo-
 ris combusti, uitrum multoties in aqua saxi-
 fragiæ extinctum, puluis lapidum cancerorum,
 limatiarum & mandibularum lucij piscis,
 Item sanguis hircinus, cortex lauri, & inter
 composita laudatur Iustinianum litōtriphon
 dialacca, &c. Competunt etiam clysteres ex
 decocto maluarum, parietariæ, camomillæ,
 melliloti, scænugraci cum butyro, oleo scor-
 pionum, benedicta, cassia, zucharo, uel cum
 oleo amygdalarum dulcium. Extrinsecus con-
 ueniunt omnia mollientia, qualia sunt un-
 guenta ex oleo amygdalino dulci, pinguedi-
 ne gallinæ, butyro, oleo de scorpionibus, &c.

Similiter & brodia pingua exhibeantur,
 &c. Ad roborationem stomachi, qui plerun-
 que imbecillitatem in hoc morbo suscipit, ista
 conferunt, scilicet oleū de absinthio, de menta
 unguentū, de absinthio, &c. Si qua uerò opus
 fuerit digestionem, perficietur cum oxymelle
 simpl. uel composito, cum aquis saxifragiæ,
 parietariæ, granorum iuniperi, &c. Quod
 si delatus ex renibus lapis circa collum ue-
 sicæ detineatur, tunc supinatus æger, eleua-
 riisque sursum coxis, adeò concutitur, donec
 ex ipso meatu lapis excidat, deinde si minus
 per urinā exierit, tunc per cautherem instru-
 mentum, uel per ea quæ calculos cōfringunt,
 amoueatur: quod si minus per hac curatio
 ad uota successerit, tunc per incisionem in-
 ter anū & testes in uesicæ collofactum adun-
 co ferro euelletur lapis.

Loci de cura calculorum renum & uesicæ.

De primis intentionibus lege Auic. 18. trac.
 2. cap. 18, ibi, Intentiones in curatione sunt
 abscissio materiæ & prohibitio generationis
 Mmm.i.

ipsius, cum abscissione causæ & rectificatio
 eius, deinde mundificatio & comminutio, &
 fractio, & compressio, & eradicatio eius, quæ
 omnia lōgo satis sermone explicat. De uictus
 ratione lege Aet. ser. 11. ca. 6. ibi, Deligant ci-
 bos, è quibus neque satietates, neque crudita-
 tes cōtingunt, &c. Gal. 10. de comp. med. per
 loc. cap. 1. Quæ calculosis auxiliant unica fa-
 cultate indigent, quæ siccare & extergere cū
 manifesta caliditate possunt: sunt autem ta-
 lia ferè omnia amara, &c. Paul. lib. 3. cap.
 45, Medicamentis uti oportet, quæ confrin-
 gere siue siccare calculos possunt absque ma-
 nifesta caliditate: sic enim Gracè habet,
 αἰὲν ἔσθ' ἀπορροῖν ἐν πικρῶς. Vnde uereor
 ne menda sit in Paulo, nam quacūque ab eo
 in hoc affectu recitantur, sunt manifestè ca-
 lida, sicut & in Gal. qui uicitur pipere, myr-
 rha, aniso, dauco, apio, &c. Aet. ser. 11. cap.
 5, Si timor adsit, ne multitudo sanguinis ob-
 acutos dolores materias ad affectam partem
 aduocet, secunda est uena cubiti à latere af-
 fecto, nec copia extrahenda, quum ex hoc fu-
 turum non sit, ut à renibus lapis excidat, &c.

Gal. i. de loc. aff. ca. i, Itaque supinato agro
ut crura reliquo corpore sint sublimiora, mul-
tifaria ipsum concuties, ut lapis ex meatu re-
cedat, deinde iube ut ager urinā reddere tē-
tet: quod si urina supprimitur, rursus uehemē-
tius cōcute, & si sic permāserit, demissa fistu-
la aenealapidē à ceruice uesicæ repelles, &c.

Generantia ac curantia calculos.

Inducunt ac efficiunt lapidem, amyllum,
caseus, camphora, candrus, farina cum la-
cte, lac coctum, lagana, porcinae carnes, tri-
ticum coctum. Curant lapidem radix aceto-
sa, acorus, amygdala amara, anisum, urina
porci, apium montanum, abrotanum, aqua
mellis & cicerum rubrorū, batheca, cap. Ven.
betonica, chamæleonta, cancer fluuiialis cum
myrrha, cardui agrestæ, cinis radicis caulis,
cicada, ciminū, cinis testarum, cochlearum, cy-
perus, condisi, cordumeni, corula, cubebe, dau-
cus, sion, id est, cresconi, fœniculum syl-
uestre, lac ficus, genista, gumæ cerasorum,
prunorum cum uino, graminis semen & ra-
dix, lapatiū, lauri cortex & radix, renes le-
poris, lūbrici terreni, malua matricaria, semē

Mmm.ij.

mellonum, millepeda, stercus muris cum aqua
 mellis, nigella, polium montanum, porri se-
 men, succus raphani, rubus, saxifragia, sa-
 uina, senation, segapenum, serpillum, scolo-
 pendria, cinis scorpionum, scenoanthos, fi-
 mus turturis & ius, tribulus, uitis aqua ca-
 dens, uitrum ustum tritum, succus urticae,
 iringi, usnea, hypericon, agaricus. Compo-
 sita sunt, Adrianum confectio Nic. antido-
 tum hemagogum, Camerina confectio Ha-
 ly, confectio conabaris Auicen. I. semen, dia-
 lacca magna Mesu. diasulphur Mes. diapi-
 retrum Nic. diaprassium Nic. electuarium Du-
 cus Nic. electuarium cabadij Haly, phylonium
 Rom. iustirium confectio Nic. Imperialis con-
 fectio Auicen. I. semen litotriphon Nic. miliu
 solis cum myrtho syluestri, Nephrocatacti-
 cum Nic. oleum benedictum Nic. oleu de gra-
 nis citri, oleum de cerasis Mes. de piperibus,
 de scorpionibus, oleum alchechengi, de sa-
 uina, petroleum, syr. maior Nic. Theodori-
 cum magnum, theriaca magna, unguenu la-
 xatiuum Nic. Zeneliten cofectio Auicen. Re-
 seruant a generatione lapidis aqua mellis, cas

sia syringa, genista, grana pini maioris comesta.

De prognosticis calculorum renum & vesicæ.

Auic. 18. tra. 2. cap. 16, In illo in quo est sedimen arenosum non aggregatur lapis, quoniam materia non est coarctata. Et scias quod parum accidit puellis & mulieribus, quoniam meatus vesicæ earum ad exteriora breuior ac latior est & paucorum anfractuum, &c. Et scias quod lapis renum & vesicæ est ex iis quæ hereditantur, &c. B. Quod dicit, mulieribus non accidere lapidem, mihi non placet: nam sua ratio potius ad facilem expulsionem, quam ad lapidis generationem pertinet: sed forte ratio potior est, quia mulieres calorem non usque adeo uehementem habent, ut materia in lapidem uerti possit, uel quia ex menstruis omnia superflua expurgantur, &c. Hippoc. aphor. 6. aphor. 6, Renum & vesicæ uitia in senioribus difficulter sanantur. B. Quia in motu semper sunt, dum contrahuntur & dilatantur, uel quia in senibus ob calorem innatum imbecillem, nec aliæ aegritudines longum.

Mmm.ij.

gè curantur, &c.

Authores dissentientes circa calculum.

- 1 Adserere, calculum generari posse à calido temperato.
- 2 Adserere, calculosis dormire super dorsum ualde nocere.
- 3 Adserere, lapidem renum curari posse per incisionem.
- 4 Adserere, diuretica in principio calculi conuenire, nulla facta euacuatione.

Confutatio.

Primum impugnat Gal. aphor. 3. cōment. 26. dicens, quòd materia crassa, cui uehementia caliditatis accedit, est causa generationis lapidum, & Auic. inquit, Virtus uerò augens est caliditas quum egressa est ab equalitate, ubi inquit Gentilis, non nisi ab excellenti caliditate lapidem posse generari.

Ad secundum Auic. 18. cap. 16, Et dormire super dorsum est ex eis quæ lapidi conferunt: nam ad resolutionē materiæ confert: & sic nō semper nocet, imò plerunque iuuat, &c.

Ad tertium Auic. loc. cit. Et sunt quidam

qui laborant extrahere ipsum per incisionem
 ilij & dorsum, sed est timor magnus in eo
 qui rationem non habet, quoniam oportet
 penetrare per musculos, per dorsum, per ossa
 magna, per nervos & arterias, & uenas ma-
 gnas, in quo casu accidit syncopis, & mors,
 & sic cura est potius impossibilis, quàm fie-
 ri posse putetur.

Ad quartum respondet Conciliator diff.
 205. quòd diuretica non còueniunt in corpo-
 re cacochymo uel pletorico, nisi facta eua-
 cuatione & digestionem. Item nec conueniunt
 in ulcere recèti, nec ubi fuerit obstructio, nam
 ut ipsa calida resoluūt ac putrificant. Præ-
 terea in ardore urinae non sunt adhidenda,
 eò quòd ad locum læsum materias ducunt, &
 plus ad mingendum stimulant, ex quo dolor
 augetur, &c.

De inflāmate, abscessu & vl-
 ceratione renum.

Dictum est sepius, quid inflāmatio, quidue
 abscessus & ulceratio, quare non est ut to-
 ties à nobis repetatur. Continet in se omnes
 hos affectus nomen nephritis iuxta Gal. 10.

Mmm.iiij.

de cōpos. med. per loc. cap. 1, Vnde Nephritis lib. fin. med. ita describitur, Nephritis est renis phlegmone cū dolore uehementi, interdū cum meiendi difficultate, ac fibrosis uel arenosis excrementis cum modico sanguine, &c. Variant deinde abscessus tum ab efficiēte materia, tum ex parte locorum, pro quibus uide Auicē. 18. cap. 1.

De causis horum affectuum.

Causae inflammationum renum extrinsecæ sunt, equitationes, percussiones, attritiones, plagæ, pharmacorum potiones, &c. Causa intrinsecæ sunt uel repletio totius corporis uel membrorum consentientium, uel sanguinis mala qualitas, uel excoariatio lapidis, uel urinae retentio renes extendens: causa coniuncta est sanguinis calidi influxus. Causæ aliorum abscessuum sunt aliorum humorum influxus, uel multitudo uaporesorum spirituum. Causæ ulcerum sunt quaecūque sunt causæ solutionis continui, sicuti apostema disruptum, uel humores erodentes, biliosi, acres, uel lapis egrediens, & quicquid scindere uel aperire uel erodere has partes potest, &c.

Loci consentientes de cau-
sis horum affectuum.

Aet. ser. 2. cap. 16, Renum inflammationes non solum humores corrupti, sed & plaga, & pharmacorum potiones, & attritiones, & praesertim continuæ, aquilonares. Auic. 18. cap. 1, Causæ apostematis renū sunt repletio in toto corpore, aut in membris communicantibus, aut qualitas & quantitas sanguinis, aut excoariatio lapidis, aut retentio urinæ apud renes extendens. Gal. aphor. 4. cōment. 75, Fit magna ex parte à lapide acuto, uel admodum aspero, aut à disrupto aliquo abscessu. Et in lib. de tumorib. cap. 2. Et 2. ad Glauc. cap. 6, Abscessus fiunt ab aliorum humorum influxu, & à multitudine uaporosorum spirituum, &c. Auic. loc. cit. Causæ ulcerum sunt causæ continuitatis solutæ & apertionis, &c.

De signis Nephritidum.

Inflammationis renum & uesicæ indicia sunt, loci affecti ardor, & cum grauitate dolor, febris cōtinua, mentis alienatio, bilis syn-

cera uomitus, mingendi impotentia, praesertim existente in uesica inflammatione. At si circa ilia dolores fuerint, & horror inaequalis, & febris inordinata, abscessus in renibus cum loci cruciatu testantur. Signa ulcerum renum uel uesicae sunt urina crassa cum exiguis carunculis. Dolor in affecto rene, interdum exiguum pus mingitur, interdum sanguis & ramenta. Item furfuracea urina, squamulae & grauis odor, cum mictu sanguinis & puris, ulcerationem uesicae denotant. Cognoscitur affectus esse in renibus uel in uesica per dolorem qui in differentibus locis accidit. Nam si ulcus sit in uesica, dolor erit in pube: si in ilijs & dorso, erit in renibus: si in urinae meatibus, erit in media regione, &c.

Loci consentientes
de signis.

Hippoc. aphor. 3. aphor. 36, Quibus autem morbo renali laborantibus praedicta accidunt signa, doloresque circa spinae musculos fiunt, siquidem circa exteriora fiunt, abscessus quoque exterius futuros expecta: si uero dolores magis circa interiora loca fiunt,

etiam abscessus interius futuros expecta. Le-
ge Gal. 6. de loc. aff. cap. 2. ibi, Renem affe-
ctum esse cognosces, si dolores cum horrore
interpellato uariòque infestare uideantur.
Hippoc. aphor. 4. aphor. 76, Quibus in uri-
na crassa existente carunculae paruae aut ue-
luti capilli una exeunt, his à renibus excer-
nitur, &c. Et aphor. 4. aphor. 77, Quibus in
urina crassa fursurea quaedam simul exeunt,
ijs uesica scabie laborat. Et aphor. 4. apho.
75, Si sanguinem aut pus mingat, aut renum,
aut uesicae exulceratione significat. B. Disce
in comment. Gal. quomodo renum affectus &
uesicae inter se distinguantur. Vide etiam
Auic. 18. tra. 2. cap. 2. ibi, Signa ulcerum. Et
Hippoc. aphor. 4. aphor. 81, Si sanguinem
aut pus minxerit, aut squamulas, & grauis
dolor adsit, uesicae exulcerationem significat.
Vide de his signis Arcul. 9. almans.

De curatione nephritidis.

Cura inflammationis renū & uesicae consi-
stit in ablatione causae. Causa autē est influ-
xus sanguinis, qui si adhuc influit, prohibē-
dum est ne influat, diuertendo cum sectione

uenarum, quæ in cruribus circa poplitæ consistunt, & cum cucurbitulis, frictionibus, &c. Quod si quidpiam iam fluxum est, per euacuationē sanguinis in cubito, deinde inflammationi ipsi per cataplasmata & foci medēdum: ita tamen ut si ad resolutionem tendat, cum his quæ pluries dicta sunt, sicut in principio cum reprimentibus, in uigore cum mixtis, in decremento cum resoluentibus, &c. Cura ulcerū etiam in abstergentibus ac mūdicantibus consistit, deinde cum his quæ cicatricem inducunt ac consolidant, &c.

Loci consentientes de cura nephritis.

Aet. ser. II. cap. 16, Si inflammationis acumen non remittatur, sed uehementior exurgat dolor, uena cubiti secanda, sanguinis detractioe repetita: & si quid inflammationis reliquatur, ad cataplasmata procedendum, &c. lege eum fusius. Auic. 18. tra. 2. cap. 3, Initio curationis est abscissio causæ per phlebotomiā ex basilica, si sanguis est uincens: interdum fit incuruatura popilitis, uel ea non ap-

parente, in saphena: & si sint cum sanguine humores acuti, calidi, per solutionem uentris, cum cassia fistula & aqua casei. Et de cura ulcerum lege eum fusius 18. cap. 12. ibi, In curatione ulcerum renum, &c. Lege de hac re Gord. & Arcul ibi, Causæ antecedenti hæc conueniunt, digestio, euacuatio, & diuersio, sed coniunctæ, quæcunque à me dicta sunt.

Observationes circa victum
in inflammatione.

Auic. loc. cit. Oportet ut detur in potu aqua dulcis frigida, sed nō ita frigida ut prohibeas maturationem. 2. Abstineat à carne & dulcibus, aqua calida, & omne calidum nocet eis, & aqua plurima non euacuetur, quin laborare faciat renes suos incessu & motu. 3. Et non est ulceribus & apostematibus aliquid magis congruum quàm quies. 4. Et balnea conueniunt eis, nisi in declinatione apostematum calidorum, &c.

Observationes circa medicamenta.

Gal. 10. de cōpos med per loc. cap. 1, Quæ

ad inflāmatas & ulceratas affectiones medicamenta componuntur, medicamentis mitigatorijs opus habent. Quū uerò impossibile sit hęc citò ad regiones renum peruenire, ob id ipsis pharmaca urinam cientia miscemus, &c. Itidē ait 4 meth. ca. 7. ibi, Quoties in uesica, &c. Gal. 13. meth. cap. 6, Ne quum circa sedem uel aliam huic uicinam partem initium phlegmones incidit, aluum deijcies, neque cū in uesica uel cole uel renibus est cœpta, pharmaca quæ urinam prouocent, bibenda dabis. Itidem ait 13. meth. cap. 11. ibi, Si quum in renibus, &c. Et 13. met. cap. 16, Calida quoque uitanda sunt, quum renes facillimè in duritiem occallescant, &c.

Aet. ser. 2. cap. 16. notat non esse exhibendum pharmacum purgatiuum, sed per clysterem aluum esse leniendam, nec multam clysteris copiam infundendam, ne repleta intestina renes comprimant, &c.

Observationes circa topica.

Auic. 19. tra. 1. cap. 10, Reprimentia frigida non longo tēpore applicanda; nam illud

nocium est, & indurant apostemata uelociter. 2. statim, si fieri potest, sedandus est dolor, quū uesica sit mēbrum neruosum. 3. quòd simus solliciti in prouocāda urina, quum frequētius retineatur in apostemate uesicæ, &c.

De prognosticis nephriticorum.

Hippoc. aphor. 6. aphor. 2, Atra bile uexatis & renum passionibus hæmorrhoides superueniētes, bonū. B. Ob id quòd mala qualitas humorū euacuatur, &c. Auic. 18. tra. 2. cap. 1, Omnia renum apostemata uelocia sunt ad hoc, ut in lapidem conuertantur. Et quādo apostema calidum est in rene, & non sit uacuum à febre, deinde accidat cōmixtio rationis, tunc est mortale. Et cap. 10. loquens de ulceribus inquit, Quòd multoties ex ulceribus renū proueniunt fistulæ, quæ nullo modo sanantur, & ille cuius ren disrumpitur, moritur. Et fen. 19. cap. de ulcer. uesicæ, inquit, quòd difficiliora sunt quā renum, & ille cuius uesica disrumpitur, moritur secundum plurimum : quòd si scindatur, non incarnatur, nisi in parte carnosā, &c.

De Diabete.

Hunc affectum uocant quidam hydropem matellæ, alij urinæ fluorem, alij dipsacon ab inexplibili siti, alij diabetem, qui nihil aliud est quàm renum affectio, in qua portio statim qualis assumpta est per urinam reijcitur, & raro accidere solet, &c.

Loci consentientes de diabete.

Gal. 6. de loc. aff. cap. 2, Diabetes est proprius renum affectus, qui caninæ in ore uentriculi cupiditati proportionem responderet, accedente præterea retentricis facultatis imbecillitate. Paul. lib. 3. cap. 43, ὁ δὲ βήτης ταχὺν τῷ πινομένῳ ὅτι διέξοδος οὐρου μόνον πιούτων δια ἐπόη. διὸ καὶ διψῶσιν ἀμέτρωσ, ὅθεν καὶ δίψακος ἐκλήθη τὸ πάθος, &c. Auic. 19. tra. 1. cap. 17, Est ut egrediatur aqua sicuti bibitur tempore breui, & proportionem responderet ad lubricitatem stomachi.

De causis diabetis.

Causæ sunt uel retentricis facultatis imbecillitas, uel facultatis attractorie uehemen-

tia. Prima fit à mala intemperie frigida in-
 trinsecus uel extrinsecus adueniente: secun-
 da fit à uehementi renum calore nudo uel
 complexo, attrahens à uenis emulgentibus, &
 ex eis ad hepar extenditur, & ex hepate ad
 stomachum, & ad omnia membra, unde hu-
 miditates membra irrorantes attrahit, & fit
 sitis uehemens, quæ potu non sedatur, unde
 ὀξυζαρκος dictus est, id est siticulus morbus,
 &c. Fit etiam à resolutione lacertorum col-
 li uesicæ, &c.

Loci consentientes de cau-
 sis diabetis.

Auic. 19. cap. 17, Causa diabetis est
 dispositio renum ob imbecillitatem acciden-
 tem & dilatantē orificia meatuum, quare fit
 ut aquositas non figatur in renibus. Et quā-
 doque fit ex frigore, toto corpori uel reni-
 bus dominante, aut à potu aquæ frigide,
 aut propter uehementiam attractiue, &c.
 Lege eum diffusius. Gal. 6. de loc. aff. cap. 2.
 Fit hic affectus à retentricis facultatis im-
 becillitate, &c. Vide eum fusius, & plura
 intelliges.

Nnn. i.

De signis diabetis.

Signa quando fit ex caliditate sunt lumborum caliditas, urina multa in principio, sicut lotura carnis recentis, minus tamen infecta & rubea, ac si defectu hepatis id proveniret: deinde processu temporis in qualitate & colore potus egreditur. Si fuerit à frigidityte, tunc circa lumbos percipitur frigus, & urina in principio est quantitatis consuetæ: deinde multiplicatur, & erit sicuti lotura carnis, sed minus tincta, quàm in fortitudine attractricis facultatis. Adest semper sitis, nec ex bibitis satiatur, sed Quo plus sunt pota, plus sitiuntur aqua, &c.

Loci consentientes de signis diabetis.

Aet. ser. II. cap. I, Comitatur sitis pertinax, ex qua nulla ex potu satietas contingit, quare assidue bibere coguntur, &c. Vide de hac re Gal. 6. de loc. aff. cap. 2. Avic. nullam de signis diabetis mentionem facit, lege tamen fusius Marc. Cat. cap. de involuntario exitu urinæ, ibi, Adest sitis intensissima, &c.

De curatione diabetis.

Cura in duabus intentionibus consistit, quarum altera ad ablationem causæ studet, altera ad mēbrorum urinae roborationem. Si causa igitur fuerit acritudo humorum, euacuatione demitur, deinde renes intrinsecè & extrinsecè cum succo granatorum & limonum infrigidentur. Si causa fuerit frigiditas, ex qua retentrix imbecillis sit, roboranda erit cum calidis stypticis, sicut cum decocto myrthi, sumach, balaustrarum, absinthij, cum uino chalybeato, aut cum puluere tali. R. cupularum glandium. 3. i. thuris myrrhæ ana. 3. 5. pelliculæ stomachorum gallinarum. 3. ij. Misce, & fiat puluis. Conueniunt etiam Troc. de spond. cum semine acetosæ T. de terra sigillata, de balaustris cum uino uel aqua absinthij. Si causa fuerit uehementia attractoriae facultatis à superflua caliditate innata, tunc expedit infrigidare & stypticare, qua ratione conueniunt syr. de agresta, de acerositate citri, cum aquis portulacæ, lactucæ, & ung. sandalinum comitissæ infrig. Gal. Si causa esset relaxatio

Nnn. ij.

musculorum colli uestica, conueniunt quacunque de paralitide scripta sunt, qualis est diacorus, acorus cōditus, &c. Sitis remouetur, si dato potu euomatur, & rursus frigidiore dato iterum reuomatur, donec sitis extinguatur, & aquositas à renibus diuertatur. Somnus etiā hac in re cōmēdatur. Quòd si prædicta morbum omnino non abstulerint, non erit præter rem, si stuporem in ducentibus utamur, sicuti lactuca, papauere, uel ceratarum ex succo papauere admota.

Loci consentientes de cura diabetis.

Auic. 19. tra. 2. cap. 18, Diabetes ut plurimum accidit ex caliditate ignea: quapropter plurimum curationis eius est infrigidatio & humectatio, &c. lege eum fusius.

Aet. ser. 11. cap. 1, Scopus medendi est ut humorū acredinē auferamus, sanguinēque, ac cum eo permixtum humorem serosum ad tardiores motū reddamus, & renū intemperiem reuocemus. Vide etiam Aet. ibi, Victus sit boni succi mordacitate carens, ut sunt oua sorbilia, alica, carnes porcinae, ui-

num ruffum craffius, frigidum, dilutum, item
caseus recens sine fale. Vide etiam Paulū &
Marc. Cat.

Obferuationes in cura diabetis.

Auicē. 19. tra. 2. cap. 18, Quæ oportet
ipsum uitare est labor dorsi, & assumptio
diureticorum, &c.

Obferuationes in euacuatione.

Gal. 7. meth. cap. 13. inquit, quòd euacua-
tio est renum, thoracis, arteriarum & uena-
rum, & cordis, & utriusque uesicæ commune
quoddam opus, fit tamen euacuatio leniens
ut Auicē.

Conferentia diabete.

Infrigidant renes, ac diabete conferunt,
camphora illinita uel bibita, cassia, siliqua,
cucurbitæ condita, oleum cucurbitæ, plum-
bum, &c.

De prognosticis diabetis.

Aet. ser. II. cap. 1, Si amplius mordēs cali-
ditas in uisceribus augeatur, uenter superior
corrugatur, & uenæ in ipso eleuantur, uni-
uersumque habent gracilem habitum, & ta-
bes totius corporis accedit: qui uerò nō min-

Nnn. iiy.

gunt, nec ex eis potus transpirat ob potus sa-
tietatem & humoris inundationem. & ue-
sicæ circūtensionē, acervatim uētre rūpuntur.

B. Siquis Aet. intelligere uoluerit, supponere
habet duas diabetis differentias: alteram, in
qua talis portio, qualis assumpta est, per uri-
nam reijcitur, alteram in qua nihil penitus
mingitur, nec potus per alia loca transpirat.

Qui igitur primo diabete laborant, incurrunt
marasum uel tabem, consumpta scilicet omni
uenarum humiditate, unde gracilis habitus
oritur & tandem mors. Qui uero non min-
gunt, nec per alia loca potum excernunt, dum
bibere non desinant, uentre rumpuntur. Vide
Gal. 6. de loc. aff. cap. 2. ad finem: & Auicen.
19. cap. 17, Quandoque perducit ad liquefa-
ctionem & ad ethicam, &c.

De vrinae stillicidio & eius
difficultate.

Mingendi actio bifariam laeditur in emir-
tendo scilicet urinam, & in retinendo. Actio
emittendi urinam, uel abolita est, uel imbecil-
lus, uel deprauata: si abolita, tunc i^gg^ge^ge^gia
dicitur, & est quā nullo pacto ager mingere

potest. Si uerò imbecillis fuerit, tunc δυσου-
εία à Græcis dicitur, à Latinis difficultas
urinæ, quæ nil aliud est, quàm meiendi desi-
deriū cum urinæ difficultate, & trifariā cō-
sideratur: primò, quum tenuiter mingitur: se-
cundò, quum in mingendo patiens longā mo-
ram occupat: tertio, quum mingere incipit, &
in mingendo persenerare non potest, sed ple-
runque intercipitur. Si uerò actio mingendi
fuerit deprauata, tunc excretio urinæ nō ri-
si guttatim destillabit, & uocatur σπασσο-
εία à Græcis, à Latinis uerò urinæ stillici-
dium, & est excretio urinæ guttatim stillātis.

Loci consentientes de stil-
licidio urinæ & diff.

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 2, At huiusce-
modi ambo uesicæ morbi unum cōmune sym-
ptoma, ischuriam, id est urinæ suppressionem.
Est & aliud symptoma, quum nihil penitus
urinæ in uesicā delabatur, abolita nimirū re-
num actione, &c. Et aphor. 5. comment. 58,
Quādo aliquis parum & frequenter mingit,
hæc passio urinæ stillicidiū nominatur, &c.

Nnn. ii.

Vide hac de re Alexan. lib. 3. cap. 38. Item
Arcul. 9. almans.

De causis stillicidii & diffi-
cultatis urinæ.

Causa primitiua uel sunt extrinsecæ,
qualis est casus, percussio, & læsio instrumen-
torum urinæ: uel non extrinsecæ, sicut sex res
non naturales assumptæ, &c. Causa anteceden-
s est triplex, uel ex parte uesicæ, aut à læ-
sione facultatum eius, aut à dispositione uri-
næ. Si ex parte uesicæ, tunc læsio aut est in
meatu colli uesicæ, aut uirgæ, & tunc uel est
aliquis abscessus, uel ulcus, uel scabies, ex
quibus dolens timet extra mittere urinam:
uel erit quædam obstructio obstruens urinæ
meatum. Si uero à læsione eius facultatum,
tunc uel erit uirtus sensibilis læsa, quæ nec
mordacitatem aut grauitatem urinæ perci-
pit: uel motiua uis uoluntaria læsa, dum
musculi relaxantur, & incontinentia urinæ ac-
cidit, uel retëtriciæ & expulsoriæ facultatis
imbecillitas, quæ à mala intemperie, aut à de-
fectu spirituum prouenit. Si à dispositione uri-
næ, tunc urina quantitate aut qualitate pec-

cat: quātitate, quum ipsa uel nimis sit pauca,
 uel nimis copiosa, unde expelli non potest:
 qualitate, quum nimis calida, mordicans,
 ulcerans, &c. Causa etiam potest esse imbe-
 cillitas renum, non ualēs aquositatem attra-
 here uel expellere, ob malam intemperie fri-
 gidam, aut calidā, aut ob earum obstructio-
 nem. Causa per consensum erit ex parte mem-
 brorum principalium, sicuti hepatis in se-
 questratione aquae deficiētis, uel ex parte ce-
 rebri spiritum animale retrahentis, &c.
 Auic. 19. tra. 2. cap. 6.

Loci consentientes de causis.

Auic. 19. tra. 2. cap. 6, Et fortasse causa
 est frigus, aut calor de foris, aut percussio,
 aut retētio urinae plurimae, &c. Aut fit pro-
 pter causam in meatu colli uesicae & capi-
 tis uirga. Aut propter causam in uirtute, aut
 propter causam in instrumento, aut propter
 causam membri mittentis, aut propter cau-
 sam in urina, &c. Gal. aphor. 3. comment. 16.
 & aphor. comment. 58. causam esse inquit
 imbecillitatem retentricis facultatis, quae ab
 intēperie, & aliquo prāter naturam tumore

fieri solet, uel acrimoniā urinae, quae etiam à renum passione, uel à superfluitate serosa ex uenis ad ipsas percolata prouenit. Et stillicidium urinae fieri inquit, recto intestino & utero inflammationem patiente, & hoc per compatiendi rationem, aut à puro ex renibus ad uesicam euacuato.

Obiectio.

Gal. stranguriam esse quoddam retentricis potentiae symptoma hinc inquit. Etenim 6. de sympt. cau. reposuit eam inter expultricis potentiae symptomata.

Responsio.

Soluit dubium Gal. 6. de loc. aff. cap. I, dum inquit, Humores mordaces omnia intestina & uesicam ad excretionem excitant: qui uerò mordaces non sunt, imbecillitatem intestinorum sequi consueuerunt, quia retinere contenta nec exiguo quidem tempore possunt. Ac si dicat, si à mordacitate humorum stranguria fiat, ad expultricem pertinebit facultatem: si uerò ab imbecillitate, ad retentoriam. lege de his causis Aet. ser. II. cap. 19. & Paul. &c.

De signis stillicidii ac difficultatis urinæ.

Stillicidium urinæ, & eius difficultas ex se manifesta sunt. Signa eius causarum erunt (si prouenit à frigore) urinæ tenuitas uel crassities cum albore, & frigus sentietur. Signa ab humorum acrimonia habentur ex urina acri bilem attestante, uel ab habitu ipso, uel à colore, & ab his quæ intemperiem calidam denotant. Signa apostematis sumuntur ex febre, uel quia paulatim fit affectus, & ex dolore loci, & eius extensione & tumore. Signa lapidis & obstructionis per syringam intromissam habebuntur. Signa humoris crassi cognoscuntur ex grauitate sensata & pondere. Signa flatuosi spiritus est tensio sine grauitate loci, quæ interdum permutatur. Signa mollificationis musculi uesicæ sunt egressiones urinæ absque uoluntate. Signa contracti musculi uesicæ sunt, quia urina retinetur, nec potest educi, nisi cum ualida compressione. Signa debilitatis sensus sunt, quod æger mordacitatē urinæ non sentit. Signa expultricis facultatis

lase sunt, si ex cōpressionē facilis fiat urinae
eductio. Signa difficultatis urinae per con-
sensum hepatis & cerebri, sunt eorum agra-
tudes praeedentes, & quod non apparent
laesiones aliae in instrumentis urinæ.

Loci consentientes de signis.

De his signis lege Auic. 19. tra. 2. cap. 7.
ibi, Signa eius, cuius causa est frigus, est al-
bedo urinae cum crassitie & tenuitate, &
multitudo surgendi ad mingendum, & sensi-
bilitas frigoris, &c. Lege diffusius librū, &
plura inuenies. Paul. lib. 3. cap. 45, Si neque
ab inflammatione, neque à calculo, sed ab
urinae acrimonia depēdeat, cognosces per si-
gna bilem attestantia. Si uerò à frigido fiat,
aderit urinae tenuitas albōrque, & prater al-
borem crassities, quæ humorem pituitosum
denotat. lege Arcul. Alex. & Gor. &c.

De cura stillicidii & diffe- rentia urinae.

Cura huius morbi consistit tantummodo
in eius causarum ablatione, ac in urinae pro-
uocatione. Inquiratur ergo omni studio eius
causa: nam si fuerit à frigore, tunc calefaciē-

do, & regimen calefaciens instituendo facile curabitur: proderunt interim clysteres ex rebus calidis, inunctiones & foci calidi prout sermo erit. Si causa erit obstructio colli uesicæ, uel fiat ab apostemate, cura erit apostematis prout millies dictum est: si à materia lapidea, recurratur ad caput calculi. Si à materia pituitosa, saniosa, uel sanguinis coagulatione, tunc intentio erit materiam attenuare cū incidentibus, attenuantibus ac aperitiuis, scilicet cum syr. bisantino de duabus rad. oxymelle simp. cum aquis fœniculi, apij, &c. deinde urinā prouocare. Prouocatio urinae multifariā fieri potest: primò leuiter uesicam comprimendo, uel cum supposito ex sale gemen, uel cū titillatione in capite uirgæ, cum fricatione in collo uesicæ prope anum. Proritant urinam ualidius inunctiones ex oleo scorpionum & liliorum alborum: nam præter quàm quòd calefaciunt, etiam resoluunt ac relaxant. Similiter focus ex paritaria, ex senecione, cum dictis oleis in sartagine frixis, & pubi admotis, uel ex rebus magis calidis, ut cum calamento, pulegio, sa-

bina. Intrinsicus conueniunt clysteres ex hiera picra, benedicta, cassia, zacharo, & oleis scorpionum. Cōueniunt etiam decocta fœniculi, asparagi, brusci, apij, petroselini, uel decoctum iuniperi, sabinae. Item puluis corticis oui, à quo pullus egressus sit, à suo cortice depurati, ad quātitatem drachmæ unius. Item rubea tinctorum, cātharides, amotis pedibus & alis. Prouocāt etiam urinā dialacca, diacurcuma Iustinianum, & confectio de cineribus scorpionum, &c.

Loci consentientes de cura stillicidii & difficul. urinæ.

Paul. lib. 3. cap. 45, Si ab acrimonia humorum dependeat, conuenit ptisana cremor, pisces, balnea, uictusque idoneus. Acris uita da sunt, uinum, exercitium, & tarda comestio. Si uero à frigida intemperie, conuenit uinum calidum, & cibi qui urinā prouocent: & hæc de regimine. Aet. ser. 11. cap. 19, Cōsiderandæ sunt præcedentes causæ: nā si fuerit frigiditas, cum calefacientibus & urinam prouocantibus tollenda est, addito etiam ad

pectinem foru. Si uerò caliditas præceſſit, ſicut urina acris & bilioſa atteſtatur, tunc ſanè exuberantem humorem uitioſum quàm celerimè purgare oportet, uitatis interim omnibus ſaliſis & acribus. Quòd ſi nec acrimonia adhuc auferatur, lac ipſum cum amylo in ueſicam deſciatur, &c. Auic. 19. T. 2. cap. 8, Si cauſa eſt humor uel ſanies, opus eſt ut curetur cum aperitiuis ac diureticis, &c. Lege eum fuſius, lege etiam Arcul. 9. almans. Item Mar. Cat. & rem aptius ac dixerim intelliges.

Conferentia ſtranguriæ.

Conferunt ſtranguriæ decoctio acori, cap. Ven. altheæ, ally, amygdala amara, apiũ, caſſia lignea, cicera, cyperus, ſemen cucurbitæ, gladiolus, gramen, chamædrys, aſſarum, phu, cardamomum, locuſta ſuffumigium, maiorana, mel, meu, mezereon, millefolium, ruta, ſerpillum, ſiſimbrium, aſparagus, ſcilla, terebinthus, porcelliones, uirga paſtoris, uſnea, rapa ſatiua, raphan⁹, miliũ panicũ. Cõpoſita ſunt cõfectio alchechegi Auic. egezea cõf. Meſ. phiſonium romanũ micridarũ, oleum amygdal.

de sabina, de ossibus persicorum, oxymel scil-
liticum, socrita conf. Haly. theriaca T. de
absinthio.

De prognosticis stranguriæ
& dysuriæ.

Hippoc. aphor. 6. aphor. 6, Renum & ue-
sicae uitia in senibus difficulter sanantur. B.
Et hoc aut propter inquietudinem renū, aut
humorum acrimoniam, aut uirtutem senum
imbecillem. Nam qui morbi senibus accidunt,
longi plerunque ad mortem ipsos concomitā-
tur. Auic. 19. tra. 2. cap. 6, Expertum est in
pluribus hominibus, & dictum est, qui habet
difficultatem urinae, & aduenit ei postea
tenasmos, moritur in septimo, nisi accidar fe-
bris, & plurimā prouocationē urinae faciat,
&c. Aet. ser. 2. cap. 19, Si acris humor diutius
in uesica moretur, partes ipsas corrodit &
exulcerat, &c. Hippo. aph. 3. aph. 16, In fine,
In siccitatibus lippitudines, articulorū do-
lores, urinae stillicidia, dysuriæ, &c. Lege
etiam 22. aph. 3, & 31. eiusdē, ibi, Senibus spi-
randi difficultas, urinae stillicidium, dysuriæ
siue urinae difficultates. Et apho. 5. apho. 58,

Recto intestino aut utero inflammationē patiente, urinae stillicidium accidit, & renibus purulentis urinae aduenit stillicidiū. Et aph. 49. lib. 7, Vrinae stillicidiū & mingēdi difficultatem seu dysuriam vini potio & uenae sectio soluit, incidere ante interiores in talo est bonum, &c.

De vrinae retentione.

Quae à Græcis ἰσχυρία dicitur, est exacta prorsus urinae retentio periculū afferens, &c. Et hoc attestatur Gal. lib. finit. med. ibi, Ischuria est exacta prorsus, &c. Vide etiam Gord. &c.

De causis retentionis vrinae.

Causae huius affectus sunt octo, inflammatio, durities, sanguinis grumus, expultricis resolutio, lapidis procidentia, membrorum compassio, ulceratio & lithiasis, uel alia obstructio. Retinetur etiam urina ob negotiorum importunitatem, uel per somnum, &c.

Loci consentientes de causis retentionis vrinae.

Gal. 6. de loc. aff. cap. 3, Ischuria prouenit, quum circa id quod continetur, contrahi

Ooo. i.

non potest, ut ipsum exprimat: interdum obstructio in inferiori meatu, aut à crassis humoribus, aut impacto lapide: nonnunquam ab inflammatione, uel alio tumore, ut angustior meatus reddatur, uel omnino obstruatur: lege locum hunc fusius, & antedictas causas inuenies, &c. Lege etiam Aet. ser. 2. cap. 21. ibi, Accidit & sanis saepe urinam ipsorum cohiberi ob negotiorum importunitatem, ac si diutius in cōcionibus foro iudiciario, somnisque mictionē retinuerint, &c. Lege Gal. loc. cit. & Auic. & Arcul. & alios modernos.

De indiciis retentionis vrinæ.

Ischuria ex compressione urinae statim cognoscitur, sed causarum suppressionis indicia nō tamen usquequaq; sunt nota. Signa igitur sunt, quod ex facultate excretoria hæc fiat, cognoscitur ex compressione uehementi ex qua urina excernitur. Signa obstructionis erunt, si minus per compressionem urina excernatur, & tunc obstructio erit à grumo sanguinis, si nulla adsit lapidis nota, & sanguis effluat: uel erit ab abscessu, si pus excernatur, uel inflammationis notæ nō aderint: uel erit

à caruncula, si ulcus & ulceris indicia præ-
cesserint: uel erit à lapide, si intromissa fistu-
la aenea lapidem remouendo urina euacue-
tur. Similiter si à crassis humoribus fiat ob-
structio, cognosces ex uictu præcedente, si in
otio educatus, si multis cibis crassis ac uisci-
dis humores generantibus usus fuerit, &c.

Loci consentientes de signis
retentionis urinae.

Gal. 1. de loc. aff. cap. 1, Intueri oportet
præterita & præsentia: nam si à resoluta fa-
cultate uesicae ischuria proueniat, tunc homi-
nem ita figurato, ut decliuus sit ceruicis uesi-
ca positus, ac tumorem præter naturam cõ-
prime, ut urina expellatur: quod si min⁹ pro-
feceris, tunc facultatẽ non resolutam, sed po-
tius urinae fistulam obstructam conijce. Si igi-
tur obstructio à lapide fiat, &c. Lege totum
hunc locum, & inuenies quaecunq; à me supra
posita sunt. Lege etiam Gal. 6. de loc. aff. ca.
3. ibi, Nõ fungẽte suo naturali munere uesica,
&c. B. Nota, q̃ in omnibus corporis parti-
bus est naturalis quædam uis excretoria, qua
excrementa secernuntur, naturalis dicta, eò q̃

Qoa. ij.

uoluntati non obediat, sed naturaliter agit. Vnde musculus ceruicem uesicæ circundans, tanquam uoluntati ipse obediens, uolentibus nobis eo usque ab actione quiescit, donec uesica suo munere fungatur, &c.

De cura retentionis urinae.

Quamprimum ischuriae causam agnoueris, facilis erit cura: nam suppressionis urinae causas amouere est curatio. Si igitur inflammatio causa sit retentionis urinae, curetur inflammationum curatione: quod si pus uel humor, uel sanguinis grum⁹ in causa sit, per dissoluentia pubi admota (uitatis urinæ cietibus, ne maior uel obstructio uel extensio circa uesicā fiat) statim curabis: uel his non conducētib⁹, ea mītēda sunt in uesicā quæ dissoluūt per syringā. Si uerò propter obtusum uesicæ sensū urina supprimatur, irritando excitare eius actionē expedit cū infestationibus aut cimicibus capiti uirgæ admotis. Si causa sit lapis, tūc admota syringa lapis excutiendus est, & sic de singulis, prout supra de distillationis urinae cura dictum est, &c. Aduertēdo etiam quaecunque à Paulo superius de regimine di-

cta sunt, &c.

Loci consentientes de cura
retentionis vrinæ.

Aet. ser. 2. ca 21, Si ex inflāmatione urina
supprimitur, sectione uenæ curabitur, adhibi-
tis etiā fomētis & cataplasmatu, quæ sæpius
ad inflāmata dicta sunt: si uerò supprimitur
à sanguinis grumo, tūc grumus eo pacto dis-
soluendus, quo de eruptione sanguinis dictum
est: si uerò lapis urinā supprimat, à loco ex-
cutiendus est, &c. Lege Arcul. 9. almans. ubi
de sectione agitur, quæ alys non iuuantibus
in collo uesticæ fieri solet, &c.

Stranguriæ & ischuriæ con-
ferentia.

Cōferunt strāguriæ & ischuriæ abrotanū,
acorus, agaricus, alliū, althea, ameos, amygd.
amar. anethū, apiū, arthemisia, bacca lauri,
balsamum, baucia, chamædry, chamepithys,
carpobalsamū, castoreū, cētaurea, ciminum,
cimices, cīnamomū, cyper⁹, cypressus, cuscuta,
crocus, daucus, eleniū, epithimū, fœniculū, fæx
uini usta, filipēdula aus, fursur tritici, gal-
banū, genista, melāchion, iuniperus, cassia,

Ooo iij.

terebinthus, lapatium, lithospermō, locustariū
 suffumigium, lūbrici terreni, maiorana, ma-
 tricaria, myrthus, nasturtium, origanum, oci-
 mū, parietaria, peonia, peucedanū, cap. Ven.
 portulaca, raphanus, rapa, satiua, siser, ruta,
 rosmarinus, salvia, sabina, saxifragia, sena-
 piū, sepia, serpillū, siler, sisimbriū, sinapis, scor-
 deon, asparagus, scenoanhus, stechas, tama-
 rischus, trifolium, betonica, uinum scilliticum,
 hypericon, hyringus, iris, porrum, cepa, aspho-
 dellus, petroselinū, iūcus odoratus, calamus o-
 doratus, resina mulei pini, lētiscus, hordeum,
 mel, eryū, pepo, piper, capparis, centauriū. Cō-
 posita sunt aureum ung. Nic. diaprasiū, dia-
 piretrum Nic. Iustinum conf. Nic. etiam mu-
 cos mingētibus, pilula diacastoreæ Nic. ung.
 mellinū dio. c. antidotū hemagogū Nic. etc.

De prognosticis retētionis vrinæ.

Hippocrates apho. 4. apho. 80, Si sangui-
 nem mingant, & grumos & stillicidium uri-
 næ habeant, & dolor in imum incidat uen-
 trem & pectinem & foemen, circa uesicam
 labor est. B. Intelligit pro labore morbi: nam

nō refert siue πρὸς siue ὑπὲρ quis dixerit, & intelligitur de omnibus urinæ instrumentis: nā partē pro toto, id est pro vesica, totum quod vesica annectitur, hic accipit, &c. Et Apho. 4. aph. 82, Quibus in urinaria fistula tubercula nascuntur, ijs suppuratione facta & eruptione, solutio. B. Hic subauditur, quod ex his tuberculis ischuria fiat, quibus disruptis proculdubio sanatur. Nota tamen quod in antiqua translatione Galen. pro ischuria legitur malè straguria, &c. Aetius ser. 2. ca. 24, Quā non eijciant lotium, subiecta membra morificantur, neque ita longè pōst moriuntur.

De urinæ incontinentia.

Quum urina inuoluntariè excernitur, tunc resolutione vesicam laborare dicimus, &c.

Loci consentientes de urinæ incontinentia.

Aet. ser. 2. cap. 24, Quibus resoluta est vesica, ijs uel prater uoluntatem urina excernitur uel supprimitur. Lege Auic. 19. cap. 13. de inuoluntario exitu urinæ. Et Pau. lib. 3. de urinæ incontinentia. Lege etiam cap. 18. ubi de resolutione, quæ unamquāque particulam

Ooo. iiij.

obsedit, mentionem facit. Lege etiā Arcul. 9.
alm. & Sauonarolam, &c.

De causis incontinentiæ urinæ.

In causa est ut plurimū resolutio musculi,
qui ceruicē uesticæ ambit, itē facultatis reten-
torie imbecillitas, item nimius potus, hepatis
imbecillitas segregare aquositatē non ualens,
itē nimia renū caliditas & superfluū frigus,
acuitas urinæ, & luxatio uertebrarū spinæ.

Loci consentientes de causis
incontinentiæ urinæ.

Gal. 6. de loc. affe. ca. 3, Si musculus qui ue-
sicam claudit resoluatur, tum inuoluntaria
urinæ excretio prouenit, &c. Auic. 19. tra. 2.
cap. 13, Fit ut plurimum propter superfluita-
tem frigoris & mollificationē lacerti, & de-
bilitatem uirtutis attractiue in uestica & re-
nibus, & propter caliditatē plurimam attra-
hentem ad uesticā resudationem à corpore, &
propter coarctationem stercoris cōprimētē, &
propter acuitatem urinæ, &c. Lege Aer. ser. 2,
cap. 24. Et Gal. de loc. aff. cap. 3. ibi, Alter lu-
xatis ad extremas partes spinæ uertebris in-
uitus urinā profudit, nullo infestante uesticam

dolore: coniecimus eius musculi neruum, qui
uesicam claudit, esse affectum, proinde spinā
curare uolumus, &c.

De signis incontinentiæ urinæ.

Nota esse possunt signa tum ex relatione
infirmi, tum ex his quæ dicta sunt: nam quo-
tiescūque copia urinæ frequēter emittitur, &
in mictione ardor nō sentitur, nec sitim ager
patitur, nec corporis extenuationē, tunc iudi-
ca musculū uesicæ esse resolutū, à quo excre-
tio inuoluntaria urinæ procedit, &c.

Loci consentientes de signis.

Lege Razem 9. almans de fluxu urinæ, &
Aui. 19. cap. 13. ibi, Et scire facile fit ex eis
quæ præterierunt, &c.

De cura incontinentiæ urinæ.

Cura talis sit, qualē diximus in cura dia-
betis, pro quib⁹ lege diffusius Aet. ser. 2. c. 24,
& ubi ad eos qui se in somno permungunt re-
media scribit, & Auicē. ubi de mictu in lecto
sermonē facit, & est fen. 19. t. 2. cap. 15. Item
curam de inuoluntario exitu urinæ, &c.

Cōferētia inuolūtario exitui urinæ.

Cōferunt inuoluntario exitui urinæ & mol

ificationi uesticæ, acetum scilliticum, acorus,
calamus aromaticus, chamepithys, ciminum,
cinis ungularum apri, cyperus, codea, pulmo
hædi, helenium, carnes ericy, sceniculum agre
ste, chubebe, laurus Alexandrina, cerebrū coa
gulum leporis, lignum aloes, mumia, ostraca,
grana pini, cortices populi, sisimbrium, scolo
pèdria, uestica apri, mures elixæ & comestæ.

Composita, confectio Aristomachi Auic. con
fectio philosophorum Auic. ibi, l. 5. Vinum ex
tinctionis ferri, oleum nardinum, oxymel scil
liticum, electuarius piperis Haly, tamaricon
cōf. Haly, trisera magna, trisera de scoria ma
ior Auic. Tro. alchechēgi Auic. hiera Galeni.
De prognostic. incontinētix vrinæ.

Aet. ser. 2. ca. 24, Qui præter uoluntatem
urinam emittunt, quanto plus eis contingit, eò
minus periculo sunt obnoxij.

De ramicum generibus, id
est, de herniis.

Quod ramicem siue herniam Latine dici
mus, Græci κήλας omnes ferè testium tumo
res uocant, & sunt numero octo. Primus Hy
drocele, quæ est incocti humoris in parte scro

ti collectio. Secundus Enterocoele, est intestini in alterū locū paulatim uel semel delapsus. Tertius, Hidrēterocoele, & est delapsus intestini, aquei q; humoris collectus in scroto. Quartus, Cirsocele, & est quorundā uel omniū uasorū, quæ testē alunt, dilatatio. Quintus, Hydrocirsocele, & est dilatatio uasorum unde aluntur testes, & crudi humoris ī scroto aliqua parte collatio. Sextus, Epiplocele, & est omenti lapsus in partē scroti. Septimus, Enteræpiplocele, & est intestini & omenti in scroto partem delapsus. Octauus, Sarcocoele, id est, carnosus ramex. Inuenitur etiam exōphalos, id est, procidens umbilicus, & est umbilici prominētia diuersis de causis proueniens, sed nos de hernia aquosa & intestinali tantū & inguinali uerba faciemus, &c.

Loci cōsentiētes de generib. ramicū.

Gal. li. de Tum. præter naturā. c. 17, & 18, Induratis testibus ὀδρκοκήλῳ nomen imposuere: quū uerò in testiū tunicis humor aquosus colligitur, ὕδρκοκήλῳ: si uerò omētum in testiū tunicas descēdat, ὀπιπλοκήλῳ: si uerò peritoneū ī inguina profluat, βελωνοκήλῳ:

si circa umbilicū, Ἰσχυρόμφολον, & uide Gal. li. finit. med. Auic. 22. cap. 2. enumerat etiā octo species herniarū, quæ sunt uentosa, aquosa, saniosa, carnosæ, uaricosæ, zirbalis, intestinalis, & apostemosa, & hoc sub ruptura nomine. Caput deinde aliud facit de umbilici augmento, quod alij de eminētia inscribūt, & habet tot species, quot de herniis nuper diximus. Unde uentosa à Græcis dicitur πνδρμόμφολον, carnosæ σαρκόμφολον, aquosa ὑδρόμφολον, Zirbalis ὀπιπλόμφολον: & est omenti in umbilicū decursus, & sic de singulis. Lege de his fusius iuxta Aet. ser. 14. ca. 22. 23. & 24.

De causis ramicum.

Causæ sunt intrinsecæ & extrinsecæ, sicut casus, percussio, plaga, saltus, uel quicūque alius motus uiolentus. Causæ intrinsecæ sunt per se notæ: nā à flatu flatuosa in parte abdominis cōtenta, uaricosæ à latitudine uenarū & ab earū imbecillitate prouenit: aquosa ab aqueo humore in scrotū delapso, & sic de reliquis. Hæc autem proueniūt peritonei membrana aut nimium extenta aut rupta, &c.

Loci cōsentientes de causis ramicū.

Aet. ser. 14. cap. 22, Aquosa hernia interdū ex occulta, interdū à manifesta causa cōtingit. Ex occulta, quum aquosus humor circa partes corpusculorum, quæ scrotū contexunt ac implicāt, sanguini admixtus, collectus fuerit: ex manifesta, quum ex plaga collisis uel fractis uasis sanguis affluens in substantiam aquosam transmutatur. Galen. lib. de Tum. præter naturam ca. 18, Interiori membrana quam Græci *ἐντέριον* uocant, uulnerata ac rupta fiunt ramicæ, &c. Lege hunc locum fusius. lege etiam Auicenn. fen. 22. cap. 2. ibi, Ruptura fit propter solutionem paniculi, &c. lege etiam Arcul. & Paul.

De signis ramicum.

Signum commune omnibus rupturis est tumor inter abdomen & peritoneum apparēs. Signa herniæ apostemose sunt signa abscessuum communia, scilicet tumor, durities, grauitas, dolor, & quod paulatim augetur. Signa herniæ cirbalis sunt, quia paulatim aduenit, non sentitur, rugitus est parue quantitatis, nec multum ad profundum olei se ex-

redit, nec resupinato agro ita facile reuertitur ac intestinalis. Signa enteroceles, id est, intestinalis sunt, facilis reductio, cū resupinatur, rugit dū intromittitur, nisi uel flatus, uel siccae faeces in causa sint, ne tam citò introducatur: est præterea magnæ molis, acciduntq; dolores uehementissimi, dum oseeum extendit, & testiculum comprimit. Signa aquosæ sunt, quod tactui cedit, & extenditur oseeum: cognoscitur etiam per eius splendorem, lenitatem: item quia cum mollitie grauis est, & paulatim fit, nec quocunque ager situetur, interiora petit. Signa flatuosæ sunt, quia redit absque dolore, statim facta compressione, absque quod ager resupinetur, etiā percussa resonat: nec adest grauitas, nec lubricitas, sed cum lenitate tendit. Signa sarcoces, id est, carnosæ sunt, quia cum duritie tumet, & est absque dolore: non augetur, nec minuitur. Signa uaricosæ sunt, quia ipsa est dura, oblonga, ueluti uirga, cuius crassities excedit aliquando crassitiem digiti: cognoscitur etiam ex repletis uenis, &c.

Loci cōsentientes de signis ramicū.

Auic. 22. cap. 3, Signum autem cōmune rupturis est additio apparens, & sentitur inter sifach & mirach. Signum herniæ intestinalis est redditio eius cum uelocitate cū resupinatur, & sensibilitas rugitus, & propriè quum premitur. Hernia uerò ex zirbo & sifach cognoscitur ex aduentu eius paulatim, &c. lege eum fusius: lege etiam Arcul. 9. alm. Item Aet. ser. 14. cap. 22. & plura intelliges.

De curatione ramicum.

Scopus curandi hydrocelem & flatuosum ramicem est, causam à qua humor aquosus uel flatuosus gignitur, amouere. Quod fiet primò cum phlegmagogis, uel aquosum humorem educantibus pharmacis siue clysteribus, deinde cum resoluentibus, sicuti cum farina fabarum, cimino, emplastro de baccis lauri, & similibus: deinceps prohibendum est ne noua eodem in loco aqua uel flatus generetur. Prohibent nonnulli extrahendo aquā, alij cū cauteriis urendo usque ad epidimin, quem Arabes didimum uocant, sed reuera in hoc casu uisionem ualde timeo: nam si epidimis

totus uratur, uereor ne testes corrumpantur.
 Si minus, certum est quod per partem non u-
 stam adhuc aqua descēdet: quare satius mi-
 hi uidetur aquā resoluentibus extrahi, quā
 urentibus. Cura enteroceles & epiploceles, id
 est, hernia intestinalis & xirbalis in duplici
 intentione consistit, in reductione scilicet in-
 testinorum ad suum situm, & in retentione
 in situ suo conuenienti, & in constipatione
 seu consolidatione rupti ac laxati. Reducū-
 tur ad suum situm intestina & omentum, si
 resupinato patiente cruribus sursum eleuatis
 leui manu comprimantur, & leuiter agiten-
 tur, quibus ob uentum renitētib; primum cū
 resoluentibus ac discutientibus mollientib; s-
 que flatum succurrimus, ut cum decocto al-
 theæ, camomillæ, melliloti, semine lini, fenu-
 græci, anisi, cimini, cum spongia applicato,
 uel cum oleis camomillæ, anethi, amygdalarū
 dulcium, adhibita interim diligētia, ut emol-
 liētibus ac unctuosis clysteribus faeces extra-
 hantur. Retinentur etiam in suo situ intesti-
 na pluribus mediis, primò cum fortè ex aqua
 uino & aceto decoctioni gallarum, nucum,

cupressi & aluminis. Secūdo, cū cerato de pel-
le arietina, descriptione Gētili, stringēdo lo-
cū in quo eminētia apparet cū angulo, quod
uulgò bracheriū dicūt, non mutando id, nisi
ad decimumquartum diē. Tertiò, cū porioni-
bus constipantibus, unde aliqui utuntur, scru-
pulo uno limaturæ chalybis cum uino, in quo
hepatica terrestris, gallæ uirides, & nuces cu-
pressi incoctæ sint. Quartò, cū manuali ope-
ratione, sicut cū incisione ac actuali, siue po-
tentiali ustione. Et modum incidendi docet
Auic. & Albucasis, & plerique alij, quos ui-
dere poteris. Cura sarcocoles, id est, carnosæ
herniæ, eo modo erit perficienda, ac si esset
quidā scirrhus. Similiter apostemosum rami-
cē curabis nō aliter, ac curari solēt alij absces-
sus: eminētia uerò umbilici eandē ferē cura-
tionem requirit, ac de hernijs dictū est, &c.

Loci consentientes de cura
ramicum.

Aet. ser. 14. ca. 22, Tutissima itaq; curatio
herniarū chirurgia & ustione perficitur, si
peritus artifex coningat: potest etiā medica-
mento serotū inuri, & consumpto humore &
Ppp. i.

cicatrice inducta firmari, &c. Gal. meth. 14. c. 13, Quod humor qui in hydrocelis uisitur, alienus à corporis substantia tota natura sit, si cuti etiā quæ in ascitis hydropibus continetur aqua, dixisse sufficit, quarū certè euacuationē uel medicamentis quæ digerant molimur, uel chirurgia in hydrocele quidem immisso sypho ne, in asciti adhibita punctiōe, quā paracense sin uocant, &c. Vide hac de re Arc. 9. almans. Auic. & Marc. Cat. Auic. 22. ca. 5, Si ambo ad osseum descendant, possibilis est reductio cum resupinatione & qualibet compressione cum manu. Quod si addatur ruptura, incipiatur in desiccādo illud quod dilatātū est propter humiditatem, & adunādo quod scissum est, & ingenietur in cōsolidatione eius. Quod si fiat inobediens ad redeundū, se deat aeger in aqua calida, & emplastretrur ruptura donec redeat, deinde cōstringatur, &c. De cura sarcocoles lege Gal. 14. meth. c. 17, nam cum scirrhis cum enumerat.

Observationes circa regimen.

Auic. 22. c. 4, Regimen uniuersaliter habentibus rupturam est dimittere repletionem &

morum plurimum, & saltus, & incestum subitum & coitum. Item dimittere cibos inflatuos, & non multum uti potu aquæ, & dimittere omnes res mollificantes, &c. B. Cōsidera quod cuiq; ramicis speciei uictus ratio sit in contrarium exhibenda.

Cōferētia enterocelis & hydrocelis.

Conferunt enterocelis & hydrocelis barba hirci, bdelliū, adeps canis cū alumine scisso, cupressi folia & nucis, glutē de corijs, muscus, herba, plātago, psylliū, semen lini cū resina & myrrha, pētaphilon, ruta sylvestris, symphitū, betonica, tritici palea, filix herba cum axungia, lenticula in modū emplastri, peucedanū, cerotū de pelle arietina. lege de his in cōsilijs Montagnana. Item Gord. Sauo. & Arcul.

De prognosticis ramicum.

Auic. 22. c. 2, Et scias quod ramex intestino rū & tribi est agritudo multū difficilis, quātumuis sit parua, & ramex aqua est agritudo facilis, & si sit magna: ramex uerò ramicosus ac carnosus difficulter aut nūquā sanatur, & tandē oēs ramices inueterati, ac lōgō tēpore facti, suspecti sunt, ne testes corrūpāt.

Ppp. 4.

Aet. ser. 14. c. 24, Caterū nosse expedit intestinorū herniā, qualiscūq; fuerit, semper aquosa deteriore. Gord. Et quū pertransit septem dies, tunc labia fiunt dura & obturata, quorum unio uidetur impossibilis, &c.

De gonorrhœa.

Quod seminis profluuium Latine dicitur, Græcè γονόρροια ἀπὸ τοῦ γόνος, quod est genitale semē, & ρεῖν quod est fluere, appellata est, quæ nil aliud est quàm inuita ac præter uoluntatem & pudendi tensionē, seminis excretio. Sunt tamen qui differentiam inter semen & geniturā esse dicant, ut semen tantū in his esse uelint qui generare adhuc non possunt, e contra uerò genituram.

Loci consentientes de gonorrhœa.

Gal. 6. de loc. aff. ca. 5, Gonorrhœa est inuita ac præter uoluntatē seminis excretio. Et paulò post, significantius dices esse assiduam seminis excretionem haudquaquam cole extenso. Aet. ser. 11. cap. 33, Gonorrhœa est seminis excretio præter uoluntatem ac pudendi tensionem.

De causis gonorrhœæ.

Causæ sunt uel spermatis copia, uel eius tenuitas & acrimonia, uel multitudo eorū quæ generant sperma, uel erunt imbecillitas re-
tentricis aut facultatis, aut expulsiuæ fortitudo in seminarijs uasis: uel gonorrhœa ex conuul-
sione contingere potest, aut ex renibus ob eo-
rum adipis liquefactionem, quæ fieri potest à
nimio coitus desiderio, aut à multitudine coi-
tus, aut eius cogitatione.

Loci consentientes de causis
gonorrhœæ.

Gal. 6. de sympt. cau. ca. 4. Gonorrhœa si
pudendo non intento euenerit, re-
tentricis facultatis in seminarijs uasis imbecillitatem sequi-
tur. Si uero intento co-
le acciderit, conuulsi-
oni quodammodo similis erit affectus, &c. Vi-
de Gal. 6. de loc. aff. ca. 5. ibi, Nam sicut re-
tentio, &c. Vide etiam Aet. 11. ca. 33. ibi, Fit
gonorrhœa ex uasorum seminaliū fluxione,
&c. Vide etiā Auic. 20. c. 30. ibi, Causa aut
est in spermate, aut in uasis seminalibus, aut
in renib⁹ & lacertis, aut in principijs ex sper-
mate uel ob eius copiam, & tenuitatem, &c.

Ppp. iij.

De signis gonorrhœæ.

Signa quando fit ex multitudine seminis sunt, quia ad copiã coitus nulla corporis imbecillitas siue diminutio sequitur. Signa tenuitatis seminis sunt manifesta inspicienti sperma. Signa mordacitatis seminis sunt, quia in exitu dolor percipitur, adest ardor urinæ, & color eius ad flauitiem decliuus est. Signa imbecillitatis retentricis sunt, quia sine erectione uirgæ semen egreditur: si à cōuulsione hoc malum proueniat, aderit erectio, &c.

Loci consentientes de signis gonorrhœæ.

Auic. 20. ca. 31, Illam, in qua causa est spermatis multitudo, non sequitur debilitas & diminutio cum multitudine coitus, &c. Et illa quæ fit à tenuitate eius, cognoscitur cum turmis spermatis præsentia. Et illa quæ fit propter acuitatem & mordicationem eius, sentitur ipsa in egressione, &c. Lege Aet. ser. II. ca. 33. & Gal. 6. de loc. aff. ca. 5. &c.

De cura gonorrhœæ.

Similis erit huic cura, qualis in omni fluxu

parari solet. primò cū paucō cibo & potu, & si à lesa retētrice gonorrhœa oriatur, cata-
 plasmatis, in seſsionibus adstringentibus uten-
 dum, ex lentisco, rubo, myrtho, acatia, hycisthi
 de paratis. Si fiat à multitudine seminis, eua-
 cuetur primū, deinde sperma exiccetur. Exic-
 cant sperma rad. nenupharis. 5. lactucæ, por-
 tulacæ, rutæ, agni, id est casti, folia salicis, ci-
 minum, calamentiū, myrrha, euphorbium, item
 diaciminū, &c. Si fiat à tenuitate spermatis,
 reſperetur cū stypticis calefaciētibz exiccā-
 do, & crassitiem inducēdo. Si à facultate ex-
 pulsoria, tunc utēdum est frigidis & parum-
 per stupefacientibus, &c.

Loci consentientes de cura
 gonorrhœæ.

Anic. lo. ci. c. 32, Minoretur cibus, fiat eua-
 cuatio, & administrentur ea quæ exiccant
 sperma, & minorant ipsum. Euacuatio tenui-
 tatis eius est cū eis quibus inest stypticitas, &
 calefactio cum exiccantiis permixta, &c. Vi-
 de illum fusius. Aer. ser. 11. cap. 33, Primū in
 quiete & paucō cibo & aquæ potu affectos
 observare oportet, cibi nō facile corruppan-

Ppp. iij.

tur, nec difficulter permulentur, & resiccan-
di vim habeant, &c. B. Quod sint in quiete,
intelligendus est Aerius in primo morbi tem-
pore: nam post hoc exercitijs agros esse com-
mittendos ait Paul. quibus totum corpus &
affecta partes firmenur.

Observationes circa curam.

Cauendum est primùm, ne quum crassitiem
tenuitatis genitura inducere queras, aliquid
in medicamentorum compositione addatur,
quod genituram adaugeat, &c.

Conferentia gonorrhœæ.

Conferunt gonorrhœæ agnus, id est castus,
aqua frigida, calamentum, camphora, lac ca-
præ cum melle potatum, castoreum cum succo
agni, casticoreu, hematites lapis, eruca, lactu-
ca semen, nymphaea, portulaca, plumbi lami-
na, semen ruta, ireos, diaprasiun Nicolai, e-
lectuarium Sauo.

De prognosticis gonorrhœæ.

Aet. ser. II. ca. 33, Non solum autem uiris,
sed & mulierculis hoc malum accidit, & in
fœminis agrè tollitur, &c.

De priapismo.

Priapismus est genitalis membri tenigo in longum & latum citra ueneris appetentiam aucta, & denominatur à Priapo, quem talem mēbrū habuisse suapte natura finxerūt homines. Sunt qui hanc affectionem Satyriasm nō minent, à Satyro etiā priapo dictam: sed quū Pau. distincta capita de satyriasi & priapismo habeat, describatūque ab ipso ἢ Ἐλευθέρου ὅτι παλμὸς τῆς αἰσθητικῆς, &c. fecit uerem à priapismo distinctam aliquamiter esse dubitare ob eorum causam, de qua infra fufius dicitur.

Loci consentientes de priapismo.

Gal. 6. de loc. aff. c. 5, Priapismus est, cū coles & in lōgitudine & circulo totus augeatur, nullo stimulatē ad libidinē desiderio, aut acquisito calore, ut quibusdā accidit, qui supini decumbunt. Lege similem descriptionem iuxta Galen 9. de cōpos. med. per loc. cap. 9. ibi, Priapismus est auctio pudendi, &c.

De causis priapismi.

Causæ huius affectus sunt tres, prima arteriarum ora immodicē patentia: secunda, uas

porosus spiritus in fistuloso nervo ortus: tertia, est rei uenereæ abstinencia. Ora arteriarum patent uel ob humorum uitia, uel ob flatuosum spiritum sine ordine & uiolenter euacuati: flatuosus uero spiritus fit ab humore uiscoso crassoque, cum caloris paucitate. Abstintia rei uenereæ accidit ob seminis retenti multitudinem, &c. Satyriasis, de qua superius mentionem fecimus, est assidua colis palpitatio, quæ cum uasorum seminis inflammatione, interdum cum intentione accidere solet: quæ si tantum à flatuoso spiritu fiat, nullo modo à priapismo differre potest.

Loci consentientes de causis
priapismi.

Gal. 6. de loc. affect. cap. ult. Fit priapismus uel ob arteriarum ora immodicè patentia, &c. Lege etiã Gal. in lib. de Tum. præter naturam ca. 15. ibi, Pudendorum resiones præter naturam quæ non desistunt, quidam ἄτυ εἰς αὐτὸν, quidam ὑπὲρ αὐτὸν nuncuparunt. uide horum differentiam postea, 6. de loc. aff. cap. ult. Vide etiam causas flatuosi spiritus, 14. meth. ca. 7. Itẽ 6. de sympt. cau. ca. 2. De

satyriasi, uide Paul. de prima palpitatione locuti. De secunda fecit mentionē Aet. unā cum priapismo. Auic. 20. c. 37, Causa propinqua tensionis est multitudo uenositatis crassae in partibus membrorum coitus aut materia uetosa, in ipso morbo concocto, aut superueniens eis ex arterijs aut uasis spermatis.

De indiciis priapismi.

Indicia p se sunt manifesta ex definitione data, & ex infirmi relatione: lege tamen Gal. 14. meth. ca. 5, In ijs qui sic sunt affecti, etiam inuitis pudendum arrigitur. quod ubi uiderit quispiam, statim intelliget esse ex inflammationum genere, &c.

De cura priapismi.

Si causa fuerit materia flatum efficiens, tunc tres medendi intentiones insurgunt: prima regimen uictus, secunda est euacuatio, tertia materiae discussio & resolutio. Regimē sit attenuans absque manifesta caliditate. Euacuatio fiet uel per sanguinis missionem, uel per purgationem, tum per uomitum, tum per ea quae per inferiora soluunt. Residuum materiae discutitur per frictiones crebras, per

exercitium & balnea ex aquis digerentibus,
 & per ea quæ unico uerbo calefaciunt & ex-
 iccant. Sed interim per initia si calidior ma-
 teria fuerit, ea imponenda quæ caloris pro-
 portioni respondeant, ut cum cerato rosaceo,
 infrigidante Galeni, cum lamina plumbi, &c.
 Digesta materia tunc ad dissoluentia acce-
 dendum sine calefactione uehementi: si autem
 cum camomilla agno, id est casto, &c.

Locī consentientes de cu-
 ra priapismi.

Aet. ser. 2. cap. 32. loquens de regimine in-
 quit, Hac affectione prehensos, inedia usque
 ad tres dies adseruare conuenit, utendumque
 esse cibis qui leniter attenuare ualeant citra
 manifestam caliditatem, &c. Iridē ait Gal.
 14. meth. & cap. 8. & 9. de compos. med.
 per loc. cap. 9. ibi, Palam est non oportere
 mēbra ipsa calefacere, sed refrigerare leniter
 per ceratū rosaceū, &c. Lege etiam fusius in
 meth. cap. 8. ibi, Principiū curationis cōmune
 est, ut totū corpus ea quam ferre potest eua-
 cuatione euacuetur, euacuatio fiet per mis-
 sionem sanguinis, &c. lege eum fusius, &

plura à me recitata intelliges, &c.

Observationes in cura.

Aet. ser. 2. cap. 32. ait cauēda esse quacūque urinam citare possunt, & omnia quae uenerē prouocare ualeant. Auic. fen. 20. cap. 39, Dimittat coitū omnino, & cogitationē in eo, & cōsiderationē ad id quod mouet desiderium, nisi acciderit priapismus propter emissionē coitus: nam tūc coitus est curatio, &c.

Prohibentia satyriasm & uenerem.

Prohibent satyriasm & uenerem uirex, allium, berberis, camphora, cicuta, cataplasmata, coriandrum, eruca, ruta, lactuca, menta, finus muris, & nymphaea, salicis folia, portulaca, rosa, plumbum, stannum, nepita, faba & diaolibanum Nic.

De prognosticis priapismi.

Aet. ser. 2. cap. 32, Ceterum dolores eis contingunt, quales tetanici habent, & hi qui reliquis membris distendunt, & ex praecipiti hoc modo affecti pereunt, nisi confestim eis auxiliū feratur: quum uerò moriuntur, uenter eorū inflatur, & frigidum exudat, &c. Auic.

loc. cit. cap. 37, Et hoc accidens quando non curatur, peruenit ad tetanum uisum spermatum, & accidit apostema calidum cum eo, & interficit, &c.

Authores dissentientes circa Venerea.

- 1 Adserere, desiderium coitus esse tantum ex cerebro ob uirtutem imaginatiuam.
- 2 Adserere, gonorrhœam esse passionem propriam pudendi & expultricis facultatis.
- 3 Adserere, coitum nec per se, nec per accides ualere in egritudinibus cerebri pituitosis.
- 4 Adserere, satyriasmum esse morbum ridiculosum potius quam curandum.

Confutatio dissentientium circa Venerea.

Ad primum respondetur, quod duplex est desiderium, alterum scilicet animale, quod in concupiscentia inuenitur: alterum naturale, ex repletionem spermatis, quam euacuare tendit natura. Primum ut quaedam concupiscentia à corde oritur, licet per cerebrum postea perficiatur, secundum prouenit à iecore, unde Auic. Et desiderium coitus est ab hepate, &c. igitur non tantum ex

cerebro, sed ex alijs etiā mēbris principalib⁹.

Ad 2. dicitur, q̄ iuxta Galeni placitū gonorrhœa sit passio per se retētorie facultatis, & propria uasorū seminaliū, sed per accidens expulsoꝛie, & secundū apparentiam ipsius pudendi, & hoc affirmant Auic. & Sera. Non erit igitur proprius expultricis nec pudendi affectus, sed per accidens.

Ad 3. inquit Auic. coitū maximè præstare ad euacuationē & diuersionē superfluitatū, unde in ileo morbo præsertim inuat, quoniā causam aegritudinis, quæ fit ob amorē, remouet, & paratos cadere in aegritudines phlegmaticas ex eius multitudine liberat, si moderatus præcipuè fuerit, &c.

Ad 4. Auic. Perducit hominem ad spasmus & tetanum uasorum spermatis, & interficit. Vnde morbus hic ualde timendus est, & non ridendus, ut aliqui adserunt, &c.

De suppressione mēstruorum.

Menses sunt mulierum profluvia, à uitiatō humore depēdētia, eoque dicti sunt, quod singulo mense accidant. Tempus durationis mēstruorū multis mulieribus est à primo usq;

576 DE CONSEN. MEDIC.

ad tertium diem non paucis à primo usque ad quintum, alijs ad septimum, & raro ad duodecimum accedit profluendo, incipitque fluere à quartodecimo anno, paucis ante 13, aut 12. nec ultra quinquagesimum fieri solet: imò à triginta quinque annis praesertim obesis mulieribus solet cessare, &c.

Loci consentientes de suppressione menstruorum.

Gal. 6. de sympr. causis cap. 4, Menses sunt deprauatae per uterum fluxiones, quae expurgato per hanc partem uniuerso corpore fiunt. Paul. lib. 3. cap. 60, Mulierum plurimis menses quartodecimo anno fluere incipiunt, paucis ante 13. aut 12. plerisque post 14. erumpunt. Haly Abb. 9. de pass. matri. latitudinem inceptions menstruorum esse inquit à quarto anno completo usque ad 14. & latitudinem desinentiae à 36. usque ad 50. & hoc idem affirmant Auic. & Arist. 9. de animalibus, & hoc intelligitur de uniuersali durationis tempore. Particulare uerò incipit à duobus diebus, & se extendit usque ad septem. Galen. 5. aphor. Tempus menstruationis

nis durat à 3. die usque ad 8. quòd si ultra
citràque fluxerit, talem fluxum præter na-
turam dicimus, &c.

De causis suppressionis
menstruorum.

Menstrua supprimuntur uel per se affe-
cto utero, uel per consensum. Per se afficitur
uterus uel ex duritie contracta, uel ex ue-
narum angustia, uel ratione facultatis ex-
pulsoria, quæ ob malam intemperiem oriri
solet. Supprimuntur rursus, obstructis uasis,
quæ ad uterum descendunt, & hoc uel ra-
tione caloris desiccantis, uel ob copiam hu-
morum crassorum, uel ob abscessum, uel car-
nem additâ. Sistuntur etiâ menses, si ad alia
loca sanguis trãsseratur, uel ob uaria excre-
tionû genera, &c. Per consensum etiâ suppri-
muntur, uel ratione hepatis sanguinẽ non dis-
cernētis, uel ratione obstructionis totius cor-
poris, uel aliorû mēbrorû particulariû, &c.

Loci cōsentientes de causis sup-
pressionis menstruorum.

Gal. 6. de sympt. cau. cap. 4, Suppressionis
causa mēstruorum uel est durities uteri, quæ

uel illico ab origine cōtrahitur, uel post generationē: & hoc ratione uteri affecti, qui ex uenarū angustia, aut ex uasorū uteri cōpressionē, quū immodicē corpus crassescit, aut ex intēperie uteri procedit. Detinētur etiā menses ob materiā ipsam, quū crassum fuerit uel uiscosū quod euacuatur. Supprimūtur rursus obstructis ob huiusmodi humores, uasis, quæ ad uterū descendūt, uel ratione uniuersi corporis, &c. lege tu fusius. Aet. ser. 16. c. 51, Sistūt mēses quibus sanguis crassus est & uiscosus, & quibus ad alia loca transfertur, uelut per nares & sedē. Quin & sanguinē ex torace reiectātibus, uel quibus per uenæ sectionem multus extrahitur, &c. Lege de his causis Gal. aphor. 5. cōment. 57. Item Auic. fen. 21. cap. 25. ibi, Mēstrua retinentur aut propter causam propriam, aut communem, &c.

De signis suppressionis menstruorum.

Suppressio mēstruorum quæ fit à frigore, cognoscitur grauitate, somno, coloris albedine, pulsus raritate, copia urinae, & excretionē pituitosa. Quæ uerò fit à caliditate, demō-

stratur ex inflatione ac exiccatione uteri,
 uel ex his quæ uterū radunt ac mordent: quæ
 uerò fit à siccitate, manifestatur ex his quæ
 præterierūt, præsertim ex extenuatione cor-
 poris & uenarū tenuitate: quæ autem fit ab
 abscessib⁹ uel carne addita per obstetricē, cū
 signis abscessuū cognoscitur. Similiter quæ
 fit à duritie, uel à cōceptione, per obstetricē
 uteri ceruicem tangentem cognoscetur, &c.

Loci consentientes de signis sup-
 pressionis menstruorum.

De signis lege Auic. 21. cap. 27, Illius quæ
 pēdet à frigore, signū est grauitas somni &
 profūdatio in ipso, & albedo coloris, uiridi-
 tas uenarū, & raritas pulsus, & multitudo
 urine, & phlegmatica egestio, & reliqua. Le-
 ge eum uberius. Gal. 6. de loc. aff. cap. de
 uteri aff. citat aph. 39. lib. 5. ibi, Si mulier
 quæ neque grauida est, neque peperit, lac ha-
 bet menstrua, huic defecerunt, & ibi alia in-
 dicia suppressionis ponit: nam inquit, Graui-
 tas totum corpus molestat. Item fastidium,
 ut nulla adsit cibi cupiditas, horror inæqua-
 lis. Quòd si inæqualitas sine horrore euenerit,

Q 99. 4.

alienaque cupiat, iube quod obstetrix uteri
 cervicem tangat: nam dictum est ab Hippoc.
 aphor. 5. aphor. 34, Quibus os uteri durum est,
 hu uteri os comprimere est necessarium: quod si
 citra duritiem clausum sit, eam pregnantem
 esse conijcies: quod si clausum sit cum duritie,
 effectum esse uterum portendit, &c. lege tu
 fusius. Lege etiam Aet. ser. 16. cap. 54. ibi, Sup-
 primuntur ex frigidiore temperatura, &c.
 Quod per excrementa corporis signa habere
 possimus, elice ex Gal. 6. de sympt. cau. cap.
 4. ibi, Talem semper refert speciem id quod
 excernitur, quale est id quod in animante
 redundat, &c.

De cura suppressionis men- struorum.

Cura retentionis mēstruorū duobus scopis
 indiget: primum in remouēda causa, alterum
 in prouocādis menstruis. Si causa igitur fue-
 rit uehementissimus calor, menstrua cohibēs,
 tunc prouocare ea non licet, quum sat sit ab
 hoc calore superfluitates absumi. Si uerò in
 causa fuerint longæ egritudines precedētes
 cum imbecillitate uirium, tunc nec prouocan

da sunt, quū corpus potius reficiētibz quā
 euacuantibz indigeat. Si uerò causa fuerit
 materia pituitosa, tunc in medendo opus est,
 materiā, à qua menstrua corrūpantur, & à
 suo naturali ordine mutātur, præparare, &
 præparatam euacuare. Præparatur crassa
 attenuādo, & obstructa aperiendo cum oxy-
 melle, sy. bisantino de duabus rad. cum aquis
 fœniculi, apy, cuscute. Euacuatur cū his quæ
 humorem superfluum educūt, ut cum agarico,
 electuario indo, diaphinicone, &c. & si quæ
 mala fuerit intēperies relicta, tunc his remo-
 ueri debet, quæ stomachum & hepar robo-
 rāt, quales sunt multæ cōfectiones, &c. Quòd
 si mēses retineātur ab aliquo abscessu, cura-
 tur cura apostematū, ut pluries dictum est. Si
 causa fuerit pinguedo, tunc adhibitis resol-
 uētibus curabitur, cum exercitijs & ieiunijs,
 &c. Si causa fuerit aliquod ulcus, tunc cura
 erit impossibilis: & si quid cura fuerit, tunc
 per regimen & frequentem uena sectionē fiet,
 ut sanguis per tenuem uictum & sangui-
 nis missionem, qui fluere per intestina con-
 suenerat, discutiatur ac euacuetur. Prouocat
 Qqq. ij.

982 DE CONSEN. MEDIC.

deinceps menstrua decoctum quinque rad.
cum sabina, pulegio, calamento, mentastro,
origano cum syr. de duobus uel quinque rad.
Prouocant ualenter trochisci de Razes, cas-
sia lignea, crocus, cinnamomum, borax auri-
ficum. Item balnea, frictiones & cucurbitulae
poplitibus ac coxarum parti domestica ap-
plicitis, item saphenae uenae incisio, & pessa-
ria ex mercuriali & melanthio cum musco
in rara syndone, &c.

Loci consentientes de cura sup-
pressionis menstruorum.

De cura lege Aet. ser. 16. cap. 53. ibi, Quae
ob nimiam caliditatem non purgatur, quam
maximè humectare oportet cum balneis, &
uberiore ac humidioris cibo & potu, quae
ob nimiam frigiditatem oppositam curatio-
nem exposcunt, &c. Gal. aph. 5. comment. 36,
Intentio sanationis est primùm ora uenarum
adaperire, quae ad uterum pertingunt, sangui-
nemque extenuare, deinde purgationem ad-
hibere: nam quando crassi euacuantur hu-
mores, tales sanantur dispositiones, &c. De
prouocandis mēstruis lege aph. 28. lib. 5. ibi,

Suffitus aromatū muliebria ducit, ſæpius uerò & ad alia utilis eſſet, niſi capitis facerent grauitatē, &c. B. Veritatē nō cōtinet apho. in omni mēſtruorū ſuppreſſione: nā ſi detinētur mēſtrua ob uteri inflāmationē, aut reſionem, aut ob alias ſimiles cauſas, nihil ſuffitus aromatum prodeſſet, ſed ſi ſiſtuntur ratione ſanguinis craſſi uel obſtructionis uasorū aut ſubſtātiæ deſitatis, uerū eſt, quòd per aromatū ſuffitus mēſes euocātur, quū craſſa extenuat, obſtructa incidēdo reſerat, & obſerata aperit. Quæ uerò ſint aromata docet Ga. eſſe amomū, caſſiam, coſtū, cinn. &c. Vide Auic. 21. tr. 3. ca. 28. Vide etiā Arc. & Marc. Cat.

Prouocantia menſtrua.

Prouocant menſtrua abſinthium, acorus, agaricus, agnus caſtus, allium, aloes, amara-cum, amygdalæ amaræ, abrotanum, artemiſia, aſſa, ciclamen, calamentum, chamædrys, chamæpithys, camomilla, cantharides, caſto-reum, centauium, cinnamomum, cupreſſus, cyperus, cucumer agreſtis, naucus, hele-nium, eupatorium, phaſeoli rub. lens ſylueſtris, galbanum, ammoniacum, iris lupini,

℞. iij.

984 DE CONSEN. MEDIC.

maiorana, cuscute, laurus, laudanum, mar-
rubium, melissa, mentastrum, matricaria,
mercurialis, myrrha, nasturtium, ouum ana-
ris, organum, oximum, papauer rub. pastina-
ca, peonia, peucedanum, pulegium, rapha-
nus, rosmarinus, rubea tinctorum, ruta, sam-
bucus, salvia, saturegia, sauina, serpillum, si-
napi, scamonium, scilla, spica, urtica, usnea.
Composita sunt diacalamentum, diatrion, pi-
percon, diaprasiū, troc. de myrrha, theria-
ca magna, triphera magna, pilula foetida de
serapino.

De prognosticis suppressionis
menstruorum.

Aet. ser. 16. cap. 52, Suppressis mens-
truis sanguinis reiectionis ac syderationis peri-
culum imminet, &c. Lege nonnulla etiā iux-
ta Gal. 6. de loc. affe. cap. 4, Quae intelli-
tam possunt de mens-
truis quā de re-
tecto se-
mine. Auic. 21. tra. 3. cap. 26, Suppressis men-
sibus ei cui uirtus ad excernendum est potēs,
assimilatur utris, & multiplicantur capilli,
& nascitur ei ueluti barba. Quare frangitur
forma eius & incrassatur, deinde moritur, &

interdum prouenit ante mortem ad dispositionem, cum qua non est possibile ut prouocentur menstrua Hippoc. aphor. 5. apho. 34, Menstruis deficientibus sanguis ex naribus fluens, bonum. Et aphor. 57. eiusdem, Si menstrua plura fiant, accidunt morbi: & si non fiant, ex utero morbi contingunt. B. Quasi dixerit, si menstrua detinentur, necesse est processu temporis ipsum uterum pari: lege Gal. comment. Et aphor. 5. aphor. 61, Si mulieri cessent purgationes, neque febris neque rigor superueniat, & fastidia accidant, iudica ipsam in utero habere.

De mensium profluuio &
eius causis.

Duplicem hic affectus habet causam, uel ab utero unde emanat, uel ab ipso humore fluente. Prima fit aut ab uteri imbecillitate, aut ab eius uenarum apertione, aut à quopiam ulcere corrodeute uel scissura. 2. bifariam fieri contingit, uel ab ipsius sanguinis quantitate uel qualitate. Quantitate uel causa repletionis nimium corpus aggrauantis, unde fit euacuatio, quæ uel naturalis uel non natu-

ralis erit. Naturalis, quum à natura ita fiat,
ut superfluum tantummodo expellatur: non
naturalis, quum ob suam multitudinem &
dominium immodicè profluat: qualitate, uel
causa caliditatis sanguinis uel tenuitatis.
Interdum etiam superfluunt menstrua causa
abortiui foetus, uel ob partus grādiore, &c.

Locis consentientes de causis
profluuii menstruorum.

Gal. aphor. 5. comment. 57, Fit immodica
menstruorum euacuatio, si ora uasorum quæ
ad uterum pertingunt, ultra modum aperiā-
tur, aut si sanguis uel calidior uel tenuior
fiat, aut sua multitudine modum natura cō-
uenientem excedat, aut totum corpus aggrā-
uet, &c. Lege etiam Auic. 21. tract. 3. cap. 2.
ibi, Superfluitates quandoque fiunt secundū
semitam egritudinis, aut propter dispositio-
nem in matrice, aut propter eius debilitatē,
aut malitiam complexionis, aut propter ul-
cera & corrosiones, &c. Lege etiam Paul.
lib. 3. ibi, Fit etiam ob partes grandiores &
crebrò ob abortiui foetus causam, &c.

De signis profluvii menstruorum.

Signa menstrui ab imbecillitate uteri, aut ab apertione uenarum prouenientis erunt, si sanguis exierit purus, nullum dolorem inferens ab ulcere, si profluat paulatim, & maximo cum dolore prodeat. Consideretur tamen & quantitas ipsius fluentis sanguinis, & modus delationis: nam amplioribus uasis ruptis magna sanguinis copia statim profluit, minoribus uero non itidem. Signa ex quantitate sanguinis nimium corpus repleris sunt. Signa repletionis, ut uenarum latitudo, exuberans faciei & corporis repletio, quæ interdum cum dolore est. Signa, quando fit à mala qualitate, sunt, caliditas, tenuitas, acrimonia & color prauus. Signa immoderate euacuationis sunt, color fœdus, pedes tumescunt, concoctio uitiatur, & prosternitur corporis robur, &c.

Loci consentientes de signis profluvii menstruorum.

Auic. 21. tra. 3. cap. 3, Factam à debilitate matricis & apertione uenarum significat exitus sanguinis puri non dolore facies, &c.

lege eum fusius. Gal. 6. de loc. aff. ca. 4, Quñ immodicè euacuantur, sequitur color fœdus, pedes molli tumore attolluntur, corporis robur prosternitur, ciborum tum concoctio, tum cupiditas uitiatur, atque in totum omnia quotquot immoderatam sanguinis euacuationem siue ex hæmorrhoides, siue alio quopiam sanguinis fluore euenientem sequi consueuerunt, accidentia huiusmodi fœminas infestant, &c. Lege Arcul. & Aer.

De cura profluuī menstruorum.

In superfluo mensium fluxu binæ requiruntur intentiones, quarum altera in remouenda fluxus causa consistit, altera in retinendo fluxum: uerū in praxi ultimū quod est in intentione, primum esse debet in executione. Si igitur causa multitudinis sanguinis menstrua superfluxerint, tunc sectione uenæ, & uictu tenui, qui sanguinem non adaugeat, succurrendum. Si uerò continui ac calidi sanguinis fluxus accadat, tunc sanguis cum syr. ros. de granatis, de suc. acer. cum aquis acerosa, portulacæ, plantaginis alteretur: & si quid bilis secū admixtum sit, euac-

cuetur cum myrobalanis, cassia & rheub.
 Deinde sanguinis discrasia cum diarrhodo-
 ne, tria sandalis, uel cum epithemate ex aqua
 ros. plantaginis & unctionibus frigidis re-
 moueatur. Si uasorum apertio in causa sit,
 per obturationem, & ruptura per congluti-
 nationem, & erosio per renutritionem cu-
 rabuntur. Si causa fuerit uteri imbecillitas,
 per aromata styptica, quæ sua proprietate
 roborant, curabitur: si causa fuerit ulcus, tunc
 opus sunt duæ intentiones, abstersio scilicet
 & conglutinatio, &c. Et hæc de prima in-
 tentione. Secunda, intentio est sanguinis co-
 hibitio, quæ duobus medijs perfici potest, pri-
 mo diuersione, ut sanguinem ad alias partes
 reuocemus: secundo cohibitione, restringendo
 & uiam intercipiendo per quam sanguis de-
 bet fluere. Diuersio igitur fiet per sectionem
 uenæ hepaticæ uel basilicæ, aut per imposi-
 tionem cucurbitularum sub manibus ante cibum,
 uel sub brachijs cum uehementi frictione. In-
 terceptio uiarum per quas sanguis fluit tum
 intrinsecè tum extrinsecè fieri potest: intrin-
 secè cum syr. frigidus stypticis, qualis est syr.

ros. myrthinus de portulaca, cum aquis plan-
taginis, solatri, acetosa, quibus adijci potest
eroc. de charabe, de terra sigillata, de spo-
dio, cum semine acetosa, item pilulis corallo-
rum rub. lapidis hamatidis, electuar. de scoria
ferri & triphera ex arte phemonis, &c. Va-
lent etiam in hoc casu nascalia ex coto in
suc. plāg. immerso cum bolo armenio sangui-
ne draconis, &c. Itē balnea & inunctiones
ex rebus stypticis, ut ex rosis cort. granatorū,
gallis, ballaustijs, acatia, hypocysthide, &c.
Quæ omnia quum nihil profecerint, ad nar-
cotica, considerata primū uirtute, refugiē-
dum, qualis est athanasia Nic. & phyloniū.

Loci consentientes de cura.

De cura lege Auic. 21. tra. 3. cap. 4. ibi,
Facta à multitudine aggrauante corpus, &c.
Si fiat à bile, euacuetur cum myrobalanis, in
quibus est uirtus styptica: si ab uteri imbecil-
litate, dentur aromata, &c. Gal. 7. de cōpos.
med. per loc. cap. 4, Osculi uasorum apertio
per obturationem, & ruptura per congluti-
nationem, & erosio per renutritionem cura-
tur, &c. Et meth. 5. cap. 4. & 5, Existimād.

est profusionis quantitas: nam si perruptum uas aliquod magnum est, aut uehementer reclusum hiat, utique adstringentibus medicinis opus est, ueluti balaustio, hypocysthide, omphacio, acatia, gallis immaturis & malicorio. Sin uel exiguum uas est perruptum, & non multus profluit sanguis, tunc aloe, & manna, & pini cortex, & lematum sigillum, lapis hematites, & alia similia ex austero uino nigro utilia medicamenta. Vide etiam de cucurbitulis ad mamillas applicandis meth. 13. cap. 19. ibi, Sic nanque ad mamillas cucurbitulas imponimus, quum sanguis ex utero profluit. Itidem meth. 5. cap. 3. Hippo. aphor. 5. aphor. 50, Mulieri si uis menstrua cohibere, cucurbitulam quam maximam ad mammas appone, &c. De regimine uictus lege Aet. ser. 16. cap. 64. ibi, Imperandum est unius aut alterius diei ieiunium, &c. Lege etiam Auicen. fen. 21. cap. 4. ibi, Ciberur ipse cum eis quæ sunt uitelli ouorum, &c.

Sistentia ac supprimentia
menstrua.

Sistent ac supprimunt menstrua acatia,

acetosa, alumen, aizoon, aqua aluminosa, ba-
 laustia, barba hirci, bolus armenius, blacta
 pisantia suffumigium, castanearum cortices,
 cauda equina, cornu cerui ustum, cicuta, ci-
 tronia, coagula, consolida, coralli, coriandrū,
 lapis hamarites, hepatica, uinum extinctio-
 nis ferri, finus caprae, galla immatura, gy-
 psum, gumi arab. glādes, granatorum cort. &
 flores hyosciami, charabe, lapis iaspis, len-
 tes, lentiscus, lycium, semen mādragorae, mar-
 garita, mastix, menta, millesfolium, myrrha,
 myrthus, frondes mori, mumia, nymphaea, oli-
 banum, oliua, polygonium, portulaca, corti-
 ces interiores quercus & ulmi, rota, rubri,
 sanguis draconis, siliqua Aegyptiae come-
 sta, solairū, sumach, scoria ferri, uernix, spo-
 dium, spica inda, uirga pastoris, flores uitis
 agrestis, hypocisthidis succus, peunidi acerbis
 & agrestis. Compos. sunt conf. alchechengi
 Auic. 1. 5. cōfectio scoriae. Auic. 3. 5. diaoliba-
 num Nic. phylonium Persicum Mes. syr. de
 myrtho, de portulaca, theodoricon magnum,
 Triphera minor senonis, Mes. Troc. de terra
 sigillata, de charabe, de spodio, de chileta,

athanasia Haly. 6. ant. &c.

De prognosticis suppressionis
menstruorum.

Hip. aph. 5. aph. 56, In fluxu muliebri si
cōuulsio & animi defectus aduenerit, malū.
B. Nā ad omnē immodicā euacuationem, tā-
quam casus cōmunis, animi defectus accidere
solet. Vnde Gal. meth. 5. ca. 5, Profluere pro-
hibetur ob animi deliquiū, quod sapius acci-
dere solet, &c. Et aph. 5. aph. 57, Si mēstrua
plura fiāt, accidunt morbi: & si nō fiant, ex
utero morbi cōtingunt. Anic. 21. ca. 2, Et illud
est deterius, quod ex cōplexionis malitia ori-
tur. Et quū superfluit sanguinis fluxus, sequi-
tur debilitas appetitus & digestionis, aut ex-
tremum inflatio, & coloris malitia, &
interdum perducit ad hydropem, &c.

De doloribus iuncturarum, siue ar-
ticulari morbo & podagra.

Dolor iuncturarū est tristis sensatio earū
à mala intēperie, uel à soluta continuitate eis
accidēte proueniēs. Cuius species sunt arthri-
tis, podagra, ischias, gonagra & chiragra,
Morbus igitur articularis, quē Greci ἄρθ-
ρρι. i.

tertiū uocant, est defluxus humorum ad artus siue iuncturas pedum ac manuum, cum dolore & tumore. Podagra est pedum affectio, ab humore calido uel frigido, dolorem inferens, etiam neruis patientibus. Ischias est coxarum dolor diuturnus ac difficilis, à materia fluente ad uertebras ischia, & ligamēta, usque ad poplites & suras. Gonagra est inflammatio genuum cum intenso dolore. Chiragra est manuum dolor, à materia in neruis & tendonibus manuum contenta.

Loci consentientes de dolo. &c.

Gal. lib. fen. med. Arthritis morbus est inflammatio articulis accidens, quæ magnum dolorem neruis patientibus adfert. Et apho. 6. comm. 49, Podagra est inflammatio pedū à fluxione humorum causata. Paul. lib. 3. cap. 77, Coxendix est dolor à natibus inguinibusque ad genua usque, in plurimis autem ad summū pedem pertingens. Auic. cap. de dolo. iūct. Sciatica est dolor, qui incipit à iūctura anchæ, & descendit retro ad coxam, & quandoque extenditur usque ad genu & ad calcaneum, &c.

De causis articularis morbi.

Causæ efficientes uel sunt extrinsecæ uel intrinsecæ. Extrinsecæ sunt casus, percussio, propulsus, uel luxatio, labor intēpestiuus, positio frigida insueta, nauseatiua satietas, nimia repletio, & omne quod bonam digestionem impedit, & superfluitates multiplicat. Item consuetarum euacuationum retentio, item mœrores, curæ, & reliqua animi pathemata. Causæ intrinsecæ sunt uel ex parte membri suscipientis, uel ex parte fluentis materiæ. Causa instrumētalis est dilatatio meatuum naturalium accidentalis, quæ fit uel propter membri imbecillitatem, aut propter eius malam intemperiem. Rursus imbecillitas membri uel erit à sui origine, uel propter caloris uehementiam, aut propter motum, uel dolores, uel causas extrinsecas. Causa materialis maiori ex parte erit pituita, sepe sanguis, raro bilis, rarissimè omnium atra bilis, &c.

Loci consentientes de causis articularis morbi.

Paul. lib. 3. ca. 78, Ceterum hoc malis fre-

Rrr. ij.

quenter antecedit improbus labor, uehemens
ambulatio, equitatus creber, usus Veneris in-
repestiuus, insueta frigida potio, &c. Lege etiā
fusius, & plura inuenies. Lege etiā Auic. 22.
cap. de dol. iuncturaru, ibi, Et de causis eius
sunt cibi generātes, &c. & paucitas digestio-
nis, quies & demissio exercitij, coitus pluri-
mus, frequētia ebrietatis, & retētio euacua-
tionum, &c. Lege locum uberius. Lege etiā
Gal. 6. aphor. com. 28. ubi causam enumerat,
quod multi idcirco laborant, quia patres &
auos habuere podagricos, in quib⁹ semē erat
initiatū, atque ideo natis uehementiorē fece-
runt partiu imbecillitatem: ubi etiā inquit,
quod necesse est pedes esse natura imbecillio-
res, si quis podagra corripī debeat, &c.

De signis articularis morbi.

Signa causarū extrinsecarum habentur ex
relatione infirmi. Signa intēperiei simplicis
sunt, quod dolor eius est sine grauitate, in-
flatione, & coloris alteratione. Signa intem-
periei cū materia sunt, grauitas, tumor, quoru
absentia nō semper significat materiæ priuā-

tionē, quā fieri possit ut materia in profundo delitescat. Item permutatio caloris, loci & doloris materiam indicant flatuosam uel humoralem. Signa particularis causæ sumuntur à iuuantibus & nocētibus, item ex calore loci, & ex pulsu, & ab egredientibus, & ex hora doloris, & ex additione eius & repletionē. Item ex atate, consuetudine, & ex regimine precedente. Signa sanguinis sunt, quia rubescit locus, nisi in profundo lateat, adest tensio, pulsatio, grauitas, regimen sanguinem adaugens, & dispositio corporis sanguinea. Signa bilis sunt, calor intensus, nulla grauitas, paucitas rubedinis, dolor est superficialis, mordicans, urina rubea, pulsus uelox, temperies biliosa, regimen bilem generans. Signa pituitæ, color albus, liuidus, dolor grauior, remissus, tumor magnus cum mollitie, non sentitur calor, urina alba, temperies pituitosa, regimen pituitam generans, & ætas senectutis. Signa melancholia sunt, dolor remissus, profundus, tumor paruus cum duritie, urina remissa, tenuis habitudo extenuata regimen præcessit melancolicum.

Rrr. iij.

Loci consentientes de signis.

Auic 22. tra. 3. cap. de sig. dolorum iunct.
 Complexio simplex fit parumper raro, & fit
 in ea dolor sine grauedine absque inflatio-
 ne, & non est alteratio coloris, &c. De signis
 humorum lege Paulum lib. 3. cap. 78. ibi, De-
 prehendi facile humorum noxam inferentiũ
 discrimina posse, tum suis coloribus, tum his
 quæ superueniunt, &c. Lege eũ fusius etiã de
 particularib⁹ causarũ signis. Lege etiã Razẽ
 in lib. de iuncturis, & plura intelliges, &c.

De cura articularis morbi.

Pro cura articularis morbi siue podagra
 quatuor opus sunt intentiones: prima erit
 auersio, quæ fiet sanguine peccante, cum se-
 ctione uenæ per rectam diametrum: aut cum
 euacuatione, minuendo materiam, sicuti cum
 pilulis de hermodactylis minoribus cũ rheub.
 aut cũ uomitu. Secũda est humoris siue calidi,
 siue frigidi digestio, quæ fit stypticis frigidis
 in causa calida, ut cũ sy. ros de granatis cum
 aquis plātaginis acetosæ, &c. Et in causa fri-
 gida, cũ rhodomelle, deinde cũ sy. de stecha-
 de, cum aquis beronica, absinthij & saluie

perficitur. Tertia intentio est præparari humo-
 ris omnimodo euacuatio, unde in causa
 calida cōueniūt pilulæ de her. min. cū rheu.
 in frigida pilulæ de hermamai. &c. Quarta
 est doloris prohibitio, quæ fieri potest in cau-
 sa calida cū repentiētib⁹ anodinis, qualis est
 cassia cū oleo ros. dissoluta, uel cū aqua so-
 latri & ros uel cū medulla panis in lacte cū
 uitello oui. Sed si fluxerit omnino materia,
 tūc anodina simpliciter conueniūt, sicuti ca-
 momilla, anechū, mellilotū, fœnugracū, &c.
 Vltimo cū his quæ resoluūt & emolliūt pro-
 cedendū, sicut cū oleo camomillæ & stercore
 uaccino, aut cū balneo ex uino & rebus sty-
 pticis, &c. Cibaria in causa calida sint frigi-
 da & humida, ut ptisana hordeacea, cū zu-
 charo, cucurbita, attriplices, cucumeres, & si-
 milia. Vitetur dulcia, acria & salsa: itē car-
 nes & uina. In causa frigida uictus sit tenuis,
 & pro potu sit hydromel. Itidem curatur ac
 dixi ischias: uerūm quū in profundo materia
 lateat, repellētib⁹ in p̄cipio nō utimur, &c.
 Loci cōsent. de cura articul. morbi.

De prima intensione loquitur Auicē. 22.

Rrr. iiij.

cap. de cur. dolo. iunct. ibi, Cum autem causa
 in eis est cum materia, tunc opus ut prohi-
 beatur quod effunditur per attractionem
 ad contrarium, & per minorationem, &c.
 In causa sanguinea opus ut administres
 phlebotomiam ex parte contraria, dein-
 de administres uomitum, &c. Paul. In qui-
 bus sanguineus humor redundat, protinus
 sanguis mitti debet, qui tamen in pituitosis
 uel atrabilaris non est detrahendus, &c.
 Razes in lib. de iunct. Incipimus minuire ex
 latere opposito, propter duo commoda: quorum
 unum est declinare materiam à suo loco, al-
 terum est retardare cursum materiae ad locum
 doloris. Et in lib. diuis. Opus ut non prolon-
 getur phlebotomia in sanguinea, sed fiat cum
 incipit dolor & pulsatio, &c. Vide de his
 etiam Haly Abbatem, Arcul. Mar. Cat. &c.
 Gal. aphor. 6. comment. 28, Non influet hu-
 mor, si omnino uacans superfluitatibus cor-
 pus extiterit: erit enim uacans, si medio-
 cri utatur exercitio, & bene cibum concoxe-
 rit: unde & desidia & crapula eis nocent,
 &c. Lege de his cibus Razem loc. cit. ibi,

IN CVR. MORB. LIB. III. 1001

Dieta sit frigida & humida, sicut aqua hordei, & cucurbita, & cucumeres, &c. Lege etiam Alexand. ibi, Vitetur dulcia, acuta, unctiosa, salsa, &c.

Observationes in euacuatione.

Mar. Cat. inquit, q̄ in euacuādo pituitā nō debemus tantū phlegmagogis uti, sed etiā cholagogis, quū pituita semper bili admixta sit, alioquin ex se non flueret. Secundo, quōd euacuantibus debemus styptica admiscere, quia constringendo vias, prohibent materiae fluxum. Tertiō, quōd à principio cum uehementi pharmaco non est euacuandum, quia tunc tenue egrederetur, & quod esset crassum, remaneret, &c.

Observationes circa digestionem.

Sera. super 9. alm. Digestiū materiae frigidae debet esse calidum stypticū, dū materia fluit: sed in materia fluxa debet esse subtiliatium & incisiuū. Mar. Cat. Digestiua non debent esse ualde aperientia, nec quae nervis & iuncturis noceant, sicut oxymel.

Observationes circa percussione.

Gilbertus, Vti debemus percussivis, do-

nec cesset dolor & apostematis pulsatio, & tunc cessabimus ab eis: quoniam si ulterius usi fuerimus, ingrossabitur materia, & reddetur difficilis dissolutio. Auic. Repercussio non oportet ut fiat materia existente fortis effusionis plurimæ resumptionis: nam materiam inobediētem facit, & dolor accidit magnus.

Observationes circa resoluentia.

Haly Abb. in sua praxi, Non oportet uti medicaminibus calefacientibus & subtilianribus, nisi post digestionem & corporis purgationem: quoniam si aliter fiat, tunc humor aduritur & indurescit, & difficilis fit sanationis. Auic. Non oportet ut approximent resolutiva fortia in principio rei ante evacuationem, quoniam faciunt euenire materias plurimas, deinde resoluunt subtile earum, & inspissant residuum, & retinent ipsum, & hoc in materia uiscosa & melancholica.

Observationes circa motum.

Alex. Tra. Non superabundantem sequantur motum, quoniam nocet, sed utantur eo paulatim absque labore, quoniam motus generat bilem rubeam, & eam attrahit ad articulos.

IN CVR. MORB. LIB. III. 1003

Razes in lib. de iunct. Caueant ab ambulatione, equitatione, balneis, retentione urinae & egestionis.

Conferentia doloribus iuncturarum.

Conferunt doloribus iuncturarum resoluenda quaedam ac liquefacienda materiam condensatam, ut crocus, mellilotus, anisum, aloes, mastix, iris, steechas arab. Quaedam crassitiam attenuando, & ex profundo attrahendo, sicut carica, mel, lentiscus, abrotanum, apium sylvestre, calamentum, aristologia, ruta cum melle, urtica, nasturtium, gumi ruta sylvestris, ammoniacum, galbanum, euphorbium, resina terebenthina, costus, castoreus. Quaedam attrahendo & uesticando, ut cepa, allium, lac, ficus, anacardi, sapo, cortex, nouum atramentum, fermentum. Quaedam urendo & ulcerando, ut atramentum, vitriolum, staphisagria, fermentum, scilla, uernix pini, chapsia, catharides. Quaedam penetrando in profundum, ut aqua uita, oleum terebenthina, oleum philosophorum. Quaedam leniendo & mollificando, ut adeps anatis, anseris,

uulpis, leonis, ursi, medullæ crurii vituli, cerui, asini, æsypus, mucilago, semē lini, sœnugraci, althææ, oleum uulpinū, costinū, liliorū, de castoreo, de sinapi, de nuce Rom. cum storace & assa. Quædā euacuando, ut pilulæ fœtidæ, aggregatiuæ de hermodactylis, de serapino, de oppoponaco Mes. pilulæ arteticæ Nic. pilulæ magistrales, confectio de turbit, &c.

De prognosticis articularis morbi.

Hip. apho. 2. aph. 46, Duobus doloribus simul eundē locum infestantibus uehementior alterū obscurat. Et aph. 4. aph. 20, Nō febricitantibus si tormina acciderint, & genuū grauitas, & lumborū dolor, purgari inferius oportere significatur. Et aph. 4. ca. 31, Lassitudinē habentibus in febribus circa articulos & maxillas potus siue abscessus fiūt. Et aph. 4. apho. 33, Sed si ante morbum aliqua parte doluerint, hic morbus firmatur. Et aphor. 4. aph. 44, Quibus febres longæ, ijs tubercula uel dolores in articulis fiunt. Et aph. 4. aph. 45, Quibus tubercula uel in articulis labores fiunt, ijs pluribus utimur cibis. Et aph. 6. apho. 22, Quicūque dolores ex dorso ad cubitū de-

IN CVR. MOR. LIB. I II. 1005

scēdunt, uenæ sectio soluit. Et aph. 6. aph. 28,
Eunuchi neque podagra laborāt, neque calui
fiant. Et aph. 29. eiusdē, Mulier podagra nō
laborat, nisi menstrua defecerint. Et aph. 30.
eiusdem, Puer podagra nō laborat ante usum
uenereorū. Et aph. 49. eiusdē, Quicūque mor
bi podagrici fiunt, hi sedata in quadraginta
diebus inflammatione finiunt. Et aph. 55. eius
dem, Dolores podagrici uere et autumno ma
gna ex parte mouentur. Et aph. 6. aph. 59,
Quibuscūque à coxendicum dolore diurno
molestatis excidit coxa, et rursus incidit, his
marcores superueniunt. Et aph. 60, eiusdem,
Quibuscūque à coxendicū dolore diurno
molestatis excidit coxa, his crus tabescit, et
claudicant, si non urantur. Auicē. loc. cit. Et
humores crudi quum retinentur in corpore,
nec euacuantur per egestionem uel urinam,
nec per artem, non est longinquum quin cur
rere faciant dolores iuncturarum. 2. Et a
ptiores ad hoc, ut in eis multiplicentur ista,
sunt senes, et habētes egritudines chronicas,
et cōualescentes quū non reguntur cū rectifi
catione. 3. Et aptiora tēpora ad dolores iun

Eturarū sunt uer, propter motum sanguinis &
 humorū: & autumnus, propter malitiā humo-
 rū & digestionis. 4. Et cū succurritur dolo-
 ribus iūcturarū, in primis quādo apparēt, fit
 eorum cura facilis. 5. Quōd si cōfirmentur, &
 consueſcant propriē illis qui generati sunt, &
 humoribus diuerſis non curātur. 6. Et quan-
 do apparēt uarices in habētib; dolores iun-
 cturarum & podagram, est eorū sanatio per
 eas. 7. Et dicitur qui habet dolorē ancha, &
 apparet in coxa eius rubedo uehemēs triū di-
 gitorū, nō faciēs ei dolorē, & accidit ei in ea
 pruritus uehemēs, & desiderat olera, morie-
 tur in 25. die. 8. Et omne mēbrū in quo est do-
 lor iūcturarū macreſcit & extenuatur. 9. Et
 dolores iūcturarū prāter ſciaticā & poda-
 grā, quū curātur & eradicātur eorū materia,
 nō redeunt uelociter. Razes 12. com. Deterior
 iūcturarū dolor erit, quādo accidit ei, cuius
 pater uel cuius illo laborauerit. Auic. Sunt æ-
 gritudines quæ hereditantur. Razes in lib.
 prognost. Dolor iūcturarum in iuuentute bre-
 uem fore uitam ſignificat, & qui ſunt in ſu-
 perioribus, ſunt ſatis deteriores, &c.

Authores erronei dissentientes circa
articulares morbos.

- 1 Adferere, in principio morbi articularis
semper esse repellendum.
- 2 Adferere, articulares morbos ad saniem
posse terminari.
- 3 Adferere, uenæ sectionē ex pede primū
& non ex manu esse committendam.

Confutatio dissentientium circa ar-
ticulares morbos.

Ad primū respondet Auic. cap. de cur. sci.
quod percussiva & fortiter styptica sunt
in hoc casu multū suspecta, quoniam mate-
riam in loco profundo incutiunt, & nocēt no-
cumento uehementi, & demum fit difficilis
eius resolutio.

Ad secundum, Razes in diuis. inquit, hoc
esse eis proprium, quod per saniem non ter-
minantur.

Ad tertium, Auic. loc. cit. Et non fiat pri-
mū phlebotomia ex pede, nisi post phlebo-
tomia in manu, materia sit ualde pauca, &c.

IOANNIS

BACCHANELLI

Regiensis, De cōsensu
Medicorum in curan-
dis febribus, Lib. 4.

Febris quid sit, & vnde dicatur.



EBRIS, quæ à ferita-
te uel à feruore dicitur,
est calor præternatura-
lis, accensus in corde &
arterijs, ad alia membra
diffusus, naturalibus a-
ctionibus incommodās. Qui calor duplex est,
alter natiuus & genuinus, alter uerò acqui-
sitius ac spurius, qui si per totū corpus diffun-
datur, febrē efficit: si min⁹, lassitudinē inducit.

Loci consentientes de febre.

Alex. lib. 5. cap. 1, Febris nil aliud est, quàm

immodicè auctus feruor, accensus præter natura in corde & arterijs, qui secundum naturam ignis cor possidens corpori uniuerso dominatur. Gal. 2. de mor. cau. ca. 2, πυρετός ὅστις ἐπὶ πάντας τῶν ὁρμῶν τῆς ἀμειβομένης οὐσας, id est, febris est totius animæ immodicus calor. Et 1. aph. Febris est cōuersio nativæ caliditatis ad igneam. Et 3. de diff. mor. c. 5, Vbi calor totum corpus infestat, febris nominatur: si uerò per totum corpus non diffundatur, lassitudo dicitur. Auic. 4. causa, cap. 1, Febris est calor extraneus accensus in corde, & procedens ab eo, mediante sanguine & spiritu per uenas & arterias ad totum corpus, & inflammatur inflammatione quæ nocet operationibus naturalibus. Gal. de difficul. respi. ca. 21, Duplex est caloris genus, alterum genuinum & corpori innatum, alterum acquisititium ac spurium.

Obiectio.

Erūne bini calores distincti, an unus & idem calor naturalis & extraneus. Quod bini distincti sint, uidetur: nam naturalis reperaturus est, ut in 2. de fac. nat. & in com. aph. sss. i.

Qui crescunt, plurimum habent caloris innati: sed in 1 aphor. est mutatus ad igneum, ut in definitione superius allata.

Responsio.

Dicimus unum & eundem calorem esse quod ad substantiam, sed esse diuersos calores quod ad fundamentum: nam aliter fundatur naturalis, quam praternaturalis, &c. Nota etiam quod febris est morbus calidus & siccus, calidus ὁ πυρετός, siccus uero potestate: nam febris si in superflua humiditate accendatur, non actu sicca dicitur, sed facultate.

De febrium diuisione.

Febrium aliqua sunt substantiales, aliqua accidentales. Substantiales sumuntur à materia, à modo moras, à quātitate. A materia, uel erūt mēbra cōtinentia, ex quibus hectica, aut humores, unde putrida, aut ὀππύωντα, id est agitata, siue impellētia, ut spiritus, à quibus ephemera prouenit. A modo mot⁹, quū ἔργον μὴ ὥστε sit ratio motus quo calor mouetur. A quātitate, id est, à remissione & intentione illius caloris. Febres accidentales dicuntur quæcūque oppilationes & inflāmationes siue a-

IN CVR. MOR. LIB. IIII. IOIR

lios abscessus sequuntur, & nō sunt per se agri-
tudines sicut alie. Sumuntur etiā accidentales à
calore, ut mordaces, mites: aut à colore, ut pal-
lidæ, liuidæ. Febriū alie sunt breues, alie lon-
gæ: aliqua salubres, aliqua insalubres: alie
interpolatæ, alie cōtinuæ: & harum aliqua
sunt simplices, aliqua cōpositæ. Rursus inter-
polatarum tres sunt, quotidiana, tertiana,
quartana. Cōtinuarum quæ à flaua bile pro-
ueniūt, duæ sunt species: altera synoche dicta,
altera sortito generis nomine continua dici-
tur. Rursus synocha tres sunt, quædā à princi-
pio usque ad finem æquales perdurant, quæ-
dam augentur, quædam decrescunt: primæ ho-
moteneæ & acmaistica. 2. anabastica & apac-
maistica. 3. peracmaistica dicuntur. Continua-
rum rursus nonnullæ singulis tertijs diebus in-
ualescunt, nonnullæ in quotidianarum figura
progrediuntur, & alie in quartanarū forma.

Loci consentientes de diuisione
ne febrium.

Gal. 1. de diff. feb. Principales ac propriæ
febriū differentiæ sumuntur ab earū substantia,
alie uerò ab aliquo accidente, &c. Aet. ser. 5.

SS. 4.

ca. 58, Differentia huius caloris maioris aut minoris ratione distinguuntur, & iuxta subiectum siue materiam, aut ipsum cordis corpus calore occupate, aut humores aut acrem substantiam, &c. Alex. lib. 5, Trifariam in summa febres ingruunt, in spiritibus, humoribus, & membris solidioribus: in spiritibus fit febris ἐφύμερα, in humoribus bifariam, aut in uenis, ut καὶ σπέρμα, si humores cum sanguine computruerint, & quas σπέρματις, id est, continuas uocant: aut extra uenas, per diuersas corporis partes putridi humores discurrunt, & febres fiunt, quas Græci πυρετὰς uocant: in membris fiunt febres heclicæ. Auic. Dicamus quod febres apostematum & oppilationum sunt febres accidentales, & aliæ febres sunt egritudines, lege Gal. 1. ad Glauconem, cap. 4. de hac re. Auic. ibi, Diuiduntur etiam febres, ut nonnullæ sint acutæ non acutæ, chronicæ non chronicæ, nocturnæ, diurnæ, salubres, & horribilia accidentia habentes, aliæ dimittentes, aliæ inseparabiles, &c. Gal. 2. de diff. feb. cap. 2, Intermittentium tres sunt omnes numero, quotidiana, tertiana, quartana:

quonidiana à pituita putredine, tertiana à flava bile, quartana à nigra. Continuarum quæ à flava bile proueniunt, duæ sunt species: altera synoche dicta, altera sortito generis nomine continua. B. Iridem ait 2. de cris. ca. 9. Et nota quòd συνεχὴς à continuo feruore dicitur, de qua Gal. 9. meth. ca. 4. mentionem facit, & harum uniuersum tempus in una acceſſione consumitur, etc.

De causis febrium in genere.

Causa febriū duplex est, extrinſeca & intrinſeca. Extrinſeca fit ab aëre calido uel frigido, à mala qualitate, à corruptione, à motu, & ab otio. Intrinſeca diuiditur in causas προκαταρκτικὰς, id est præincipiētes, & in προγυμνάς, id est antecedētes, & in con-
 τῆτιον siue cōiunctas. Procatartica est, quæ cū peractū est opus, recedit, ut exustio solis uel ictus scorpij. Cōiuncta est quæ quū adest, præsentem seruat morbum, sublata tollit, ut calculus in uesica. Antecedens uerò à coniuncta prorsus constituitur: nam hac præſente adest affectus, & aucta augetur, & minuta minuitur, & sublata remouetur. Nota tamen
 sss. iij.

quod hæ causæ, scilicet præincipientes, conjuncta & antecedens referuntur ad causam efficientem: nam causa materialis in febribus erunt membra, ut in hectica humores, in putrida spiritus: in ephamera causa formalis erit calefacere & adurere corpus, & causa finalis, cuius gratia hæc aguntur, erit sensibilis lesio operationum, &c.

Loci consentientes de causis febrium.

Gal. 1. de diff. feb. cap. 5, Quum febris sit in corde quædam præternaturalis caliditas, eius causas nunc ostendere intendimus: nam non unus est tantum generationis caliditatis modus, sed aut propter motum, aut propter putrefactionem, uel propter adhaesum alterius caloris, aut propter retentionem calidi effluxus, aut propter mixtionem calidæ substantiæ fiunt, &c. De alijs causis lege Gal. in lib. de cau. procatarēt. & primo meth. ca. 8. Vide etiā de causis caliditatis Gal. 2. de morb. cau. cap. 2. Et nota q Gal. 4. meth. cap. 3. inquit, Externæ causæ cognitionem non nisi ad noscedos affectus, qui nostram notitiam fugiunt, utilem esse, &c.

De febrium temporibus.

Tempora febrium bifariam considerantur, aut quatenus uniuersalia, aut quatenus particularia. Uniuersalia sunt quæ totius morbi, siue febris circuitu absoluuntur.

Particularia sunt quæ paroxysmi siue exacerbationis partem metiuntur. Rursus uniuersalia non solum penes morbi essentiam, sed et penes symptomata et materie alterationem distinguuntur: nam sicut morbi principium tempus dicitur in quo morbus apparet, sic etiam principium erit, quum materia cruda nullum coctionis uestigium demonstrat, aut quum sympt. incipiunt. Similiter augmentum dicitur, quum morbus augetur, uel accidentia intendantur, uel aliquod indicium appareat. Status erit quum morbus et symptomata non se mutando in sua dispositione maneant, aut quum signa concoctionis manifesta uideantur. Declinatio erit quum non solum febris declinet, sed et accidentia et materia iam digesta expellitur. Tempora uero particularia distinguuntur circa caloris modum: nam si calor à materia submergatur, in membro erit principium: quum uero

ss. iij.

calor excitatur, erit augmentum: at quum intensiori gradu calefacit, erit status: & quum remittitur, declinatio seu remissio morbi dicitur. Nonnulli inter initium & incrementum inaequalitatis nomen connumerarunt, sicut interuallum ac quietem in declinationis fine, &c. Nota quid principium morbi interdum uidetur absconditum, & hoc quum morbi principium adeo breue sit, ut cognosci non possit, sicuti in synocha, epilepsia & apoplexia, aut quum morbus est paucorum accidentium, aut quum in prima die morbi concoctionis indicia appareant, &c.

Locī consentientes de februm temporibus.

Gal. lib. de totius morb. temporibus, cap. 1. equiparat morbi tempora ad animantium aetates, unum quidem principium generationi eorum tribuens, alterum incremento, tertium uigori, quartum declinationi, quum aegri salui futuri sunt. Auic. 4. can. cap. 3, Febrium hora sunt sicut reliquarum aegritudinum, principium, augmentum, status apud ultimum, & declinatio: & sunt quinque particulae casus

se cuiusque paroxysmi, &c. Aet. ser. 5. cap. 2.
 Principium febrilis exacerbationis est con-
 tractio extremarū partium omnium, & ma-
 ximè nasi: augmentū habet accidētium in-
 crementum & cessat frigiditas: uigor erit ubi
 calor equaliter per totum corpus diffundi-
 tur, &c. uide illū fusiū. Gal. in lib. de morb.
 temporibus, sex tempora enumerat, initij no-
 men, inaequalitatis, incrementi, status siue ui-
 goris, declinationis & integritatis interual-
 lum ac quietem nominans, &c. De his plura
 in hoc lib. iuxta Gal. inuenies. nā secat etiam
 periodum in duas partes, in accessionem &
 remissionem siue interuallū. Et nota pro iu-
 niōribus, quod periodus idem importat, ac si
 diceretur, circuitus, & est tempus in morbis
 ex intensiōe & remissione consistens. Ty-
 pus uerò est intensiōum remissionūque or-
 dine succedens redditio. Paroxysmus & ex-
 acerbatio idem important, & sunt, ut inquit
 Aet. motus morbi particularis à remissione
 ad deterius. De principijs morbi absconditi
 lege Auic. lat. 4. can. cap. 3.

Quomodo status morbi præcognoscatur.

Cognosces morbos fore breues uel prolixos, ab ipso morbi paroxysmo: nã paroxysmi longi longum, breues breuem morbum prænũciāt. Item ab ipso genere morbi: nam apoplexia, tertiana, breui, paralysis & quartana longo tempore terminantur. Ab ipsa uirtute debili uel ualida, unde ex debili, breuis, ex ualida, longus erit. Ab ipsa ætate & tempore: nam in senio & hyeme, longus: in iuuentute & æstate, breuis. Ab ipsis accidentibus beruiter uel longo tempore durantibus. Ab ipsis excrementis exeuntibus mutatis: nam in urina nullum apparem cõcoctionis indicium, longum morbum: & econtrã, breuem significat. Nota quòd peracuti morbi quartũ diem non transcendunt: acuti uerò plerunque 14. Vocandi erunt morbi acuti, si cum seuis symptomatibus terminantur. Quare febres ephemera non erunt morbi acuti, &c.

Loci consentientes de præcognitione status.

Hippoc. aphor. I. aphor. 12, Accessiones &

IN CVR. MORB. LIB. III. 1019

constitutiones morbi indicabunt & anni tempora & circuitum, ad inuicem incrementa, siue quoridie, siue alternis diebus, siue per maiora intervalla fiant. Gal. non solum in hoc coment. sed etiam in 1. de crisi 6 lib. quomodo quispiam futurum morbi uigorem possit primo cognoscere, facile ostendit, quem legere poteris. Auic 4. can. cap. 4. docet cognoscere statum ex tempore & motu morbi, ex ipsa uirtute, etate, tempore, pulsu, rigore, & paroxysmo, ab accidentibus ipsis, & ex euacuatione & digestionem, &c. Vide illum latius de his. Hippoc. aphor. 2. aphor. 23, Acuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur. Et Auicem. 4. can. cap. 3, Status diuersus est in morbis: morborum enim ualde acutorum status quartum diem non transcendit, nec febres ephemera morbi acuti dicuntur, & si propinquus sit earum status, quum hoc non satis sit, sed oportet insuper quod timorem inducant: acuti uero absolute morbi sunt, quorum status 14. attingunt, &c.

Authores dissentientes cir-
ca febrem.

- 1 Adserere, febrem esse complexionem calidam & siccam.
- 2 Adserere, febrem nō posse diuidi in morbum & accidens.
- 3 Adserere, in omni morbo esse assignanda quatuor tempora.

Confutatio dissentientium
circa febrem.

Ad primum respondetur, quod si cōplexio calida & sicca esset, febris tunc sequeretur, quod cōplexio biliosa esset febris, quod falsum est: nam febrientes siue pituitosi siue sanguinei sint, remanent semper in eadem complexione ac præditi erant. Præterea idem homo pluries in complexione mutaretur: nam febriens esset biliosus, non febriens pituitosus, quod falsum esse omnes asseuerant.

Ad secundum Auic. & Concil. differentia 87. tenent, quod febres sunt accidentales, quā mediātē uel immediātē à morbo depēdeant: sunt autem morbi, quum nullum morbum sequuntur.

Ad tertium respondet Arcul. morbos qui nullam uarietatem medico sensibilem de se præbent, & qui in principio generationis contrahuntur, & qui ad mortem terminantur, non habere quatuor tempora, & sic falsum est quod in omni morbo sint quatuor tempora.

De febre ephemera.

Febris ephemera nil aliud est quam calor accessus in spiritibus, & dicitur ephemera siue diaria, non ex eo quod duret tantum per unam diem, sed quia plerunque accidit ut in uno die desinat: perdurare tamen potest usque ad quartum diem, sed raro tertium diem progreditur.

Loci consentientes de febre ephemera.

Gal. aphor. 4. comment. 55, Febres diariæ omnes ab ipso Hippoc. uocantur, quæcunque sui ratione una die durant: tales uel à tumoribus inguinum, uel à causis manifestis fiunt. De reliquis à me dictis lege Gal. 10. meth. cap. 2. ibi, Sanè dicuntur id genus febres omnes diariæ, quia solui una die sunt aptæ, &c. Item 9. meth. cap. 1.

Obiectio.

Anceps sum an tantum in spiritibus calor accedatur, quum sanguis & spiritus una permisceantur, ut uoluit Gal. 6. de usu paruum, immo & 2. de diff. febrium cap. 9. tenet à sanguine calefacto fieri ephemeram, quare non solum in spiritibus, sed etiam in sanguine calor accendetur.

Responsio.

Dicimus utrumque à calore febrili calefieri: sed si aduertamus, quod primo non in sanguine, sed in spiritibus calor fundatur, dubitatio nulla erit.

De causis febris ephemeræ.

Quum duplex sit ephemera, uera scilicet & spuria, uera fit tantum à causis procatacticiis, spuria uero fit per accidens, uel ex obstructione, uel per ἀντιπερισσῶν, sicut ex cohibitione, &c. Causæ ephemerarum totidem ac suæ species sunt, quæ, teste Auic. enumerantur 21. Nam aliquæ ad animam magis quam ad corpus pertinent, ut angustia, tristitia, cogitatio, ira, uigilia, somnus, quies, timor & gaudium: aliquæ magis spectant ad corpus

quæ in ad animam, ut motus, quies, euacuatio, dolor, syncopis, fames, sitis, obstructio, satietas, nausætiua, inflammatio, soliditas: aliqua uerò extrinsecè ueniunt, sicut ab adustione, frigore, soliditate, balneis, &c.

Loci consentientes de causis febris ephemeræ.

Auic. 4. can. cap. 5, Omnes febres diariæ fiunt aut à causis præincipientibus per se calefacientibus: aut per accidens, ut oppilando: aut per antiperistasin, ut cohibendo, &c. lege eum fusius. Gal. 2. de cris. cap. 13, Sunt autem hæc tantummodo spiritus passionis absque humorum putredine aut membri inflammatione, nisi inflammatis inguinibus accidant: earum uerò generationis occasiones sunt uigilia, cruditas, tristitia, timor, ira, curæ, deustio, refrigeratio, lassitudo, ebrietas, & quæcunque similia, &c. Vide Aet. ser. 5. cap. 58. ibi, Auspicantes ac externè laceffentes causæ, &c.

De signis febris ephemeræ.

Signa febrium ephemerarum sumuntur à iocunditate caloris, non incipiunt cum frigore, rigore, somno, uelut putridæ, nec in

principio calor concentratur. Concoctio in
 urina primo die apparet: fiunt à primitiuis
 tantum causis, pulsus non est diuersus, nec sy-
 stoles magis se accelerat quam naturalis, prin-
 cipium paroxysmi leue est ac facile, augmen-
 tum non ultra duas horas se extendit, in sta-
 tu nullum uehemens symptoma uidetur. De-
 clinatio fit cum sudore, ad integritatem de-
 sinit, et adhibito balneo nullus horror senti-
 tur. Signa transmutationis ephemera in alias
 febres sumuntur ab ipsa declinatione febris:
 nam si absque sudore fiat, uel cum sudore, per
 quem integra recoalescentia non sequatur,
 iam in alias febres transit: ite si declinatio ul-
 tra 24. horas cum symptomatibus et pulsu
 non naturali se extenderit, aut si remanse-
 rint aliqua symptomata in sui recessu. Co-
 gnoscitur etiam quum in hectica transmuta-
 tur ex signis hecticae, de quibus infra latius,
 aut in synocham, ex uenarum repletionem, ex
 caliditate, inflammatione, rubore faciei, etc.
 aut in putridas ex horrore, pulsus diuersita-
 te et coarctatione, ex mordaci calore et à
 uehementia symptomatum, etc.

Loci consentientes de signis.

Gal. 1. de diff. feb. cap. 7, Indicia sunt, ut si fiant à procatarctiis causis, & est signum inseparabile, sed non proprium, si concoctio in urinis, si pulsus frequentia à proprietate deficiat, si nullo modo systoles ad celeritatem tendat, si caliditatis adsit suauitas, si cum sudore aut rore, uel optimo aliquo uapore declinatio ad integritatē sequatur: hæc omnia propria & inseparabilia signa sunt, &c. De reliquis lege Auic. 4. can. cap. 6. Itē Aet. ser. 5. cap. 58. & Paul. lib. 2. ca. 15. Item Gal. 6. de cris. cap. 13. & 1. art. cur. ad Glauc. cap. 2. & 3. lege etiam Arcul. & alios neotericos, &c. De signis trāsmutationis lege Auic. 4. can. cap. 8. Item Gal. 1. de diff. feb. cap. 7.

De cura febris ephemeræ.

Si à causis procatarctiis febres ephemeræ fiant, tunc alteratione sola curatur: si uerò à causis corporeis oriatur, tūc triplex erit intentio. Prima circa causæ ablationē & febris alterationē, ita ut calida frigidis curetur, ut exustio solis cum umbra, & sic duo efficies,

Ttt. i.

causam remouebis, & malam febris discrasiam per alterationē expelles. 2. Prohibet ne fiat transitus ab hac febre ad alias, meatus aperiendo, uapores resoluēdo, cum balneis in febris declinatione adhibitis, uel cum oleo quopiā perfricando. Tertia est quæ symptomatibus occurrit, & regimen instituit: ad febrem enim sequitur dolor, sitis, uigilia, & ad eius causam syncopis epilepsia, &c. quibus occurritur opportunis præsiidijs. Regimen uerò nō solūm febrē, sed eius quoque causam respicit. Viētus igitur ratio humida ac boni succi in declinatione febris exhibeatur, ijs uinum interdicator qui ex inflammatione uel furore febricitāt: in uigilijs tamen cōcedendū: at in reliquis rebus non naturalibus semper contrariū est offerendū, sicuti in labore quietem iubemus, in uigilijs somnum, in ira & furore animi iocūditatem, &c. Interdū cibus modo quodā coactō & irregulari in principio febris est exhibēdus, ijs præsertim qui ex labore, angustia, fame, & superflua bile febricitant, &c. Ad species ephemerarū particulares scribēdo non descendā, si quidē rarissimē

opus medici desideratur, ni prius morbus in
putridam aut hecticam febrem mutetur, &c.

Loci consentientes de cu-
ra ephemerarum.

Aet. ser. 5. cap. 59. usque ad cap. 69. de
omnibus febribus ephemeris particularē curā
pertractat. Similiter Auic. 4. can. à cap. 10.
usque ad 44 de singulis particularibus mē-
tionē facit, signa demonstrādo, causas & cu-
rationē. Alexan. itidē agit lib. 5. cap. 1. Paul.
unicum tantum caput de diarijs habet lib. 2.
cap. 15. Gal. 1. art. cur. ad Glauc. ca. 3, Omnes
hasce febres balneis curare oportet, & ad cō-
suetam uictus rationē eos perducere, &c. Et
paulò post loquens de uictu, Interdicitur, in-
quit, uinū, qui inflammatione inguinū laborāt,
similiter & furore percitis, cibo insuper hu-
mido ac boni succi reficiendi sum, &c. quòd
aliquos cibare oporteat in principio paro-
xysmi, lege Auic. 4. can. cap. 9. ibi, Necessē est
in principio febris cibare qui patiūtur ephe-
merā ex labore & angustia. Iridem ait Gal.
10. meth. cap. 5. ibi, Quum adhuc inuasura
sit febris, uel quum incipit, &c.

Ttt. ij.

Observationes circa balneum
& euacuationem.

Avic. 4. can. cap. 9, Balneū non cōuenit in quatuor casibus: primo, quum timetur de casu putredinis. 2. quū adest obstructio ab humoribus crassīs. 3. quum adest satietas nau-seatiua. 4. quum adest catarrihus, &c. Item dixit, quōd in ephemera, nulla euacuatio cōuenit, nisi adsit materia obstruēs, aut satietas nau-seatiua, aut totius corporis repletio, &c.

De prognosticis ephemerarum.

Gal. 1. ad Glau. cap. 2, Cura harū februm in promptu est: at earum cognitio maiorem exigit diligentiam, & de qua nemo ante nos quantum oportuerit, scriptum reliquit, &c. itidem ait Avic. 4. can. cap. 5.

Obiectio.

Gal. 1. de diff. feb. cap. 7. uidetur contrarium innuere, quum dicat, Nec earum cognitio est difficilis.

Responsio.

Dicimus hāc esse difficilis cognitionis, quū ipsum adhuc perseuerat principium, sed facilis, quum iam ad declinationē uenit manife-

stam. Hippoc. aphor. 4 aphor. 55, Ex inguinum tumoribus omnes febres malæ præter diarias. Vide in hac re Oribasii cōment. fufius. Auic. 4. can. cap. 5, Homines quibus maximè nocent febres ephemeræ, sunt calidi & sicci, quia ad hecticā citò perueniūt: aut calidi & humidi, quia in febrem putridam incidunt, &c.

Authores dissentientes circa febrem ephemeram.

- 1 Adserere, omnem ephemeram esse febrem accidentalem.
- 2 Adserere, ephemeram coniungi posse cum putrida.

Confutatio dissentientium circa febrem ephemeram.

Ad primū respōdetur, q̄ si ephemeræ sequeretur calorē aut dolorē alicuius apostematis, quòd hoc uerum esset, sed non omnes huiusmodi sunt, igitur non accidentales.

Ad secundū dicit Arcul. quòd tenenda est eorū pars, qui negāt has febres cōiungi posse: nam quotiēs calor ad humorum putredinem transit, non amplius ephemeram efficere po-

Ttt. iij.

test, sed tantum putridam.

De febre hectica.

Febris hectica est calor praternaturalis, accessus in membris radicalibus siue solidioribus, quæ Græci μέγας σπῆρα uocant, consumptis tamen in ipsis humiditatibus, cuius species sunt tres, iuxta quatuor humiditates secundas: quarum prima uocatur Nomen non habens, secunda ros, tertia cābium, quarta glutē, ita tamen ut quoties humiditas prima desinit, et secunda quæ est ros, incipit accēdi, tunc prima species hectica dicitur: quæ si ad cambium, tertiā humiditatē peruenerit, tunc erit secunda species, et uocatur ab Auic. dubalen. id est, arefactio siue μδρασμὸς, id est tabes: si uerò ad gluten deuenierit, tunc erit tertia species, et uocatur ab Auic. almuchasif, siue curuatura: nam ferè eadem forma uidetur, ac est in decrepitis curua, etc.

Loci consentientes de febre hectica.

Auicē. 4. can. cap. 1. tra. 3, Cum inflammantur membra radicalia et propriè cor, est illud ipsa agritudo quæ est hectica, se-

cundum quòd sciuisti, &c. Gal. 2. præd. comment. 60, Quum partes ipsæ corporis solidiores ignitiores euadunt, febres heclicas nominamus. Quòd sint tres species heclicæ, lege etiam Auicen. loc. cit. ubi etiam enumerat humiditates secundas. Lege etiam Gal. 1. de diff. feb. cap. 9, Tabida febris incipit, quum natiaa humiditas in unoquoque corpore inspersa in medijs spatijs partium similariū, ex qua primū partes nutriuntur, & circa cordis corpus periclitatur: quum uerò iam res eò periculi uenerit, ut nihil iam ex tali humiditate supersit, tunc exquisita talis cōsistit, &c. Et cap. 8. eiusdē, Tabida febris non tantū sicca, sed etiam calida est passio, &c.

De causis febris heclicæ.

Causæ febris heclicæ uel sunt febres ephemerae, aut putridæ, aut febres ex partium nobilium inflammationibus ortæ, sicuti ex pulmonis aut thoracis affectibus, præsertim ex empyemate & pti, aut febres ardentes cum totius animalis & cordis præsertim siccitate. Interdum causæ sunt errores medicorum, qui uictum nimis tenuem instituunt,

Ttt. iij.

aut aquā frigidā in inflāmatione diaphragmatis prohibēt, aut quū ob defectū animi, uinū & aquam carnis & diamuscū iubent, quæ omnia ob sui caliditatem ad hecticā ægrum perducunt, & rarò hectica per se incipit.

Loci consentientes de causis febris hecticæ.

Auic. 4. can. tra. 3. cap. 1, Cause hecticæ sunt febres ephemeræ, aut putridæ, aut febres inflāmationū, quia rarò hectica incipiendo accidit, nisi sit causa ualde fortis, &c.

Galen. 1. de diff. feb. cap. 9, Exoritur hæc passio ipsi cordi nonnūquam per se ipsam sicuti excādescētis, eristit; nonnunquam ex ardentibus febribus: aliquando ex pulmonis & thoracis affectibus, præsertim ex empyemate & pti, & ex omnib⁹ diuturnis inflāmationibus nobiliores partes occupātib⁹, &c. lege locum fusi⁹. de reliquis lege Auic. 4. can. tra. 3. cap. 1. ibi, Fiunt etiam ab alijs, &c.

De indiciis febris hecticæ.

Febrium hecticarū duo sunt propria indicia: primū, qd à principio usque ad finē sunt æquales, nec accessione, nec augmentū, nec ui-

gorē, nec remissionē habēt: secū dū, q̄ ager nō se febricitare percipit. Reliqua signa sumū-
tur partim à calore, si quidē à comestione ca-
lor crescit: item in primo tactu ceteris arden-
tibus febribus est suauior, sed in processu for-
tior & magis erodens: item pulsus est durus,
frequens, debilis, fixus, partim ab ipso corpo-
re mutato: nam oculi sunt cōcaui, flos uitalis
coloris extinctus, adsunt uigilia, corpus exte-
nuatur, in urina apparet quedā supernatās
unctuositas, cutis fit arida, squalida. Hæc fe-
bris si aliqua à lēione mēbrorum incipiat,
ab eorū arida intēperie, ex qua siccitas no-
tabilis prouenit, faciliē deprehendes, &c.

Loci consentientes de indi-
ciis febris hecticæ.

Gal. lib. 3. de præ sag. puls. cap. de arteria
cordis, Febriū hecticarū duo hæc sūt propria
signa, ut si perpetuò sibi illæ similes sint, nec
inuasione ullam accessionis, nec incrementum,
nec uigorem, nec remissionem habeant, nec se
febricitare percipiat ager, &c. lege Gal. 1. de
diff. feb. cap. 9. abūde enim de his signis per-
tractat, ibi, Adest oculi cōcauitas, amisso eorū

liquore, flos uitalis coloris extinctus, in tota cute squaliditas immoderata, palpebrae dormitantiis similes, &c. lege tu fusius. Auic. 4. can. cap. 2. tra. 3. sumit indicia à pulsu, à tactu, à cibis: nam pulsus, inquit, est durus, frequens, debilis, fixus, & sic de reliquis. Alex. lib. 5. cap. 22. seorsum de omnibus signis pertractat. quomodo scilicet hectica à diaria putridaque distet, & quomodo hectica in marasmum transeat, lege cum si lubeat. Vide etiam Auic. de signis adubul, &c.

De curatione hecticae.

Duplici scopo hecticam curabis, quorum alter sit ad sex res non naturales, alter ad medicinalia. Primus fiet, si aer in aestate declinet ad frigidum, si uictus sit humidus & frigidus, plus tamen humectas quam infrigidans, qualis est prisana hordei, carnes hœdi, perdicum, caponum, qui ex amylo & frumento nutriti sint, pisces petrosi, cœcri fluuiatiles, testudines nemorales, limacia & ranae, oua sorbilia, caseus recens. Potus sit aqua hordeacea, uel uinum album oligophoron: absint morus, uigiliae, superflua repletio & ieiunium: sit uictus ratio pan-

lò plenior,quàm tenuior ob morbi lōgitudi-
nem,gaudeat ager & letetur.Circa medici-
nalia quatuor opus sunt intētionēs:prima sit
in remouēda causa hectic.e,unde si fuerit cau-
sa ulcus in pulmone,primò remoueatulr ulcus,
nō neglecta tamē hectic.e cura. Si causa fue-
rit tristitia,inducēdo letitiā auferetur.Secū-
da intētio respicit febrē quatenus febrē hecti-
cā,& tūc infrigidatio & humectatio tā per
interiora quàm per exteriora cōpetunt,sicu-
ti est aqua hordeacea cū cancris fluuiialibus
decocta,sy. uiol. de papauere, de iuiubis, item
electuaria resumptiua ueluti quoddā à Gor-
donio & à Francisco Pedemontio extat de-
scriptum. Valet etiam lac asininum & mu-
liebre, modò asina & mulier ex rebus fri-
gidis & humidis nutriantur, & dosis erit
iuxta Auicēna placitū à tertiodecimo usque
ad uigesimumtertium,& communiter ab un-
cīs tribus usque ad quatuor: uerum lac præ-
bēdum non est,quum post eius assumptionem
sitis & difficultas spirandi & caloris rece-
pti augeri uideātur,uel ubi febris putrida he-
cticā coniūcta sit.Extrinsecus uerò cōueniūs

unguenta ex oleo uiolaceo nenupharino, ceratum à Francisco Pedemontio descriptum, & epithema facultate frigidum, sed actu tepidum. Tertia intentio est eorū remotio quæ cum febre hæctica copulantur, in quorum numero quum febris putrida adsit, tunc euacuatio non ratione hæctica, quæ est immaterialis, sed ratione putridæ, ex qua superflua plurima aggregantur, cōuenit: sit tamen pharmacum non ualde soluens, tñ propter uirtutis imbecillitatem, tum quia periculum esset de maxima exiccatione, quæ proculdubio fugiēda sunt, sed eius loco, pharmaco leni ac lenituo utantur. Vltima intentio est symptomaticum correctio, & sunt syncopis, tussis, & fluxus uentris. Syncopis tollitur cum aqua carnis, uino granatorum, uirellis ouorum, & uino odorifero: irroretur etiam facies ex aqua ros. mosch. Fluxus uentris ac ipsa tussis emendatur, ac dictum est supra, pro quibus recurre ad sua capita.

Loci consentientes de cura
hæctica.

De prima intentione loquitur Galen. 10.

MEDIC.
IN CVR. MORB. LIB. IIII. 1037

meth. cap. 2. ibi, Nutrimentum oportet esse humidum & frigidum, quod hecticis febribus sic conducturum, ut ptisana cremor frigidus, &c. Vide Paul. lib. 2. cap. 22. Auerrhois 2. collig. inquit, quod magis humectatione indiget aeger, quam refrigeratione, &c. De secunda intentione Gal. in art. par. inquit, Vnius cuiusque causam prius abscindere oportet, deinde ad eam, quæ ex ea facta est, ægritudinem deuenire. Auic. 4. can. tra. 3. cap. 4, Intentio curandi febrem hecticam est infrigidatio & humectatio, &c. Itidē ait Aet. ser. 5. cap. 93. ibi, Scopus curationis in humectantibus & refrigerantibus consistit. De exhibendo lacte lege Gal. 10. meth. cap. 2, Item Paul. lib. 2. cap. 22, Et inuenies modum exhibendi, &c. De balneo similiter lege Gal. 10. meth. cap. 10. Et Auic. loc. cit. & Aet. ser. 5. cap. 93.

Observationes circa curam.

Auic. loc. cit. Caue tamen in his frigidis ob caloris eorum imbecillitatem, ne multum in gradu extollantur, alioqui calor eorum suffocaretur.

De prognosticis hecticæ.

Hip. aph. 2. aph. 28, Febricitantium non omnino leuiter permanere corpus, & non minui, uel etiam plusquā ratio expostulat, contabescere malum: hoc enim morbi longitudinem, hoc uerò imbecillitatē significat. Gal. 1. de diff. feb. ca. 8, Vbi iā febris hectica exquisitē cōsistit, & iam dudū incēpit, non modò eandē curare est difficile, sed etiā impossibile. Auic. 4. can. tr. 3. ca. 1, Hectica est in principio rei difficilis cognitionis & facilis curationis, & finis adubul nō penitus recipit curationē. B. Difficilis est cognitionis, quia parū uel nihil à sua naturali dispositione corpus permutatur: idcirco postea curatur, quoniam uirtutis robur uehementē tolerat refrigerationē: at quum $\mu\delta\rho\alpha\sigma\mu\acute{\omega}\delta\eta\varsigma$ efficitur, in eius curatione frustrātur medici, tū ob nimiam cōsumptionē, tū ob eorū imbecillimā uirtutē.

Authores dissentientes circa hecticam febrem.

- 1 Adserere, hecticam febrem posse absque alia febre per se incipere.
- 2 Adserere, in hectica febre fieri mutationē

ex specie in aliam speciem.

3 Adserere, cibum non esse causam, quur in hectica magis calor appareat, &c.

Confutatio dissentientium circa
febrem hecticam.

Ad primū, inquit Auic. 4. can. tra. 3. ca. 1,
Quod longinquū est, ut accidat hectica inci-
piēdo, & posse membra radicalia inflāmari,
quin prius humores & spiritus nō inflammē-
tur, & sic non posse per se incipere, nisi ab
alia urgente causa dependeat, &c.

Ad secūdū, Arcul. inquit nō esse dicēdū eū-
dē calorem numero & aequē intēsum migrare
de specie in speciem, sicuti patet in exemplo
Auic. Nā flāma accēsa in lychnio primū ab-
sumit oleū in lucerna positū, deinde oleū ly-
chnio imbibitum, demum humiditatē coti, &
sic non migrat de specie in speciem.

Ad tertiū, respōdet Gal. 1. de diff. feb. quōd
caliditas arida, humido irrorata magis ma-
nifestatur, eo quōd aliquam partem cibi te-
nuem in uapores conuertat. Vel si magis pla-
cet opinio Auerrhois, eo qd caliditas febrilis,
quæ non sentiebatur per cibum assumptum,

mutatur ex non sensu ad sensum apparetem:
 Et sic causa efficitur, ut calor magis appa-
 reat, &c.

De febrium putridarum diui- sione & numero.

Recitat Gal. 2. meth. cap. 7. quod tres sunt
 febrium diuisiones ex humorum putredine ortæ:
 prima ex eo, quod causæ ipsius putredinis
 adsunt uel nō adsunt. Secunda ex eo, quod per
 totum animal aut eius partem aliquam est diffusa
 putredo. Tertia, quatenus cum phlegmone est,
 aut citra hanc. Enumerat deinde in lib. con-
 tra Lycum has esse febres putridas, quæ nume-
 ro sunt nouem, ut ardens, lypiria, hepiala, ty-
 phodes pestilentes, semitertiana, quotidiana,
 tertiana, quartana, de quibus seorsum
 tractabimus, &c.

De putredinis definitione.

Putredo iuxta medicorum opinionem, est
 corruptio humoribus contingens propter ebul-
 litionem extranei caloris, &c.

Loci consent. de putredinis definit.

Gal. 2. meth. ca. 8, Putredo est mutatio to-
 tius putrescentis corporis substantiæ ad corru-

prelata à calido externo. Arist. 4. meth. Putredo est corruptio propriæ caliditatis ab aliena caliditate in unoquoque humido. B. Nō mirū quum familiaris & nativa caliditas concoctionem adiuuat, externa uerò corrumpit. lege Aet. sermo. 5. cap. 74.

De causis putredinis.

Duplex est causa putredinis, altera ipsam complens, altera preparans. Complens, si intrinseca fuerit, tunc est respirationis priuatio, quæ à multo, crasso, ac uiscido humore meatus cōstipante fiet. Si extrinseca, tūc erit ab aëris mutatione preparatoria, ueluti cibus, qui malè per suā substantiā, qualitatem, tēpus, ordinem & artificiū disponitur: nam substantia eius uel est nimis uiscosa ut anguille, aut nimis humida ut fructus, aut renuitur à natura, aut corruptibilis per se est, ut lac. Qualitas in causa erit, ubi cibus plurimæ humiditatis erit particeps. Tēpus erit etiā causa preparatoria, si cib⁹ in tēpore nō opportuno sumatur. Ordo etiā erit causa, ubi crassa & dura tenuibus in comedēdo præponantur. Artificium, si cibaria malè parantur: at in

Vuu. s.

genere loquendo, omnis putredo à calido & humido fieri potest, &c.

Loci consentientes de causis putredinis.

De causis putredinis lege Avic. 4. can. tr. 2. cap. 1. ibi, Putredo fit à cibo, ab obstructione, aëre, humore: ubi de cibo tanquã de causa preparatoria loquitur: lege enim fusius. Similiter Aet. ser. 5. cap. 74. Et Gal. 2. de cau. morb. ca. 8. ibi, Putredinẽ inducunt aut medicamenta quæ suapte natura putrefacere possunt, aut excrementa in ipso animali genita, aut ea quæ transpirationem impediunt. Hip. 3. epidim. à calido & humido putredinẽ fieri dixit: nam si annus, inquit, calidus & humidus fuerit, necesse est ut magna pestilentia succedat. Vide de hac re Gal. 1. de temper. cap. 4. Item de inaequali intemperie cap. 4. & 7. ibi, Non tantum quæ inculcata sunt & prospiratu prohibita, sed & putrescunt alia multa, &c. Vide etiã Gal. 2. meth. ca. 8. &c.

De ratione diuersitatis febrium.

Putredo est aut in uno solo membro tan-

tum, unde aliquis abscessus orietur, & hoc uel ratione imbecillitatis membri, uel eius uehementis caloris, uel eius doloris, &c. aut erit in totius corporis ambitu diffusa: quæ si à maximis uenis ad minimas transierit, fiet febris continua: si uerò extra uenas in omnes corporis meatus distribuatur, tunc erit interpolata. Causa interpolationis est triplex: prima, quia humor uelociter uel tardè putrescit. Secunda, quia humor uelociter uel tardè in loco putredinis colligitur. Tertia, quia humor uelociter uel tardè à putredine expurgatur. Pituita igitur quotidianam facit, ex eo quòd uelocius ob sui humiditatem ad putredinem mouetur, aut citius ob sui quantitatem colligitur, cuius accessio durat horas 17. Quartana ratione suæ siccitatis duos dies interponens tardè putrescit, & ratione suæ paucitatis tardè colligitur. Tertia uerò inter has seruat mediū, unde si fuerit pura, durat 12. horis, sicuti quartana si fuerit à naturali melancholia, durat horis 19. Et procius quiete assignantur horæ 48. & in quotidiana sex, & in tertiana, 24.

V&U&J&

Loci consentientes de ratione
diuersitatis febrium.

Auic. 4. can. 2. tra. cap. 1, Dupliciter uariatur putredo, uel ratione humorum putrescentium, aut ratione loci: quia quandoque est in uno solum membro, quod quadrifariam contingit, uel ratione suae imbecillitatis, uel ratione uehementis eius loci caliditatis, uel ratione acuitatis & doloris, &c. Gal. 2. de diff. feb. cap. 2, Rationem reddit quur febres interpolatae, quurue conclusae sint: quā quum in longā orationē protrahat, ad illud caput te conferes. Vide etiam 2. de crisibus cap. 3, Quāquā uberius de his pertractet Auic. &c.

De signis feb. putridarū in genere.

Indicia febrium putridarum propria sunt, quia nulla antecedit causa procatactica: incipiunt cum rigore, horrore, sed nō omnes: adest inaequalitas pulsū, calor mordax, atque tactui molestus. Sed propriū ac inseparabile est indicium pulsū, systolae uelocitatis, & urinarū cruditas, debiliſque concoctio: praecedit etiā primū morbi insultū lassitudo, pigritia, somnolētia, uigiliae, spirādi difficultas,

IN CVR. MOR. LIB. IIII. 1045

uenarum tensio, sitis, dolor capitis, inquietudo, periodus cum sudore terminatur, &c.

Loci consentientes de signis febrium putridarum.

De his indicys loquutus est Gal. satis uberiorius primo de diff. feb. cap. 7. ibi, Indicia febrium, quæ humorū ratione acceduntur, hæc sunt, primū non inseparabile, sed propriū est, quod nulla ex causis procatarteticis ipsas antecedit: initiū sumere à rigore propriū est putridarum, sed nō inseparabile signū, &c. Lege locū fusi⁹, & plura ad hanc rem facientia inuenies: lege insuper Paul. lib. 2. cap. 2. Et Auic. 4. can. ca. 2. ibi, Vt plurimum antecedit almellilotu, cui associatur lassitudo, pigritia, alices, saltus, commotio, somni, uigilia, anhelitus, constrictio, uenarum tensio, &c.

De cura febrium putridarum in genere.

Morbus quatenus morbus per sui contrariū auferri exposcit, febris est morbus: igitur per sui cōtrariū tollenda erit. Sed hæc febris minimè tolli potest, ni prius putredo, à qua depēdet, inhibeatur, quæ nec causa manente

Vuu. iij.

inhiberi potest: igitur primum erit remouenda putredinis causa, mox ipsa febris sanabitur. Causa putredinis erit trāspirationis prohibitio, quæ uario modo oriri solet: nā aut à densatis exiguis meatibus & constrictis corporibus fiet, aut ab humorū abundantia, aut à crassitie & lentore, quæ singula affectiones per sua contraria remouebuntur, ut densitas per rarefacientia, constrictio per dilatantia, crassities per incidētia, lentor per detergētia: & si totum corpus iam singula dictorum occupauerint, etiam toti corpori per contraria est occurrēdū. Sed quia febris est morbus de repletionē, idcirco etiam euacuari desiderat: euacuabitur manu & pharmaco: manu, per sectionem uenæ, cucurbitulas, hirudines & frictiones: pharmaco purgante per inferiora aut superiora, per urinam & sudorem. Demū symptomatibus complicitis succurrēdum, & norma uiuendi instituenda erit, &c.

Loci consentientes de cura febrium putridarum in genere.

Gal. 2. meth. c. 4. & 5, Febris sanari nō potest, nisi inhibita prius putredo sit: porro ea

inhiberi causa manente nō potest, quare sub-
 mouēda eius causa erit si modò, &c. lege eum
 fusius, & habebis quaecunque dicta sunt, licet
 sub alijs uerbis, &c. lege etiam Auic. 4. can.
 2. tract. cap. 7. ibi, Scias quòd intentio in
 medicādo has febres, quandoque uertitur ad
 partem febris, quare est infrigidare & hume-
 ctare: interdum ad materiae partem, &c. De
 uictu lege fusius in lib. I. ubi omnes aph. ferè
 ad propositum accommodauimus.

De febre tertiana pura.

Febris tertiana pura est interpolata febris,
 à flaua bile pura ac tenui putrescente orta,
 cuius est de tertio in tertium agrum afflige-
 re, secundum naturam humoris propriam, &
 in septem periodis, uel antè, iudicatur.

Loci consentientes.

Gal. 2. de diff. feb. ca. 3, Febris tertiana ex-
 quisita est, quæ per sensibiles corporis partes
 delata oritur, cum rigore inuadens, atque ar-
 dentis febris similitudinem gerens, & bilis uo-
 mitibus, aut deiectionibus, aut sudoribus: uel
 ex horum quibusdā, uel omnibus soluitur, cu-
 ius accessio duodecim ad summum horarum

Viii. iij.

aquinoctialium spatio finitur. Hippoc. apho.
4. aph. 59, Tertianæ exquisita in septenis circuitibus, quod tēpus longissimū est, iudicatur.

De causis febris tertianæ puræ.

Febres tertianæ puræ fiunt à flava bile putrefacta ac mota, & extra uasa lata, præsertim in consistentiū ætate biliosissima, tēpore æstiuo, in regione calida & sicca, & in ijs præcipuè, qui laboribus, uigilijs, & solis ardore & cibis calidis & siccis, aut immodico pharmacorum calidorum ac exiccantiū usu, curis, & similibus usi fuerunt, &c.

Loci consentientes de causis febris tertianæ.

Gal. 2. de diff. feb. cap. 3, Febris hæc à flava bile per sensibiles corporis partes delata oritur. Et in 1. ca. eiusdem lib. Tertianæ fiūt ab amara bile, & plerunque in corporibus, quorum naturalis habitus ad bilem accedit, in consistentium ætate biliosissima, tempore æstiuo, &c. B. Nota quòd tres sunt febres biliosæ iuxta Auicē. placitum, tertiana, scilicet continua, tertiana periodica, & caisson. Periodica rursus diuiditur. nam aut est puræ,

aut spuria: pura, quæ à pura bile, cui nullus
 aliter humor admiscetur, oriri solet. lege de
 his causis Aet. ser. 5. ca. 79. Item Galen. 2. de
 cris. cap. 3. Item Oribas. apho. 4. com. 59. Et
 intelliges febrem interpolatam extra uasa pu
 trefieri. lege etiam Auic. 4. can. ca. 35. Et Ga
 len. 4. apho. com. 59. Etc.

De signis febris tertianæ.

Sex sunt ex quibus indicia febris tertiana
 sumuntur: primum à modo rigoris, ut incipiat
 cum horrore et rigore difficili, ita ut pungi
 ac uulnerari cutis uideatur. Secundum, ab u
 rina et sudore, nam sudor per totum corpus
 apparet in paroxysmi recessu, urinæque sit ru
 bra ac ueluti ignea. Tertium, à caloris quali
 tate, ut sit consonus calore suauior, ac minus
 mordens, æqualis tamen quoquo uersus, quia
 primò acris uideatur, sed paulò post à manu
 remanente uincitur. Quartum, ab ipsis sym
 ptomatibus, unde sitis quæ hominem exurit,
 et uigiliae adsunt sine capitis grauitate.
 Quintum, à pulsu, qui est uelox, magnus, non
 æqualis in diastole et sistole. 6. sumitur ab
 ætate, regione, tēpore, et à multitudine euen

eus tertianarum & ad infebricitationem desinit. Signa quibus tertiana exquisita à spuria differat, sunt quatuor: primū, q̄ eius accessio non transcendit duodecim horas. Secundū, exquisita tertiana in septenis circuitibus iudicatur. Tertium incipit cum rigore breui & intenso, & terminatur cum sudore exuberante. Quartum, quia in prima, uel quarta, uel septima uidetur urinae coctio, quod in spuria nequaquam.

Loci consentientes de signis
febris tertianæ.

Gal. 2. de cris. cap. 3, Febris tertiana cognoscitur, quia æqualem & liberā celeritatē habet, neque ullū adest inflammationis signū, sitim inuehit, hominē exurit, in uigore cōsistit, calor æqualis est quaque uersus, post potū plurimus uapor per cutem exhalat, sudoris nunciū, uomitus bilis adest, uenter soluitur, & biliosum mingunt, sudor apparet uaporosus, calidus per totum corpus æqualiter sudans, pulsus uelox, magnus, ad infebricitationem desinit, & accessionis tempus ultra 12. horas non se extendit, sæpius septem horas, interdum ci-

tius & tardius incipit cum rigore, &c. De indicijs per quæ distinguitur à spuria tertiana, lege Auicenn. 4. can. ca. 37. tra. 2. Oribas. apho. 4. comment. 59, Sex modis cognoscitur exquisita tertiana, nempe materia, natura, tempore, regione, copia ciborum & temperie, &c. Galen. 2. de diff. feb. enumerat de tertio in tertium accessionem, breue tempus cum rigore inuadens, & per sudores & bilis uomitū & excrementa biliosa, &c. lege Paulum lib. 2. cap. 18.

De cura febris tertianæ puræ.

In cura febris tertianæ puræ sex opus sunt intentiones, quarū prima uersatur circa regimen sex rerū non naturalium: secunda erit lenitio uentris ac materia in contrarium alteratio: tertia erit euacuatio: quarta urinae uel sudoris prouocatio: quinta caloris remanentis alteratio, & membrorum roboratio: sexta accidentium correctio. Regimen contrarias omnino qualitates requirit, unde aer sit frigidus & humidus, sicuti & cibi humectare & refrigerare habent, ut ex oleribus attri-plex, blitum, lapathum, lactuca, endiuia,

cucurbita, cremor ptisanae, & sorbitiones alie, aqua hordeacea. Caueant à melle, sinapi, salitis, & ab omnibus acerbis, item à uino, præcipuè uetustis: ubi uerò morbus concoqui cœperit, dandum est uinum tenue aquosum: quum uerò morbus soluitur, liberius exhibendum. Secunda intentio est uentris lubricatio & materie ulceratio: prima fiet cum clysteribus ex cassia, rhodomelle, & oleo uiolato, uel cum cassia simplicis bolo, &c. Alteratio materie per refrigerantia & humectantia, ut cum syrup. de endiuia ros. uiol. de agresta, de suc. acer. aceroso simplici cum aquis endiuia uiol. &c. Tertia scilicet euacuatio fiet per sectionem uena, si sub forma antecedentis causæ materia fuerit sanguini admixta, aut in futuro de admiscenda timeatur: quæ si à sanguine fuerit separata, tunc fiet per pharmaca soluentia, sicuti cum rheubarbaro, cum cassia, diacatholicone, electuario de suc. ros. &c. Quarta eliciet sudorem & urinam non rebus calidis, sed potius id ualentibus frigidis, sicuti cum aceroso simp. cum emulsione scilicet communium frigid. in aquis

endiuiæ acetosæ, aut cum balneis temperatis
boni odoris. Quinta erit caloris derelicti al-
teratio, ac laxorum membrorum roboratio.
Relaxantur enim membra tum ob imbecilli-
tatem ex resolutione spirituum acquisitam,
tum ex calore febrili, et euacuationibus tam
naturaliter, quam artificialiter factis: his igitur
succurritur cum rebus frigidis, roboranti-
bus, siccis, cum Troc. de camphora, syrup. ros.
aut cum tria sandalis, diarrhodone Abb. zu-
charo ros. uel cum epithemate tum cordi tum
hepatis applicito. Sexta remouet accidentia
quæ huic feбри contingere solent, sicut sunt si-
ris, uigilia, dolor capitis, et asperitas linguæ.
Sitis tollitur cum collutione oris multifariam
parata, sicuti cum aquis endiuie acetosæ, cum
uino granatorum et omphacio, addito zu-
charo, cum electuarijs de uino granatorum,
aut cum mucilagine psylli in syndone rara
involuto, ac in aqua immerso. Vigilia remo-
uentur cum unguento populeone, addita cas-
sia odorata, opio et croco: aut cum lotioni-
bus ex rebus somniferis, etc. Dolor capitis
tollitur cum cucurbitulis, frictionibus, cum

oxyrrhodino, & pilule cap. frig. &c.

Loci consentientes.

De prima intentione loquitur Galen. 1. ad Glauc. cap. 9. ibi, Semper oportet contrarias qualitates illis, quæ præter naturam inualuerint, opponere, cū hoc multò plus iuuet, quàm quomodolibet euacuare. Et paulò pòst, Cibi humectātes & refrigerantes omnes exquisitis tertianis sunt utiles, quantitas tanta sit, ut cōcoqui possit, ex olerib⁹ sint attriplex, blitū, lathū, malua, lactuca, & cucurbita, & ex alijs ptisana succus, & alicæ sorbitiones, ex piscibus saxatiles, ex uolatilib⁹ quæ mollibus cōstant carnibus. Itē testiculi gallorū & suum pedes & cerebella. Itē onorum sorbillum uirelli, quia hi facilius quàm pars alba concoquuntur, &c. Lege locū fusi⁹, & nota prædictam uictus rationē tantūm deliciosis esse exhibendā, robustis uerò qualem nobis monstrauit Hip. scilicet tenuem, &c. lege Paul. lib. 2. cap. 19. Et Auicen. 4. can. cap. 39. De secunda intentione loquitur Galenus, & similiter de tertia, primò ad Glauc. cap. 9. ibi, Exquisitam tertianam, quæ ex flaua bile commo-

N. MEDIC.
IN CVR. MOR. LIB. II. 1055
ta inualescit, quàm maximè fieri potest, refrè-
gerare oportet & humectare, &c. De cæteris
uerò intentionibus lege iuxta Auicem. loc. ci-
tato, ubi enumerat lenientia pharmaca, &
commendat fieri phlebotomiam quando est
possibile, deinde materiæ adæquationem cum
syr. acetoso, & euacuationem. demum resol-
uentia, &c. lege eum fusius.

Observationes circa victum.

Auicem. loc. cit. Et non cibus nisi apud has
conditiones: prima, nisi alius primùm soluta
sit: secunda, quòd prior cibus sit cōcoctus an-
te paroxysmi aduentum: tertia, non exhibea-
tur cibus, nisi in tempore quietis, sicut in de-
clinatione, si possibile est: quarta, quotiens ad
statum properatur, tunc victum magis atte-
nuare oportet, &c.

De prognosticis febris tertianæ.

Gal. I. ad Glauc. ca. 8, Exquisita tertiana
septē circuitibus indicatur, & præter id etiā
minimè periculosa. B. Nota quòd in febribus
intermittētibz annumerātur tantū accessio-
nes & nō dies, unde in tertiana septē circui-
tus 14. dies referūt, in quibus etiam alij acutū

morbi finiuntur. uide aphor. 4. comment. 59.

Hippoc. apho. 4. aph. 36, Sudores febricitanti si incæperint, boni tertio die. 5. 7. 9. 11. 12. 17. 20. 27. 34. Hi enim sudores indicant morbos: qui uerò non ita fiunt, laborem significant, & morbi longitudinem & recidiuam. Gal. 3. de cris. cap. 3, Tertianæ uomitibus & excrementis biliosis & sudoribus toto corpore fluentibus finiri debet, quia humor tenuissimus, si modò ascēdit, uomitum irritat: si descendit, aluum mouet: si ad meatus, cutis sudorem copiosum ab sui tenuitate elicit, &c.

Auicē. 4. can. cap. 37, Et quandoque consumitur in uno paroxysmo ob suæ materiæ tenuitatem, &c. B. Gal. 2. de diff. febr. cap. 3, Quatuor causas breuitatis enumerat, quæ sunt humoris quantitas, qualitas, laborantis uigor, & corporis dispositio: ut exempli gratia, si cum pauca quantitate humoris & tenui eius qualitate, uigor cum rara dispositione corporis maior fuerit, tunc morbus erit breuis: sed si multa bilis, crassa, uigoris imbecillitas, & densa corporis dispositio simul fuerit, tunc morbus erit ualde longus, &c.

De febre tertiana notha siue spuria.

Gal. 2. de diff. feb. cap. 8. enumerans signa exquisitæ tertianæ, inquit: Quibus uerò aliquid horum deficit, hæ non amplius exquisitæ, sed simpliciter tertianæ nuncupantur, maxime si intermissione iuxta prædictum, id est, brevior rem habuerint, accessione uidelicet in longius tempus protracta: Et notat quatuor huius febris differentias, prima uocatur simpliciter extensa, quæ ad 24. horas extenditur. Secunda paululum extensa, et durat usque ad horas 30. Tertia dicitur amplius extensa, et durat usque ad horas 36. Quarta uocatur plurimum extensa, et durat usque ad 40. et plures horas, ita ut quotiens magis à pura siue exquisita distabit, totiens magis notha, siue spuria, siue extensa nuncupabitur, etc. Similis sensus est 1. ad Glau. cap. 8.

De causis febris tertianæ nothæ.

Causa ut plurimum est crassa bilis putrefacta, interdum bilis cum pituita admixta et unita, etc.

Loci consentientes.

De causis lege Aue. 4. can. 2. tra. c. 35. ibi,

Xxx. i.

Tertiana non pura fit à putredine bilis crassæ substantiæ, ob commixtionem bilis cum phlegmate, commixtione complexionali unita, &c. B. Intellige ita humores misceri, ac si ab utroque una forma perueniret, & in hoc ab emitriteo differt, qui à duabus inuicem distinctis formis efficitur. Et nota quòd Galen. facit differentiam inter duas tertianas & duplicem tertianam: nam duplicis tertianæ causa ab una tantum minera provenit, sed duarum tertianarum causa à duabus minis loco distinctis efficitur.

De signis febris tertianæ nothæ.

Signa sunt sex, grauitas capitis cum dolore tensiuo. Secundum, Accessio durat ob humoris crassitiem usque ad 24. uel 30. horas, & tepor eius usque ad 48. Tertium non apparet concoctionis uestigiū, sed urina est cruda. Quartum, non extenuatur corpus sicuti in tertiana simplici. Quintum, nec cum sudore desinit, nec rigorem interdum habet, nec adest caliditas acris & mordax. Sextum, nulla adsunt seua accideria, ut dictum est in simplici tertiana, & idem accessionis tempus semper est.

Loci consentientes de signis tertianæ.

De his signis lege Auic. 4. can. 2. tract. cap. 37. ibi, In non pura tertiana adest grauitas capitis cum dolore extensiuo, durâtque paroxysmus usque ad 24. horas, uel 30. usque ad declinationem, & tunc repescit donec compleantur 48. horæ, &c. lege eum fusius. Gal. 1. ad Glau. ca. 8. ex historia adolescentis omnia signa huius febris demonstrauit inquiēs: Urina cruda admodū, febris incidit cum horrore, quæ neque in caliditate, neque in pulsibus exquisita tertianæ est similis, accessio durat ab aurora tertiæ diei, usque ad auroram quartæ: & semper idem accessionis tempus. lege hunc locum uberius. Et nota quod non idem accessionis tempus semper est, nisi materia crassa bili dominetur, &c.

De cura febris tertianæ nothæ.

Curadi intentiones tot erūt, quot dictæ sunt in febre tertiana simpl. Versatur igitur prima circa regimē sex rerum non naturalium, unde uictus in primis nō quotidie, sed alternis dieb' in tēpore quietis exhibendus erit, qui

Xxx. ij.

nō adeò infrigidet & humectet, ut in tertia simplici, sed aliquatenus calefaciat, incidat, & abstergat, sitque nō tenuis adeò, sed crassior quàm dictū est. Cetera uerò res non naturales eadem ferè qualitate fac ut pollent. Secunda quæ est uentris lenitio ac materia preparatio, efficietur primò clysteribus ex cassia, hiera picra, oleo camomillino, & sale paratis. Similiter preparatio materiae cū syr. acer. simp. rhodomelle, syr. de duabus rad. bisantino, cū aquis & decoctis cichorij, boraginis, sceniculi, &c. Tertia erit euacuatio quæ peccante materia cū sanguine fiet per sectionem uenæ, aut corpore existente plethorico, quod ubi à sanguine separatum cognoueris, tunc uomitu uel pharmaco solutiuo euacuabis, ut puta cum infusione rheubarbari, agarici, aut cum diaphinicone & cassia, &c. Quarta erit urinae & sudoris prouocatio, quæ cum hordei decocto, uel petroselini, apij, cichorij, &c. Quinta erit membrorū quæ laxa sunt, roboratio: & fit cum Troc. de ros. de eupatorio, aut aromatico ros. Extrinsecus cū oleo de mastice, de spica, de menta, de absin-

thio, aut cum foru ex camomilla, absinthio, menta, addendo semper aliquid uini odoriferi, &c. Vltima intentio est quorundam symptomatum remotio, quæ sunt in apperentia, & somnus profundus, incitatur appetitus cum capparibus cōditis in aceto, aut cum diaitonite, cum zucchero, aut inunctionibus suprà scriptis, &c. Somnus etiā remouetur cum aceto calido, ut refert Auicenna. cap. de subet, aut cum lotionibus, & cum his similibus, quæ agrum expergisci possunt.

Loci consentientes de cura
febris tertianæ nothæ.

Gal. 1. ad Glauca. ca. 10, Non oportet cibū quotidie exhiberi, sed alternis diebus: uictus ratio nō sit quæ humectet & refrigeret uniuersum corpus, qualis in exquisitis tertianis exhibetur, sed aliquem modum sumat ad calefaciendum & incidendum, &c. Post uictum, sectionem uenæ commendat, ibi, Quid si sanguinem mittere oporteat, neque hoc omittendum, sed ab initio statim faciendum. Laudat etiam humorum præparationem ex hyssopo, origano, spica nardi, cum mulsâ decoctis, &
Xxx iij.

post septimum coma absinthij danda est cum oxymelle, solutionem deinde cum his quæ moliter uentrem subducunt, &c. Paul. lib. 2. cap. 20, Vomitus post cibū ijs utilissimus est, quibus hæc febris in uetustatem incidit. similiter Auic. & Razes 17. cōti. Auic. 4. can. 2. tra. ca. 40, Et quū uideris urinas eorum crassas, tunc phlebotoma, & post hæc adiuanantia ad digestionem sunt syrup. acetosus, &c. quæcūque à me dicta sunt de alijs iniectionibus, ipse uberius pertractat. Nota tamē ex Haly Abb. non concedi in principio huius morbi pharmacum electiuum, nisi materia turgeat, quāquam iuxta Manardum in epistola ad Charandinum uideatur legi contrarium, imò uix inuenies Galen. in omni febre absque concoctione humorum pharmacum solutiuum exhibere, sed in alijs à febre morbis paucos inuenies, quos per pharmacum non expurget, &c.

Observationes de humorum concoctione.

Gal. 1. ad Glauc. cap. 10, Ab initio statim uitāda quæ nimis exiccāt & calefaciūt, &c.

Obferuat . circa pharmaca folutiua.

Auic. 4. can. & Arcul. Rarò & tardè folutiuum exhibendum eft, alioqui fi importuna fuerit euacuatio, tunc tenues tantùm exoluentur, & crassæ partes remanebunt, &c.

De prognosticis febris tertianæ nothæ.

Auic. 4. can. ca. 35, Hæc quidem non pura quandoque prolongatur tēpore longo, & circiter medietatem anni, & quandoque perducit ad mollitiē & magnitudinē splenis. Gal. 1. ad Glauc. ca. 8, Vidi quandoq; quū in autūno incœpisset in uere desisse, tū quia ager medici præceptis non paruisset, tū quia læsus ex hyeme esset, lien intumuit, præcordia flatibus fuerant opplata, & iam subrumida quædam aderat in facie decoloratio, & præsertim circa crura, adeò ut de adolescēte dubitare nobis cōtigerit, &c. B. Prorogationis febriliū causa, Gal. teste 2. prognost. com. 25. est triplex, prima fit propter aliquā partem affectā curatū difficilē. Secunda fit propter humores crassos, crudos, incoctōs q; Tertia, propter aliquod circa agrū cōmissū: idcirco di-

Xxx.iiij.

cebat Auic. In morbo longo resupinetur aeger,
 & crura curuemur, & tãgantur eius viscera,
 & uideatur si qua parte corp' tumuerit, &c.
 Hipp. aph. 4. aph. 29, Quibuscũque in febris
 bus sexto die rigores fiunt, difficile iudicium
 sequitur. Et aph. 4. aph. 43, Febres quacun-
 que non intermittentes tertia die fortiores
 fiunt, magis periculosa: quocunque modo in-
 termiserint, periculum abesse significat. Et a-
 phor. 4. apho. 44, Quibus febres longæ, his
 tubercula uel labores in articulis fiunt. Et
 aphor. 4. apho. 45, Quibus tubercula uel in
 articulis labores ex lōgis febribus fiunt, ij plu-
 ribus utuntur cibis. Et apho. 46. eiusdem, Si
 rigor incidat febre non deficiente, agro iam
 debili, lethale, &c. Lege Galen. comment.

Authores dissentientes circa
 febres tertianas.

- 1 Adserere, tertianam febrem cognosci pos-
 se per accessionem tãtũ de tertia in tertiã.
- 2 Adserere, solũ humori putrido digestio-
 nem conuenire.
- 3 Adserere, omnes fructus nocere febricitan-
 tibus cum Auicen.

4 Adserere, nullum in febribus vinū esse concedendum.

Confutatio dissentientium circa febres tertianas.

Ad primum respondet Auicen. 4. can. 2. traēt. cap. 36, quod qui cōsiderat tertianam per paroxysmum, errat in ea, sed oportet ut attendat ad significationes alias. Hac etiam de re à Galeno irridetur Thessalus, qui diatritum in cognoscendo tertianā expectabat: 2. de cris. cap. 3.

Ad secundum dicit Gal. 1. de uic. in mor. acut. ubi loquitur de ptisana ordeacea, quod nullo modo humori putrido conuenit digestio, quum nec ad benignitatem humor reduci possit, sed continuò euaporans humidum, quoddam cineritium permaneat: nisi hoc forte acciderit in continuis febribus, quia tunc humor putridus digeri debet, quum tota materia putrescere incipiat.

Ad tertium, dicimus propositionē esse ueram, modò de his omnibus fructibus intelligatur, qui sua humiditate ad corruptionem sunt proni: sed quum multi sint qui sua humi-

ditate corruptioni resistent, ut granata mala, citrina, pruna, &c. idcirco in febris con ceduntur, quum magis per suam frigiditatem iuuant, quàm per humiditatem putrescibilem noceant.

Ad quartum Galen. 3. de uic. in morb. ac. comment. 8, Vinum, inquit, aquosum maximè febrientibus est idoneum, & id est quod album est colore & substàcia tenui, nullam earum, quæ in cæteris uinis insunt, habens qualitatem, nec austeritatem, nec adstringentiã, nec dulcedinem, nec acrimoniam, nec odorem, & quod in Italia imbecillum est, Sabinum, quod febrientibus administrant, & quod reperiri potest tale uinũ in Asia, Cilicia, Phœnicia, Palæstina, Scyro & Creta: unde si multa reperiuntur in Italia, Asia, Bithynia, nil mirum, imò quod plus est, miratur cur nil tãctum sit de hoc uino ab Hippocrate, quum febrientibus plus quàm cætera omnia sit iocundius, &c.

De febre quotidiana simplici.

Quotidiana est febris intermittens, à pituita extra uenas putrefacta proueniens, cuius

est agrum quotidie per sex horas cum falsa
quiete dimittere. Vocatur etiam alio nomine
emphemerina.

Loci consentientes de fe-
bre quotidiana.

Galen. 2. de diff. feb. cap. 4, Febris quoti-
diana exquisita est quæ ex pituita putredi-
ne ortum habet, per sentientes corporis par-
tes à natura detrusa, &c. lege etiam cap. 7.
huius libri.

De causis febris quotidianæ simpl.

Causæ præcedentes sunt tēperatura humi-
diores, anni que tēpora, quies, otium, repletio,
balnea statim à cibo. Causæ antecedentes &
coniunctæ sunt ipsa pituita, quæ quū sit qua-
druplex, acida, dulcis, salsa & nitrea, quæ est
acida qualitatis particeps, ita quatuor spe-
cies siue differentia febrium efficiet.

Loci consentientes de causis
febris quomodo.

Galen. 1. ad Glau. cap. 7, Fiunt hæ febres
atratibus, naturis, anni que statibus & tēpera-
turis humidioribus, &c. uide latius textū. Itē
Auic. ibi, Fit febris humidis, quietis, senibus,

infantibus, nauseatiuam satietatem patientibus & balneantibus se super repletionē, &c. Galen. 2. de diff. feb. cap. 1, Sicut tertiana à flaua bile, ita quotidiana à pituita sunt. Et in lib. de plenit. tres species pituitæ enumerat. & 2. de diff. feb. cap. 64. esse dixit ut salsa, acida, dulcis, uitrea, quæ acida etiam qualitatis particeps dicitur. Vnde Auicen. 4. can. 2. tra. cap. 47. quatuor species enumerat ibi, Et phlegma putridū quandoque est uitreum, quādoque acetosum, quādoque dulce, quandoque salsum. B. Nota tamen, si quæ sint aliæ species pituitæ, per has quatuor intelligi: nam crudum & mucilaginosum sub uitreo comprehenditur, sicut insipidum & aquosum sub dulci, & ponticum sub acetoso: gypseum uerò febrem non accendit. lege de his fusius lib. 1. cap. de humoribus.

De signis febris quotidianæ simpl.

Febris quotidiana cognoscitur, quia in primis diebus nullū habet uigorem, sed potius in progressu tēporis refrigerationē quandā, ob humoris crassitiē. Paul. Fit inæqualis, submer

sus, debilis, rarus, in principiis uerò particula-
 ribus fit frequēs, sed nō adeò uelox nec uehe-
 mens, nec magnus ut in tertiana, sed rarus.
 Urina alba, tenuis, deinde fit rubra, nulla
 adest sitis, nisi à pituita salsa aut ualde pu-
 trida fiat, sudor nō apparet materia existen-
 te crassa. Os uētriculi & hepar malè afficiū-
 tur ob uim concoctoriā imbecillē. Præcordia
 ultra naturalē habitū intumescūt ob caloris
 imbecillitatem. Calor etiam accidit hyber-
 no tempore, & fit principium accessionis cir-
 ca uesperū: febris incipit serè cum syncopi, &
 principiu uniuersale durat 18. diebus, & de-
 clinationis 64. Calor huius febris in primo
 tactu est debilis, uaporosus: sed dum mora fit
 in tangendo, sentitur acris & mordax: si ue-
 rò febris fiat à uitreo & acetoso phlegmate,
 multiplicatur ualde frigus, & in uitreo ri-
 gor est uehementior: quæ uerò fit à salsa pi-
 uita, sequitur horror, & non fit uehemens
 frigus: quæ uerò à dulci, rarò aduenit frigus
 uel rigor.

Loci consentientes de signis.

De his signis fusissimè loquutus est Gal. 2.

de cris. cap. 5. ibi, Febris quotidiana cognoscitur, quia nō primo statim die cum rigore inuadit, sed processu temporis refrigerationes potius quā rigores ipsis adueniunt, neq; in pulsibus seruatur ordo uel aequalitas, dū accessiones fiunt, &c. lege locum hunc fusius, & intelliges iam à me pridem dicta. Lege etiam Paul. lib. 2. cap. 23. Item Razen 10. almans. Item Auicen. 4. can. cap. 48. Item Gal. 2. de diff. feb. ca. 10. Et primo ad Glauc. cap. 7, Vniuscuiusque humoris pituitosi signa etiam diffusè habes ex Auic. loc. cit. Vide etiam Aet. ser. 5. cap. 85.

De cura febris quotidianæ.

Quinis intentionibus febrē pituitosam curabis, primò cum regimine sex rerū non naturalium. 2. cū humoris crassi incisione. 3. euacuatione. 4. cum urinae prouocatione. 5. cū symptomatum remotione & membrorum roboratione. Prima intentio perficitur cum attenuantibus cibis & incisorijs, ita ut in primis diebus tenuem exhibeamus uictū, sed in processu temporis crassiotem, & hoc in cura tentatiua. Sint itaque cibi temperati, ad aliqualem

calore uergētes, ut panis cōtritū, caro pulli,
 borago, fœniculū, uinū interdū cōceditur al-
 bum & lymphatum. In alijs rebus non natu-
 ralibus nō uniformis regula dari potest, quū
 inter salſam & crudā pituitā, inter dulcem
 & acidam magna quippe adsit differentia.
 Secūda intētio fiet, si primū aluum cū cly-
 steri lenimus: deinde humorē crassum incidi-
 mus cum oxymelle simp. rhodomelle, uel sy. de
 duabus rad. uel bisantino cū aquis uel deco-
 ctis cap. Ven. fœniculi, petroselini, maratri,
 apij. Tertia intentio pręparari poterit cum
 agarico, troc. rheub. cōfectione de turbit, dia-
 phinico, el. indo, &c. Quarta intentio quę
 est urinae proritatio, multifariā fieri poterit,
 tū cū pilulis ex semine urticae, cuscute, tū cū
 decocto apij, fœniculi, tū cum topicis quę ad-
 hiberi possunt. Quinta intētio duo mala sym-
 ptomata, quę huic feбри coniungi solent, re-
 mouet, sicut est somnolentia quędam pro-
 funda in principio paroxysmi, & rigor ual-
 de intēsus. Somnus remouetur cum aceto ma-
 nibus admoto, uel in angulis oculorū posito.
 Rigor tollitur cum oleo ruta, in quo tandiu

uinū Creticum bullierit, donec cōsumptū uinum amoueatur, facta inūctione ante rigoris aduentū circa totā dorsi spinam. Roboratur etiam stomachus cum oleo mastichino de spica, de absinthio: aut intrinsecus cum aromatico ros. diarrhodone Abb. &c.

Loci consentientes de cura febris quotidianæ.

De prima intentione loquitur Gal. 1. ad Glauc. cap. 12. ibi, Et uniuersum totius uictus caput sit ad incidendum efficacius.

Aui. 4. can. cap. 58, Et fortasse cōtētus erit aqua hordei in primis diebus, dum speratur status propinquior: & nota q̄ instituitur uictus tenuis, dū in cognitionē febris peruenire uolum⁹, uel tenuis ratione quartanæ, uel quia processu tēporis pituita coquitur, & sanguis efficitur, modò à natura uincatur, ut refert Gal. 2. de uic. in morb. ac. De alijs intētionibus loquitur Gal. 1. ad Glauc. cap. 12. ibi, Curamus quotidianā cum oxymellite in primis diebus, & his quæ ualidè urinam cient: circa statum habēda est uentriculo sollicitudo, &c. Vide illū fusi⁹, Vide etiā Razē 10. almans.

cap. de cura febris phlegmatica, &c.

De prognost. feb. quotidiana.

Hippoc. aphor. 4. aph. 63, Quibus in febris
bus quotidie rigores fiunt, quotidie febres sol-
uuntur. Razes 10. almans, cap. de quot. in-
terpol. Hæc febris multus moratur mēſibus, &
moris suspiciōē habet. Et 18. cōment. Quo-
ridiana est periculosa. Et Auer. 4. collig. De-
terior omnibus est quæ ex phlegmate vitreo,
& saluior omnium quæ est mūdorum tempo-
rum, & quæ est multæ sudoris: nam humoris
significat tenuitatē & corporis rarā textu-
ram: & rarō inquit Auic. euacuatur febrien-
tes à læsione stomachi. B. Quia quū locus pi-
uitæ sit stomachus, fieri nō potest ut si sit fe-
bris pituitosa, q̄ nō noceat stomacho, sicut ter-
tiana felli & hepātī, et quartana spleni, &c.

De febre quartana.

Febris quartana ut plurimū periodica, est
febris à melācholia non naturali putrefacta,
per adustionē bilis genita plerūque eueniens.
Cuius est agrū de quarto in quartū diem af-
figere, & hæc duplex, exquisita & spuria:
exquisita fit à naturali melancholia, spuria

Yyy. i.

uerò à non naturali, & hæc cap. de hum.

Loci consentientes de fe-
bre quartana.

Cause quartanæ sunt quæcūque atrā bilē generāt, nā ex solo humore atrabilari, putrefacto oritur. Putrefit uerò atra bilis ob sui crassitiē, multitudinē, aut ob aliquā meatuū obstructionem, aut ob facultatis expulsoariæ impotentiā, quæ in corpore corrupta expellere nequit, unde sequitur putrefactio. Fiūt etiam quartanæ ex aliquo hepatis uel splenis affectu, uel successione aliarū agritudinū, &c.

Loci consentientes de cau-
sis quartanæ.

Gal. 2. de diff. feb. cap. 5, Generatur quartana ex solo humore atræ bilis putrefacto: putrefit interdum ob crassitiem, aut multitudinem, aut tenacitatem materiæ inutilis, aut aliquam meatuum obstructionem, &c. Auic. 4. can. cap. 64, Eius cause sunt que generant melācholiā, postea putrefaciunt eam, &c. Euenit autem ut plurimum ex successione agritudinum febrium diuersarum, ex quorum putrefactione quum adduntur & non

euacuatur, multiplicatur melancholia. B. Raro quartana continua accidit ex eo, quod quum in uenis atra bilis ad putrefactionem mouetur, tanquam uirtuti dissimilis extrahitur, quæ putrescens intermittentem efficit. Notat Arcul. ex hoc Auic. loco, quod id uerum non sit, quod putridum à putrido fiat: nam atra bilis ex putredine humorum generatur, quæ non est putrida, quod etiam confirmatur à Gal. 3. de prognost. comment. 29.

De signis febris quartanæ.

Signa quartanæ uniuersalia sunt, quia ipsa incipit cum paucis frigore, quod augeatur & minuitur in eodem paroxysmo, adueniente statu caliditas non est uehemens ut in tertiana, sed maior quam in pituitosa: præterea quartana paulatim ac insensibiliter à frigore ad calorem se confert, fit etiam plerumque in autumno. Cognoscitur ex uictu præcedente, & si homo lienosus sit, si populariter fiat quartana, si urinae tenues, albæ & aquosæ fuerint. Signa particularia sunt, ut si fiat à sanguine adusto, aderit rubedo urinae, signa sanguinis præcesserunt, forma, ætas, tempus, &

XX.ij.

fit post febres sanguineas. Signa bilis adustæ sunt pulsus uelox, frequēs, incipit cū horrore, frigore, siti, sudore, inflammatione, tēpore, atate, & febriū cholericarū successionē. De signis pituitæ adustæ aliquid in præsentia nō afferā, quā anceps sim, an pituita ita aduri possit, ut in melancholiam conuerti possit, &c.

Loci consentientes de signis quartanæ.

De omnibus signis tā uniuersalibus quā particularibus loquitur Auic. 4. can. cap. 65. ibi, Signa quartanæ sunt, q̄ incipit cū paruo frigore, &c. lege eū fusius. Gal. 2. de cris. cap. 4. omnia hæc etiam habet, ibi, Quartana febris cognoscitur, si autūnus frigida & siccam & inæqualē tēperaturā habuerit, quia tunc quartanarij circuitus frequentiores fiunt, &c. lege locum ultra, de pituita utrū aduri possit, ut atra bilis euadat, lege Manardum.

De cura febris quartanæ.

Quinque in cura intēctiones cōueniūt, quarū prima expostulat uictum optimū, non flatuosum, sed uentrē emolliēre. Cauēda est suilla caro, & tenacia edulia, & quæcūque re-

frigerant ac exiccāt:uinū concedatur album,
 tenue. Cōcedantur inter uolatilia quæ optimi
 succi sunt, in statu morbi uictus tenuis adhi-
 beatur magis quā ante & post, sitque cali-
 dus & humidus. Secūda intētio est uētris le-
 nitio, ac humoris aliqua preparatio: lenimus
 cū clysterib⁹ uel alyis leniētibus, ac præpara-
 mus primū cū acetos. simp. rhodomelle, sy. de
 epitimo, de fumo terræ, de suc. borag. bisanti-
 no cū aquis uel decoctis conueniētibus, ut fu-
 mi terræ, lupulorum borag. epitimi, senæ, po-
 lypodij. Tertia intentio est euacuatio, quæ
 parari potest cum sectione uenæ interioris,
 modò sanguis admisceatur, uel abundare ui-
 deatur: aut fiet per phārmacum solutium,
 qualis est infusio senæ in sero caprino, aut
 decoctū myrobalanorū cheb. & ind. aut cō-
 fectio hamec. pilulæ de fumo terræ, indæ de
 lapide lazuli, & hoc quum decocta ac præ-
 parata fuerit materia: interdum etiam eua-
 cuatio fiet per uomitum, per urinas, & sudo-
 rem, &c. Quarta intētio roborat mēbra, si-
 cuti cor cū ung. de nenuph. citrino, hepar cū
 rebus hepaticis, similiter lienē & stomachum

Xy.ij.

prout suis locis dictum est. Quinta intentio
 Symptomata tollit, perficitque primò remo-
 uendo rigorem ualidum & frigus, in ungēdo
 spinam dorsi cum oleo rutaceo, costino, cum
 mithridato & theriaca, &c. Et hæc de fe-
 bre quartana exquisita. At spuria hisdemet
 intentionibus curabitur, præter quòd dicta
 magis ad humiditatem & frigiditatem uer-
 gere debet, præsertim si à sanguine adusto,
 uel à bile adusta prouenerit. Digestio etiam
 aliter ac dixi fiet, sed cum oxysachara, syr.
 uiol. acetos. simp. Variabit etiam euacuatio
 quæ fieri debet cum myrobalanis citrinis &
 indus, &c. cetera erunt prout dictum est. Cu-
 ra quartanæ continuæ erit eadem ac dictum
 de interpolata, nisi quòd infrigidationem re-
 quirat maiorem ob assiduum calorem, item
 audacius uena secatur, & tenuius cibandum,
 quum breuioris sit status.

Loci consentientes de cura fe- bris quartanæ.

De prima intentione loquitur Gal. 1. ad
 Glau. cap. 2. ibi, Victus instituendus est opri-
 mus, sine flatibus, ac uentrem emolliens: ar-

cēdi sunt à carnibus porcorum, & ab omni-
 bus edulys tenacibus & tardè exeuntibus,
 quæ corpus refrigerant & exiccant. Vide
 etiam Auic. 4. can. cap. 68. nam ibi fusius de
 uictu pertractat. De alijs intentionibus lo-
 quitur ad unguem Gal. loc. cit. ibi, Quartana
 mediocriter ac leniter ab initio tractanda
 est, nullum forte medicamen aut euacuationē
 exhibentes, nisi sanguis uehementer abunda-
 re uideatur: nam tunc uena secetur interior
 uel media, quæ est in sinistro cubito: quòd si
 niger ac crassus sanguis uideatur, audacius
 mittatur: si flauus & tenuis, statim suppri-
 matur: quā morbus in suo uigore fuerit, pro-
 uidendum est uisceribus cum his quæ emol-
 lunt & laxant, deinde medicamentis uten-
 dum quæ urinam cient: & si coctionis indi-
 cia apparuerint, cum his purgandum quæ
 humores atros exoluunt, non semel tantum,
 sed sæpius si fuerit necessarium: utendum &
 à cibo uomitibus, & qui nequeunt uomere,
 per inferiora purgentur. Auic. de his fusius
 pertractat 4. can. cap. 66. Et Razes 10. alm.
 cap. proprio.

Yyy. iiij.

Observationes circa euacuationem.

Auic. 4. can. cap. 66, Quando quartana est à melancholia sanguinea, tunc extrahatur sanguis secundum quantitatem necessarium: & quando non est necessaria, tunc phlebotomia est nociva, quatenus debilitat & ducit contrarium melancholia, & quatenus mouet humores ad exteriora, &c. Gal. 1. ad Glauc. cap. 11, Quicumque aliquid ex fortibus medicamentis ab initio exhibuerunt, omnino ante statum, quartanam, quæ erat simplex, sæpius duplicem fecerunt, &c.

Observationes circa victus rationem.

Auic. cap. cit. Prohibeatur in die paroxysmi à comestione: nam rectius est ut eueniat febris uentre uacuo, & non occupetur natura, sed præcipiatur ieiunium, & interdicator aqua frigida illa die.

De prognosticis quartanæ.

Hippoc. aphor. 2. aphor. 25, AEstiua quartana magna ex parte breues, autumnales longe, & maximè quæ ad hyemem attingunt. Et aphor. 5. aphor. 70, A quartana capti non

admodum conuulsionibus capiuntur: si uerò prius capiantur, & quartana superuenerit, liberantur. B. Quia quum duplex sit horum sanatio, excretio scilicet & coctio, hæc duo quartana, excretionem scilicet à rigore & coctionem à calore febrili efficit. Aui. 4. can. cap. 64, Saluior quartana est illa, quæ non accidit ab apostemate splenis: quæ uenit ab apostemate splenis, perducit ad hydropem & perniciem. Quartana quæ salua est, liberat ab aegritudinibus melancholicis, ut ab epilepsia, melancholia, & in ea est securitas à spasmo, & non durat nisi per annum, modò error non accadat. Sunt & quartana quæ per 12. annos perdurant, quibus omnibus inimicus est autumnus, &c.

De febribus sanguineis.

Quum duplex sit genus februm sanguinis, alterum à putrefacto sanguine, alterum à nō putrefacto, ambo sub uno tantum nomine synochi continentur: unde dicimus synochum esse febrem acutam, continuam, ex sanguine in uenis putrefacto ortam: altera uerò synochus, id est, continens, est febris acuta ex san-

guine in uenis non putrefacto in multa copia peccare, id est, succis æqualiter adauctis. Harum febrium tres sunt species, acmaistica, epacmaistica & paracmaistica, id est, in uigore perseverantes, crescentes & decrescētes.

. Loci consentientes de febribus sanguineis.

Gal. 9. meth. cap. 3, Duplex est genus synochi, unum quod ex natura eadem cum diarrijs constat, alterum est ubi in omnibus uasis ac potissimum maximis æqualiter succi putrescunt. Auic. 4. can. cap. 44. inquit medium utriusque scilicet ephemera & putrida synochum sapere: nam differt ab ephemera, quia humor est qui calefactus est: differt à putridis, quia nulla adest putredo, &c. Lege de his Gal. 9. meth. cap. 2. ibi, Quædam enim febrium manifestam habent putredinis notam, quedam nō habent. Lege etiam 2. de cris. ca. 6. Et Paul. lib. 2. ca. 26. & habebis utranque synochi descriptionem. Gal. 2. de diff. feb. ca. 2. & 9. meth. ca. 3. & 2. de cris. ca. 6. tres species synochi demonstrat, quas Aet. ser. 5. cap. 70. inquit solum competere febribus à san-

guine non putrido factis, &c.

De causis febrium sanguinearum.

Sex sunt sanguinearum febrium cause. prima est obstructio. 2. est repletio. 3. multitudo exercitij non consueti laboriosa. 4. consuetæ euacuationis retentio. 5. aquositas ipsius sanguinis ex comestis fructibus elaborata. 6. Humoris crassi & crudi copia sanguine admixta, &c.

Loci consentientes de causis
febrium sang.

Paul. lib. 2. cap. 27, Continentium febrium origo ex sanguine est, qui nunc efferuescens, nunc putrefactus obstruitur, &c. Galen. 9. meth. cap. 3. inquit, harum febrium in gracili & frigido corpore neutrum consistere, sed tantum in corpulentis qui sanguine abundant. & cap. 4. loquens de iuvene palestræ perito inquit, quod suspicio erat hæc esse synochon, quæ ex sanguinis abundantia & obstructione præ carnis copia stipatione provenit, &c. Lege de his fusius Auic. 4. can. cap. 44. Et Aet. ser. 5. cap. 7. ibi, Conflatur hæc ob calidi sanguinis copiam, &c.

De signis febrium sanguinis.

Duodecim signis synochum cognoscēs: primo febris assidua est. 2. rubedo faciei & oculorum. 3. inflatio uenarum temporum & eorum repletio. 4. nullus adest rigor uel sudor. 5. interdum adest nasi pruritus, & circa locum cui cucurbitulae applicantur. 6. somnus profundus. 7. loquendi difficultas cum faucium inflammatione. 8. effusio lachrymarum. 9. pulsus maximi, uehementes, citati, crebri, non mordaces. 10. urina neque consistentia, & colore à naturali habitu aliena. 11. estus intolerabilis. 12. graues uigiliae, &c.

Loci consentientes de signis febrium sang.

De his signis facit mentionem Auic. 4. can. cap. 45. ibi, Signa febris sanguineae sunt adhaerentia febris, rubedo faciei & oculorum, &c. Gal. 9. meth. cap. 4, Vbi se inuenisse febrem admodum calidam dicit, pulsus aequales maximos, celeres & frequentes & uehementes, calorisque qualitatem, quae tactum minimè morderet, & urinas seu sēōē, id est, consistentia, ac colore non multum à natu-

rali habitu alienus, &c. Lege Paul. lib. 2. cap. 27. ibi, Indicia, &c.

De cura febris sanguineæ.

Cura febris à non putrefacto sanguine, duas tantum intentiones requirit, quarum prima est euacuatio sanguinis per sectionem uenæ usque ad animi defectum. 2. est febrilis caloris alteratio, quæ fit interdum cum aquæ frigidae potu. Cura uerò febris à putrefacto sanguine quatuor exposcit intentiones, quarum prima est circa regimen, quod ad frigidum & siccum ordinari debet, unde in cibando primum morbum & uirtutem metire: nam si ultra septimum diem non se morbus extendere uideatur, parum cibabis, exhibendo prisanam hordeaceam, panem contritum cum seminum melonis expressione: similiter ualent lactuca, acetosa, endiuia, mala granata, &c. Secunda erit euacuatio, quæ fiet per sectionem uenæ, uel per cucurbitulas, uel per pharmaca solutiva, quæ uaria esse debent, prout humorum mixtio cum sanguine diuersa fuerit, unde bilis per cholagoga, sicuti cum myrobalanis citrinis educetur, uel cum rheubarb. cas-

fia, &c. Pituita cū phlegmagogis ut pluries
 dictū est. Tertia intētio est causarū putredi-
 nis amotio, quæ adimi solent per sui cōtraria:
 nā si à frigida causa dēsum stipatūmue cor-
 pus reddatur, tūc per relaxātia & rarefaciē-
 tia curabimus. Si ex obstructione, per aperiē-
 tia: si ex abūdātia humorū, per euacuātia: si
 ex crassitie, per attenuātia: si ex tenuitate, p
 incrassantia, &c. Quarta intētio est caloris
 febrilis alteratio, quæ fieri potest cū reb⁹ in-
 frigidātibus & attenuātibus, præsertim si san-
 guis crassus existat, ut cū oxysacharo acetos.
 simp. sy. de endiuia, uel existēte tenui cū sy. de
 iuiubis, cū aquis & decoctis acetosæ, portu-
 lacæ, &c. Vel aliquo cū eclegmate, sicuti cū
 rucharo ros. triasand. diarrhodone, &c. Cor-
 rectio accidētū, sicut dolor capitis, sitis, som-
 ni profunditas, fiet, ut pluries dictum est, suis
 in locis.

Loci consentientes de cura
 febris sanguinæ.

Gal. 2. meth. cap. ult. loquēs de uictu, si cō-
 tinens, inquit, ultra septimū progressū nō ui-

IN CVR. MORB. LIB. IIII. 1087

debitur, prorsus à cibo cōtinēdus est ager, in
virtutē defecturam cōiicias, &c. Auic. 4. can.
cap. 46, Cibi sint ex iuiubis, ex lentibus cum
aceto, granatis & sumach. B. Intellige san-
guine existente tenui. Aet. ser. 5. cap. 7, Cu-
rādi scopus est copiā euacuare, & calorem
praternaturalē extinguere, & si qua adest
crassities, siccare, & debilitatis partibus an-
tiquā temperiem bonā restituere. De sectione
uena lege Gal. historiā de libero & seruo, 9.
meth. cap. 4. Auic. 4. can. cap. 46, Intētio in
hac febre est euacuatio plurimi sanguinis us-
que ad syncopim: & si sanguis fuerit subtilis,
incrassandus: si cholericus, infrigidandus: si
crassus, attenuandus. B. Cōueniunt Paul. Aet.
Gal. & Auic. in extrahendo sanguinē usque
ad animi deliquium, sed Auerrhois, qui aliās
stimulus medicorum dictus est, 3. sui collig. re
probat euidenti ratione Gal. & aliorum in
hac sectione uenæ opinionē, quæ rationes nō
parui apud me momenti sunt: uide tu eas si
lubeat. Gal. loc. cit. synochi cū putredine cu-
ram recitat, ibi, Si putredo equaliter in om-
nibus uasis subsistat, aut in maximis, &c.

Observationes in cura.

Gal. 9. meth. cap. 4, In sectione serua vires, item si ciborum cruditas adfuerit, uel secessus superfluitatum in intestinis, uel alius sanguinis fluxus, uel puerilis uel senilis ætas, uel frigidum, uel gracile corpus, uenam non secabis usque ad syncopim, imò naturæ reliquos itidem ait Auic. & Aet.

De prognosticis febrium sanguinis.

Gal. 3. de cris. ca. 4, Synochi raro eueniunt, & ubi nullus sit error, in quarto finiuntur, natura proprijs circuitibus perueniente, &c. Auic. 4. can. cap. 44, Ex tribus speciebus saluior est epacmastica, deinde homotena, nequior uerò acmastica. B. Nota quòd acmastica & homotena idem significant iuxta Gal. placitum, quare in nominum significato ipse deceptus est, ita ut intelligere uellet, quòd decrescens est salubrior, sed acmastica uel homotena seruans, scilicet eundem tenorem, est minus mala, & epacmastica quæ augendo se semper procedit, ceteris est nequior: quamquam ego crediderim ceteris deteriore,

quæ ac mastica nominatur, sicuti testari uide-
tur & ipse Gal.

De causone febre.

Causon siue ardens est febris continua, ar-
dentissima ex flaua bile putrefacta, accensa,
putrefacta inquã, ne crederet quispiam, sicuti
Auerrhois 7. collig. quòd ex bile non putrida
ebulliente fieri posset, ex eo fortè Gal. com-
ment. deceptus, qui est 59. quarti aphoris.
ubi inquit, Tertiana febris ab ea quæ ardēs
nominatur, humore faciēte nō differt: utra-
que enim à flaua bile fit. Differūt autē, quo-
niam febris ardens habet in uenis unā cum
sanguine bilem plurimam ebulliētem, tertia-
na uerò eandem bilem habet in toto corpo-
re delatam & motam.

Loci cōsentiētes de causone.

Aet. ser. 5. cap. 78, Causon siue ardens est
febris continua, &c. Gal 4. de uic. in morb.
ac. tex. 13, Causon est febris, in qua urens
caliditas, sitisque incompressibilis hominem
torquet, &c.

De causis febris causi.

Causæ primitiue causi sunt quacunque

Zxx. i.

calida & sicca sunt, ut uini potus, salforum
 esus, uigilia, motus laboriosi, ira, &c. Causæ
 coniunctæ & antecedentes sunt, flaua bilis
 putrescens, uel pituita salsa: unde proprium
 & legitimum causum nominant, qui à bile:
 improprium & spurium, qui à pituita salsa
 prouenit. Interdum causa ipsius causi est ce-
 rebri inflammatio, &c.

Loci consentientes de cau-
 sis febris causi.

Hippocrates 4. de uictu in morbis acutis,
 textu 1, Causus, id est febris ardens, fit, quum
 uenulæ tempore æstiuo exiccatae, acres ac
 biliosas, quæ tenues sunt, trahunt ad se hu-
 miditates, quas *ἰχμῆρες* uocant. Et textu 3,
 Fit causus ob longum iter, longamque si-
 tim, &c. Ex quibus intelligere potes à cau-
 sis calidis & siccis oriri causum. Si uis dein-
 de scire quomodo uenulæ illæ ad se trahant
 humiditates, lege Galenum comment. 58. in
 4. aphorism. ibi, A febre ardente habito,
 &c. Aetius serm. 8. cap. 77, Ex flaua bi-
 le putrescente incenditur, & alternis diebus

exacerbatur, & quandam habet febris im-
 minutionem siue remissionem. B. Nota quo-
 modo causus differat à synocho: nam causus
 à flaua bile, synochus à sanguine. Causus
 habet aliquam imminutionem siue remissio-
 nem, sed synochus à primordio usque ad fi-
 nem, unam tantum habet exacerbationem,
 ne fortè, sicuti & ipse Arcul. ambas febres
 in unum confundas. Vult enim de mente
 Galen. causon in epacmaesticam, homotenam,
 & paracmaesticam diuidi, sicuti synochon,
 quod nullibi Galen. (quod sciam) somniauit,
 ne dicam scripserit. Auic. 4. can. ca. 41, Cau-
 son fit secundum duos modos, aut est à cho-
 lera, aut à phlegmate salso putrefacto. Hoc
 idem etiam adserit Galen. 4. de uic. in mor.
 ac. comment. 13. Galen 1. prorrhœu. tex. 18,
 Febris ardens tum ob alias causas, tum pro-
 pter cerebri inflammationem fit, &c.

De signis causi febris.

Signa sunt, arida lingua, nigra, appeti-
 tus deiectio, uomitus biliosus, uigiliae, inter-
 dum deliria, fluxus sanguinis narium, dolor

Zxx. y.

capitis, oculi cōcavi, uentris solutio, inquietudo, sitis uehemens, nisi tussi sicca leuiter irritans adfuerit, &c.

**Loci consentientes de signis
febris causi.**

Auic. 4. can. ca. 42, Signa cholerica car-
sonis sunt accidētia mala ex uigilijs, inquietu-
dine, adustione, permixtione mentis, &c.
Paulus lib. 2. cap. 28, Ardentibus hac super-
ueniunt, arida lingua, crassa & nigra, uen-
triculi rosio, deiectiones pallidæ, sitis uehe-
mens, uigiliae, & nonnunquam delirium, &c.
B. Hac omnia eueniunt ex motu bilis: sed ef-
ficacius reddit rationes. Galen. de his 4. de
uic. in mor. ac. comment. 40.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 34, Quibus plu-
rimum sicca tusses leuiter irritantes in feбри-
bus ardentibus fiunt, non multum siti infe-
statur, &c. Vide etiam de his signis Hippoc.
4. de uic. in mor. ac. tex. 4. &c.

De cura carain febris.

Curatur hac febris quadrisariam: pri-
mò uictus ratione quæ humidis & frigidis
constet. 2. euacuatione, quæ per sectionem ue-

MEDIC.
IN CVR. MOR. LIB. II. 1093

na, & alui eiectionem fieri potest. 3. cum
extinctione caloris febrilis. 4. cum acciden-
tium correctione, quæ omnia fient prout di-
ctum est in cura tertianæ interpolatæ, &c.

Loci consentientes de cu-
ra causi.

Paul. lib. 2. cap. 29, Dupliciter solui debet
morbus, aut excernendo humores biliosos, aut
eos extinguendo. Excernuntur per sudores, uo-
mitiones & inum uentrem, extinguuntur aqua
frigida potu, &c. Auicen. 4. can. cap. 43,
Causus curatur cura tertianæ puræ, & si in-
diget euacuatione, festina: nā euacuatio me-
lior est quā in tertianā, sed complemen-
tum sit apud digestionem, & non phleboto-
metur, nisi in urinā adsit turbiditas & ru-
bedo, &c.

De prognosticis causi febris.

Hippoc. aphor. 4. aphor. 58, A' febre ar-
dente habito rigore superueniente solutio.
B. Rigor incitatur à bili per sensilia mem-
bra, ueluti motu delata, unde aluus soluitur,
sudores & uomitus excitantur, & bilis ex-
purgatur. Hippoc. aphor. 4. aphor. 48, In
Zzz. ij.

febris non intermittens si partes exteriores frigidae, interiores uruntur, & serim habeat, lethale est. B. Intelligitur hoc de causo: nam Galen. 1. prorrh. tex. 7. quando causus interna quidem urit, externa uero nec mediocriter calefacit, lethalis est. Hippoc. aphor. 4. aphor. 43, Febres quaecunque non intermittentes tertia die fortiores fiunt, magis periculosae: quocunque autem modo intermiserint, periculum abesse significatur. Et aphor. 4. aphor. 49, In febre non intermittente, si labrum, uel oculus, uel nasus, uel supercilium peruertatur, uel non uideat, uel non audiat, tam debili existente corpore, quicquid horum euenerit, mors proxima est. Et aphor. 4. aphor. 50, Vbi in febre non intermittente difficultas spirandi & delirium acciderit, lethale. Et aphor. 6. aphor. 26, Quibus in febribus ardentibus tremores fiunt, delirio soluuntur. Auicenn. 4. can. cap. 41, Raro febris ardens senibus accidit: & si accidat eis, pereunt, quoniam non fit in eis nisi a causa ualde forti. B. Similis sententia habetur ex Galen. aphor. 1. comment. 14. ibi, Senibus

non acute febres accidunt, nisi quando rarerent talis accidat febris, qualis iuuenibus, omnino hæc ad egrotantis interitum terminatur, quoniam indicium est, immensam quandam esse causæ febrem facientis magnitudinem, &c. Hippoc 4. de vic. in mor. ac. tex. 10. Si è naribus fluxerit sanguis, soluitur aegritudo, atque si sudores superuenerint iudicatorij, legitimi, cum urinis albis, crassisque, & lenibus subsidentijs, &c.

De febre epiala.

Epiala, est febris pituitosa intermittens, à pituita vitrea in locis à corde remotis putrefacta, quæ ex sua propria natura eodem tempore frigus & calorem inducit. Dicta est à leni afflictione, sicuti ἡπιᾱλος sonat.

Loci consentientes de febre epiala.

Galen. 2. de diff. feb. cap. 6, Quando quis febricitat, simul & riger, atque eodem tempore in toto corpore utrumque affectum sentit, ea febris est quæ propriè epiala uocatur. B. Si-

Zxx. iij.

milis sententia est in lib. de inaequali intēpe-
rie, cap. 8. Idem etiam adserit Haly Abb. 6.
sue theoricæ cap. 6. Et Razes 16. continētis,
cap. 3. Serapio 6. sui breuiarij, Hæc febris
non est continua, sed interpolata, durans tri-
bus uel quatuor periodis. B. Nota quòd Se-
rapio & Auicen. in hac febre plurimùm à
Galen. discrepant, siquidē epialem pro lipy-
ria sumunt: nam quotiens frigus in interiori-
bus, & calor in exterioribus sentitur, epia-
lam esse dicunt. Galen. uerò quotiens uterque
affectus unā sentitur: sed ideo errant, quia
nomina simul confundunt. Vide Aet. ser. 5.
cap. 87. Febris epiala à leni afflictione uo-
cata est, quum simul febricitant & rigent,
& utrunque percipiūt eodem tēpore in omni
corporis parte. Paul. lib. 2, ἡ πιάλος ἢ ἀπὸ
μεταφορῆς τῆς ἀλός, ἢ ἀπὸ τοῦ ἡπίως
ἀλεαίνειν, ὃ ἀπ' ὧν δερμαίνειν. id est, e-
piala dicitur per translationem à sale, uel
ab epios, quod est molliter, & aleanem quod
est calefacere, eò quòd uehementer non urat,
sed molliter ac blandè calefacit, &c.

De causis epialæ febris.

Causa est pituita vitrea, partim cruda, partim putrefacta, interdum cum amara bile coniuncta, atque per sensilia membra delata ac mota, etc.

Loci consentientes de causis epialæ.

Gal. 2. de diff. feb. cap. 6, A' pituita tantum vitrea partim putrefacta, partim cruda remanente, unde fit ex putrefacta calor febrilis, & ex cruda frigus pari ratione gignitur. Avic. 4. can. cap. 51, Causa est phlegma vitreum in profundo corporis contentum, quod locum infrigidat in quo collocatur, cui si accidat putredo, vapor eleuatur, & partes exteriores petens calefacit. Gal. de inæquali intemperie cap. 8, Si pituitosus succus, qui est frigidus, & quem vitreum Praxagoras appellat, & amara bilis quæ calida est, simul abundat, ac per sensilia membra moueatur, nil mirum est utrumque à cubante pari modo sentiri. Lege Paul. lib. 2. cap. 25. Et Aet. ser. 5. cap. 87.

De signis epialæ febris.

Signa sunt, quod una sentitur frigus & ca-

lor, urina alba, tenuis, cruda, pulsus rarus, tardus, habita scilicet aliarum febrium ratione, in quibus frequentior esse solet: seruat interdum accessionem tertianam & quartanam ob sui crassitiam & paucitatem: nam humana natura humorem hunc vitreum abundare non sinit. Spatium eius paroxysmi est à quatuor horis usque ad 24. horas, interdum pauca existente materia citius absumitur.

Loci consentientes de signis epialæ.

De his signis lege Avicem. 4. can. cap. 52. ibi, Signa eius sunt quæ prædicta sunt, & urina est frigida, cruda, etc.

De cura febris epialæ.

Eadem cura est, ac in quotidiana dictum est: verum calidioribus magisque incidentibus præsijs indiget, etc.

Loci consentientes de cura epialæ.

Paul. lib. 2. cap. 25, Hæc febris ex pituita nascens, quum ex quotidianarum genere existat, curationi illarum subijcitur, à quotidiana tamen differt, quia tanto calidiori-

bus, magisque incidentibus indiget, quanto frigidior pituita existit.

Observatio in cura.

Auic. 4. can. cap. 60, Caue ne calidioribus in principio medicamentis utaris, sed incipe cum syr. aceroso, mellino, deinde ad sy. compositos, demum ad semina aperitiua & ad infusionem aloes, & troc. de rosas, sed os stomachi præcipuè inter alia confortetur, &c.

De prognosticis febris epialæ.

Serapio 6. breuia. Hæc febris non multum permanet, & fortasse durat per 20. dies, aut ultra parum, aut minuitur parum, quia ob humoris paucitatem logo tempore durare non potest.

De febre lipyria.

Lipyria febris est ea in qua exteriora & superficies refrigeratur, & profundum uritur, & excretiones derinentur, aspera sitientibus lingua est, pulsus parvus & obscurus ob calorem intra se receptum.

Loci consent. de lipyria febre.

Gal. de inæquali intemperie cap. 8, Lipyria est quum intus in ipsis uisceribus calorem sentimus, & in extremis partibus uniuersis

1100 DE CONSEN. MEDIC.

frigus. Itidem ait Auicen. & omnes practi-
cantes.

De causis febris lipyriæ.

Causa quur exteriora frigeant, & inte-
riora urantur, est calor ad interiora reuo-
catus, uel spiritus, quum ad interiora se con-
ferunt, exteriora relinquentes. Vel ideo frige-
scunt exteriora, quia in externis partibus pi-
tuita uitrea continetur, aut quia uapor à pu-
erido humore eleuatus, dum à calore sepa-
ratur, multoties corpus infrigidat, &c.

Loci consentientes de causis
febris lipyriæ.

De his causis lege Auicen. 4. can. cap. 53,
ibi, Quia uirtus effunditur ad locum in quo
est lesio, idcirco exteriora à calore relin-
quuntur, &c. Lege etiam Gal. aphor. 4. cōm.
48. ibi, Quia fortis inflammatio in profun-
diori parte corporis, uel erysipelas euenit, un-
de totus ex toto corpore sanguis ad patien-
tem locum trahitur, ut sit in principijs acces-
sionum, &c.

De indiciis febris lipyriæ.

Indicia & eius cura manifesta sunt, quia

IN CVR.MORB.LIB.III. IIOR

curatur ut cetera phlegmatica, & cognoscitur ex descriptione data, &c.

Loci de prognosticis lipyriæ.

Hippoc.aphor. 4.aphor. 48, Infebris non intermittentibus, si partes exteriores frigida, interiores uruntur, & sitim habeat, lethale. Gal. 2. prognosticorum comment. 4, Si caput manus ac pedes frigidi sunt, uetro, costisque calentibus, malum. Est etiam cap. quæ possent etiam de lipyria intelligi.

Authores dissentientes circa febrem lipyriam.

1 Adserere, lipyriam non esse febrē, eò quòd calor extraneus non diffundatur per totum corpus.

2 Adserere, lipyriam esse posse febrem interpolatam.

Confutatio dissentientium circa febrem lipyriam.

Ad primum responderet Auicen. 4. can. cap. 53, Et si calor non diffundatur per totum corpus, hoc non prohibet, quin sit fe-

bris, dummodo calor extraneus aptus, natus sit per totum corpus diffundi, sicuti non repugnat hominem esse risibilem, etsi non rideat.

Ad secundum, Gal. 4. apho. comment. 48. respondet dicens, Nunquid huiusmodi casus possit fieri in febre intermittente? ego neque uidi inquit, neque animo capio: uidentur siquidem solis accidere febribus, quæ causones ab incendio nominantur, perniciosi, uel si aliter libeat appellare, κακοντεσσι τοις, uelut lipyrijs, &c.

FINIS.

INDEXEORVM QV AE
in libris de Curandis morbis con-
tinentur.

A	Ætas non dicitur
an Absinthii suc-	calidavel frigi-
cus magis sto-	da, nisi ratione
macho cōferat	subiecti 38
quàm ipsa her	Ægritudines cō-
ba. 339	positionis quot
Ætas quid 35	81
Ætates quot sint	Alfeniati 391
36	Alteratricis offi-
Ætatum tempe-	cium 72
ramenta quot	Alteratio corpo-
35	ris quot modis
Ætates an sint	fiat 80
plures , quàm	Alteratio duplex
quatuor 36	133
Ætates an pos-	Alteratio, conco-
sint præfiniri	ctio, humorum
37	que præparatio
Ætatū doctrina	ac digestio quo
an sit utilis 37	modo differāt
	133. 134

INDEX.

- | | | |
|-------------------|------------------|-----|
| Alteratio per se | tarius | 590 |
| an sit causa do- | Anima quomo- | |
| loris | do à natura di- | |
| 207 | stinguatur | 13 |
| Angina quid sit | Animæ sedes vbi | |
| 540 | 70.71 | |
| Anginæ differē- | Animalis virtus | |
| tia 541. causæ | ex motu co- | |
| 542. indicia 545. | gnoskitur | 70 |
| cura 546. confe- | Appetentia quot | |
| rentia, progno- | modis lædatur | |
| stica 551. an cō- | 704 | |
| ueniant reper- | Appetitus du- | |
| cussiva | plex | 704 |
| 554 | Appetitus canini | |
| Angina an ma- | causæ 706. si- | |
| gis à pituita, | gna 708. cura | |
| quàm à cæteris | 709. conferen- | |
| humoribus fiat | tia 712. progno- | |
| 553 | stica | 713 |
| An omni ang- | Appetitui canino | |
| inæ conueniat | an semper vi- | |
| sectio venæ 554 | num conferat | |
| Anhelitus an sit | 717 | |
| motus natura- | | |
| lis vel volun- | | |

INDEX.

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----|
| Aperitiua in spu | finunt | 305 |
| to sanguinis ex | Aphtharũ causæ | |
| retentione mē- | 527. indicia & | |
| struorum factō | cura 528. 529. 530 | |
| an cōferant 618 | prognostica | |
| Apertio quid re- | 530 | |
| ferat 89. 90 | Arquuatus mor- | |
| Apoplexiæ spe- | bus siue auri- | |
| cies 310. causæ | go | 760 |
| 292. signa 293. | Ars curatoria | |
| cura 297. pro- | quotuplex 114 | |
| gnostica 308 | Arteriarum tres | |
| Apoplexia an à | dimēfiones 102 | |
| calido humore | Arteriæ an tantũ | |
| fiat 310 | moueātur mo- | |
| Apoplexia an à | tu pulsus 103 | |
| simplici frigo- | Articularis mor- | |
| re fiat 311 | bi causæ 994, | |
| Apoplexia fortis | 995. signa 997. | |
| an possit sana- | cura 1000. pro- | |
| ri 311 | gnostica 1004 | |
| Error eorum qui | Asciti an semper | |
| apoplecticum | incisio cōferat | |
| dormire non | 816. 817 | |

Aa. i.

INDEX.

Asthma an sit ve Auditiui nocen-
 rus morb⁹ pul tia 460
 monis 550 Ausonii epigrā-
 Asthmatis cau- ma de intētio-
 ſe 580. 582. indi- nibus medico-
 cia 584. confe- rum 280
 rentia 588. cura Azaraius pro-
 586. prognosti- hiber ſecari ve-
 ca 588 nam in phre-
 Asthmati an cō- nitide 225
 ueniant valde B
 ſoluentia 591 Balneū quid pro-
 Attraſtricis offi- ficiat in oph-
 cium 72 thalmia 417
 Auſtio 69 Balneum quibus
 Auſtrix & nutrix caſibus nō con-
 an ſint idē 73 ueniat 1028
 Auriū dolor 449 Batrachi cauſe,
 doloris cauſa indicia & cura
 450. indicia 451 424. 425
 cura 453. 460. Bpoyxos 557
 prognostica 462 Bulimi 714. cau-
 Auditiui acuen- ſe, ſigna 715 cu-
 tia 444 ra & prognosti

INDEX.

- **ta** 717 Calidū quot mo-
 - **Bulimus an idē** dis dicatur 28, 29
 - **cū appetitu ca-** Calidiora mem-
 - **nino** 717 bra 210
 - **Bulimo an cibi** Calor naturalis &
 - **crassi conferāt** extraneus 1008
 - **718** Calor an accen-
 - **C** di possit tan-
 - **Cachexia** 791 tū in spiriti-
 - **Cachexia an sem-** bus 1021
 - **per præcedat** Caput lædētia
 - **hydropem** 817 204
 - **Cachochimia** 109 Capilli cur de-
 - **Calculorum re-** fluant 630
 - **num progno-** Cardiacā passio
 - **stica** 917 654. 655
 - **Calculi an pos-** Catarrho confe-
 - **sint generari a** rentia 567
 - **calido tempe-** Cataraeta oculo-
 - **rato** 918 rum 427
 - **Calculosis dormi** Cause salubres &
 - **re super dor-** insalubres 80
 - **sum an noceat** Cause morbi
 - **918** quot sint in ge

Aaaa. ij.

INDEX.

nere	81	Cerebri ventri-	
Causæ morborū		culos respirare	
calidorum	83		108
Causæ frigidorū		Cerebri substan-	
& siccorum hu-		tia an possit	
morum	83	inflammari	231
Causæ morborū		Charibitus	111
an semper con-		Chiragra	994
siderandæ	85	Cibi melancho-	
Cephalæa 165. quē		lici	331
locum occupat		Cibandū aliquan-	
166. signa 171.		do in morbi vi-	
cura 165. cur do-		gore	119
lorem per in-		Coitus an valeat	
terualla effi-		in morbis pi-	
ciat	174	tuitosis	974.
Cephalæa & he-			975
micrania pro-		Colicæ an in prin-	
gnostica	205	cipio cōueniāt	
Cephalæa an à ce-		narcotica	734
phalalgia diffe-		Colici doloris cau-	
rat	207	sæ 877. signa	
Cepæ cur noceāt		879. cura 883.	
capiti	231, 238	nocetia & con-	

INDEX.

- | | |
|--------------------|------------------|
| ferentia 891. | Contraria cōtra- |
| prognost. 893 | riis curatur 89 |
| Columella 534 | Conuulsio 334 an |
| Cōcoctio duplex | fit morbus vel |
| 134. præcedit | symptoma 337. |
| digestionē 139. | diuisio & cau- |
| an à frigido | sæ 338. an sit |
| fiat 139 | curabilis 343. |
| Concoctio quot | quod fieri pos- |
| modis lædatur | fit à flatu 341. |
| 690 | signa 345. cura |
| Cōcoctionis cor- | 348. progno- |
| ruptæ causæ | stica 359 |
| 691 | Cōuulsio ex hel- |
| Cōcoctionis corru- | leboro quomo |
| ptæ signa 694. | do intelligatur |
| cura 696. pro- | 359 |
| gnost. 700, 701 | Cōuulsio ab ina- |
| Cōcoctio an læ- | nitione an sem |
| datur à siccita- | per mortalis |
| te & humidita- | 364 |
| te absque aliis | Conuulsio ex re- |
| qualitatibus | pletionē, an à |
| 702 | febre sepe cu- |

Aaaa.ij.

I N D E X.

- | | |
|--|---|
| <p>rari possit 364</p> <p>Conuulsio incu-
rabilis 365</p> <p>Cordialis medi-
cina quot mo-
dis dicatur 664</p> <p>Cordi nocentia
& conferentia
666</p> <p>Coriza 556</p> <p>Corpus fluidum
quomodo in-
telligatur 85</p> <p>Corpus respirat
etiam per ve-
nas 108</p> <p>Corporibus sanis
quod nutriti-
um 121</p> <p>Cura singulorum
morborum in ge-
nere 87</p> <p>Curationis præci-
pua intentio 88</p> | <p style="text-align: center;">D</p> <p>Delirium fit in-
terdum non pa-
tiente cerebro
230</p> <p>Dentes an per se
patiantur 516</p> <p>Dentes an ab aliis
offib' ferant 516</p> <p>Dentes an possint
apostemari 516</p> <p>Dentium dolor
458. causa 459.
signa & cura
511. 514. progno-
stica 515</p> <p>Dentibus nocen-
tia 514</p> <p>Destillatio quid
sit 556</p> <p>Destillationum cau-
sa 557. indi-
cia 559. cura 561
prognost. 567</p> |
|--|---|

INDEX.

- Destillatiões quæ
veræ vocentur 568
Desideriū an sit
ex cerebro 973
Diabetis signa, &
ei' cura 928, 930
Diabeti conferen-
tia, & eius pro-
gnostica 333
Differentiæ par-
tiū quatuor 62
Difficultas spirā-
di an proue-
niat tantū à
læsione spirita-
lium 590
Digestio 135. du-
plex 140. an
sit humorum
alteratio 139
Discordia Auicē-
næ cum Gale-
no in cura ap-
petitus canini
710
Diuretica an in
principio cal-
culi conueniāt
918
Dolor, & eius spe-
cies 874
Dolor an fiat ab
humido tantū
207
Dolor an fiat à so-
lutione conti-
nui tantū 207
Dolor auriū 449
causæ 450. in-
dicia 451. cura
453, 460. pro-
gnostica 462
Dolor dentium
458. causæ 459.
signa & cura
511. curatia 514.
prognostica 515

AAAA.iiij.

INDEX.

Dolores dentium	an magis calidi- tate, quàm fri- giditate fiât 516	rarum cōferen- tia 995
Dolor stomachi	& eius causæ 719. signa 720. cura 722. confe- rentia & nocen- tia 727. progno- stica 728	Dysenteria quid, & eius causæ 831 Dysenteria signa 833. cura 836. cō- ferentia 844. prognostic. 845
Dolori maximo	an semper phle- bothomia con- ferat 730	Dysenteria san- guinea an bilio- sa deterior 848
Dolor colic⁹, cau- sæ 877. signa 879. cura 883.	nocentia & cō- ferētia 891. pro- gnostica 893	Dysenteria ab a- tra bile an sem- per lethalis 848 δυσεντερία 935 δυσπνοία, & ei⁹ cau- sæ 580. 581
Dolor iunctura- rum 994	Doloribus iūctu	E Elemētum phy- sicum & medi- cum 17 Elemēta quot 18 Elementa homi- nis 18, 19

INDEX.

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| Elemētorum do- | lidi & sicci 288 |
| ctrina an sit v- | Epilepsia an ha- |
| brilis 12 | beat cum apo- |
| Empyema 620 | plexia eandem |
| Empyematis si- | causam & locū |
| gna 623. cura 625 | affectum 288 |
| prognostica 629 | Epilepsiæ causa |
| Empyema an per | immediata an |
| vitionē vel in- | fit vapor absq; |
| citionē curan- | materia fouen- |
| dum 633 | te 288 |
| Epilepsia an sit | Epulis qd sit 518 |
| morb ⁹ vel sym | Euacuatio quot |
| ptoma 267 | modis fiat 150 |
| Epilepsia excitā- | Euacuatiōi quot |
| tia, curatiāque | requirūtur 152 |
| 184 | Euacuatio nimia |
| Epilepsia per cō- | morbū parit |
| sensū an post | 153 |
| pubertatem cu | Euacuationes |
| retur 288 | quādo non de- |
| Epilepsia an cure | beant fieri 155 |
| tur per omnē | Euacuatio an fie |
| mutionē ca- | ri possit in prin |

INDEX.

cipio morbi ma-
 teria. nō turgē-
 te 455
 Euacuatio an sit
 optima, si copia
 humorū exeat
 156
 Excremēta quan-
 doq; partes, quā-
 doq; signa sunt
 92
 Extremis morbis
 extrema reme-
 dia 131
F
 Facultas triplex
 65
 Facultas vitalis
 an naturali sit
 prior 72
 Facultates omnes
 ubi collocētur
 66
 Facultates pro-
 priæ corporis
 quot sint 68
 Facultates natu-
 rales an sint in
 qualibet cor-
 poris parte 71
 Facultates an ali-
 bi sint, quā-
 in animato cor-
 pore 72
 Facultatum co-
 gnitio utilis 72
 Febris quid & vn-
 de dicatur 1009
 Febris an sit cali-
 da & sicca cō-
 plexio 1020
 Febris an diuida-
 tur in morbū
 & accidēs 1020
 Febris ephemeræ
 causæ, signa &
 cura 1021, 1022,
 1023

INDEX.

- | | |
|--------------------|--------------------|
| Feb. biliosa 1049 | 1041. 1043. 1048 |
| Febris ephamera | Febris tertiana an |
| - an sit acciden- | possit per ac- |
| - talis 1029 | cessionē de ter- |
| Febris hectica an | tio in tertium |
| possit per se | 1064 |
| incipere 1038 | Febres acciden- |
| Febris hectica cur | - tales 10 |
| - difficilis cogni | Febrium diuisio |
| - tionis & facilis | 1010 |
| - curationis 1038 | Febrium causæ |
| Feb. hepiala 1095 | in genere 1012 |
| Feb. lipyria 1099 | Febrium tempo- |
| Febris quotidiana | - ra 1015 |
| 1067 | Febrientibus an |
| Febris quartana | omnes fructus |
| 1073 | noceant 1065 |
| Febris tertiana | Febribus an ali- |
| - mortha 1059 | quod vinū con- |
| Febris tertiana | ueniat 1065 |
| - pura 1047 | Febris sanguineæ |
| Febris tertianæ | genera 1081. |
| - causæ, signa, cu | causæ 1083. si- |
| - ra, prognostica | gna 1084. cura |

INDEX.

1085 . progno-	an conueniant
stica 1088	styptica 894
Febris putridæ di-	Fluxus hepaticus
uisio & nume-	an requirat te-
rus 144, 1040.	nuem victum
Feb. caufon 1089	894
Finis medicinæ 9	Fluxus hepaticus
Fluxionum dif-	an fit facilis cu-
ferentia 543	rationis 894
Fluxus in apo-	G
stematis hepa-	Generatio nō est
tis an mortalis	simplex natu-
758	ræ actio 68
Fluxus vehemēs	Gingiuarum affe-
an in principio	ctus 518. caufæ
fit compescen-	519. figna 520
dus 848	Gingiuæ cur cor-
Fluxus hepatici	rodantur 521
fpecies 850. cau-	Glaucoma quid
fæ 852. figna 855	427
cura 858. cōfe-	Gonagra 994
rentia 893. pro-	Gonorrhœa 964
gnofit. 893, 894	caufæ & figna
Fluxui hepatico	965. conferen-

INDEX.

stia 968. progno	niat	cerussa
stica 968	758	
Gonorrhoea an	Hepatis aposte-	
fit propria pas-	matib ⁹ an con	
sio pudēdi vel	ferāt styptico	
expultricis fa-	ra, q̄ in morbis	
cultatis 974	stomachi 188	
Grauedo 555	Hepatis aposte-	
Gurgulio 533	mati an confe-	
Gutturi nocentia	rat sectio venæ	
555	in pede, an in	
H	brachio 758	
Hectica 1030	Herniarum spe-	
Hemicrania 195.	cies 953, 954	
causæ, signa 196.	Homo an possit	
cura 199	viuere sine ci-	
Hepatis imbecil-	bo vel plures	
litas 730. causæ	dies 702	
731. signa 732. cu	Humidiora mem	
ra 733. conueni-	bra quæ 130	
entia 780. pro-	Humiditas quo-	
gnostica 141.	modo efficiat	
Hepati supercale	dolorem 209	
facto an cōue-	Humores quid	

INDEX.

sint 1 30, 147 an semper ma
 Humores unde 812 la 805
 generentur, & Hypofarca an de
 quomodo 41, 42 terior a forte 818
 Humores mali 847 an possint nu- Ictericia qd 760
 trire 57 Ictericici cur fla-
 Humores calidi 812 tuosi non sint
 & tenues num 774
 præparatione Ictericia ante se-
 indigeāt, ante- 8 ptimū an sem-
 quam euacuen per mala 775
 tur 139 Ileus causæ signa
 Humores crassi 897 . curatio
 an coquendi & 899. nocētia &
 maturandi 139 conferētia 901.
 Hydropis species 892 prognostica
 798, 800. cau- 902
 sæ 801. signa 8 Ileus an possit ge-
 804. curatio nerari ex stran-
 807 guria 903
 Hydropum signa 8 Ileus an possit cu-
 815 rari per fluxū
 Hydropi tussis 903
 urinae 903

INDEX.

Inflāmatio quid	L
208 fit	518 Lac an possit ad-
Inflammationis	Inberi in oph-
818 iecinoris causæ	thalmia 421
741. signa 746.	Lac an phthificis
cura 747. pro-	conferat 633
gnostica 756	Lapis renum &
Inflāmatiōi he-	vesicæ 905
patis an conue	Lapis renū num
niat aqua hor-	possit auferri
deacea 758	per incisionem
Insania quid 366	918
Inginorosi qui di	Lapidē generan-
cantur 731	tia & curantia
Ixovēia quid 934,	1003
945	Lethargi 233. cau-
Ischuriæ causæ	sæ 135. signa 136
& signa 946. cu-	curatio 241. pro
ratio 948	gnostica 247
Ischuriæ & stran	Lethargi & phre-
gurix cōferen-	nitidis discri-
tia 949. progno	men 239
stica 950	Lethargi & apo-
Ischias quid 994	plexiæ discri-

INDEX.

men	239	820	
Letharg' an fiat		Lienteria	num
primo in cere-		detur, in qua	
bro	262	sint semper aci-	
Lethargus ang-		ductus	831
gni possit à me-		Linguae bathra-	
lancholia	262	chus quid	473
Lethargo an con-		Lippa quid apud	
ueniat sectio ve-		Arabes	407
næ, si ab humi-		Locus affectus in	
ditate & frigi-		hæmicrania	195
ditate fiat	263	Locus affectus in	
Lethargo an re-		lethargo	234
pellentia occi-		Locus affectus in	
piti adhibean-		paralitide	481
tur	263	Locus affectus in	
Leuitatis intesti-		dolore dentiū	
norum causæ			509
821. signa	823.	Lotium quid, &	
cura	825. confe-	eius diuifio	95
rentia	828. pro-	Lotium optimū	
gnostica	829	quod	98
Lienis signa	778	Lotiū an sit ex-	
<i>Aseneia</i> quid		crementū tan-	

INDEX.

- tum renum 99,
100
Lipopsychia &
syncopis quid
differant 670
M
Mali habitus 791
signa & cura
793, 794. pro-
gnostica 798
Medicina quid 9
Medicamenti pur-
gat. non potest
dari certa qua-
ritas 151
Medicamentorum
species 159
Melancholia, &
eius diuifio 44
Melancholiæ ge-
neratio 45
Melancholia, mor-
bus 366
Melancholiæ mor-
bi species 367.
causæ 369. signa
376. cura 382
Melancholia, mor-
bus quomodo
differat ab hu-
more melan-
cholico 395
Melancholia cō-
firmata an pos-
sit sanari 395
Melancholia per
inferiora pur-
ganda 386
Melancholiæ per
cōsensum cura
386
Melancholiā in-
citantia 391
Melancholiā cu-
rantia 391
Melancholici cur
fiant epileptici
394

Bbbb.i.

INDEX.

Membra quid sint	Mensium proflu-
41	uii, signa, cura
Membra frigidiora	988. prognosti-
quæ 30	ca 983
Membra cur sen-	Modus cibandi
sus impressio-	in morbis, an
nem non reci-	cū apostemate
piant 402	223
Membrorum di-	Modus segregandi
uisio 42, 43	lac à sero 386
Memoratricis of-	Modi reuulsionū
ficiū 66	an sint sex tan-
Memoria quid 75	tum 208
Menses prouocā-	Morbus quid sit
tia 983	75
Menses suppri-	Morbus regius
mentia 992	ante septimum
Mensium suppres-	cur malus 477
sionis causæ	Morbus vetera-
977. signa 978.	nus 234
cura 982. pro-	Morbi status ve-
gnostica 984	rè non cogno-
Mensium proflu-	scitur 119
uii causæ 986	Morbi comitalis

INDEX.

265. causa 267. Morborum nu-
 signa 271. cura merus 86
 274. prognosti- Morborum astu-
 ca 286 torum cur non
 Morbi regii 74. sunt certa præ-
 59. causa 761. sagia 553
 signa 265. cura N
 466. cōferentia Natura quid sit
 472. prognosti- 13
 ca 477 Natura humana
 Morbi omnes an quid 14
 cognosci pos- Natura quot mo-
 sint per urinā dis accipiatur 15
 86 Naturalis sciētia
 Morbi similes medico neces-
 & instrumen- saria 12
 tarii 86 Nausea quid, &
 Morbi an cogno quotuplex 67.
 scantur, non co 34
 gnito affectu Nauseæ causæ
 secundum na- 674
 turam 85 Nephritidis cau-
 Morborū genera sæ 920. signa
 77 921. curatio 923.
 Bbbb. ij.

INDEX.

- | | |
|--|--|
| prognost. 927 | ceat hepati 758 |
| Nerui an oriantur à corde 364 | O |
| Neruis an vsus calidorum frequēs profit 334 | Obstructio an sit causa missionis sanguinis 148 |
| Neruis calor qd efficiat 334 | Oculi an sint complexiōis igneae 425 |
| Notæ temperaturarum in genere 30 | Oculis an prosint stupefacientia 425 |
| Nutrire in accessionibus quandoque licet 129 | Operatio naturalis quibus perficitur 61 |
| Nutritio quid sit 58 | Operatio quot modis lædatur 62 |
| Nutritioni necessaria quæ 69 | Ophthalmia qd 396 |
| Nutrimētū non datur ratione morbi, sed virium 18 | Ophthalmiæ species 397. causæ 399. signa 403. cura 407. localia 409. no- |
| Nutrimētū viscosum an no- | |

INDEX.

centia, progno	dis prognosti-
stica 424	ca 668
Ophthalmia quo	Palpitatio & tre-
modo cogno-	mor an idē 670
scitur, longè du	Paraphrenitis vn
ratura 425	de fieri possit
Orthopnoæ cau	231
sæ 581. indicia	Paralysis 314 cau
584. cura 585.	sæ 316. signa 320
conferētia 588	cura 321
Orthopnoæa an	Paralyfim gene-
possit fieri abs	rantia 330. cu-
que febre 590	rantia 331
Ossa etiā aposte-	cur in Paralyfi,
mātur, teste A-	sensu remanen
uicen. & quo-	te, solus amitta
modo 232	tur motus 315
Oxyrhodinū an	Parotidum cau-
applicādum in	sæ & indicia
phrenitide 228	496. cura 499.
Ozæna quid 452	prognostic. 500
Ozænæ causæ 453	παράφρενα 532
P	Partes medicinæ
Palpitationis cor	quot 11
	Bbbb. iij.

INDEX.

- Peripneumonia** an sint eiusdē naturæ. 156
 & ei' causæ 593
 indicia 595. cura 593. conferētia 600. prognostica 602
Peripneumonia an fiat per viā fluxus 603
Peripneumonia cur fiat à pleuride, & non e-conuerso 600
Peripneumonia pituitosa an sit biliosa deterior 603
Peripneumonia ab aliis morbis ortæ, an phlebotomia conferat 603
Pharmaca si plura misceantur, an sint eiusdē naturæ. 156
Pharmaca an proprios humores attrahant 157
Pharmaca à nutrimento quid differant 158
Pharmacū an omni tēpore possit exhiberi 158
Pharmaca an indifferenter omnes humores purgent 158
Pharmaco assumpto an dormiendum 164
Phrenitidis diuissio & definitio 211. causæ 212. indicia 214. cura. 217. prognostica 219

INDEX.

- | | |
|---|---|
| Phrenitis quānā
mitior 230 | recens confe-
rat 632 |
| Phrenitis an pos-
sit fieri absque
febre 231 | Pituita & eius di-
uisio 45 |
| Phrenitis à san-
guine an sit si-
gnum exitio-
sum 231 | Pituita quomo-
do falsa fieri
possit 50 |
| Phrenitidi an fri-
gida cōueniant
231 | Pituita non po-
test adeò assari,
vt nigra eua-
dat 373 |
| Phthysis 619. cau-
sæ 621. indicia
222 cura 625. pro-
gnostica 629 | Pituita an frigi-
dior atra bile 56
quomodo ex Pi-
tuita fit melan-
cholia 56 |
| Phthysis an à
siccitate per se
fiat 632 | Plenitudo ad vi-
sa & ad vires 111 |
| Phthysi an ab-
stergentia solū
conferant 631 | Plenitudo an sē-
per indicet de
secunda vena
143 |
| Phthysicis an zuc-
carum rosaceū | Plethora quid, &
quotuplex 109 |

Bbbb.iiij.

INDEX.

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| Plethora quomo | prognost. 457 |
| do curatur 110 | Potentia quid 63 |
| Pleuritis quid, & | Præparatio an sit |
| quotuplex 636. | idem cum dige |
| causæ 638. in- | stione & deco- |
| dicia 639. cura | ctione 139 |
| 642. conferen- | Præparatio quot |
| tia 649 | modis fiat 141 |
| Pleuritis an à te- | Propriapismus |
| nui pituita fiat | quid, & ei ⁹ cau |
| 652 | sæ 969. cura 970 |
| Pleuritis an dete- | Propositum artis |
| rior in sinistro | medicæ est sa- |
| quàm in dex- | nitas 9 |
| tro latere 653 | Principiũ & ele- |
| Podagra quid | mētum an idē |
| 994 | 20 |
| Polipus quid 457 | Pubertas quot |
| causæ & cura | annis duret |
| 509 | 286 |
| Polypum & ozæ | Pubertatis tem- |
| nas curantia | pus 36 |
| 457 | Pulsus diuisio |
| Polypi & ozænæ | 102. vehemens |

INDEX.

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| 102. plenus, va- | mido tantū 633 |
| cuus 104 | Purgatio quid |
| Pulsus ex tempe- | fit 151 |
| rie & ætate 104 | Purgatio an non |
| Pulsus ex anni | indigētib ⁹ pro- |
| temporibus & | ficiat 158 |
| regione 105 | Purgare an liceat |
| Pulsus virorum | in die critica |
| & foeminarum | 158 |
| discrimen 106 | Purgatio cur dif- |
| Pulsus ex som- | ficilis sub cane |
| no & vigilia | 163 |
| 106 | Quid vitandum |
| Pulsuum genera | in purgantibus |
| 107 | medicamentis |
| Pulsus an dilate- | 154 |
| tur ex reple- | Qui apti nō sunt |
| tione 107 | ad purgādū 154 |
| Pulmo an sit in- | Putredo an sit |
| strumentū an- | causa mittendi |
| helitus pro- | sanguinem 150 |
| prium 590 | Q |
| Pulmo an vlcera | Qualitates duæ |
| ri possit ab hu- | an sint in ele- |

INDEX.

- | | | | |
|------------------|-------|--------------------|--------------|
| mento | 21 | ius causæ | 1067 |
| Quartanæ cau- | | Quotidianæ fe- | |
| sæ & signa | 1074 | bris signa | 1068 |
| cura | 1076. | Quotidianæ sim- | |
| pro- | | plicis cura | 1073 |
| gnostica | 1081 | | |
| Quatuor tempo- | | R | |
| ra an reperian- | | Ramicum spe- | |
| tur in omni | | cies | 955. causæ |
| morbo | 1019 | 958. signa & cu- | |
| Quot modis di- | | ra | 959. progno- |
| catur aliquid | | stica | 963 |
| frigidū vel ca- | | Ranūculus quid | |
| lidum | 28 | fit | 523 |
| Quomodo expi- | | Ratiocinatricis | |
| tuita fieri pos- | | officium | 67 |
| fit melancho- | | Ratio diuersitatis | |
| lia | 56 | febrium quæ | |
| Quomodo ali- | | 1043 | |
| quid per se per | | Raucedo | 556 |
| consensum af- | | Reficiētia an præ- | |
| fici cognosca- | | cedere debeant | |
| tur | 351 | stiptica in syn- | |
| Quotidiana fe- | | copi | 630 |
| bris quæ, & c. | | Regio cōsideran- | |

INDEX.

da in tempera-	Sanguis vnde acci-
turis 31	piat suum co-
Renum & vesicæ	lorem 45
calculi 905. cau	Sanguinis sedes 45
sæ 905. signa	Sanguis sincerus
908. cura 911	in venis nõ re-
Repletio duplex	peritur 57
110	Sanguis quot mo-
Repletio nimia	dis inutilis 58
quid agat 110	Sanguis spumo-
Resolutio an fiat	sus an semper
tantum sensu	indiciu affe-
omisso 333	cti pulmonis
Reuulsionu mo-	617
di 209	Sanguinis missio
Rifus an possit	etiam in vige-
esse in melan-	sima die fieri
cholia 389	potest 58
Robur sanis ser-	Sanguinis missio
uadum vel au-	an tantum ma-
gendum 121	ne fieri debeat
S	148
Sanguis quid, &	Sanguinis missio
eius diuissio 44	an visum he-

I N D E X.

betet	149	pleuritidi con-	
Sanguinis missio		ueniat	231
an seper in ple		Sectio venæ an	
nitudine fiat		omni ophthal-	
149		miæ conueniat	
Sanguinis mitten-		425	
di scopus	138	Sedimentum vri-	
Sanguinis reiecta-		næ, an semper	
tio per superio		bonū signum	
ra an semper		100	
mala	617	Senes quādoque	
Sanitas quid sit		sectionem ve-	
74		næ perferunt	
Sanitatis cogni-		146	
tio an medico		Senum tempe-	
necessaria	85	ries	37
Sanitati quæ re-		Sicciora membra	
quiruntur	75	quæ	30
Sciatica quid	955	Signa optimæ tē-	
Scotomaticus af-		peraturæ	33
fectus an suffu		Signa morborū	
sionibus oculo		in genere	92
rū differat	148	Signorum alia di	
Sectio an omni		uisio	93

INDEX.

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| Signa per vrinā | ritiei an confe- |
| an certiora, q̄ | rat oē lac 790 |
| per pulsū 107 | Sputi sanguinis |
| Signa vniuscu- | cura 609. |
| iisque humo- | Stat ⁹ morbi quo- |
| ris 102 | modo cognosci |
| Somnus quomo | tur 1018 |
| do malus 247 | Sternutamētum |
| Sonitus aurium | an sit in distil- |
| 473 causæ 474 | latione salubre |
| signa 477. cura | 569 |
| 778. curantia | Strāgulatio quid |
| 484 | 540 |
| Spasmus 337 | Strangulatio an |
| Spiratio omnis | possit fieri ex- |
| an deficiat in | inflāmatione |
| apoplexia 310 | asperæ arteriæ |
| Splenis affectus | 554 |
| cura 784 | Stranguria quid |
| Splenis humores | 935 |
| an educi pos- | Stranguria cuius |
| sint pervias vri- | facultatis sym- |
| næ 789 | ptoma 938 |
| Splenis omni du | Stranguriæ pro- |

INDEX.


- gnostica 944
 Subuersio 677
 Sudor in lethar-
 go deicit vires
 247
 Suffusionis cau-
 sa 429. signa
 433. cura 437.
 obseruationes
 444. prognosti-
 ca 446
 Suffusio omnis
 an per chyrur-
 giam possit cu-
 rari 447
 Surditas quomo-
 do à graui audi-
 tu differt 446
 causæ 446. si-
 gna 449. cura
 490. prognosti-
 ca 495
 Σωάτην quid
 540
 Syncope 656. pro-
 gnostica 668.
 indicia 658. cu-
 ra 660
 Syncopa frequē-
 ter accidens an
 sit signum mo-
 tale 670
 Singultus nō de-
 finens quid si-
 gnificet 686
 T
 Tabes qd sit 619
 Tabis species 619
 Tabidis cōferen-
 tia 628
 Tactus solus in-
 dicat tēperie 33
 Ταράξις quid 402
 Tēperies quid, &
 quotuplex 22, 23
 Theriaca an ve-
 nenosa & non
 exhibenda 904


INDEX.

Tinesini curatio	870	Tympanites an à frigido fiat	817
Tinnitus aurium	476	V	
Tonsillarum cura	537	Vacuatio quot de causis fiat in principio morbi	180
Tremor in paralitide cur bonus	333	Venæ sectio quo tēpore fieri debeat	143
Tremoris cordis cura	660	Venæ sect. an vsque ad syncope faciēda	678
Tumores an fieri possint in gutture absque dolore	554	Qui multam & paucam venæ sectionē expostulant	145
Tussis curatio	574	Venæ sectionem quādoq; senes perferunt	146
In omni tussi sic ca, nū cōueniāt pilulæ bechicæ	579	Vertigo quid	249
Tussis in hydrope an sit signū malum	818	Vertigo per consensum an attribuenda ca-	

INDEX.

piti	263	dificantia	473
Vertigo omnis		Vlcerũ brevis Ga	
an per sectionẽ		leni cura	471
arteriæ curan-		Vomitũ an sem	
da	263	per possit pro-	
Viçt ⁹ ratio à qui-		uocari	688
b ⁹ sumitur	116.	Vrina aquosa	220
vt instituẽda	118	Vrinæ retentio	945
Viçtus ratio per		Vrinæ stillicidiũ	
ætates	112	& causæ	926
Viçtus ratio ex		Vrinæ stillicidii	
tẽporibus an-		cura	940
ni	124	Vrinæ in volun-	
Viçtus plen ⁹	129	tario exitui cõ-	
Vinum cur in pa-		ferentia	954
ralysi non con		Vrinæ incõtinen-	
cedatur	314	tia, & eius cau-	
Vinum an in syn-		sæ 951. signa &	
copi exhiben-		cura	153
dum	670	Vrinæ sedimen-	
Visio an fiat extra		tum an sem-	
mittẽdo	425	per bonũ	100
Vlçus auriũ	464		
Vlcera auriũ mũ-		FINIS.	





1. F.